
PRO SCIENTIA ATQUE SALUTE
REPUBLICÆ
LIBRARY OF
THE NEW YORK BOTANICAL GARDEN
Septemb 1899
R.W. Gibson. Invt

Catalogue raisonné

DES

Champignons des Pays-Bas.

PAR

C. A. J. A. OUDEMANS.

Verhandelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam.

(TWEEDE SECTIE).

Deel XI.

AMSTERDAM,
JOHANNES MÜLLER.
Juni 1905.

VERHANDELINGEN

DER

KONINKLIJKE AKADEMIE

VAN

WETENSCHAPPEN

TWEEDE SECTIE

(Plantkunde - Dierkunde - Aardkunde - Delfstofkunde - Ontleedkunde - Physiologie - Gezondheidsleer en Ziektekunde)

DEEL XI

AMSTERDAM — JOHANNES MÜLLER
Juni 1905

Gedrukt bij Joh. Enschedé en Zonen. — Haarlem.

INHOUD.

C. A. J. A. Oudemans. Catalogue raisonné des Champignons des Pays-Bas.

Catalogue raisonné

DES

Champignons des Pays-Bas.

PAR

C. A. J. A. OUDEMANS.

Verhandelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam.

(TWEEDE SECTIE).

Deel XI.

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN

AMSTERDAM,
JOHANNES MÜLLER.
1904.

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN

PRÉFACE.

Le „Catalogue raisonné des Champignons des Pays-Bas" qu'il nous importe de voir publié dans les Traités de l'Académie royale des Sciences à Amsterdam, comprend les noms de tous les Champignons (au nombre de 4100 à peu près), rencontrés jusqu'à présent (1901) dans notre patrie, mais qui, au grand regret de tous ceux qui s'intéressent pour notre flore mycologique, se trouvent dispersés dans un grand nombre d'écrits et de journaux, remplissant, quant à l'époque de leur apparition, un laps de temps de 70 années (1834—1904) à peu près.

On peut se figurer aisément combien, dans de telles circonstances, il se perdra de temps, d'abord à rechercher si telle espèce p. ou m. rare de champignon, rencontré en herborisant, et dont la détermination vient d'être accomplie, doit être comptée parmi les formes connues; puis à préciser l'endroit où une espèce reconnue indigène, a été publiée, et cela d'autant plus que tantôt d'anciens noms auront été remplacés en beaucoup de cas par des noms modernes, tantôt la classification des espèces et des genres pourra être modifiée à une ou plusieurs reprises au cours des temps.

Une conséquence inévitable des difficultés énumérées, c'est que non seulement tel champignon, faisant partie de notre flore mycologique, se voyait, dans les imprimés de diverse origine, introduit plusieurs fois dans le système sous des noms divers, mais encore que la place qu'on lui réservait parmi ses congénères, variait sensiblement selon les idées des auteurs, dont les manuscrits n'avaient pas été au préalable contrôlés par des autorités plus versées en questions systématiques.

Une telle expérience, faite à plusieurs reprises par des personnes s'occupant d'herborisations mycologiques, dut forcément faire naître

le desir, depuis toujours plus vif, que dans cet état de choses plus ou moins chaotique, un peu d'ordre s'établît, et qu'un effort sérieux fût fait pour composer un guide sûr à l'usage de ceux, qui, plus particulièrement, s'intéressent à des questions de mycologie systématique. L'auteur du présent Catalogue, reconnaissant ce que ce désir avait de légitime, et fort d'une expérience de 60 ans en matière mycologique, résolut d'essayer d'y répondre, d'autant plus qu'il dispose d'une bibliothèque très étendue, d'une série d'herbiers dans le commerce, et d'un herbier particulier assez complet.

Le manuscrit qu'à ce moment je destine à la publication, m'a occupé deux ans. Il n'en fallait pas moins pour collectioner et comparer tous les écrits publiés sur notre flore mycologique dans une espace d'environ 70 années et de me tracer le chemin pour bien réussir en consultant les ouvrages les plus récents et les plus reputés sur la matière traitée.

Le cadre systématique dans lequel j'essayerai à concentrer mes études, est emprunté au Tome XIV de la Sylloge de Mr. le Prof. P. A. Saccardo, tandisque les livres et les journaux, publiés dans notre patrie, et qui m'ont servi pour accomplir la tache que je me fus imposée, portaient les titres suivants:

1. Tijdschrift voor Natuurlijke Geschiedenis en Physiologie, uitgegeven door J. van der Hoeven en W. H. de Vriese. — Leiden, 1834—1845. — XII Vol. 8°.

2. Prodromus Florae Batavae, Tome II, pars 3 (1858) et pars 4 (1866).

3. Flora Batava, 1800—1904, XVI vol. 4° avec 1724 planches coloriées.

4. Nederlandsch Kruidkundig Archief. — 1e Serie, Deel I—V (1846—1860); 2e Serie, Deel I—VI (1874—1895); 3e Serie, Deel I—III (1899—1904). — Leiden, Amsterdam, Nijmegen.

5. Archives Néerlandaises, publiées par la „Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen" à Harlem. — Tome II (1867), Tome VIII (1873), Tome XIV (1879), Tome XV (1880).

6. Verslagen en Mededeelingen der Kon. Akademie van Wetenschappen", 2e Serie, Deel X (1876); 2e Serie, Deel XVIII (1883); 3e Serie, Deel II (1885); 3e Serie Deel VII (1890).

7. Zittingsverslagen der Kon. Ak. v. Wetens. 1896 (p. 224—233); 1897 (p. 155—164); 1900 (110—157); ibid. (p. 290—305); ibid. (p. 347—362); ibid. (p. 380—393); 1903 (p. 18—59); ibid. (p. 110—111); 1904 (p. 745—749).

8. C. A. J. A. Oudemans Revisio Pyrenomycetum in Regno Batavorum hucusque detectorum (1884). Pas dans le commerce.

9. C. A. J. A. Oudemans. Révision des Champignons des Pays-Bas. — Tome I, 1892 (638 pages); Tome II, 1897 (518 p. et XVI pl. — Publication de la „Kon. Akad. v. Wetenschappen."

10. C. A. J. A. Oudemans, dans le Journal „Hedwigia" 1882, n°. 11, pag. 166; 1883, n°. 4, p. 61; 1883, n°. 6, p. 85; 1883, n°. 8, p. 113; 1883 n°. 8, p. 116; 1894, p. 17—21; 1898, p. 175—188 et p. 313—320.

11. C. A. J. A. Oudemans. Beiblatt zum bot. Centralblatt, 1902.

Dans cette liste mention n'a pas été faite de quelques publications peu volumineuses, telle que la „Liste provisoire des Fonges supérieurs" de feu le Dr. F. A. Hartsen; la „Flora Noviomagensis de feu Th. H. A. J. Abeleven, et autres, parce que à tout ce qui pourrait m'intéresser dans ces travaux, avait été fait justice déjà dans ma Révision des Champignons des Pays-Bas, et qu'il me parut désirable de ne pas étendre mon manuscrit outre mesure.

Après ou avant les places où nos champignons ont été publiés dans les ouvrages d'origine néerlandaise, j'ai fait mention des volumes et des pages de la „Sylloge" de Mr. Saccardo, et des „Pilze Deutschland's, Oesterreich's und der Schweiz" (1881—1903) de feu le Dr. G. Winter, afin que ceux qui désireraient pouvoir consulter une description de telle espèce trouvée, perdraient le moins de temps pour atteindre leur but.

L'ordre dans lequel se suivent les noms d'auteurs et des publications, n'est pas partout le même. Les initiales des auteurs néerlandais et des publications néerlandaises ordinairement ouvriront la série, abstraction faite des cas où le nom des Champignons fut appliqué par des savants étrangers.

Parmi les ouvrages les plus récents et les plus renommés que j'ai consultés, j'aime à mentionner:

1. Ernest Salmon: A Monograph of the Erysiphaceae. — Edited by the Torrey-botanical-Club. — New-York. 1900.

1. Arthur Lister. A Monograph of the Mycetozoa. London 1894 (with LXXVII plates). — Edited by the Trustees of the British Museum.

3. P. et H. Sydow. — Monographia Uredinearum. — Lipsiae, 1902, 1903 . . . . . .

4. H. Klebahn. — Die wirthswechselnden Rostpilze. — Berlin 1904.

5. H. Klebahn. — Kulturversuche mit Rostpilzen, communiqués dans: Pringsheim's Jahrbücher; Sorauer's Zeitschrift für Pflanzenkrankheiten; Jahrbuch der Hamburgischen wissenschaftlichen Arbeiten, XX, 1902; Berichte der deutschen botanischen Gesellschaft.

6. Une grande quantité d'Extraits, tirés des Journaux les plus en vogue de l'étranger.

J'espere continuer cet ouvrage par la publication de suppléments annuels, aussi longtemps que les conditions pour atteindre ce but ne me manqueront pas.

C. A. J. A. OUDEMANS.

Prof. honoraire de l'Université d'Amsterdam.

Arnhem, Mai 1904.

TABLEAU

des divisions systématiques appliquées à notre Catalogue [1] augmenté des noms génériques qui s'y rapportent.

I. Basidiomycetae.	Nombre d'espèces.
† Nidulariaceae.	
Nidularia	1
Cyathus	2
Crucibulum	1
Thelebolus	1
Sphaerobolus	1
	6
†[2] Lycoperdaceae.	
α. Diplodermeae.	
Tulostoma	1
Geaster	10
β. Lycoperdeae.	
Lycoperdon	15
Bovista	2
	28
†[3] Sclerodermaceae.	
Scleroderma	2
	2
†[4] Hymenogastraceae.	
Rhizopogon	1
Hydnangium	1
	2
†[5] Phallaceae.	
α. Phalleae.	
Ithyphallus	1
Mutinus	1
	2
	10

[1] Emprunté au tome XIV de la Sylloge du Prof. P. A. Saccardo de Padoue.

β. Clathreae.	Nombre d'espèces.
Clathrus	1
	1

†6 Agaricaceae.

* Haplophyllae.

§ Molles.

1. Leuc. sporae.

× AGARICEAE.

Amanita	11
Amanitopsis	2
Lepiota	22
Armillaria	6
Tricholoma	19
Clitocybe	30
Collybia	24
Mycena	53
Omphalia	15
Pleurotus	21

×× PAXILLEAE

Hygrophorus	23

××× LACTARIEAE.

Lactarius	35
Russula	11

×××× CANTHARELLEAE.

Cantharellus	10
Nyctalis	1

§§ Tenaces.

× MARASMIEAE.

Marasmius	20
Lentinus	1
Panus	2

×× LENZITEAE.

Lenzites	6

** Schizophylleae.

Schizophyllum	1

2. Rhodosporae.

Volvaria	6
Pluteus	5
Entoloma	9

	Nombre d'espèces.
Clitopilus	2
Leptonia	6
Nolanea	3
Eccilia	1
Claudopus	3
3. Ochrosporae.	
× AGARICEAE.	
Pholiota	18
Hebeloma	11
Inocybe	21
Flammula	7
Naucoria	9
Galera	6
Tubaria	4
Crepidotus	3
Bolbitius	1
Cortinarius	66
×× PAXILLEAE.	
Paxillus	6
4. Melampsorae.	
Agaricus	11
Stropharia	8
Hypholoma	15
Panaeolus	7
Anellaria	2
Psilocybe	10
Psathyra	8
Psathyrella	9
Deconica	1
Coprinus	26
Gomphidius	5
	671
†[7] Polyporaceae.	
× BOLETEAE.	
1. Leucosporae.	
Gyrodon	1
2. Ochrosporae.	
Boletus	38
Strobilomyces	1
Fistulina	1

×× POLYPOREAE.	Nombre d'espèces.
1. Leucosporae.	
Polyporus	12
Polystictus	10
Fomes	18
Poria	27
Trametes	5
Daedalea	7
Ceriomyces	1
Merulius	9
Solenia	3
2. Ochrosporae	163
Poria (*ex parte*).	
†8 Hydnaceae.	
1. Leucosporae.	
Hydnum	28
Caldesiella	1
Irpex	4
Sistotrema	3
Radulum	1
Phlebia	2
Grandinia	2
Kneiffia	1
Mucronella	1
2. Ochrosporae	
Odontia	2
	48
†9 Clavariaceae.	
Sparassis	1
Clavaria	10
Calocera (*voir p.* 11).	
Typhula	6
Pistillaria	3
†10 Thelephoraceae.	50
× THELEPHOREAE.	
1. Leucosporae.	
Craterellus	3
Stereum	11
Corticium	18

	Nombre d'espèces.
Peniophora	3
Cyphella	12
2. Ochrosporae.	
Thelephora	13
Hymenochaete	2
Coniophora	1
×× HYPOCHNEAE.	
Hypochnus	6
××× EXOBASIDIEAE.	
Exobasidium	1
	70
†[11] Tremellaceae.	
× AURICULARIEAE.	
Auricularia	1
Hirneola	1
×× PILACREAE.	
Pilacre	1
××× TREMELLEAE.	
Exidia	3
Ulocolla	2
Tremella	9
Naematelia	2
×××× DACRYOMYCETEAE.	
Ditiola	2
Dacryomyces	6
××××× PROTOCLAVARIEAE.	
Calocera	3
	30
†[12] Uredinaceae.	
× ENDOPHYLLEAE.	
Endophyllum	2
×× MELAMPSOREAE.	
1. Amerosporae.	
Cronartium	3
Melampsora	15
Melampsoridium	1
Melampsorella	1
2. Phragmosporae.	
Chrysomyxa	2
Coleosporium	7

	Nombre d'espèces.
Ochrospora	1
3. Dictyosporae.	
Puccimiastrum.	3
Thecopsora	3
Calyptospora	1
××× PUCCINIEAE.	
1. Amerosporae.	
Uromyces	29
2. Didymosporae.	
Gymnosporangium	5
Puccinia	98
3. Phragmosporae.	
Phragmidium	9
4. Dictyosporae.	
Triphragmium	1
5. Formae inferiores.	
Uredo	103
Caeoma	3
Aecidium	79
Peridermium	10
Roestelia	5
Ceratites	1
Ceratitium	
Aecidiolum	1
	382
†[13] Ustilaginaceae.	
× USTILAGINEAE.	
1. Amerosporae	
Ustilago	19
Sphacelotheca	1
Cintractia	1
2. Dictyosporae.	
Sorosporium	1
Thecaphora	2
×× TILLETIEAE.	
1. Amerosporae.	
Tilletia	3
Entyloma	7
Melanotaenium	1
2. Dictyosporae.	

	Nombre d'espèces
Urocystis	6
Doassansia	2
3. Genera dubia.	
Graphiola	1
	14

II. Ascomycetae.	Nombre d'espèces.
†[14] Perisporiaceae.	
× ERYSIPHEAE.	
Podosphaera	1
Sphaerotheca	2
Phyllactinia	1
Uncinula	3
Microsphaera	6
Erysiphe	5
×× EUROTIEAE.	
Eurotium	3
Kickxella	1
××× PERISPORIEAE.	
1. Hyalosporae.	
Anixia	1
Apiosporium	4
2. Phaeosporae.	
Chaetomidium	1
Ascotricha	1
3. Hyalodidymae.	
Asterina	1
Asterella	1
4. Phaeophragmiae.	
Perisporium	3
××××CAPNODIEAE.	
Capnodium	4
Antennaria	
	38
†[15] Sphaeriaceae.	
× SPHAERELLEAE.	

	Nombre d'espèces.
1. Hyalosporae.	
Carlia (*Laestadia*)	1
Phomatospora	1
2. Hyalodidymae.	
Mycosphaerella (*Sphaerella*)	34
Epicymatia	1
Stigmatea	4
Venturia	7
3. Hyalophragmiae	
Sphaerulina	2
×× PLEOSPOREAE.	
1. Hyalosporae.	
Physalospora	2
Ditopella	1
2. Hyalodidymae.	
Didymella	14
3. Phaeodidymae.	
Didymosphaeria	1
4. Hyalophragmeae.	
Metasphaeria	15
5. Phaeophragmiae.	
Leptosphaeria	15
6. Hyalodictyae	
Catharinia	1
7. Phaeodictyae	
Pleospora	17
Pyrenophora	2
Scleroplea	1
××× MASSARIEAE.	
1. Allantosporae.	
Enchnoa	1
2. Phaeodidymae.	
Massariella	2
3. Hyalophragmiae	
Massarina	1
4. Phaeophragmiae.	
Massaria	5
5. Phaeodictyae.	
Pleomassaria	3
Karstenula	2

6. Scolecosporae.	Nombre d'espèces.
Therrya	1
××××CLYPEOSPHAERIEAE.	
1. Phaeosporae.	
Anthostomella	2
2. Hyalodidymae.	
Apiospora	2
3. Hyalophragmiae.	
Hypospila	2
4. Phaeophragmiae.	
Clypeosphaeria	1
5. Scolecosporae.	
Linospora	2
×××××SPHAERIEAE.	
1. Hyalosporae.	
Trichosphaeria	2
2. Phaeosporae.	
Bombardia	1
Rosellinia	9
Chaetomium	5
3. Hyalodidymae.	
Bertia	1
Melanopsamma	1
4. Phaeodidymae.	
Amphisphaeria	1
5. Hyalophragmiae.	
Zignoëlla	1
Melomastia	1
Lasiosphaeria	6
Herpotrichia	1
6. Phaeophragmiae.	
Melanomma	5
Trematosphaeria	1
Chaetosphaeria	1
7. Phaeodictyae.	
Teichospora	1
Pleosphaeria	1
××××××SORDARIEAE.	
1. Phaeosporae.	
Sordaria	8
Hypocopra	14

	Nombre d'espèces.
Coprolepa	3
Philocopra	3
2. Phaeodidymae.	
Delitschia	7
3. Phaeophragmiae.	
Sporormia	10
××××××CUCURBITARIEAE.	
1. Allantosporae.	
Nitschkia	2
2. Hyalosporae.	
Botryosphaeria	1
3. Hyalodidymae.	
Lizonia	1
4. Phaeodidymae.	
Otthia	3
5. Phaeodictyae.	
Cucurbitaria	10
	311
†[16] Ceratostomaceae.	
1. Hyalosporae.	
Ceratostomella	2
Gnomoniella	8
2. Phaeosporae.	
Ceratostoma	1
3. Hyalodidymae.	
Gnomonia	7
4. Hyalophragmiae.	
Ceratosphaeria	1
5. Scolecosporae.	
Ophiobolus *Rhaphidospora*	15
	34
†[17] Xylariaceae.	
1. Phaeosporae.	
Hypoxylon	6
Daldinia	1
Nummularia	2
Ustulina	1
Poronia	1
Xylaria	7
	18

†[18] Valsaceae.	Nombre d'espèces.
1. Allantosporae.	
Calosphaeria	3
Coronophora	2
Quaternaria	2
Valsa	22
Eutypella	2
Valsella	1
Eutypa	12
Cryptosphaeria	1
Cryptovalsa	1
Diatrype	6
Diatrypella	6
2. Hyalosporae.	
Cryptosporella	5
3. Phaeosporae.	
Anthostoma	3
4. Hyalodidymae.	
Melanconis	1
Hercospora	1
Diaporthe	70
5. Hyalophragmiae.	
Calospora	1
6. Phaeophragmiae.	
Pseudovalsa	5
Aglaospora	1
Melogramma	2
7. Phaeodictyae.	
Fenestella	1
8. Scolecosporae.	
Cryptospora	3
Vialaea	1
Sillia	1
	159
†[19] Dothideaceae.	
1. Hyalosporae.	
Mazzantia	1
Phyllachora	7
2. Hyalodidymae.	
Plowrightia	1
Dothidella	2
Scirrhia	2

	Nombre d'espèces.
3. Phaeodidymae.	
Dothidea	3
4. Phaeophragmiae.	
Homostegia	1
Rhopographus	2
Sphaeria	
	19

†[20] Hypocreaceae.

1. Hyalosporae.	
Hyponectria	1
Nectriella	3
Polystigma	2
2. Phaeosporae.	
Sphaeroderma	1
3. Hyalodidymae.	
Nectria	16
Hypocrea	2
Hypomyces	1
4. Hyalophragmiae.	
Calonectria	3
Gibberella	5
5. Scolecosporae.	
Epichloë	1
Claviceps	2
Cordyceps (*Torrubia*)	4
	41

†[21] Microthyriaceae.

1. Hyalosporae.	
Myiocopron	1
2. Hyalodidymae.	
Asterina	2
Microthyrium	2
	5

†[22] Lophiostomaceae.

1. Hyalophragmiae.	
Lophiotrema	1
2. Phaeophragmiae	
Lophiostoma	6
3. Phaeodictyae	
Lophidium	1
Platystomum	2
	10

†[23] Hysteriaceae.	Nombre d'espèces.
× HYSTERIEAE.	
1. Hyalosporae.	
Schizothyrium	1
2. Hyalodidymae.	
Aulographum	1
Glonium	1
3. Phaeodidymae.	
Lembosia	1
4. Hyalophragmiae.	
Dichaena	3
5. Phaeophragmiae.	
Hysterium	3
Mytilidion	1
6. Hyalodictyae.	
Gloniopsis	1
7. Phaeodictyae.	
Hysterographium	3
8. Scolecosporae.	
Hypoderma	7
Lophiodermium	7
Sporomega	1
Colpoma	1
Lophium	1
×× ACROSPERMEAE.	
1. Scolecosporae.	
Acrospermum	1
	36
†[24] Elaphomycetaceae.	
1. Phaeosporae.	
Elaphomyces	2
	2
†[25] Cenococcaceae.	
1. Phaeosporae.	
Caenococcum	1
	1
†[26] Tuberaceae.	
× TUBEREAE.	
1. Phaeosporae.	
Pachyphlaeus	1
Tuber	2
	3

†[27] Helvellaceae.	Nombre d'espèces.
× MORCHELLEAE.	
1. Hyalosporae.	
Morchella	6
Gyromitra	2
Helvella	11
Verpa	1
×× GEOGLOSSEAE.	
Mitrula	3
Microglossum	1
Cudoniella	1
2. Phragmosporae.	
Geoglossum	5
3. Scolecosporae.	
Spathularia	1
	31

†[28] Pezizaceae.	
1. Hyalosporae.	
Acetabula	4
Geopyxis	6
Peziza	16
Otidea	4
Discina (*Postularia*)	5
Detonia	1
Pyronema	3
Barlaeina (*Barlaea*)	3
Humaria (*Leucoloma*)	16
Macropodia	2
Pseudoplectania	1
Lachnum	1
Lachnea	18
Sepultaria	1
Neottiella	2
Sclerotinia	10
Ciboria	4
Helotium	11
Phialea	15
Pezizella	4
Pseudohelotium	6
Cyathicula	2
Peziculа	2

	Nombre d'espèces.
Chlorosplenium	1
Mollisia	7
Pyrenopeziza	6
Tapesia	5
Desmazierella	1
Lachnella	5
Trichopeziza	12
Dasyscypha	17
2. Phaeosporae.	
Phaeopezia	1
3. Hyalodidymae.	
Dermatella	2
Belonidium	2
Niptera	1
Belonium	1
Solenopezia	1
Scutula	1
4. Scolecosporae.	
Gorgoniceps	1
	207
†[29] Ascobolaceae.	
1. Hyalosporae.	
Ascophanus	9
Lasiobolus	1
Rhyparobius	3
2. Phaeosporae.	
Ascobolus	8
Saccobolus	4
	25
†[30] Dermateaceae.	
1. Hyalosporae.	
Dermatea	3
Cenangium	4
Tympanis	3
2. Phragmosporae.	
Scleroderris	2
	12
†[31] Bulgariaceae.	
1. Hyalosporae.	
Leotia	1

	Nombre d'espèces.
Orbilia	1
Ombrophila	2
Agyrium	1
2. Phaeosporae.	
Bulgaria	1
3. Didymosporae.	
Calloria	1
4. Phragmosporae.	
Coryne	3
	10

†32 Stictidaceae.

1. Hyalosporae.	
Propolis	1
Naevia	2
2. Scolecosporae.	
Stictis	1
	4

†33 Phacidiaceae.

1. Hyalosporae.	
Cryptomyces	1
Phacidium	1
Pseudopeziza	3
Trochila	3
Stegia (*Eustegia*)	1
Fabraea	1
2. Didymosporae.	
Abrothallus	1
3. Scolecosporae.	
Coccomyces	4
Rhytisma	6
4. Dictyosporae.	
Dothiora	1
	25

†34 Patellariaceae.

1. Hyalosporae.	
Patinella	1
Heterosphaeria	1
2. Didymosporae.	
Karschia	1
3. Phragmosporae.	
Patellaria	–

	Nombre d'espèces.
Durella	2
Lecanidion	2
4. Dictyosporae.	
Blitrydium	1
	8
†[35] Caliciaceae.	
1. Hyalosporae.	
Roesleria	1
Coniocybe	1
2. Didymosporae.	
Acolium	1
Calicium	8
3. Phaeosporae.	
Cyphelium	3
Sphinctrina	1
	15
†[36] Arthoniaceae.	
1. Didymosporae.	
Celidium	1
	1
†[37] Gymnoascaceae.	
1. Hyalosporae.	
Myxotrichum	1
Bolacotricha	1
	2
†[38] Exoascaceae.	
1. Hyalosporae.	
Exoascus	4
Taphrina	1
	8
†[39] Saccharomycetaceae.	
1. Hyalosporae.	
Saccharomyces	18
	18
†[40] Endomycetaceae.	
1. Hyalosporae.	
Endomyces	1
	1
†[41] Protomycetaceae.	
1. Hyalosporae.	
Protomyces	2
	2

†42 Monascaceae.	Nombre d'espèces.
1. Hyalosporae.	
Thelebolus	1
	1

III. Phycomycetae.	Nombre d'espèces.
A. Zygomycetae.	
†43 Mucoraceae.	
MUCOREAE.	
Mucor (*Hydrophora*)	13
Circinella	1
Spinellus	2
Rhizopus	2
Phycomyces	1
Sporodinia	1
Thamnidium	1
Chaetostylum	1
Pilaira	1
Pilobolus	2
MORTIERELLEAE.	
Mortierella	1
CHAETOCLADIEAE.	
Chaetocladium	1
PIPTOCEPHALIDEAE.	
Piptocephalis	3
Syncephalis	2
	35
†44 Entomophthoraceae.	
Empusa	1
B. Oomycetae.	1
†45 Chytridiaceae.	
SYNCHYTRIEAE.	
Synchytrium	1
RHIZIDEAE.	
Rhizophidium	2
CLADOCHYTRIEAE.	
Cladochytrium	2
	8

†[46] Saprolegniaceae.	Nombre d'espèces.
SAPROLEGNIEAE.	
Achlya	1
PYTHIEAE.	
Pythium	1
	2
†[47] Cystopodaceae.	
Cystopus (*Albugo*)	1
	1
†[48] Peronosporaceae.	
Phytophthora	1
Plasmopara	4
Bremia	1
Peronospora	20
	26

IV. Myxomycetae.	Nombre d'espèces.
†[49] Myxomycetaceae.	
A. Amaurosporae.	
PHYSAREAE.	
Badhamia	2
Physarum	7
Fuligo	1
Craterium	2
Leocarpus	1
Chondrioderma	4
Diachaea	1
DIDYMEAE.	
Didymium	4
Spumaria	1
Lepidoderma	1
STEMONITEAE.	
Stemonites	2
Comatricha	3
Enerthenema	1
Lamproderma	2
B. Lamprosporae.	
HETERODERMEAE.	

	Nombre d'espèces.
Cribraria	4
Dictydium	1
TUBULINEAE.	
Tubulina (*Licea*)	1
RETICULARIEAE.	
Reticularia	1
TRICHIEAE.	
Trichia	5
Hemitrichia	1
ARCYRIEAE.	
Arcyria	5
Perichaena	2
LYCOGALEAE.	
Lycogala	4
	56
†[50] Ceratiomyxaceae.	
Ceratiomyxa	1
	1
†[51] Acrasiaceae.	
Dictyostelium	1
	1
†[52] Phytomyxaceae.	
Plasmodiophora	1
	1

V. Deuteromycetae.	Nombre d'espèces.
†[53] Sphaerioidaceae.	
Phyllosticta	98
Depazea	5
Phoma	182
Macrophoma	11
Asposphaeria	4
Dendrophoma	2
Sclerotiopsis	3
Plenodomus	1
Mycogala	1
Sphaeronaema	4

	Nombre d'espèces.
Asteroma	12
Cicinnobolus	2
Selenia	1
Pyrenochaeta	2
Vermicularia	19
Dothiorella	6
Rabenhorstia	1
Fuckelia	1
Placosphaeria	1
Fusicoccum	5
Cytosporella	9
Cytospora	48
Ceuthospora	3
Coniothyrium	19
Sphaeropsis	2
Chaetomella	3
Haplosporella	2
Diplodia	52
Botryodiplodia	6
Ascochyta	20
Diplodina	36
Vermiculariella	1
Actinonema	1
Darluca	5
Thoracella	1
Cytodiplospora	4
Stagonospora	10
Hendersonia	22
Prosthemium	2
Cryptostictis	1
Camarosporium	23
Dichomera	1
Septoria	106
Rhabdospora	19
Cheilaria	
Phleospora	4
Phlyctaena	1
Micropera	1
Septoriella	1
Cytosporina	1
	774

	Nombre d'espèces.
†54 Nectroidaceae.	
Zythia	1
Sphaeronaemella	1
	2
†55 Leptostromaceae.	
Leptothyrium	22
Piggotia	2
Melasmia	3
Leptostroma	20
Labrella	1
Sacidium	2
Trichophila	1
Pirostoma	1
Discosia	4
Entomosporium	1
Actinothyrium	1
Leptostromella	2
	60
†56 Excipulaceae.	
Excipula	1
Dothichiza	1
Discula	8
Sporonema	2
Psilospora	2
Dinemasporium	3
Discella	7
Microstieta	1
	25
†57 Melanconiaceae.	
Hainesia	4
Glocosporium	33
Myxosporium	15
Naemaspora	3
Trullula	1
Melanconium	18
Thyrsidium	2
Didymosporium	1
Bullaria	1
Marsonia	13
Septomyxa	5
Septogloeum	3

	Nombre d'espèces.
Psammina	1
Stilbospora	5
Coryneum	12
Scolecosporium	1
Pestalozzia	13
Asterosporium	1
Steganosporium	2
Cylindrosporium	1
Cryptosporium	6
Libertella	10
	151

†[58] Mucedinaceae.

Chromosporium	1
Sporendonaema	1
Oospora	1
Fusidium	7
Monilia	9
Cylindrium	2
Polyscytalum	1
Geotrichum	1
Oidium	11
Oedocephalum	5
Botryosporium	2
Coemansiella	1
Cephalosporium	4
Trichoderma	5
Aspergillus	9
Sterigmatocystis	5
Amblyosporium	1
Penicillium	11
Gliocladium	1
Haplaria	1
Acladium	1
Haplariopsis	1
Hyphoderma	1
Sporotrichum	19
Monosporium	3
Botrytis	15
Phymatotrichum	7
Cylindrophora	2

	Nombre d'espèces.
Ovularia . .	9
Sepedonium	1
Verticillium	13
Acrocylindrium.	1
Acrostalagmus	3
Clonostachys. .	1
Spicaria	6
Gonatobotrys	2
Naematogonium	2
Hormiactis. .	1
Trichothecium.	2
Bostrichonaema.	1
Didymaria . . .	2
Mycogone. . .	1
Diplocladium .	2
Arthrobotrys.	1
Fusoma	2
Septocylindrium .	2
Dactylaria.	1
Monacrosporium.	2
Ramularia	28
Cercosporella . .	1
Prismaria	1
Trinacrium . . .	1
Titaea	1
	221
† 59 Dematiaceae.	
Chloridium . . .	1
Coniosporium. .	10
Echinobotryum.	1
Torula	13
Hormiscium . . .	5
Camptoum . . .	1
Rhopalomyces. .	1
Periconia	3
Stachybotrys.	2
Hormodendrum	2
Goniosporium. .	1
Arthrinium . . .	2
Monotospora	1

	Nombre d'espèces.
Hadrotrichum	2
Trichosporium	4
Zygodesmus	1
Dematium	2
Torulopsis	1
Bolacotricha	1
Verticicladium	3
Gonytrichium	1
Stachylidium	1
Haplographium	3
Dicoccum	1
Bispora	3
Trichocladium	1
Cladosporium	17
Passalora	1
Scolecotrichum	3
Fusicladium	6
Polythrincium	1
Epochnium	1
Clasterosporium	5
Cryptocoryneum	2
Sporoschisma	1
Polydesmus	1
Acrothecium	1
Heterosporium	10
Helminthosporium	12
Brachysporium	6
Napicladium	1
Cercospora	15
Dendryphium	1
Stigmella	2
Coniothecium	13
Tetraploa	1
Speira	1
Sporodesmium	7
Stemphylium	10
Macrosporium	11
Septosporium	2
Alternaria	2
Fumago	1

	Nombre d'espèces.
Triposporium	1
Helicosporium	1
	209

†[60] Stilbaceae.

Stilbum	6
Tilachlidium	3
Ciliciopodium	2
Isaria	8
Ceratium	1
Pilacre	1
Coremium	4
Isariopsis	2
Graphium	5
Stysanus	6
Sporocybe	1
Arthrobotryum	1
	40

†[61] Tuberculariaceae.

Tubercularia	19
Dendrodochium	1
Illosporium	5
Phyllocdia	2
Aegerita	1
Sphacelia	1
Hymenula	4
Cylindrocolla	1
Patellina	1
Periola	1
Volutella	7
Fusarium	10
Pionnotes	2
Epicoccum	6
Strumella	1
Hymenopsis	1
Chaetostroma	1
Myrothecium	1
Exosporium	1
Exosporina	1
	97

†[62] Mycelia sterilia.	Nombre d'espèces.
Sclerotium	29
Rhizoctonia	1
Ectostroma	5
Rhizomorpha	4
Anthina	1
Athelia	1
Ozonium	4
Rhacodium	2
Hypha	3
Himantia	7
Xylostroma	1
	58

RÉCAPITULATION.

	Nombre d'espèces.
1. Nidulariaceae	6
2. Lycoperdaceae	28
3. Sclerodermaceae	2
4. Hymenogastraceae	2
5. Phallaceae	3
6. Agaricaceae	671
7. Polyporaceae	163
8. Hydnaceae	48
9. Clavariaceae	50
10. Thelephoraceae	70
11. Tremellaceae	30
12. Uredinaceae	382
13. Ustilaginaceae	44
14. Perisporiaceae	38
15. Sphaeriaceae	314
16. Ceratostomaceae	34
17. Xylariaceae	18
18. Valsaceae	159
19. Dothideaceae	19
20. Hypocreaceae	41
21. Microthyriaceae	5
22. Lophiostomaceae	10

	Nombre d'espèces.
23. Hysteriaceae	36
24. Elaphomycetaceae	2
25. Cenococcaceae	1
26. Tuberaceae	3
27. Helvellaceae	31
28. Pezizaceae	207
29. Ascobolaceae	25
30. Dermataceae	12
31. Bulgariaceae	10
32. Stictidaceae	4
33. Phacidiaceae	25
34. Patellariaceae	8
35. Caliciaceae	15
36. Arthoniaceae	1
37. Gymnoascaceae	2
38. Exoascaceae	8
39. Saccharomycetaceae	18
40. Endomycetaceae	1
41. Protomycetaceae	2
42. Monascaceae	1
43. Mucoraceae	35
44. Entomophthoraceae	1
45. Chytridiaceae	8
46. Saprolegniaceae	2
47. Cystopodaceae	4
48. Peronosporaceae	26
49. Myxomycetaceae	56
50. Ceratiomyxaceae	1
51. Acrasiaceae	1
52. Phytomyxaceae	1
53. Sphaerioidaceae	771
54. Nectroidaceae	2
55. Leptostromaceae	60
56. Excipulaceae	25
57. Melanconiaceae	151
58. Mucedinaceae	221
59. Dematiaceae	209
60. Stilbaceae	40
61. Tuberculariaceae	97
62. Mycelia sterilia	58
Total des espèces	1321

I. BASIDIOMYCETAE.

A. Eubasidiae.

a. Holobasidiae.

1. Angiocarpae.

†[1] Nidulariaceae.

NIDULARIA.

***Nidularia campanulata** Fr. — T. N. G. XI, 392. — Voir: *Cyathus campanulatus.*

1. **Nidularia confluens** Fr. et Nordholm Symb. Gasterom., 3. — Oud. Rév. I, 155; N. K. A. I, V, 346; Arch. Néerl. VIII, 357 et XV, 364. — Sacc. Syll. VII, 29. — Wint. Kr. Fl. I, 918.

***Nidularia Crucibulum** Fr. — T. N. G. XI, 392. — Voir: *Crucibulum vulgare.*

***Nidularia striata** Bull. — T. N. G. XI, 392. — Voir: *Cyathus striatus.*

CYATHUS.

***Cyathus campanulatus** Fr. — Voir: *C. Olla.*

***Cyathus Crucibulum** Hoffm. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 11. — Voir: *Crucibulum vulgare.*

1. **Cyathus Olla** (Batsch) P. Syn. 237. — Oud. Rév. I, 156; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 11. — Nidularia campanulata Fr. — T. N. G. XI, 392. — Cyathus vernicosus Tul. — N. K. A. 2, I, 87; Oud. Herb. Ned. Pl. n° 446. — Sacc. Syll. VII, 38. — Wint. Kr. Fl. I, 920. — Cyathus campanulatus Fr. — Arch. Néerl. XV, 363; Oud. Fgi. Neerl. exs. n° 242; Fl. Bat. tab. 700 f. 2.

2. **Cyathus striatus** (Hudson) Willd. Fl. Berol. 399. — Oud.

*) L'astérisque devançant le nom spécifique signifie que le champignon doit être cherché sous un autre nom générique indiqué en même temps, d'où suit qu' un numéro à la place de l'astérisque n'aurait pas de sens.

Rév. I, 457; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 11; N. K. A. 2, I, 87; 2, V, 371 et 532; Arch. Néerl. XV, 363; Fl. Bat. tab. 1135; Oud Herb. Ned. Pl. n° 447. — Sacc. Syll. VII, 38. — Wint. Kr. Fl. I, 920. — Nidularia striata Bull. — T. N. G. XI, 392.

Cyathus verrucosus (Bull.) D. C. Fl. Fr. II, 270. — N. K. A. 2, I, 87; Oud. Herb. Ned. Pl. n° 446. — Voir: *Cyathus Olla.*

CRUCIBULUM.

1. **Crucibulum vulgare** Tul. A. S. N. 1844, I, 90. — Oud. Rév. I, 457; N. K. A. 2, I, 87 et 2, V, 371 et 587; Arch. Néerl. XV, 364; Oud. Fgi Neerl. exs. n° 243 et Herb. Ned. Pl. n° 445. — Sacc. Syll. VII, 43. — Wint. Kr. Fl. I, 919. — Nidularia Crucibulum Fr. — T. N. G. XI, 392. — Cyathus Crucibulum Hoffm. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 11.

THELEBOLUS.

1. **Thelebolus stercoreus** Tode. Mecklb. I, 11. — Oud. Rév. I, 458. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 12; Arch. Néerl. XV, 365. — Sacc. VII, 44.

SPHAEROBOLUS.

1. **Sphaerobolus stellatus** Tode Mecklb. I, 13. — Oud. Rév. I, 458; T. N. G. XI, 392; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 11; Arch. Néerl. XV, 365. — Sacc. Syll. VII, 46. — Wint. Kr. Fl. I, 921.

4² Lycoperdaceae.

α. Diplodermeae.

TULOSTOMA.

1. **Tulostoma mammosum** (Mich.) Fr. S. M. III, 42. — Oud. Rev. I, 461. T. N. G. XI, 397; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 15; N. K. A. 2, V, 370; Arch. Néerl. XV, 374; Fl. Bat. tab. 750. — Sacc. Syll. VII, 60. — Wint. Kr. Fl. I, 892.

GEASTER.

1. **Geaster Cesatii** Rab. Bot. Zeit. 1851, p. 628. — Oud. Rév. I, 479. N. K. A. 2, II, 99 et 2, VI, 195; Arch. Néerl. XV, 366; Fl. Bat. tab. 1145. — Sacc. Syll. VII, 82. — Wint Kr. Fl. I, 913.

2. **Geaster coliformis** (Dicks.) P. Syn. 131. — Oud. Rév. I, 477; N. K. A. 2, V, 371 et 2, VI, 492; Arch. Néerl. II, 36 et XV, 365; Fl. Bat. tab. 1034. — Sacc. Syll. VII, 73. — Wint. Kr. Fl. I, 909.

***Geaster cryptorrhynchus** Haszl. — N. K. A. 2, II, 177; Arch. Néerl. XV, 368. — Voir: *G. triplex*.

3. **Geaster fimbriatus** Fr. S. M. III, 16. — Oud. Rév. I, 479; T. N. G. XI, 397; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 12; N. K. A. 2, II, 179; 2, III, 149; 2, VI, 499; 3, I, 234; Arch. Néerl. XV, 366; Fl. Bat. tab. 1195. — Sacc. Syll. VII, 82. — Wint. Kr. Fl. I, 913.

4. **Geaster fornicatus** (Huds.) Fr. S. M. III, 12. — Oud. Rév. I, 477; N. K. A. 2, I, 166 et 2, VI, 493; Arch. Néerl. VIII, 353 et XV, 366; Fl. Bat. tab. 1205. — Sacc. Syll. VII, 73. — Wint. Kr. Fl. 912.

5. **Geaster hygrometricus** P. Syn. 136. — Oud. Rév. I, 480; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 12; N. K. A. 1, V, 346 et 2, VI, 500; Arch. Néerl. XV, 368; Fl. Bat. tab. 1180. — Sacc. Syll. VII, 90. — Wint. Kr. Fl. I, 914.

6. **Geaster mammosus** Fr. S. M. III, 17. — Oud. Rév. I, 479, T. N. G. XI, 397; Prodr. Fl. Bat. II, p. 12; N. K. A. 2, V, 371 et 2, VI, 498; Arch. Néerl. XV, 367; Fl. Bat. tab. 1185. — Sacc. Syll. VII, 85. — Wint. Kr. Fl. I, 914.

***Geaster rufescens** P. Syn. 131. — T. N. G. VII, 287 et XI, 397; Prodr. Pl. Bat. II, 4, p. 12; Fl. Bat. tab. 1125. — Voir: *G. triplex*.

7. **Geaster Schmideli** Vittadini Monogr. Lycop. in Mem. Acad. di Torino S. 2, V, 157. — Oud. Rév. I, 478; N. K. A. 2, V, 163 et 371, et 2, VI, 495; Fl. Bat. tab. 1555. — Sacc. Syll. VII, 76. — Wint. Kr. Fl. I, 910.

8. **Geaster striatus** D. C. Fl. Fr. II, 267. — Oud Rév. I, 478; N. K. A. 2, I, 166 et 2, V, 191; Arch. Néerl. VIII, 353 et XV, 366; Fl. Bat. tab. 1141; Oud. Fgi Néerl. exs. n° 2. — Sacc. Syll. VII, 77. — Wint. Kr. Fl. I, 909.

9. **Geaster triplex** Jungh. T. N. G. VII, 287. — Oud. Rév. I, 478; N. K. A. 2, II, 36 et 178; 2, V, 371 et VI, 437; Arch. Néerl. XV, 368. — G. rufescens P. — T. N. G. VII, 287 et XI, 397; Prodr. Fl. Bat. II, 4. p. 12; Fl. Bat. tab. 1125. — G. cryptorrhynchus Haszl. — N. K. A. 2, II, 177. — Sacc. Syll. VII, 74.

***Geaster vulgaris** Oud. (errore) Fgi Neerl. exs. n° 244. — Voir: *G vulgatus*.

10. **G. vulgatus** Vitt. Monogr. Lycop. 20. — Oud. Rév. 1, 479; N. K. A. 2, II, 179; 2, V, 371; 2, VI, 496; Arch. Néerl. XV, 367; Oud. Fgi Neerl. exs. n° 214; Fl. Bat. tab. 1165. — Sacc. Syll. VII, 83.

β. Lycoperdeae.

LYCOPERDON.

***Lycoperdon aculeatum** Bon. — Arch. Néerl. XV, 371. — Supprimé.

***Lycoperdon aestivale** Bon. — Bot. Zeit. 1857, p. 630. — Oud. Rév. 1, 470; N. K. A. 2, I, 87 et 166; 2, V, 370; Arch. Néerl. VIII, 353; Oud. Herb. N. Pl. n° 439. — Voir: *L. Vittadini.*

1. **Lycoperdon Bovista** L. Spec. Pl. 1653. — Oud. Rév. 1, 468; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 14; N. K. A. 1, V, 298; 2, V, 117 et 370; Fl. Bat. tab. 720. — L. giganteum Batsch. — T. N. G. XI, 397; N. K. A. 2, V, 588; Arch. Néerl. XV, 371. — Sacc. Syll. VII, 109. — Wint. Kr. Fl. I, 899.

2. **Lycoperdon caelatum** Bull. Ch. de Fr. tab. 430. — Oud. Rév. 1, 468; T. N. G. XI, 397; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 14; N. K. A. 2, V, 117, 369 et 588; Arch. Néerl. XV, 370; Fl. Bat. tab. 715. — Sacc. Syll. VII, 115. — Wint. Kr. Fl. I, 897.

***Lycoperdon cupricum** Bon. — Arch. Néerl. XV, 371. — A supprimer.

3. **Lycoperdon depressum** Bon. Bot. Zeit. 1857, p. 611. — Oud. Rév. 1, 469; N. K. A. 2, I, 87 et 166; Arch. Néerl. VIII, 353 et 370. — Oud. Fgi Neerl. exs. n° 118 et Herb. Ned. Pl. n° 137. — L. hiemale Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 11 (fide exempl. Herb. Un.) — Sacc. Syll. VII, 116. — Wint Kr. Fl. I, 703.

4. **Lycoperdon echinatum** P. Disp. meth. Fg. 53. — N. K. A. 2, V, 370. — L. gemmatum γ echinatum T. N. G. XI, 397; Arch. Néerl. XV, 372. — Sacc. Syll. VII, 107.

5. **Lycoperdon excipuliforme** Scopoli Fl. Carn. II, 488. — Oud. Rév. 1, 467. — L. gemmatum var. α excipulif. P. et Fr. — T. N. G. XI, 397; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 13; Arch. Néerl. XV, 372; Fl. Bat. tab. 715. — Sacc. Syll. VII, 108.

6. **Lycoperdon favosum** Oud. N. K. A. 3, II, 676.

7. **Lycoperdon foetidum** Bon. Bot. Zeit. 1857, p. 629. — Oud. N. K. A. 3, II, 199. — Sacc. Syll. VII, 488. — Wint. Kr. Fl. I, 903.

8. **Lycoperdon furfuraceum** Schaeff. Comm. ad Fung. Bav. 117. — Oud. Rév. 1, 470. — Sacc. Syll. VII, 110. — L. gem-

matum P. var. furfuraceum Fr. — T. N. G. XI, 397; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 14; N. K. A. 2, V, 588; Arch. Néerl. XV, 373. — L. pusillum (P.) Schaeff. — T. N. G. XI, 397; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 14; N. K. A. 2, V, 370. — L. molle P. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 14.

9. **Lycoperdon gemmatum** Batsch El. 147. — Oud. Rév. I, 469. — T. N. G. XI, 397; Prodr. Fl. Bat. II, 4, 13; N. K. A. 2, V, 370; Arch. Néerl. XV, 372. — Sacc. Syll. VII, 110. — Wint. Kr. Fl. I, 904.

***Lycoperdon gemmatum α excipuliforme** Scop. — Prodr. II, 4, p. 13; Arch. Néerl. XV, 372. — Voir: *L. excipuliforme.*

***Lycoperdon gemmatum ε. furfuraceum** Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 13; Arch. Néerl. XV, 373. — Voir: *L. furfuraceum.*

***Lycoperdon gemmatum δ. hirtum** Mart. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 13. — Voir: *L. hirtum.*

***Lycoperdon gemmatum ζ papillatum** Schaeff. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 13. — Voir: *L. papillatum.*

***Lycoperdon gemmatum β. perlatum** P. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 13; N. K. A. 1, V, 298; Arch. Néerl. XV, 372. — Voir: *L. perlatum.*

***Lycoperdon giganteum** Batsch. — T. N. G. XI, 397; N. K. A. 2, V, 588; Arch. Néerl, XV, 371. — Voir: *L. Borista.*

***Lycoperdon hiemale** Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 14. — Voir: *L. depressum.*

10. **Lycoperdon hirtum** Mart. — Oud. Rév. I, 467. — L. gemmatum var. hirtum Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 13; Arch. Néerl. XV, 372. — Sacc. Syll. VII, 16. — Wint. Kr. Fl. I, 905.

***Lycoperdon laxum** Bon. — Arch. Néerl. VIII, 353. — A. supprimer.

***Lycoperdon molle** P. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 14. — Voir: *L. furfuraceum.*

11. **Lycoperdon papillatum** (Schaeff.) Fr. S. M. III, 38. — N. K. A. 2, V, 370.

12. **Lycoperdon perlatum** P. Obs. Myc. I, 4. — Oud. Rév. I, 469; N. K. A. 2, V, 370. — L. gemmatum var. perlatum T. N. G. XI, 397; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 13; N. K. A. 2, I, 88; Arch. Néerl. XV, 372; Oud. Herb. Ned. Pl. n° 438.

13. **Lycoperdon piriforme** Rupp Fl. Jen. ed. 2ª p. 304. — Oud. Rév. I, 469; T. N. G. XI, 397; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 13; N. K. A. 2, I, 88 et 2, V, 370; Arch. Néerl. XV, 373; Oud. Fgi Neerl. exs. n° 119; id. Herb. Ned. Pl. n° 436. — Sacc. Syll. VII, 117. — Wint. Kr. Fl. I, 905.

*Lycoperdon pusillum (P.) Batsch. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 14; N. K. A. 2, V. 370; Arch. Néerl. XV, 370. — Voir: *L. furfuraceum*.

14. **Lycoperdon saccatum** Vahl Fl. Dan. tab. 1139. — Oud. Rév. I, 167. — T. N. G. XI, 397; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 13; N. K. A. 2, V, 588; Arch. Néerl. XV, 371; Fl. Bat. tab. 715. — Sacc. Syll. VII, 128; Wint. Kr. Fl. I, 901.

15. **Lycoperdon serotinum** Bon. Bot. Zeit. 1857, p. 63. — N. K. A. 3, II, 200; Arch. Néerl. VIII, 353; XV, 373. — Sacc. VII, 118 et 488. — Wint. Kr. Fl. I, 905.

*Lycoperdon turbinatum α. lividum P. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 14. — A supprimer.

16. **Lycoperdon Vittadini** Massee. — Oud. Rév. I, 168. — L. aestivale N. K. A. XIV, 372.

BOVISTA.

1. **Bovista nigrescens** P. Disp. meth. 6. — Oud. Rév. I, 171; T. N. G. XI, 397; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 12; Arch. Néerl. XV, 369; N. K. A. 2, V, 370. — Sacc. Syll. VII, 99. — Wint. Kr. Fl. I, 907.

2. **Bovista plumbea** P. Obs. Myc. I, 5. — Oud. Rév. I, 171; T. N. G. XI, 397; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 13; N. K. A. 2, I, 87 et 2, V, 370 et 587; Arch. Néerl. XV, 369. — Oud. Fgi. Neerl. exs. n° 117; id. Herb. Ned. Pl. n° 433.

†[3] Sclerodermaceae.

SCLERODERMA.

*Scleroderma pedunculatum Lk. — T. N. G. XI, 398 β. var. spadiceum (Schaeff.) Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 15. — Voir: *Scl. verrucosum*.

1. **Scleroderma verrucosum** (Vaill.) P. Syn. 154. — Oud. Rév. I, 181, T. N. G. XI, 398; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 15; N. K. A. 2, V, 370; Arch. Néerl. XV, 374. — Oud. Fgi Neerl. exs. n° 120. — S. pedunculatum Lk. T. N. G. XI, 398. β. var spadiceum (Schaeff.) Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 15.

2. **Scleroderma vulgare** Hornem. Fl. Dan. tab. 1969 f. 2. — Oud. Rév. I, 131; T. N. G. XI, 398; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 15; N. K. A. 2, V, 370 et 588; Arch. Néerl. XV, 374. — Oud. Fgi Neerl. exs. n° 345; Fl. Bat. tab. 720.

†[4] Hymenogastraceae.

RHIZOPOGON.

***Hymenangium virens** Kl. — N. K. A. 1, V, 298. — Voir: *Rhizopogon virens.*

***Melanogaster variegatus** Tul. var. *Broomeianus* Berk. — N. K. A. 2, IV, 225 et 2, V, 163. — Voir: *Rhizopogon virens.*

***Rhizopogon luteseens** Fr. — N. K. A. 2, V, 162; Arch. Néerl. XV, 361. — Voir *Rhizopogon virens.*

1. **Rhizopogon virens** (A. S.) Schröt. Kr. Fl. I, 713. — Oud. Rév. I, 482; Arch. Néerl. XV, 361. — R. luteolus Fr. — N. K. A. 2, V, 162; Arch. Néerl. XV, 360. — Splanchnomyces Rabenhorstii Cda. — Sprée in N. K. A. 1, V, 346 et in Rab. F. E. n° 570. — Melanogaster variegatus var. Broomeianus N. K. A. 2, IV, 225 et 2, V, 163.

***Splanchnomyces Rabenhorstii** Cda. — N. K. A. 1, V, 346; Arch. Néerl. VIII, 352; Rab. F. E. n° 570. — Voir: *Rhizopogon virens.*

HYDNANGIUM.

1. **Hydnangium carneum** Wallr. in Klotzsch Flora Boruss. n° 165. — Oud. Rév. I, 483; N. K. A. 2, I, 87; Arch. Néerl. II, 35 et XV, 360. — Oud. Herb. Ned. Pl. n° 188.

†[5] Phallaceae.

a. Phalleae.

ITHYPHALLUS.

1. **Ithyphallus impudicus** (L.) Fr. S. M. II, 283. Oud. Rév. I, 452. — Phallus impud. L.; T. N. G. XI, 392; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 10; N. K. A. 1, II, 89; 1, V, 346; 2, II, 237; 2, V, 371 et 587; Arch. Néerl. XV, 361; Fl. Bat. tab. 795.

MUTINUS.

***Cynophallus caninus** Fr. S. M. II, 284. — Arch. Néerl. XV, 362. — Voir: *Mutinus.*

1. **Mutinus caninus** (Hudson) Fr. S. V. S. 134. — Oud. Rév. I, 453. — Sacc. Syll. VII, 12. — Cynophallus caninus Fr. — Arch. Néerl. XV, 362. — Phallus caninus Huds. — T. N. G. XI, 392; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 10; N. K. A. 2, V, 371. Wint. Kr. Fl. I, 869.

***Phallus caninus** Huds. — T. N. G. XI, 392; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 10; N. K. A. 2, V, 371. — Voir: *Mutinus*.

***Phallus impudicus** L. — T. N. G. XI, 392; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 10; N. K. A. 1, II, 89; 1, V, 346; 2, II, 337; 2, V, 371 et 587; Arch. Néerl. XV, 361; Fl. Bat. tab. 795. — Voir: *Ithyphallus*.

β. Clathreae.

CLATHRUS.

1. **Clathrus cancellatus** (Tournef.) Scopoli Fl. Carn. II, 485. — Linn. Hort. Cliff. 479; Oud. Rév. I, 453; T. N. G. XI, 392; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 10; Arch. Néerl. XV, 362. — Sacc. Syll. VII, 119. — Wint. Kr. Fl. I, 870.

†[6] Agaricaceae.

Haplophyllae.

§ Molles.

× AGARICEAE.

1. Leucosporae.

AMANITA.

1. **Amanita excelsa** Fr. Ep. 21. — Oud. Rév. I, 32. — Sacc. Syll. V, 9. — Ag. Am. excelsus Fr. — N. K. A. 2, IV, 117. — Wint. Kr. Fl. I, 847.

***Amanita lenticularis** (Lasch). — Arch. Néerl. XIV, 210. — Voir: *Lepiota*.

2. **Amanita Mappa** (Batsch) Fr., Ep. 19. — Oud. Rév. I, 29; N. K. A. 2, VI, 8. — Sacc. Syll. V, 10. — Ag. Am. Mappa Fr. — T. N. G. XII, 261; Prodr. Fl. Bat. II, 3, 304; N. K. A. 1, I, 293; 2, IV, 204; 2, V, 342 et 584; Arch. Néerl. XIV, 210; Fl. Bat. tab. 1584. — Wint. Kr. Fl. I, 849.

3. **Amanita muscaria** (L.) Fr. Ep. 20. — Oud. Rév. I, 30. — Sacc. Syll. V, 10. — Ag. Am. muscarius Fr. — T. N. G. XI, 380; Prodr. Fl. Bat. II, 3, 304; N. K. A. 1, I, 292; 2, I, 437; 2, V, 342; Arch. Néerl. XIV, 210; Flor. Bat. tab. 195. — Wint. Kr. Fl. I, 848.

forma **pulla** Gonn. et Rab. tab. 7 f, 2; Schaeff. tab. 28. — Herb. O.

4 **Amanita nitida** Fr. Ep. 24. — Oud. Rév. I, 34. — Sacc. Syll. V, 18. — Ag. Am. nitidus Fr. — N. K. A. 2, V, 148; Fl. Bat. tab. 1400. — Wint. Kr. Fl. I. 845.

5. **Amanita pantherina** (D. C.) Fr. Ep. 21. — Oud. Rév. I, 31. — Sacc. Syll. V, 14. — Ag. Am. pantherinus Fr. — N. K. A. 1, I, 292; 2, IV, 205; 2. V, 117 et 342; Arch. Néerl. XIV, 210; Fl. Bat. tab. 1380. — Wint. Kr. Fl. I, 847.

var. **exannulata** Oud. N. K. A. 2, IV, 205; id. Rév. I, 31.

6. **Amanita phalloides** Fr. Ep. 18. — Oud. Rév. I, 29. — Sacc. Syll. V, 9. — Ag. Am. phalloides Fr. — T. N. G. XI, 380; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 303; N. K. A. 2, I, 436; 2, V, 243 et 583; Fl. Bat. tab. 738 et 829. — Wint. Kr. Fl. I, 850.

7. **Amanita rubescens** Fr. Ep. 23. — Oud. Rév. I, 33. — Sacc. Syll. V, 16. — Ag. Am. rubescens Fr. — T. N. G. XI, 380; Prodr. Fl. Bat. II, 3, 304; N. K. A. 1, I, 293; 2, I, 437; 2, V, 342; Arch. Néerl. XIV, 210; Fl. Bat. tab. 765. — Wint Kr. Fl. I, 846.

8. **Amanita spissa** (Currey) Fr. Ep. 23. — Oud. Rév. I, 33. — Sacc. Syll. V, 17. — Ag. Am. spissus (Curr.) Fr. — N. K. A, 2, V, 461; 3, I, 233; Arch. Néerl. XIV, 210. — Wint. Kr. Fl. I, 845.

***Amanita strangulata** Fr. — Ag. Am. strangulatus Fr. — N. K. A. 2, V, 148; Arch. Néerl. II, 18; XIX, 211. — Voir: *Amanitopsis.*

9. **Amanita strobiliformis** (Vitt.) Fr. Ep. 21. — Oud. Rév. I, 32. — Sacc. Syll. V, 15. — Ag. Am. strobiliformis Fr. — N. K. A. 2, IV, 507; Arch. Néerl. II, 18; XIV, 210. — Wint. Kr. Fl. I, 847.

***Amanita vaginata** Fr. — Ag. Am. vaginatus (Bull.) — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 305; Arch. Néerl. XIV, 210; Fl. Bat. tab. 784. — Wint. Kr. Fl. I, 842. — Voir: *Amanitopsis.*

10. **Amanita verna** Fr. Ep. 18. — Oud. N. K. A. 3, I, 140; id. Hedw. 1898, p. 184. — Sacc. Syll. V, 10.

11. **Amanita virosa** Fr. Ep. 18. — Oud. Rév. I, 28; N. K. A. 2, VI, 8. — Sacc. Syll. V, 9. — Ag. Am. virosus Fr. — N. K. A. 2, IV, 203. — Wint. Kr. Fl. I, 850.

AMANITOPSIS.

1. **Amanitopsis strangulata** Fr. Ep. 27. — Oud. Rév. I, 35. — Sacc. Syll. V, 23. — Ag. Amanitopsis strang. Fr. — N. K. A. 2, V, 148. — Arch. Néerl. II, 18; XIV, 211. — Wint. Kr. Fl. I, 842.

2. **Amanitopsis vaginata** (Bull.) Fr. Ep. 27. — Oud. Rév. I, 35. — Sacc. Syll. V, 21. — Ag. Amanitopsis vaginatus Fr. — T. N. G. XI, 380; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 305; N. K. A. 2, I, 437; 2, V, 312; Arch. Néerl. XIV, 210; Fl. Bat. tab. 784. — Wint. Kr. Fl. I, 842.

LEPIOTA.

1. **Lepiota acutesquamosa** (Weinm.) Fr. Ep. 31. — Oud. Rév. I, 42. — Sacc. Syll. V, 31. — Ag. Lep. acutesquamosus Fr. Ep. 31. — N. K. A. 2, V, 342; Arch. Néerl. XIV, 212; Fl. Bat. tab. 1569. — Wint. Kr. Fl. I, 840.

2. **Lepiota amianthina** (Scopoli) Fr. Ep. 37. — Oud. Rév. I, 46. — Sacc. Syll. V, 18. — Ag. Lep. amianthinus Fr. — T. N. G. XII, 261; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 306; N. K. A. 2, I, 437; 2, V, 343; Arch. Néerl. XIV, 212; Fl. Bat. tab. 1524.

3. **Lepiota Badhami** (Berk.) Fr. Ep. 31. — Oud. Rév. II, p. (1); id. Hedw. 1898, p. 185; N. K. A. 3, I, 440. — Sacc. Syll. V, 35. — Ag. Lep. Badh. Fr. — Wint. Kr. Fl. I, 840.

4. **Lepiota Carcharias** (P.) Fr. Ep. 36. — N. K. A. 3, II, 186. — Sacc. Syll. V, 16. — Ag. Lep. Carch. Fr. — Wint. Kr. Fl. I, 837.

5. **Lepiota cepaestipes** (Sow.) Fr. Ep. 35. — Oud. Rév. I, 11. — Sacc. Syll. V, 13. — Ag. Lep. cepaestipes Fr. — T. N. G. XI, 380; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 306; N. K. A. 1, I, 293; 2, I, 437; Arch. Néerl. II, 19; XIV, 212. [1])

α. **cretacea** (Bull.) Oud. Rév. I, 11. — Sacc. Syll. V, 11. — Ag. Lep. cep. *α.* cretaceus N. K. A. 2, IV, 206; Arch. Néerl. II, 19; XIV, 212; Fl. Bat. tab. 1214.

β. **lutea** (Bull.) Oud. Rév. I, 11. — Sacc. Syll. V, 11. — Ag. Lep. cep. *β.* luteus N. K. A. 2, IV, 206 (sub 5). — Ag. Lep. cep. var. Flos sulphuris Schnitzl.; Arch. Néerl. II, 19; XIV, 212. — Ag. Lep. Flammula Fr. — N. K. A. I, I, 49.

6. **Lepiota cinnabarina** (A. S.) Fr. Ep. 36. — Oud. Rév. I, 15. — Sacc. Syll. V, 16. — Ag. Lep. cinnabarinus Fr. — N. K. A. 2, III, 237; Arch. Néerl. XIV, 212. — Wint. Kr. Fl. I, 827.

7. **Lepiota clypeolaria** (Bull.) Fr. Ep. 32. — Oud. Rév. I, 13. — Sacc. Syll. V, 36. — Ag. Lep. clypeolarius Fr. — T. N. G. XI, 380; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 306; N. K. A. 2, I, 437; 2, V, 162 et 343; Arch. Néerl. XIV, 212. — Wint. Kr. Fl. I, 839.

[1]) L'*Ag cepaestipes* du Fl. Bat. tab. 1214 semble appartenir à l'*Ag Meleagris*.

8. **Lepiota cristata** (A. S.) Fr. Ep. 32. — Oud. Rév. I, 14. — Sacc. Syll. V, 39. — Ag. Lep. cristatus Fr. — T. N. G. XI, 380; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 306; N. K. A. 2, I, 437; 2, V, 343; Arch. Néerl. XIV, 212. — Wint. Kr. Fl. I, 839.

9. **Lepiota excoriata** (Schaeff.) Fr. Ep. 30. — Oud. Rév. I, 11. — Sacc. Syll. V, 31. — Ag. Lep. excoriatus Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 305; N. K. A. 2, I, 437; Arch. Néerl. XIV, 311; Fl. Bat. tab. 725. — Wint. Kr. Fl. I, 841.

***Lepiota Flammula** (Kickx.) — Ag. Lep. Flammula Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 307; N. K. A. 1, I, 49. — Lep. cepaestipes β. lutea. — Voir: *Lep. cepaestipes* β.

10. **Lepiota Friesii** (Lasch) Fr. Ep. 31. — Oud. Rév. I, 41. — Sacc. Syll. V, 34. — Ag. Lep. Friesii Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 305; Arch. Néerl. XIV, 211; Fl. Bat. tab. 1055; Oud. Herb. Ned. Pl. n° 119. — Wint. Kr. Fl. I, 840.

11. **Lepiota gracilenta** (Krombh.) Fr. Ep. 30. — Oud. Rév. I, 40. — Sacc. Syll. V, 32. — Ag. Lep. gracilentus Fr. — N. K. A. 2, V, 149; Fl. Bat. tab. 1370. — Wint. Kr. Fl. I, 841.

12. **Lepiota granulosa** (Batsch) Fr. Ep. 36. — Oud. Rév. I, 46. — Sacc. Syll. V, 47.— Ag. Lep. granulosus Fr. b. ferrugineus N. K. A. 1, V, 331; Arch. Néerl. VIII, 345; XIV, 212. — Wint. Kr. Fl. I, 837.

13. **Lepiota lenticularis** (Lasch) Fr. Ep. 26. — Oud. Rév. I, 47; N. K. A. 3, II, 644. — Sacc. Syll. V, 69. — Ag. Lep. lentic. Fr. — N. K. A. 2, I, 164; 437; 3, I, 232; Ag. Aman. lentic. Arch. Néerl. VIII, 344; XIV, 210. — Agar. lenticul. Fl. Bat. tab. 1100.

14. **Lepiota mastoidea** Fr. Ep. 30. — Oud. Rév. I, 41. — Sacc. Syll. V, 33. — Ag. Lep. mastoideus Fr. — Arch. Néerl. II, 18 et XIV, 211. — Wint. Kr. Fl. I, 841.

15. **Lepiota Meleagris** (Sow.) Fr. Ep. 51. — Oud. Rév. I, 42. — Sacc. Syll. V, 36. — Ag. Lep Mel. Fr. — N. K. A. 12, IV, 206 et 508; Fl. Bat. tab. 1214, sous le titre abusif d'*Ag. cepaestipes*. — Wint. Kr. Fl. I, 840.

16. **Lepiota molybdites** (Meyer) Fr. Ep. 30. — Oud. Rév. I, 11. — Sacc. Syll. V, 30. — Ag. Lep. molybd. Fr. — Arch. Néerl. II, 18 et XIV, 211.

17. **Lepiota naucina** Fr. Ep. 34. — Oud. Rév. I, 44. — Sacc. Syll. V, 43. — Ag. Lep. naucinus Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, 306; Arch. Néerl. XIV, 212. — Wint. Kr. Fl. I, 838.

***Lepiota ochracea** T. N. G. XII, 261. — Voir: *L. amianthina.*

18. **Lepiota polysticta** (Berk.) Fr. Ep. 37. — Oud. Rév. I,

46. — Sacc. Syll. V, 49. — Ag. Lep. polystictus Fr. — N. K. A. 2, 1, 312; Arch. Néerl. VIII, 345 et XIV. 213. — Wint. Kr. Fl. 1, 836.

19. **Lepiota procera** (Scop.) Fr. Ep. 29. — Oud Rév. 1, 40. — Sacc. Syll. V, 27. — Ag. Lep. procerus Fr. — T. N. G. XI, 380; Prodr. Fl. Bat. II. 3, p. 305; N. K. A. 2, 1, 437; 2, V, 117, 342 et 584; Arch. Néerl. XIV, 211; Fl. Bat. tab. 725; Oud. Herb. Ned. Pl. n° 345. — Wint. Kr. Fl. 1, 842.

20. **Lepiota rhacodes** (Vitt.) Fr. Ep. 29. — Oud. Rév. 1, 40. — Sacc. Syll. V, 29. — Ag. Lep. rhacodes Fr. — N. K. A. 2, 1, 437; 2, V, 342; Arch. Néerl. II, 18; VIII, 341; XIV, 211; Fl. Bat. tab. 1055, sous le nom abusif d'Ag. Friesii; Oud. Fgi Neerl. exs. n° 101. — Wint. Kr. Fl. 1, 841.

21. **Lepiota seminuda** (Lasch) Fr. Ep. 38. — Oud Rév. 1, 47. — Sacc. Syll. V, 50. — Ag. Lep. seminudus Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 1, p. 307; N. K. A. 2, 1, 437; 2, V, 343; Arch. Néerl. XIV, 213. — Wint. Kr. Fl. 1, 835.

22. **Lepiota straminella** (Bagl.) Fr. Ep. 35. — Oud. Rév. 1, 45. — Sacc. Syll. V, 15. — Ag. Lep. straminellus Fr. — N. K. A. 2, IV, 207.

ARMILLARIA.

1. **Armillaria laqueata** Fr. Ep. 46. — Oud. Rév. 1, 50. — Sacc. Syll. V, 85. — Ag. Arm. laqueatus Fr. — T. N. G. XI, 380; Prodr. Fl. Bat. II, 3. p. 308; N. K. A. 2, 1, 437; Arch. Néerl. XIV, 213. — Wint. Kr. Fl. 1, 830.

2. **Armillaria Laschii** Fr. Ep. 43. — Oud. Rév. II. (2). — Sacc. Syll. V, 79. — Ag. Arm. Laschii Fr. — Fl. Bat. tab. 1559; N. K. A. 3, 1, 443. — Wint. Kr. Fl. 1, 831.

3. **Armillaria luteo-virens** (A. S.) Fr. Ep. 41. — Oud. Rév. 1, 49. — Sacc. Syll. V, 75. — Ag. Arm. luteo-virens Fr. — Arch. Néerl. II, 19; XIV, 213. — Wint. Kr. Fl. 1, 833.

4. **Armillaria mellea** (Fl. Dan.) Fr. Ep. 44; Oud. Rév. 1, 50. — Sacc. Syll. V, 80. — Ag. Arm. melleus Fr. — T. N. G. XI, 380; Prodr. Fl. Bat. II, 3. p. 308; N. K. A. 1. 1, 293; 2, 1. 437; 2, V, 343 et 584; Arch. Nat. XIV, 213; Fl. Bat. tab. 775 et 815, perperam pro Pholiota mutabili habita! — Wint. Kr. Fl. 1, 834.

5. **Armillaria mucida** (Schrad). Fr. Ep. 46. — Oud Rév. 1, 50; N. K. A. 3, II, 858. — Sacc. Syll. V, 35. — Ag. Arm. mucidus Fr. T. N. G. XI, 380; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 308;

N. K. A. 2, I, 437; id. 2, V, 343; Arch. Néerl. XIV, 214. — Fl. Bat. tab. 1150. — Wint. Kr. Fl. I, 829.

6. **Armillaria robusta** (A. S.) Fr. Ep. 41. — Oud. Rév. I, 49. — Sacc. Syll. V, 74. — Ag. Arm. robustus Fr. — N. K. A. 2, IV, 509 et 3, I, 233; Arch. Néerl. II, 19; XIV, 213; Fl. Bat. tab. 1230. — Wint. Kr. Fl. I, 833.

TRICHOLOMA.

1. **Tricholoma albo-brunneum** (P.) Fr. Ep. 51. — Oud. Rév. I, 64. — Sacc. Syll. V, 93. — Ag. Tr. albo-brunneus Fr. — N. K. A. 2, IV, 509; 2, V, 343; Arch. Néerl. II, 21; XIV, 214; Fl. Bat. tab. 1604.

2. **Tricholoma album** (Schaeff.) Fr. Ep. 70. — Oud. Rév. I, 72. — Sacc. Syll. V, 127. — Ag. Tr. albus Fr. — T. N. G. XII, 262; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 11. — N. K. A. 2, I, 438; 2, V, 341; Arch. Néerl. XIV, 217; Fl. Bat. tab. 1410. — Wint. Kr. Fl. I, 812.

3. **Tricholoma anserinum** (v. Eeden) Oud. Rév. II, (3). — N. K. A. 2, VI, 282 et 3, I, 444. — Ag. Tr. anserinus v. Eeden Fl. Bat. tab. 1514. — Ag. Tr. personatus var. anserinus Fr. Ep. 72.

4. **Tricholoma arcuatum** (Bull.) Fr. Ep. 70. — Oud. Rév. I, 71. — Sacc. Syll. V, 126. — Ag. Tr. arcuatus Fr. — N. K. A. 2, I, 438; Arch. Néerl. XIV, 217. — Wint. Kr. Fl. I, 812.

5. **Tricholoma argyraceum** (Bull.) Fr. Ep. 58. — Oud. Rév. I, 68. — Sacc. Syll. V, 104. — Ag. Tr. argyraceus Fr. — N. K. A. 2, I, 438 et α chrysites ibid; Arch. Néerl. II, 21; XIV, 215. — Ag. Fr. terreus β argyraceus Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 310. — Wint. Kr. Fl. I, 821.

6. **Tricholoma atro-cinereum** (P.) Fr. Ep. 60. — Oud. Rév. I, 69. — Sacc. Syll. V, 107. — Ag. Tr. atro-cinereum Fr. — T. N. G. XII, 281; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 301; N. K. A. 2, I, 438; Arch. Néerl. XIV, 216. — Wint. Kr. Fl. I, 819.

7. **Tricholoma atro-squamosum** (Chev.) Oud. Rév. I, 68. — Sacc. Syll. I, V, 104. — Ag. Tr. atro-sanguineus Cooke. — N. K. A. 2, IV, 208.

8. **Tricholoma brevipes** (Bull.) — Fr. Ep. 75. — Oud. Rév. I, 73. — Sacc. Syll. V, 135. — Ag. Tr. brevipes Fr. — T. N. G. XI, 380; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 312; N. K. A. 2, I, 438; Arch. Néerl. XIV, 218; Fl. Bat. tab. 1095. — Wint. Kr. Fl. I, 809.

9. **Tricholoma cinerascens** (Bull.) Fr. Ep. 73. — Oud. Rév. I, 72. — Sacc. Syll. V, 131. — Ag. Tr. cinerascens Fr. — N. K. A. 2, I, 438; Arch. Néerl. XIV, 218.

10. **Tricholoma Columbetta** Fr. Ep. 55. — Oud. Rév. I, 67. — Sacc. Syll. V, 99. — Ag. Tr. Col. Fr. — T. N. G. XII, 261; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 309; N. K. A. 2, I, 138; 2, V, 343; Arch. Néerl. XIV, 215. — Wint. Kr. Fl. I, 823.

11. **Tricholoma elytroides** (Scop.) Fr. Ep. 62. — N. K. A. 3, II, 337. — Sacc. Syll. V, 110. — Ag. Tr. elytroides Fr. — Wint. Kr. Fl. I, 817.

12. **Tricholoma equestre** L.) Fr. Ep. 48. — Oud. Rév. I, 62. — Sacc. Syll. V, 87. — Ag. Tr. equestris Fr. — T. N. G. XII, 261; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 309; N. K. A. 2, I, 437, Arch. Néerl. XIV, 214; Fl. Bat. tab. 1134. — Wint. Kr. Fl. I, 829.

13. **Tricholoma flavo-brunneum** Fr. Ep. 51. — Oud. Rév. I, 64; N. K. A. 2, VI, 9. — Sacc. Syll. V, 93. — Ag. Tr. flavo-brunneus Fr. — Wint. Kr. Fl. I, 826.

14. **Tricholoma fulvellum** Fr. Ep. 50. — Oud. Rév. I, 63. — Sacc. Syll. V, 92. — Ag. Tr. fulvellus Fr. — Arch. Néerl. II, 20 et XIV, 214.

15. **Tricholoma gambosum** Fr. Ep. 66. — Oud. Rév. I, 70. — Sacc. Syll. V, 120. — Ag. Tr. gambosus Fr. — N. K. A. 2, IV, 208, Fl. Bat. tab. 1494. — Wint. Kr. Fl. I, 814.

***Tricholoma glauco-nitens** (Batsch.) Fr. — Ag. Tr. glauco-nitens Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 313; N. K. A. 2, I, 438. — Voir: *Hygrophorus.*

16. **Tricholoma grammopodium** (Bull.) Fr. Ep. 74. — Oud. Rév. I, 73. — Sacc. Syll. V, 133. — Ag. Tr. grammopodius Fr. — T. N. G. XII, 262; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 312; N. K. A. 2, V, 314 et 163; Arch. Néerl. XIV, 218. — Wint. Kr. Fl. I, 810.

17. **Tricholoma graveolens** (P. Fr. Ep. 67. — Oud. Rév. I, 70. — Sacc. Syll. V, 122. — Ag. Tr. graveolens Fr. — N. K. A. 2, I, 138; Arch. Néerl. XIV, 217. — Wint. Kr. Fl. I, 813.

18. **Tricholoma humile** Fr. Ep. 75. — Oud. Rév. I, 74. — Sacc. Syll. V, 136. — Ag. Tr. humilis Fr. — T. N. G. XII, 262. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 312; N. K. A. 2, V, 364; Arch. Néerl. XIV, 218; Fl. Bat. tab. 1599. — Wint. Kr. Fl. I, 808.

19. **Tricholoma imbricatum** Fr. Ep. 56. — Oud. Rév. I, 67. — Sacc. Syll. V, 101. — Ag. Tr. imbricatus Fr. — T. N. G. XII, 261; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 309; N. K. A. 2, I, 438; 2, V, 343. Arch. Néerl. XIV, 215. — Wint. Kr. Fl. I, 822.

20 **Tricholoma immundum** (Berk.) Fr. Ep. 56. — N. K. A. 3,

II, 645. — Sacc. Syll. V, 102. — Ag. Tr. immundus Fr. — Wint. Kr. Fl. I, 822.

21. **Tricholoma inamoenum** Fr. Ep. 64. — Sacc. Syll. V, 113. — Ag. Tr. inamoenus Fr. — Fl. Bat. tab. 1695. — Wint. Kr. Fl. I, 816.

22. **Tricholoma ionides** (Bull.) Fr. Ep. 65. — Oud. Rév. I, 69. — Sacc. Syll. V, 116. — Ag. Tr. ionides Fr. — N. K. A. 2, I, 438; 2, V, 344; Arch. Néerl. XIV, 216.

23. **Tricholoma leucocephalum** Fr. Ep. 71. — Oud. Rév. I, 72. — Sacc. Syll. V, 128. — Ag. Tr. leucocephalus Fr. — T. N. G. XII, 262; N. K. A. 2, I, 438; Arch. Néerl. XIV, 217. — Wint. Kr. Fl. I, 811.

24. **Tricholoma luridum** (Schaeff.) Fr. Ep. 54. — Oud. Rév. I, 66. — Sacc. Syll. V, 97. — Ag. Tr. luridus Fr. — N. K. A. 2, IV, 207; Fl. Bat. tab. 1645. — Wint. Kr. Fl. I, 821.

25. **Tricholoma melaleucum** (P.) Fr. Ep. 71. — Oud. Rév. I, 73. — Sacc. Syll. V, 134. — Ag. Tr. melaleucus Fr. — N. K. A. 2, I, 438; 2, V, 344; Arch. Néerl. II, 21; XIV, 218. — Wint. Kr. Fl. I, 809.

26. **Tricholoma nudum** (Bull.) Fr. Ep. 72. — Oud. Rév. I, 72. — Sacc. Syll. V, 131. — Ag. Tr. nudus Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 311; N. K. A. 2, I, 438; 2, V, 344; Arch. Néerl. XIV, 218; Fl. Bat. tab. 1450. — Wint. Kr. Fl. I, 810.

27. **Tricholoma orcinum** Fr. Ep. 70. — Oud. Rév. I, 71; N. K. A. 2, VI, 10. — Sacc. Syll. V, 127. — Ag. Tr. orcinus Fr.

28. **Tricholoma orirubens** Quél. Fl. Myc. de la Fr. 285. — Oud. Rév. I, 67; N. K. A. 2, VI, 9. — Sacc. Syll. V, 104. — Ag. Tr. orirubens Fr.

29. **Tricholoma panaeolum** Fr. Ep. 73. — Oud. Rév. I, 72. — Sacc. Syll. V, 132. — Ag. Tr. panaeolum Fr. N. K. A. 2, IV, 209. — Wint. Kr. Fl. I, 810.

30. **Tricholoma patulum** Fr. Ep. 69. — Oud. Rév. I, 71. — Sacc. Syll. V, 125. — Ag. Tr. patulus Fr. — N. K. A. 1, I, 49; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 311. — Arch. Néerl. XIV, 217. — Wint. Kr. Fl. I, 812.

31. **Tricholoma personatum** Fr. Ep. 72. — Oud. Rév. I, 72. — Sacc. Syll. V, 130. — Ag. Tr. personatus Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 311; N. K. A. 2, I, 438; 2, V, 344. — Arch. Néerl. XIV, 218. — Wint. Kr. Fl. I, 810.

32. **Tricholoma Pes caprae** Fr. Ep. 68. — Oud. Rév. I, 70. — Sacc. Syll. V, 124. — Ag. Tr. Pes. caprae Fr. — N. K. A. 2, III, 238; Arch. Néerl. II, 217. — Wint. Kr. Fl. I, 813.

33. **Tricholoma pessundatum** Fr. Ep. 51. — Oud. Rév. I,

64. — Sacc. Syll. V, 94. — Ag. Tr. pessundatus Fr. — N. K. A. 2, III, 238; Arch. Néerl. XIV, 214. — Wint. Kr. Fl. I, 826.

34. **Tricholoma portentosum** Fr. Ep. 48. — Oud. Rév. I, 62. — Sacc. Syll. XI, 89. — Ag. Tr. portentosus Fr. — N. K. A. I, V, 331 et 2, V, 343; Arch. Néerl. VIII, 345 et XIV, 214; Fl. Bat. tab. 1529. — Wint. Kr. Fl. I, 828.

35. **Tricholoma psammopus** (Kalchbr.) Fr. Ep. 54. — Oud. Rév. I, 66. — Sacc. Syll. V, 98. — Ag. Tr. psammopus Kalchbr. Icon. Sel. Fg. Hung. tab. III, f. 2 et p. 12. — Fr. Ep. 54. — N. K. A. 2, III, 238; Arch. Néerl. XIV, 215.

36. **Tricholoma resplendens** Fr. Ep. 49. — Oud. Rév. I, 62; N. K. A. 2, VI, 9. — Sacc. Syll. V, 90. — Ag. Tr. resplendens Fr. — Wint. Kr. Fl. I, 827.

37. **Tricholoma Russula** (Schaeff.) Fr. Ep. 52. — Oud. Rév. I, 65. — Sacc. Syll. V, 94. — Ag. Tr. Russula Fr. — N. K. A. I, V, 331; Arch. Néerl. VIII, 345 et XIV, 214. — Wint. Kr. Fl. I, 825.

38. **Tricholoma rutilans** (Schaeff.) Fr. Ep. 53. — Oud. Rév. I, 65; N. K. A. 2, VI, 283. — Sacc. Syll. I, 96. — Ag. Tr. rutilans Fr. — T. N. G. XI, 380; Prodr. Fl. Bat. II, 3, 309; N. K. A. 2, I, 137; 2, V, 345 et 584; Arch. Néerl. XIV, 215; Fl. Bat. tab. 1039. — Wint. Kr. Fl. I, 825.

39. **Tricholoma saponaceum** Fr. Ep. 59. — Oud. Rév. I, 69. — Sacc. Syll. V, 106. — Ag. Tr. saponaceus Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 310; N. K. A. 2, I, 138; 2, V, 343; Arch. Néerl. XIV, 216; Fl. Bat. tab. 1120. — Wint. Kr. Fl. I, 820.

40. **Tricholoma scalpturatum** Fr. Ep. 55. — Oud. N. K. A. 3, II, 645. — Sacc. Syll. V, 100. — Ag. Tr. scalpturatus Fr. — Wint. Kr. Fl. I, 823.

41. **Tricholoma sordidum** Fr. Ep. 77. — Oud. Rév. I, 74; N. K. A. 2, VI, 10. — Sacc. Syll. V, 139. — Ag. Tr. sordidus Fr. — Wint. Kr. Fl. I, 807.

42. **Tricholoma spermaticum** Fr. Ep. 76. — Oud. N. K. A. 3, I, 143; id. Rév. II, p. (2). — Sacc. Syll. I, 90.

43. **Tricholoma subpulverulentum** (P.) Fr. Ep. 76. — Oud. Rév. I, 74. — Sacc. Syll. V, 136. — Ag. Tr. subpulverulentus Fr. — N. K. A. 2, II, 35; Arch. Néerl. XIV, 218. — Wint. Kr. Fl. I, 808.

44. **Tricholoma sudum** Fr. Ep. 61. — Oud. Rév. I, 69. — Sacc. Syll. V, 109. — Ag. Tr. sudus Fr. — T. N. G. XII, 264; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 310; N. K. A. 2, I, 138; Arch. Néerl. XIV, 216. — Wint. Kr. Fl. I, 818.

45. **Tricholoma sulphureum** (Bull.) Fr. Ep. 63. — Oud. Rév. 1, 69. — Sacc. Syll. V, 112. — Ag. Fr. sulphureus Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 311; N. K. A. 2, I, 438; 2, V, 343; Arch. Néerl. XIV, 216; Fl. Bat. tab. 1070. — Wint. Kr. Fl. I, 817.

46. **Tricholoma terreum** (Schaeff.) Fr. Ep. 57. — Oud. Rév. I, 67. — Sacc. Syll. V, 104. — Ag. Tr. terreus Fr. — T. N. G. XI, 380; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 309; N. K. A. 2, I, 438; 2, V, 343; Fl. Bat. tab. 1544. — Wint. Kr. Fl. I, 821.

47. **Tricholoma ustale** Fr. Ep. 51. — Oud. Rév. I, 64. — Sacc. Syll. V, 94. — Ag. Tr. ustalis Fr. — N. K. A. 2, V, 343; Arch. Néerl. II, 21 et XIV, 214; Fl. Bat. tab. 1345. — Wint. Kr. Fl. I, 826.

48. **Tricholoma vaccinum** Fr. Ep. 56. — Oud. Rév. I, 67; N. K. A. 3, II, 646. — Sacc. Syll. V, 102. — Ag. Tr. vaccinus Fr. — N. K. A. 2, I, 438; 2, II, 34; Arch. Néerl. 215; Fl. Bat. tab. 1130. — Wint. Kr. Fl. I, 822.

49. **Tricholoma variegatum** (Scopoli) Fr. Ep. 53. — Oud. Rév. I, 65. — Sacc. Syll. V, 96. — Ag. Tr. variegatus Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 309; N. K. A. 2, I, 438; 2, IV, 207; 2, V, 343; Arch. Néerl. XIV, 215. — Wint. Kr. Fl. I, 825.

CLITOCYBE.

1. **Clitocybe brumalis** Fr. Ep. 103. — Oud. Rév. I, 87. Sacc. Syll. V, 180. — Ag. Cl. brum. Fr. — N. K. A. 2, V, 463 et 3, I, 232. — Wint. Kr. Fl. I, 788.

2. **Clitocybe candicans** (P.) Fr. Ep. 88. — Oud. Rév. I, 84. — Sacc. Syll. V, 157. — Ag. Cl. cand. Fr. — T. N. G. XI, 386; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 314; N. K. A. 2, V, 344; Arch. Néerl. XIV, 220. — Wint. Kr. Fl. 799.

3. **Clitocybe catina** Fr. Ep. 99. — Oud. Rév. I, 86. — Sacc. Syll. V, 174. — Ag. Cl. catinus Fr. — N. K. A. 2, I, 139; 2, V, 345; Arch. Néerl. II, 22; XIV, 221. — Fl. Bat. tab. 1504. — Wint. Kr. Fl. I, 792.

4. **Clitocybe cerussata** Fr. Ep. 86. — Oud. Rév. 84. — Sacc. Syll. V, 154. — Ag. Cl. cerussatus Fr. — T. N. G. XII, 262; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 313; N. K. A. 2, IV, 509 et 2, V, 344; Arch. Néerl. XIV, 220; Fl. Bat. tab. 1579. — Wint. Kr. Fl. I, 800.

5. **Clitocybe clavipes** (P.) Fr. Ep. 79. — Oud. Rév. I, 83. — Sacc. Syll. V, 143. — Ag. Cl. clav. Fr. — T. N. G. XII, 262; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 313; N. K. A. 2, V, 344; Arch. Néerl. XIV, 219. — Wint Kr. Fl. I, 805.

6. **Clitocybe cyathiformis** Fr. Ep. 100. — Oud. Rév. 1, 86. — Sacc. Syll. V, 176. — Ag. Cl. cyathif. Fr. — T. N. G. XII, 262; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 315; N. K. A. 2, I, 139; 2, V, 345; Arch. Néerl. XIV, 221. — Wint. Kr. Fl. I, 791.

7. **Clitocybe dealbata** (Sow.) Fr. Ep. 88. — Oud. Rév. 1, 84. — Sacc. Syll. V, 157. — Ag. Cl. dealbatus Fr. — N. K. A. 1, V, 293; 3, I, 232; Arch. Néerl. XIV, 222. — Wint. Kr. Fl. I, 799.

8. **Clitocybe ericetorum** (Bull.) Fr. Ep. 99. — Oud. N. K. A. 3, III, 1082. — Sacc. Syll. V, 175. — Ag. Cl. ericet. Fr. — Wint Kr. Fr. I, 791.

9. **Clitocybe expallens** (P.) Fr. Ep. 100. — Oud. Rév. I, 87. — Sacc. Syll. V, 177. — Ag. Cl. expall. Fr. — N. K. A. 2, III, 239; Arch. Néerl. XIV, 221. — Wint. Kr. Fl. I, 790.

10. **Clitocybe flaccida** (Sow.) Fr. Ep. 97. — Oud. Rév. I, 86. — Sacc. Syll. V, 172. — Ag. Cl. flaccidus Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, 315; N. K. A. 2, I, 139; 2, V, 345; Arch. Néerl. XIV, 221; Fl. Bat. tab. 1041. — Wint. Kr. Fl. I. 793.

11. **Clitocybe fragrans** (Sow.) Fr. Ep. 105. — Oud. Rév. I, 88. — Sacc. Syll. V, 188. — Ag. Cl. fragrans Fr. — T. N. G. XII, 262; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 315; N. K. A. 2, I, 139; 2, V, 345; Arch. Néerl. XIV, 222; Fl. Bat. tab. 1365. — Wint. Kr. Fl. I, 787.

12. **Clitocybe fumosa** (P.) Fr. Ep. 91. — Oud. N. K. A. 3, I, 232. — Sacc. Syll. V, 161. — Ag. Cl. fumosus Fr. — Wint. Kr. Fl. I, 797.

13. **Clitocybe geotropa** (Bull.) Fr. Ep. 96. — Oud. Rév. I, 85. — Sacc. Syll. V, 171. — Ag. Cl. geotropus Fr. — N. K. A. 2, IV, 209. — Wint. Kr. Fl. I, 793.

14. **Clitocybe gilva** (P.) Fr. Ep. 95. — Oud. Rév. I, 85; N. K. A. 3, II, 646. — Sacc. Syll. V, 170. — Ag. Cl. gilvus Fr. — T. N. G. XI, 381; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 314; N. K. A 2, I, 139; 2, V, 345; Arch. Néerl. XIV, 221. — Wint. Kr. Fl. I, 794.

15. **Clitocybe infundibuliformis** (Schaeff.) Fr. Ep. 93. — Oud. Rév. I. 85. — Sacc. Syll. V, 165. — Ag. Cl. infund. Fr. T. N. G. XI, 381; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 311; N. K. A. I, V, 293; 2, I, 139; 2, V, 344; Arch. Néerl. XIV, 220. — Wint. Kr. Fl. I, 795.

Subsp. **membranaceus** Fr. Ep. 94. — Oud. N. K. A. 3, II, 858.

16. **Clitocybe inornata** (Sow.) Fr. Ep. 80. — Oud. Rév. I, 83. —

Sacc. V, 144. — Ag. Cl. inornatus Fr. — N. K. A. 2, IV, 209; Fl. Bat. tab. 1250.

17. **Clitocybe inversa** (Scop.) Fr. Ep. 96. — Sacc. Syll. V, 172. — Ag. Cl. inversus Fr. — Fl. Bat. tab. 1630. — Wint. Kr. Fl. I; 793.

18. **Clitocybe laccata** (Scop). Fr. Ep. 108. — Oud. Rév. I, 88. — Sacc. Syll. V, 197. — Ag. Cl. laccatus Fr. — T. N. G. XI, 381; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 316; N. K. A. 1, V, 293; 2, I, 439; 2, V, 345 et 584; Arch. Néerl. 222; Fl. Bat. tab. 824. — Wint. Kr. Fl. I, 785.

19. **Clitocybe maxima** (Gaertn. et Meyer) Fr. Ep. 93. — Oud. Rév. I, 85. — Sacc. Syll. V, 165. — Ag. Cl. maximus Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 314; N. K. A. 2, I, 439; 2, V, 344; Arch. Néerl. XIV, 220; Fl. Bat. tab. 1330. — Wint. Kr. Fl. I, 795.

20. **Clitocybe metachroa** Fr. Ep. 103. — N. K. A. 3, II, 186. — Sacc. Syll. V, 185. — Ag. Cl. metachrous Fr. — Wint. Kr. Fl. I, 788.

21. **Clitocybe nebularis** (Batsch.) Fr. Ep. 79. — Oud. Rév. I, 83. — Sacc. Syll. V, 142. — Ag. Cl. nebul. Fr. — T. N. G. XI, 381; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 313; N. K. A. 2, I, 439; 2, V, 344; Arch. Néerl. XIV, 219; Fl. Bat. tab. 1160. — Wint. Kr. Fl. I, 806.

22. **Clitocybe obbata** Fr. Ep. 101. — Oud. Rév. I, 87. — Sacc. Syll. V, 177. — Ag. Cl. obbatus Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 315; Arch. Néerl. XIV, 222. — Wint. Kr. Fl. I, 790.

23. **Clitocybe obsoleta** (Batsch.) Fr. Ep. 105. — Oud. Rév. I, 88. — Sacc. Syll. V, 189. — Ag. Cl. obsoletus Fr. — N. K. A. 2, IV, 210 et V, 315. — Wint. Kr. Fl. I, 786.

24. **Clitocybe odora** (Bull.) Fr. Ep. 105. — Oud. Rév. I, 84. — Sacc. Syll. V, 153. — Ag. Cl. odorus Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 313; N. K. A. 2, I, 139; 2, V, 344; Arch. Néerl. XIV, 219; Fl. Bat. tab. 1220. — Wint. Kr. Fl. I, 801.

25. **Clitocybe opaca** With. Fr. Ep. 93. — Oud. Rév. I, 85. — Sacc. Syll. V, 164. — Ag. Cl. opacus Fr. — T. N. G. XII, 262; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 314; N. K. A. 2, V, 344; Arch. Néerl. XIV, 220. — Wint. Kr. Fl. I, 796.

26. **Clitocybe phyllophila** Fr. Ep. 87. — Oud. Rév. I, 84. — Sacc. Syll. V, 155. — Ag. Cl. phyllophilus Fr. — T. N. G. XI, 381; Prodr. Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 311; N. K. A. 2, I, 139; 2, V, 344; Arch. Néerl. XIV, 220. — Wint. Kr. Fl. I, 800.

27. **Clitocybe splendens** (P.) Fr. Ep. 96. — Sacc. Syll. V,

172. Ag. Cl. spl. Fr. — Fl. Bat. tab. 1169. — Wint. Kr. Fl. I, 793.

28. **Clitocybe suaveolens** (Fl. Dan.) Fr. Ep. 102. — Oud. Rév. I, 87. — Sacc. Syll. V, 179. — Ag. Cl. suav. Fr. — T. N. G. XII, 262; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 315; N. K. A. 2, II, 439; 3, I, 233; Arch. Néerl. XIV, 222. — Wint. Kr. Fl. I, 789.

29. **Clitocybe tortilis** (Bolton) Fr. Ep. 109. — Oud. Rév. I, 88. — Sacc. Syll. V, 198. — Ag. Cl. tort. Fr. — T. N. G. XII, 262; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 316; N. K. A. 2, I, 439; 2, V, 345. — Arch. Néerl. XIV, 222. — Wint. Kr. Fl. I, 784.

30. **Clitocybe Tuba** Fr. Ep. 99. — Oud. Rév. I, 86. — Sacc, Syll. V, 175. — Ag. Cl. Tuba Fr. — N. K. A. 2, III, 239; Arch. Néerl. XIV, 221; Oud. Fgi. Neerl. exs. n°. 201. — Wint. Kr. Fl. I, 791.

31. **Clitocybe tyrianthina** Fr. Ep. 83. — Oud. Rév. I, 84. — Sacc. Syll. V, 117. — Ag. Cl. tyrianthinus Fr. — Arch. Néerl. II, 21; XIV, 219. — Wint. Kr. Fl. I, 803.

COLLYBIA.

1. **Collybia acervata** Fr. Ep. 122. — Oud. Rév. I, 96. — Sacc. Syll. V, 234. — Ag. Coll. acervatus Fr. — N. K. A. 2, I, 139; Arch. Néerl. XIV, 224. — Wint. Kr Fl. I, 773.

2. **Collybia aquosa** (Bull.) Fr. Ep. 122. — Oud. Rév. I, 97. — Sacc. Syll. V, 237. — Ag. Coll. aquosus Fr. — Arch. Néerl. 2, IV, 210. — Wint. Kr. Fl. I, 773.

3. **Collybia butyracea** (Bull.) Fr. Ep. 113. — Oud. Rév. I, 95. — Sacc. Syll. V, 209. — Ag. Coll. butyraceus Fr. — N. K. A. 2, V, 345; Arch. Néerl. II, 22; XIV, 223.

***Collybia caulicinalis.** — Ag. Coll. caulicinalis Prodr. Fl. Bat. 3, I, 318 (nec Bull.). — Voir: *C. stipitaria.*

1. **Collybia chrysoropha** (B.Br.). — Sacc. Syll. V, 213. — Ag. Coll. chrysorophus B.Br. — Fl. Bat. tab. 1655.

5. **Collybia cirrhata** (Schum.) Fr. Ep. 119. — Oud. Rév. I, 96. — Sacc. Syll. V, 224. — Ag. Coll. cirrhatus Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 318; N. K. A. 2, V, 346; Arch. Néerl. XIV, 224. — Wint. Kr. Fl. I, 776.

6. **Collybia Clavus** (L.) Fr. Ep. 123. — Oud. Rév. I, 97. — Sacc. Syll. V, 238. — Ag. Coll. Clavus Fr. — Wint. Kr. Fl. I, 773.

7. **Collybia collina** (Scop.) Fr. Ep. 119. — N. K. A. 2, VI, 283 et 3, I, 114. Oud. Rév. I, 96. — Sacc. Syll. V, 226. Ag. Coll.

collinus Fr. — Arch. Néerl. II, 23; XIV, 224. — Wint. Kr. Fl. I, 775.

8. **Collybia confluens** (P.) Fr. Ep. 117. — Oud. Rév. I, 96. — Sacc. Syll. V, 222. — Ag. Coll. confl. Fr. — N. K. A. 2, I, 165 et 2, V, 345; Arch. Néerl. VIII, 345 et XIV, 224. — Wint. Kr. Fl. I, 777.

9. **Collybia conigena** (P.) Fr. Ep. 118. — Oud. Rév. I, 96. — Sacc. Syll. V, 223. — Ag. Coll. conigenus Fr. — N. K. A. I, V, 332; Arch. Neerl. VIII, 346 et XIV, 224. — Wint. Kr. Fl. I, 776.

10. **Collybia dryophila** Fr. Ep. 122. — Oud. Rév. I, 96. — Sacc. Syll. V, 254. — Ag. Coll. dryophilus Fr. — T. N. G. XI, 381; Prodr. Fl. Bat. II, 319; N. K. A. 2, I, 439; 2, V, 346; Arch. Néerl. XIV, 224; Fl. Bat. tab. 1325. — Wint. Kr. Fl. I, 773.

11. **Collybia erythropus** — Ag. Coll. erythropus P. Syn. 367. — Rab. Kr. Fl. 532. — N. K. A. 2, I, 139.

12. **Collybia fusipes** (Bull.) Fr. Ep. 111. — Oud. Rév. I, 94. — Sacc. Syll. V, 206. — Ag. Coll. fusipes Fr. — T. N. G. XI, 381; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 317; N. K. A. 2, V, 345; Arch. Néerl. XIV, 223; Fl. Bat. tab. 1705. (Détermination fautive). — Wint. Kr. Fl. I. 782.

12. **Collybia longipes** (Bull.) Fr. Ep. 110. — Oud. Rév. I, 94. — Sacc. Syll. V, 202. — Ag. Coll. longipes Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 317; N. K. A. 2, V, 345; Arch. Néerl. XIV, 223. — Wint. Kr. F. I, 783.

13. **Collybia Ludius** Fr. Ep. 125. — Oud. Rév. I, 97. — Sacc. Syll. V, 239. — Ag. Coll. Ludius Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 319; Arch. Néerl. XIV, 225. — Wint. Kr. Fl. I, 771.

14. **Collybia maculata** (A. S.) Fr. Ep. 112. — Oud. Rév. I, 94; N. K. A. 2, VI, 11. — Sacc. Syll. V, 207. — Ag. Coll. maculatus Fr. — Arch. Néerl. II. 22; XIV, 223; Fl. Bat. tab. 1154. — Wint. Kr. Fl. I, 781.

15. **Collybia Micheliana** Fr. Ep. 124. — Oud. Rév. I, 97. — Sacc. Syll. V, 239. — Ag. Coll. Michelianus Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 319; Arch. Néerl. XIV, 225. — Wint Kr. Fl. I, 772.

16. **Collybia muscigena** (Schum.) Fr. Ep. 124. — Oud Rév. I, 97. — Sacc. Syll. V, 239. — Ag. Coll. muscigenus Fr. — T. N. G. XII, 262; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 319; N. K. A. 2, V, 584; Arch. Néerl. XIV, 225; Fl. Bat. tab. 1500. — Wint. Kr. Fl. I, 772.

17. **Collybia platyphylla** Fr. Ep. 110. — N. K. A. 3, II,

187. — Sacc. Syll. V, 203. — Ag. Coll. platyphyllus Fr. — Wint. Kr. Fl. I, 782.

18. **Collybia radicata** (Relhan) Fr. Ep. 109. — Oud. Rév. I, 94. — Sacc. Syll. V, 200. — Ag. Coll. radicatus Fr. — N. K. A. 2, V, 345; Arch. Néerl. II, 22; XIV, 223. — Wint. Kr. Fl. I, 783.

19. **Collybia rancida** Fr. Ep. 125. — Oud. N. K. A. 3, II, 646. — Sacc. Syll. V, 242. — Ag. Coll. rancidus Fr. — Wint. Kr. Fl. I, 771.

20. **Collybia stipitaria** Fr. Ep. 116. — Oud. Rév. I, 95. — Sacc. Syll. V, 216. — Ag. Coll. stipitarius Fr. — T. N. G. XI, 381; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 318 (sub. 2426); N. K. A. 2, V, 345; Arch. Néerl. XIV, 224. — Wint. Kr. Fl. I, 778.

21. **Collybia Trochilus** (Lasch) Fr. Ep. 116. — Oud. Rév. I, 95. — Sacc. Syll. V, 215. — Ag. Coll. Troch. Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 318; Arch. Néerl. XIV, 224. — Wint. Kr. Fl. I, 778.

22. **Collybia tuberosa** (Bull.) Fr. Ep. 119. — Oud. N. K. A. 3, II, 187. — Sacc. Syll. V, 221. — Ag. Coll. tuberosus Fr. — Wint. Kr. Fl. I, 776.

23. **Collybia velutipes** (Curtis) Fr. Ep. 115. — Oud. Rév. I. 95. — Sacc. Syll. V, 212. — Ag. Coll. velut. Fr. — T. N. G. XI, 381; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 317; — N. K. A. I, V, 293; 2, I, 139; 2, V, 345; Arch. Néerl. XIV, 223. — Fl. Bat. tab. 799.

24. **Collybia xanthopoda** Fr. Ep. 120. — Oud. Rév. II, (3); N. K. A. 2, VI, 283 et 3, I, 445. — Sacc. Syll. V, 226. — Ag. Coll. xanthopus Fr. — Wint. Kr. Fl. I, 775.

MYCENA.

1. **Mycena Aeicula** (Schaeff.) Fr. Ep. 147. — Oud. Rév. I, 117. — Sacc. Syll. V, 288. — Ag. Myc. Acic. Fr. — T. N. G. XI, 381; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 321; N. K. A. 2, V, 346; Arch. Néerl. XIV, 228. — Wint. Kr. Fl. I, 754.

2. **Mycena acitis** Fr. Ep. 113. — Oud. Rév. I, 116. — Sacc. Syll. V, 280. — Ag. Myc. act. Fr. — N. K. A. 2, IV, 211. — Wint. Kr. Fl. I, 757.

3. **Mycena alcalina** Fr. Ep. 112. — Oud. Rév. I, 116. — Sacc. Syll. V, 277. — Ag. Myc. alcalinus. Fr. T. N. G. XII, 262; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 323; N. K. A. 2, V, 346; Arch. Néerl. XIV, 227. — Wint. Kr. Fl. I, 759.

4. **Mycena ammoniaca** Fr. Ep. 142. — Oud. N. K. A. 3, II, 647. — Sacc. Syll. V, 278. — Ag. Myc. ammoniacus Fr. — Wint. Kr. Fl. I, 759.

5. **Mycena atro-cyanea** (Batsch) Fr. Ep. 141. — Oud. Rév. I, 116; N. K. A. 2, VI, 11. — Sacc. Syll. V, 276. Ag. Myc. atrocyaneus Fr. — Wint. Kr. Fl. I, 759.

6. **Mycena balanina** (Berk.) Fr. Ep. 130. — Oud. Rév. I, 112. — Sacc. Syll. V, 252. — Ag. Myc. balaninus Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 320; Arch. Néerl. XIV, 225. — Wint. Kr. Fl. I, 768.

7. **Mycena Benzonii** Fr. Ep. 136. — Oud. Rév. I, 114. — Ag. Myc. Benz. Fr. — Arch. Néerl. II, 23; XIV, 226. — Hiatula Benzonii (Fr. El. I, 20) Sacc. Syll. V, 305.

8. **Mycena capillaris** (Schum.) Fr. Ep. 153. — Oud. N. K. A. 3, III 1082. — Ag. Myc. capillaris Fr. — Wint. Kr. Fl. I, 749.

9. **Mycena chloranthа** Fr. Ep. 134. — Oud. Rév. I, 113. — Sacc. Syll. V, 258. — Ag. Myc. chloranthus Fr. — T. N. G. XII, 262; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 321; N. K. A. 2, V, 346; Arch. Néerl. XIV, 226. — Wint Kr. Fl. I, 765.

10. **Mycena citrinella** (P.) Fr. Ep. 150. — Oud. Rév. I, 119. — Sacc. Syll. V, 296. — Ag. Myc. citrinellus Fr. — N. K. A. 1, V, 332; Arch. Néerl. VIII, 346; XIV, 229. — Wint. Kr. Fl. I, 751.

11. **Mycena clavicularis** Fr. Ep. 149. — Oud. Rév. I, 119. — Sacc. Syll. V, 295. — Ag. Myc. clav. Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 325; N. K. A. 2, I, 410; Arch. Néerl. XIV, 229. — Wint. Kr. Fl. I, 752.

12. **Mycena clavularis** (Batsch) Fr. Ep. 151. — Oud. Rév. I, 119. — Sacc. Syll. V, 298. — Ag. Myc. clav. Fr. — T. N. G. XII, 263; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 325; Arch. Néerl. XIV, 229.

13. **Mycena cohaerens** Fr. Ep. 137. — Oud. Rév. I, 114. — Sacc. Syll. V, 265. — Ag. Myc. coh. Fr. — N. K. A. 1, V, 332; Arch. Néerl. VIII, 346 et XIV, 226. — Wint Kr. Fl. I, 763.

14. **Mycena corticola** (Schum.) Fr. Ep. 152. — Oud. Rév. I, 121. — Sacc. Syll. V, 302. — Ag. Myc. cort. Fr. — T. N. G. XII, 263; Prodr. Fl. Bat. 3, p. 326; N. K. A. 1, V, 293; 2, I, 410; 2, V, 347; Arch. Néerl. XIV, 230. — Wint. Kr. Fl. I, 749.

15. **Mycena debilis** (Bull.) Fr. Ep. 145. — Oud. Rév. I, 117. — Sacc. Syll. V, 285. — Ag. Myc. deb. Fr. — T. N. G. XII, 262; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 323; Arch. Néerl. XIV, 228. — Wint. Kr. Fl. I, 756.

16. **Mycena discopoda** (Lév.) Fr. Ep. 151. — Oud. Rév. I, 120. — Sacc. Syll. V, 299. — Ag. Myc. discopus Fr. — Ag. Myc. discopoda Arch. Néerl. XIV, 229; Ag. Myc. subtilissimus Oud. Arch. Néerl. II, 24.

17. **Mycena dissiliens** Fr. Ep. 141. — Oud. Rév. I, 116; — Sacc. Syll. V, 276. — Ag. Myc. diss. Fr. — T. N. G. XII, 262; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 323; N. K. A. II, 1, 140; Arch. Néerl. XIV, 227. — Wint. Kr. Fl. I, 759.

18. **Mycena echinipes** (Lasch) Fr. Ep. 152. — Oud. Rév. I, 120. — Sacc. Syll. V, 300. — Ag. Myc. ech. Fr. — T. N. G. XI, 381; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 325; Arch. Néerl. XIV, 229. — Wint. Kr. Fl. I, 750.

19. **Mycena epipterygia** (Scop.) Fr. Ep. 149. — Oud. Rév. I, 118. — Sacc. Syll. V, 294. — Ag. Myc. epipt. Fr. — T. N. G. XII, 263; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 325; N. K. A. I, V. 293; 2. V, 346; Arch. Néerl. XIV, 229; Oud. Fgi Neerl. exs. n°. 202. — Wint. Kr. Fl. I, 752.

20. **Mycena excisa** (Lasch) Fr. Ep. 137. — Oud. Rév. I, 114. — Sacc. Syll. V, 267. — Ag. Myc. excisus Fr. — T. N. G. XII, 262; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 322; N. K. A. 2, I, 140; Arch. Néerl. XIV, 226. — Wint. Kr. Fl. I, 762.

21. **Mycena fagetorum** Fr. Ep. 138. — Oud. Rév. I, 114. — Sacc. Syll. V, 267. — Ag. Myc. fag. Fr. — N. K. A. 2. III, 240; Arch. Néerl. XIV, 227. — Wint. Kr. Fl. I, 762.

22. **Mycena filipes** (Bull.) Fr. Ep. 144. — Oud. Rév. I, 117. — Sacc. Syll. V, 283. — Ag. Myc. filipes Fr. — T. N. G. XII, 262; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 323; N. K. A. 2, V, 346; Arch. Néerl. XIV, 228. — Wint. Kr. Fl. I, 757.

23. **Mycena flavo-alba** Fr. Ep. 135. — Oud, Réd. I, 114. — Sacc. Syll. V, 259. — Ag. Myc. flavo-albus Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 321; Arch. Néerl. XIV, 226. — Wint. Kr. Fl. 764.

24. **Mycena galericulata** (Scop.) Fr. Ep. 138. — Oud. Rév. I, 115. — Sacc. Syll. V, 268. — Ag. Myc. galericulatus Fr. — T. N. G. XI, 381; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 322; N. K. A. 2, I, 140; 2, V, 346; Arch. Néerl. XIV, 227. — Wint. Kr. Fl. I, 761.

25. **Mycena galopoda** Fr. Ep. 149. — Oud. Rév. I, 118. — Sacc. Syll. V, 292. — Ag. Myc. galopus Fr. — T. N. G. XII, 263; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 324; N. K. A. 2, V, 346; Arch. Néerl. XIV, 228. — Wint. Kr. Fl. I, 753.

26. **Mycena haematopoda** (P.) Fr. Ep. 148. — Oud. Rév. I, 117. — Sacc. Syll. V, 291. — Ag. Myc. haematopus Fr. — T.

N. G. XII, 263; Prodr Fl. Bat. II, 3, p. 324; N. K. A. 2, V, 346; Arch. Néerl. XIV, 228. — Wint. Kr. Fl. I, 754.

27. **Mycena hiemalis** (Osb.) Retz. — Fr. Ep. 153. — Oud. Rév. I, 121. — Sacc. Syll. V, 302. — Ag. Myc. hiem. Fr. — N. K. A. I, I, 49; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 326; N. K. A. 2, I, 440; 2, V, 347; Arch. Néerl. XIV, 230. — Wint. Kr. Fl. I, 749.

28. **Mycena lactea** (P.) Fr. Ep. 135. — Oud. Rév. I, 114. — Sacc. Syll. V. 258. — Ag. Myc. lacteus Fr. — T. N. G. XII, 262; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 321; N. K. A. 2, V, 346; Arch. Néerl. XIV, 226. — Wint. Kr. Fl. I, 763.

29. **Mycena leptocephala** (P.) Fr. Ep. 141. — Oud. Rév. I, 116. — Sacc. Syll. V, 277. — Ag. Myc. leptocephalus Fr. — Prodr. Fl. Bat. 3, II, p. 323; Arch. Néerl. XIV, 227. — Wint. Kr. Fl. I, 759.

30. **Mycena lineata** (Bull.) Fr. Ep. 134. — Oud. Rév. I, 113. — Sacc. Syll. V, 258. — Ag. Myc. lineatus Fr. — N. K. A. 2, V, 210. — Wint. Kr. Fl. I, 764.

31. **Mycena luteo-alba** (Bolton) Fr. Ep. 134. — Oud. Rév. I, 113. — Sacc. Syll. V, 259. — Ag. Myc. luteo-albus Fr. — N. K. A. I, V, 332; 2, V, 346; Arch. Néerl. VIII, 346; XIV, 226. — Wint. Kr. Fl. I, 764.

32. **Mycena metata** Fr. Ep. 142. — Oud. N. K. A. 3, II, 859. — Sacc. Syll. V, 278. — Ag. Myc. metatus Fr. — Wint. Kr. Fl. I, 758.

33. **Mycena parabolica** Fr. Ep. 139. — Oud. Rév. I, 115. — Sacc. Syll. V, 270. — Ag. Myc. parabolicus Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 322; Arch. Néerl. XV, 227. — Wint. Kr. Fl. I, 761.

34. **Mycena pelianthina** Fr. Ep. 130. — Oud. Rév. I, 112. — Sacc. Syll. V, 251. — Ag. Myc. pelianthinus Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 320; N. K. A. 2, V, 346; Arch. Néerl. XIV, 225. — Wint. Kr. Fl. I, 768.

35. **Mycena plicosa** Fr. Ep. 142. — Oud. Rév. I, 116. — Sacc. Syll. V, 279. — Ag. Myc. plicosus Fr. — Arch. Néerl. II, 23 et XIV, 228. — Wint. Kr. Fl. I, 758.

36. **Mycena polygramma** (Bull.) Fr. Ep. 139. — Oud. Rév. I, 115. — Sacc. Syll. V, 269. — Ag. Myc. polygrammus Fr. — T. N. G. XI, 381; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 322; N. K. A. 2, I, 440; 2, V, 346; Arch. Néerl. XIV, 227. — Wint. Kr. Fl. I, 761.

37. **Mycena psammicola** (Berk. Br.) Ann. Nat. Hist. 4, XVII,

130. — Oud. Rév. 1, 116. — Sacc. Syll. V, 275. — N. K. A. 2 VI, 11.

38. **Mycena pullata** (Berk. et Curt.) Grev. XI, 69. — Oud. N. K. A. 3, II, 647. — Sacc. Syll. V, 277. — Ag. Myc. pullatus Fr. — Wint. Kr. Fl. I, 630.

39. **Mycena pura** (P.) Fr. Ep. 133. — Oud. Rév. I, 113. — Sacc. Syll. V, 256. — Ag. Myc. purus Fr. — T. N. G. XII, 262; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 321; N. K. A. 1, V, 293; 2, I, 440; 2, V, 346; Arch. Néerl. XIV, 226; Fl. Bat. tab. 1060. — Wint. Kr. Fl. I, 765.

40. **Mycena rosella** Fr. Ep. 132. — Oud. Rév. I, 112. — Sacc. Syll. V, 255. — Ag. Myc. rosellus Fr. — N. K. A. 2, IV, 210. — Wint. Kr. Pl. I, 766.

41. **Mycena rubro-marginata** Fr. Ep. 132. — Oud. Rév. I, 112. — Sacc. Syll. V, 254. — Ag. Myc. rubro-marginatus Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 320; Arch. Néerl. XIV, 225. — Wint. Kr. Fl. I, 766.

42. **Mycena rugosa** Fr. Ep. 138. — Oud. Rév. I, 115. — Sacc. Syll. V, 267. — Ag. Myc. rugosus Fr. — T. N. G. XI, 381; Prodr. Fl. Bat. II, 3, 322; N. K. A. I, V, 293; 2, V, 346; Arch. Néerl. XIV, 227; Fl. Bat. tab. 1574. — Wint. Kr. Fl. I, 762.

43. **Mycena saccharifera** (Berk.) Fr. Ep. 151. — Oud. Rév. I, 120. — Sacc. Syll. V, 299. — Ag. Myc. sacchariferus Fr. — N. K. A. 2, V, 149.

44. **Mycena sanguinolenta** (A. S.) Fr. Ep. 148. — Oud. Rév. I, 118. — Sacc. Syll. V, 291. — Ag. Myc. sanguinolentus Fr. — Arch. Néerl. II, 23; XIV, 228. — Wint. Kr. Fl. I, 753.

45. **Mycena setosa** (Sow.) Fr. Ep. 153. — Oud. Rév. I, 121. — Sacc. Syll. V, 303. — Ag. Myc. setosus. Fr. — N. K. A. 2, II, 240; Arch. Néerl. XIV, 230.

46. **Mycena stannea** Fr. Ep. 113. — Oud. Rév. I, 117. — Sacc. Syll. V, 280. — Ag. Myc. stanneus. — N. K. A. 2, IV, 211. — Wint. Kr. Fl. I, 757.

47. **Mycena stylobates** (P.) Fr. Ep. 150. — Oud. Rév. I, 119. — Sacc. Syll. V, 292. — Ag. Myc. stylob. Fr. — T. N. G. XII, 263; Prodr. Fl. Bat., II, 3, p. 325; N. K. A. 2, V, 347; Arch. Néerl. XI, 229. — Wint. Kr. Fl. I, 751.

48. **Mycena sudora** Fr. Ep. 138. — Oud. N. K. A. 3, II, 859. — Sacc. Syll. V, 268. — Ag. Myc. sudorus Fr.

49. **Mycena supina** Fr. Ep. 147. — Sacc. Syll. V, 287. — Ag. Myc. supinus Fr. — N. K. A. 2, I, 165, Oud. Herb. Ned. Pl. n° 196. — Wint. Kr. Fl. I, 755.

50. **Mycena tenerrima** (Berk.) Fr. Ep. 151. — Oud. Rév. I, 119. — Sacc. Syll. V, 298. — Ag. Myc. tenerrimus Fr. — Arch. Néerl. II, 23; XIV, 229. — Wint. Kr. Fl. I, 751.

51. **Mycena vitilis** Fr. Ep. 145. — Oud. Rév. I, 117. — Sacc. Syll. V, 285. — Ag. Myc. vitilis Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 224; Arch. Néerl. XIV, 228. — Wint. Kr. Fl. I, 755.

52. **Mycena vitrea** Fr. Ep. 143. — Oud. Rév. I, 117. — Sacc. Syll. V, 280. — Ag. Myc. vitreus. — Arch. Néerl. II, 23; XIV, 228. — Wint. Kr. Fl. I, 757.

53. **Mycena vulgaris** (P.) Fr. Ep. 150. — Oud. Rév. I, 119. — Sacc. Syll. V, 295. — Ag. Myc. vulgaris Fr. — N. K. A. I, V, 332; 2, V, 347; Arch. Néerl. VIII, 316 et XIV, 229; Oud. Fgi. Néerl. exs. n° 203. — Wint. Kr. Fl. I, 752.

OMPHALIA.

1. **Omphalia affricata** Fr. Ep. 158. — Oud. Rév. I, 125. — Sacc. Syll. V, 314. — Ag. Omph. affricatus Fr. — N. K. A. 2, I, 165; Arch. Néerl. VIII, 346; XIV, 230. — Wint. Kr. Fl. I, 747.

2. **Omphalia camptophylla** (Berk.) Fr. Ep. 163. — Oud. Rév. I, 127. — Sacc. Syll. V, 329. — Ag. Omph. camptophyllus Fr. — N. K. A. 2, II, 35; Arch. Néerl. VIII, 346; XIV, 231.

3. **Omphalia Fibula** (Bull.) Fr. Ep. 164. — Oud. Rév. I, 127. — N. K. A. 3, II, 338. Sacc. Syll. V, 331. — Ag. Omph. Fibula Fr. — T. N. G. XII, 263; Prodr. Fl. Bat. 3, II, 327; N. K. A. 2, V, 347; Arch. Néerl. XIV, 231; Oud. Fgi Neerl. exs. n° 205. — Wint. Kr. Fl. I, 741.

4. **Omphalia gracillima** (Weinm.) Fr. Ep. 165. — Oud. Rév. I, 127. — Sacc. Syll. V, 332. — Ag, Omph. gracillimus Fr. — N. K. A. 2, I, 165; Arch. Néerl. VIII, 346 et XIV, 231. — Wint. Kr. Fl. I; 740.

5. **Omphalia hepatica** (Batsch) Fr. Ep. 160. — Oud. Rév. I, 126. — Sacc. Syll. V, 321. — Ag. Omph. hepaticus Fr. — T. N. G. XII, 263; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 326; N. K. A. 2, I, 440; 2, V, 347; Arch. Néerl. XIV, 231. — Wint. Kr. Fl. I, 744.

6. **Omphalia hydrogramma** Fr. Ep. 154. — Oud. Rév. I, 124. — Sacc. Syll. V, 309. — Ag. Omph. hydrogrammus Fr. — N. K. A. 2, V, 149. — Wint. Kr. Fl. I, 748.

7. **Omphalia Oniscus** Fr. Ep. 158. — Oud. Rév. I, 125. — Sacc. Syll. V, 314. — Ag. Omph. Oniscus Fr. — N. K. A. 2, II,

97 et V, 164; Arch. Néerl. XIV, 230. — Wint. Kr. Fl. I, 746.

8. **Omphalia polyadelpha** (Lasch.) Fr. Ep. 165. — Oud. Rév. I, 128. — Sacc. Syll. V, 338. — Ag. Omph. polyadelphus Fr. — N. K. A. 1, V, 332; Arch. Néerl. VIII, 346; XIV, 232. — Wint. Kr. Fl. I, 740.

9. **Omphalia pyxidata** (Bull.) Fr. Ep. 157. — Oud. Rév. I, 125. — Sacc. Syll. V, 313. — Ag. Omp. pyxidatus Fr. — Prodr. Fl. Bat. 3, II, p. 326; N. K. A. 2, I, 440; 2, V, 347; Arch. Néerl. XIV, 230. — Wint. Kr. Fl. I; 747.

10. **Omphalia rustica** Fr. Ep. 159. — Oud Rév. I, 126. — Sacc. Syll. V, 316. — Ag. Omph. rusticus Fr. Arch. Néerl. II, 24; XIV, 231. — Wint. Kr. Fl. I, 745.

11. **Omphalia scyphiformis** Fr. Ep. 159. — Oud. Rév. I, 126. — Sacc. Syll. V, 316. — Ag. Omph. scyph. Fr. — N. K. A. 2, III, 241; Arch. Néerl. XIV, 231; Oud. Fgi Neerl. exs. n° 201. — Wint. Kr. Fl. I, 745.

12. **Omphalia scyphoides** Fr. Ep. 156. — Oud. Rév. I, 125. — Sacc. Syll. V, 310. — Ag. Omph. scyph. Fr. — N. K. A. 1, V, 332; Arch. Néerl. VIII, 346; XIV, 230. — Wint. Kr. Fl. I, 747.

13. **Omphalia setipes** Fr. Ep. 164. — Oud. Rév. I, 127. — Sacc. Syll. V, 330. — Ag. Omph. setipes Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 327; N. K. A. 2, I, 440; Arch. Néerl. XIV, 231. — Wint. Kr. Fl. I, 741.

14. **Omphalia stellata** Fr. Ep. 162. — Oud. Rév. I, 127. — Sacc. Syll. V, 325. — Ag. Omph. stellatus Fr. — T. N. G. XII, 263; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 327; N. K. A. 2, V, 347; Arch. Néerl. XIV, 231. — Wint. Kr. Fl. 743.

15. **Omphalia umbellifera** (L.) Fr. Ep. 160. — Oud. Rév. I, 126. — Sacc. Syll. V. 321. — Ag. Omph. umbelliferus Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 326; Arch. Néerl. XIV, 231; Oud. Fgi. Neerl. exs. n° 102. — Wint. Kr. Fl. I, 114.

PLEUROTUS.

1. **Pleurotus acerinus** Fr. Ep. 175. — Oud. Rév. I, 135. — Sacc. Syll. V, 360. — Ag. Pl. acer. Fr. — T. N. G. XII, 263; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 329; Arch. Néerl. XIV, 233.

2. **Pleurotus ambiguus** Oud. Rév. I, 134. — Sacc. Syll. V, 356. — Ag. Pl. amb. Oud. N. K. A. 2, IV, 212.

3. **Pleurotus applicatus** (Batsch) Fr. Ep. 180. — Oud. Rév. I, 136. — Ag. Pl. appl. Fr. — T. N. G. XI, 381; Prodr. Fl. Bat.

II, 3, p. 329; N. K. A. 2, I, 440; 2, V, 347; Arch. Néerl. XIV, 234. — Wint. Kr. Fl. I, 731.

4. **Pleurotus atro-caeruleus** Fr. Ep. 179. — Oud. Rév. I, 136. — Sacc. Syll. V, 377. — Ag. Pl. atro-caer. — Arch. Néerl. II, 25; XIV, 233. — Wint. Kr. Fl. I, 732.

5. **Pleurotus corticatus** Fr. Ep. 166. — Oud. Rév. I, 132; Sacc. Syll. V, 339. — Ag. Pl. cort. Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, 327; N. K. A. 2, I, 440; 2, V, 347; Arch. Néerl. XIV, 232. — Wint. Kr. Fl. I, 739.

6. **Pleurotus dryinus** (P.) Fr. Ep. 167. — Oud. Rév. I, 132; Sacc. Syll. V, 340. — Ag. Pl. dryinus Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 327; N. K. A. 2, I, 440; 2, V, 347; Arch. Néerl. XIV, 232. — Wint. Kr. Pl. I, 739.

7. **Pleurotus Eryngii** (D. C.) Fr. Ep. 171. — Oud. Rév. I, 133. — Sacc. Syll. V, 347. — Ag. Pl. Eryngii Fr. — Arch. Néerl. II, 24; XIV, 232. — Wint. Kr. Fl. I, 737.

8. **Pleurotus cuosmus** (Berk.) Fr. Ep. 174. — Oud. N. K. A. 3, II, 648. — Sacc. Syll. V, 358. — Ag. Pl. cuosmus.

8. **Pleurotus fimbriatus** (Bolton) Fr. Ep. 169. — Oud. Rév. I, 133. — Sacc. Syll. V, 344. — Ag. Pl. fimbr. Fr. — T. N. G. XII, 263; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 328; Arch. Néerl. XIV, 232. — Wint. Kr. Fl. I, 738.

10. **Pleurotus mitis** (P.) Fr. Ep. 177. — Oud. N. K. A. 3, II, 187. — Sacc. Syll. V, 364. — Ag. Pl. mitis Fr. — Wint. Kr. Fl. I, 734.

11. **Pleurotus ostreatus** (Jacq.) Fr. Ep. 173. — Oud. Rév. I, 133. — Sacc. Syll. V, 355. — Ag. Pl. ostr. Fr. — T. N. G. XII, 263; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 328; N. K. A. 2, I, 440; 2, V, 347. — Arch. Néerl. XIV, 233. — Fl. Bat. tab. 780. — Wint. Kr. Fl. I, 735.

***Pleurotus palmatus** (Bull.) — Ag. Pl. palm. Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 328. — Voir: Pl. subpalmatus.

12. **Pleurotus perpusillus** Fr. Ep. 180. — Oud. Rév. I, 136. — Sacc. Syll. V, 383. — Ag. Pl. perp. Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 329; N. K. A. 2, I, 440; 2, V, 347; Arch. Néerl. XIV, 234. — Wint. Kr. Fl. I, 730.

13. **Pleurotus revolutus** (Kickx.) Fr. Ep. 174. — Oud. Rév. I, 134. — Sacc. Syll. V, 359. — Ag. Pl. revol. Fr. — N. K. A. 2, III, 241; Arch. Néerl. XIV, 233.

14. **Pleurotus salignus** (P.) Fr. Ep. 174. — Oud. Rév. I, 135. — Sacc. Syll. V, 359. — Ag. Pl. sal. Fr. — T. N. G. XI, 381; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 329; N. K. A. 2, I, 440; 2, V,

584; Arch. Néerl. XIV, 233; Fl. Bat. tab. 725? — Wint. Kr. Fl. I, 753.

15. **Pleurotus septicus** Fr. Ep. 179. — Oud. Rév. I, 135. — Sacc. Syll. V, 375. — Ag. Pl. sept. Fr. — T. N. G. XII, 263; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 329; Arch. Néerl. XIV, 233. — Wint. Kr. Fl. 732.

16. **Pleurotus serotinus** (Schrad.) Fr. Ep. 176. — Oud. in herb. — Sacc. Syll. V, 363. — Ag. Pl. serot. Fr. — Wint. Kr. Fl. 734.

17. **Pleurotus spongiosus** Fr. Ep. 167. — Oud. Rév. I, 132. — Sacc. Syll. V, 340. — Ag. Pl. spong. Fr. — N. K. A. 2, IV, 211 et 3, III, 1084.

18. **Pleurotus Staringii** Oud. Rév. I, 135. — Sacc. Syll. V, 359. — Ag. Pl. Star. Oud. N. K. A. IV, 212.

19. **Pleurotus subpalmatus** Fr. Ep. 168. — Oud. Rév. I, 133; N. K. A. 3, II, 619. — Sacc. Syll. V, 343. — Ag. Pl. subp. Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 328 (sub. 2169); Arch. Néerl. XIV, 232. — Wint. Kr. Fl. I, 738.

20. **Pleurotus tremulus** (Schaeff.) Fr. Ep. 167. — Oud. Rév. I, 135. — Sacc. Syll. V, 367. — Ag. Pl. trem. Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 329; N. K. A. 2, I, 110; 2, V, 584. — Arch. Néerl. XIV, 233. — Wint. Kr. Fl. I, 733.

21. **Pleurotus ulmarius** (Bull.) Fr. Ep. 167. — Oud. Rév. I, 133. — Sacc. Syll. V, 341. — Ag. Pl. ulm. Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 327; N. K. A. 2, I, 110; 2, V, 317; Arch. Néerl. XIV, 232; Fl. Bat. tab. 1611. — Wint. Kr. Fl. I, 739.

×× PAXILLEAE.

HYGROPHORUS.

1. **Hygrophorus ceraceus** Fr. Ep. 117. — Oud. Rév. I, 141. Prod. Fl. Bat. II, 3, p. 356; N. K. A. 2, V, 356; Arch Néerl. XIV, 266. — Sacc. Syll. V, 112. — Wint. Kr. Fl. I, 561.

2. **Hygrophorus chlorophanus** Fr. Ep. 120. — Oud. Rév. I, 142. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 357; N. K. A. 2, I, 111; 2, V, 356; Arch. Néerl. XIV, 267; Fl. Bat. tab. 1570. — Sacc. Syll. V, 119. — Wint. Kr. Fl. I, 558.

3. **Hygrophorus clivalis** Fr. Monogr. II, 131 et Ep. 111. — Oud. N. K. A. 3, II, 188. — Sacc. Syll. V, 106.

4. **Hygrophorus coccineus** Fr. Ep. 117. — Oud. Rév. I, 141. — Prod. Fl. Bat. II, 3, p. 356; N. K. A. 2, I, 111; 2, V, 365. —

Arch. Néerl. XIV, 266; Fl. Bat. tab. 810. — Sacc. Syll. V, 412. — Wint. Kr. Fl. 1, 512.

5. **Hygrophorus conicus** Fr. Ep. 419. — Oud. Rév. 1, 142. — T. N. G. XI, 384; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 356; N. K. A. 2, 1, 444; 2, V, 117, 356, 585; Arch. Néerl. XIV, 267; Fl. Bat. tab. 810 et 845. — Sacc. Syll. V, 418. — Wint. Kr. Fl. 1, 559.

6. **Hygrophorus discoideus** Fr. Ep. 408. — Oud. N. K. A. 3, II, 651. — Sacc. Syll. V, 393. — Wint. Kr. Fl. 1, 568.

7. **Hygrophorus eburneus** Fr. Ep. 406. — Oud. N. K. A. 3, II, 651; Fl. Bat tab. 1600. — Sacc. Syll. V, 388. — Wint. Kr. Fl. 1, 570.

8. **Hygrophorus glauco-nitens** Fr. Ep. 421. — Oud. N. K. A. 3, II, 188. — Sacc. Syll. V, 422. — Ag. Tricholoma glauco-nitens T. N. G. XII, 262; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 313; N. K. A. 2, 1, 438. — Sacc. Syll. V, 422.

9. **Hygrophorus hypothejus** Fr. Ep. 410. — Oud. Rév. 1, 140. — T. N. G. XII, 266; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 355; N. K. A. 1, V, 294; 2, 1, 143; 2, V, 294 et 356; Arch. Néerl. XIV, 265; Fl. Bat. tab. 1609. — Sacc. Syll. V, 396. — Wint. Kr. Fl. 1, 566.

10. **Hygrophorus intermedius** Pass. — Fr. Ep. 419. — Oud. N. K. A. 3, II, 652. — Sacc. Syll. V, 418.

11. **Hygrophorus limacinus** Fr. Ep. 409. — Oud. Rév. 1, 140. — N. K. A. 3, 1, 233; Arch. Néerl. XIV, 265; Fl. Bat. tab. 1320. — Sacc. Syll. V, 395. — Wint. Kr. Fl. 1, 567.

12. **Hygrophorus miniatus** Fr. Ep. 330. — Oud. Rév. 1, 141.; T. N. G. XI, 381; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 356; N. K. A. 2, 1, 144; 2, V, 356; Arch. Néerl. XIV; 266. — Sacc. Syll. V, 413. Wint. Kr. Fl. 1, 560.

13. **Hygrophorus niveus** Fr. Ep. 414. — Oud. Rév. 1, 141. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 355; N. K. A. 2, 1, 444; 2, V, 356; Fl. Bat. tab. 1539. — Sacc. Syll. V, 403. — Wint. Kr. Fl. 1, 563.

14. **Hygrophorus obrusseus** Fr. Ep. 419. — Oud. Rév. 1, 142; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 156; N. K. A. 2, V, 585; Arch. Néerl. XIV, 267. — Sacc. Syll. V, 117. — Wint. Kr. Fl. V, 559..

15. **Hygrophorus olivacco-albus** Fr. Ep. 410. — Oud. N. K. A. 3, 1, 333. — Sacc. Syll. V, 395. — Wint. Kr. Fl. 1, 567.

16. **Hygrophorus penarius** Fr. Ep. 406. — Oud. N. K. A. 3, II, 652. — Sacc. Syll. V, 389. — Wint. Kr. Fl. 1, 570.

17. **Hygrophorus pratensis** Fr. Ep. 413. — Oud. Rév. 1, 140. — T. N. G. XI, 384; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 155; N. K. A.

2, I, 444; 2, V, 356; Arch. Néerl. XIV, 266. — Sacc. Syll. V, 401. — Wint. Kr. Fl. I, 564.

18. **Hygrophorus psittacinus** Fr. Ep. 420. — Ond. Rév. I, 142. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 357; N. K. A. 2, I, 444; 2, V, 356; Arch. Néerl. XIV, 267. — Sacc. Syll. V, 420. — Wint. Kr. Fl. I, 558.

19. **Hygrophorus puniceus** Fr. Ep. 419. — Ond. Rév. I, 141; T. N. G. XII, 266; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 356; Arch. Néerl. XIV, 266. — Sacc. Syll. V, 416. — Wint. Kr. Fl. I, 559.

20. **Hygrophorus purpurascens** (A. S.) Fr. Ep. 407. — Ond. Rév. I, 140; T. N. G. XII, 266; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 354; N. K. A. 2, I, 443; Arch. Néerl. XIV, 265. — Sacc. Syll. V, 390. — Wint. Kr. Fl. I, 569.

21. **Hygrophorus turundus** Fr. Ep. 418. — N. K. A. 3, II, 188. — Sacc. Syll. V, 413. — Wint. Kr. Fl. I, 560.

22. **Hygrophorus unguinosus** Fr. Ep. 421. — Ond. Rév. I, 142; Arch. Néerl. II, 30; XIV, 267; Fl. Bat. tab. 1665. — Sacc. Syll. V, 421. — Wint. Kr. Fl. I, 557.

23. **Hygrophorus virgineus** Fr. Ep. 413. — Ond. Rév. I, 141; T. N. G. XII, 266; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 355; N. K. A. 2, I, 444; 2, V, 356; Arch. Néerl. XIV, 266.

××× LACTARIEAE.

LACTARIUS.

1. **Lactarius aeris** (Bolt.) Fr. Ep. 429. — Ond. Rév. I, 155. — N. K. A. 2, III, 241; Arch. Néerl. XIV, 268. — Wint. Kr. Fl. I, 550. — L. acer Sacc. Syll. V, 434.

2. **Lactarius aurantiacus** Fr. Ep. 432. — Ond. Rév. I, 156; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 359; N. K. A. 2, I, 444; Arch. Néerl. XIV, 209. — Sacc. Syll. V, 440. — Wint. Kr. Fl. I, 547.

3. **Lactarius blennius** Fr. Ep. 432. — Ond. Rév. I, 154; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 358; N. K. A. 2, I, 441; 2, V, 357; Arch. Néerl. XIV, 268; Fl. Bat. tab. 1550. — Sacc. Syll. V, 429. — Wint. Kr. Fl. I, 553.

4. **Lactarius camphoratus** Fr. Ep. 437. — Ond. Rév. I, 160; N. K. A. 2, I, 444; 2, VI, 22; Arch. Néerl. II, 30; XIV, 270. — Sacc. Syll. V, 451. — Wint. Kr. Fl. I, 541.

5. **Lactarius chrysorrheus** Fr. Ep. 428. — Ond. Rév. I, 155; N. K. A. 2, V, 357 et VI, 21. — Sacc. Syll. V, 433; Wint. Kr. Fl. I, 550.

6. **Lactarius controversus** Fr. Ep. 423. — Oud. Rév. I, 153; T. N. G. XI, 384; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 358; N. K. A. 1, V, 295; 2, I, 444; 2, V, 155; 3, I, 295 et 333; Arch. Néerl. XIV, 268; Fl. Bat. tab. 1091.

7. **Lactarius deliciosus** Fr. Ep. 431. — Oud. Rév. I, 156; T. N. G. XI, 381; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 359; N. K. A. 1, V, 295; 2, I, 444 et V, 295 et 357; Arch. Néerl. XIV, 269. — Sacc. Syll. V, 438. — Wint. Kr. Fl. I, 548.

8. **Lactarius flexuosus** Fr. Ep. 427. — Oud. Rév. I, 154; T. N. G. XII, 266; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 358; N. K. A. 2, V, 357; Arch. Néerl. XIV, 268. — Sacc. Syll. V, 132. — Wint. Kr. Fl. I, 551.

9. **Lactarius glyciosmus** Fr. Ep. 434. — Oud. Rév. I, 157; N. K. A. 2, II, 176 et V, 156; Arch. Néerl. XIV, 270. — Sacc. Syll. V, 444. — Wint. Kr. Fl. I, 545.

10. **Lactarius helvus** Fr. Ep. 433. — Oud. Rév. I, 157; N. K. A. 2, IV, 218. — Sacc. Syll. V, 443. — Wint. Kr. Fl. I, 545.

11. **Lactarius ichoratus** Fr. Ep. 436. — Oud. Rév. I, 159; N. K. A. 2, III, 143; Arch. Néerl. XIV, 270. — Sacc. Syll. V, 449. — Wint. Kr. Fl. I, 543.

12. **Lactarius insulsus** Fr. Ep. 424. — Oud. Rév. I, 154; T. N. G. XII, 266; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 358; N. K. A. 2, I, 444; 2, V, 357; Arch. Néerl. XIV, 268. — Sacc. Syll. V, 427. — Wint. Kr. Fl. I, 554.

***Lactarius lignyotus** Fr. Ep. 434. — Oud. Rév. I, 158; N. K. A. 2, III, 143; Arch. Néerl. XIV, 270. — Sacc. Syll. V, 445. — Wint. Kr. Fl. I, 544. — Esp. dubieuse pour notre flore.

13. **Lactarius lilacinus** (Lasch) Fr. Ep. 435. — Oud. N. K. A. 3, II, 653. — Sacc. Syll. V, 447; Wint. Kr. Fl. I, 544.

14. **Lactarius luridus** (P.) Fr. Ep. 338. — Sacc. Syll. V, 431. — Wint. Kr. Fl. I, 552. — Ag. Coll. luridus P. — N. K. A. 2, I, 489.

15. **Lactarius mitissimus** Fr. Ep. 437. — Oud. Rév. I, 159; N. K. A. 2, VI, 22. — Sacc. Syll. V, 450; Wint. Kr. Fl. I, 542.

16. **Lactarius obnubilus** Lasch. — Fr. Ep. 138. — Oud. Rév. I, 160; Arch. Néerl. XIV, 270. — Sacc. Syll. V, 452. — Wint. Kr. Fl. I, 541. — L. obscuratus T. N. G. XI, 384; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 360.

***Lactarius obscuratus** Fr. — T. N. G. XI, 384; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 360. — Voir: *L. obnubilus.*

17. **Lactarius pallidus** Fr. Ep. 431. — Oud Rév. I, 156; Arch. Néerl. II, 30. — Sacc. Syll. V, 439. — Wint. Kr. Fl. I, 547.

18. **Lactarius piperatus** Fr. Ep. 430. — Oud. Rév. I. 155; T. N. G. XI, 384; Prodr. Fl. Bat. II. p. 358; N. K. A. 2, I, 114; 2, V, 357 et 585; Arch. Néerl. XIV, 269; Fl. Bat. 825. — Sacc. Syll. V, 436. — Wint. Kr. Fl. I, 548.

19. **Lactarius pubescens** Fr. Ep. 424. — Oud. Rév. I. 153; N. K. A. 2, I, 444; 3, I, 233; Arch. Néerl. XIV, 268. — Sacc. Syll. V, 427. — Wint. Kr. Fl. I, 554.

20. **Lactarius pyrogalus** Fr. Ep. 427. — Oud. Rév. I, 154; N. K. A. 1, V, 295; 2, V, 295 et 357; Arch. Néerl. XIV, 268. — Sacc. Syll. V, 432. — Wint. Kr. Fl. I, 551.

21. **Lactacius quietus** Fr. Ep. 431. — Oud. Rév. I, 156; T. N. G. XI, 384; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 359; N. K. A. 2, I, 441; 2, V, 156 et 357; Arch. Néerl. XIV, 269. — Sacc. Syll. V, 440. — Wint. Kr. Fl. I, 547.

22. **Lactarius rufus** Fr. Ep. 433. — Oud. Rév. I, 157; — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 360; N. K. A. I, V, 295; 2, I, 444; 2, V, 295 et 357; Arch. Néerl. XIV, 269; Fl. Bat. tab. 1560. — Sacc. Syll. V, 442. — Wint. Kr. Fl. I, 545.

23. **Lactarius scrobiculatus** Fr. Ep. 422. — Oud. Rév. I, 152; Arch. Néerl. II, 30; XIV, 267. — Sacc. Syll. V, 424. — Wint. Kr. Fl. I, 556.

24. **Lactarius serifluus** Fr. Ep. 436. — Oud. Rév. I, 159; T. N. G. XI, 384; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 359; Arch. Néerl. XIV, 270. — Sacc. Syll. V, 449. — Wint. Kr. Fl. I, 542.

25. **Lactarius subdulcis** Fr. Ep. 437. — Oud. Rév. I, 160; T. N. G. XII, 266, Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 360; N. K. A. 2, I, 444; 2, V, 357; Arch. Néerl. XIV, 270; Fl. Bat. tab. 1659 et 1720. — Sacc. Syll. V, 150. — Wint Kr. Fl. I, 541.

26. **Lactarius thejogalus** Fr. Ep. 432. — Oud. Rév. I, 156; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 432; N. K. A. 2, I, 444; 2, V, 357; 2, VI, 21; Arch. Néerl. XIV, 269. — Sacc. Syll. V, 441. — Wint. Kr. Fl. I, 547.

27. **Lactarius torminosus** Fr. Ep. 422. — Oud. Rév. I, 152; T. N. G. XI, 384; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 357; N. K. A. 2, I, 111; 2, V, 357 et 585; Fl. Bat. tab. 825. — Sacc. Syll. V, 424. — Wint. Kr. Fl. I, 556.

28. **Lactarius trivialis** Fr. Ep. 426. — Oud. Rév. I, 154; T. N. G. XII, 266; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 358; N. K. A. 3, I, 233; Fl. Bat. tab. 1550. — Sacc. Syll V, 430. — Wint. Kr. Fl. I, 552.

29. **Lactarius turpis** Fr. Ep. 423. — Oud. Rév. I, 152; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 357; N. K. A. I, V, 295; 2, I, 444; 2, V,

155, 295 et 357; Fl. Bat. tab. 835. — Sacc. Syll. V, 426. Wint. Kr. Fl. I, 555.

30. **Lactarius umbrinus** Fr. Ep. 429. — Oud. Rév. I, 618. — Sacc. Syll. V, 435. — Wint. Kr. Fl. I, 550.

31. **Lactarius uvidus** Fr. Ep. 426. — Oud. Rév. I, 154; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 358; N. K. A. 2, I, 444; Arch. Néerl. XIV, 260. — Sacc. Syll. V, 431. — Wint. Kr. Fl. I, 552.

32. **Lactarius vellereus** Fr. Ep. 430. — Oud Rév. I, 155; N. K. A. 2, V, 357; Arch. Néerl. XIV, 269. — Sacc. Syll. V, 437. — Wint. Kr. Fl. I, 548.

33. **Lactarius vietus** Fr. Ep. 132. — Oud. Rév. I, 157; T. N. G. XII, 266. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 359; N. K. A. 2, V, 357; Arch. Néerl. XIV, 296. — Sacc. Syll. V, 441. — Wint. Kr. Fl. I, 546.

34. **Lactarius volemus** Fr. Ep. 435. — Oud. Rév. I, 158; N. K. A. 2, V, 157. — Sacc. Syll. V, 447. — Wint. Kr. Fl. I, 543.

35. **Lactarius zonarius** Fr. Ep. 425. — Oud. Rév. I, 154; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 358; N. K. A. 2, I, 444; 3, I, 233; Arch. Néerl. XIV, 268; Fl. Bat. tab. 825. — Sacc. Syll. V, 428. — Wint. Kr. Fl. I, 553.

RUSSULA.

1. **Russula adusta** Fr. Ep. 439. — Oud. Rév. I, 171; N. K. A. 1, V, 295; 2, V, 358; Arch. Néerl. XIV, 271. — Sacc. Syll. V, 454. — Wint. Kr. Fl. I, 538.

2. **Russula aeruginea** Fr. Ep. 449. — Oud. Rév. I, 178; N. K. A. 2, IV, 220. — Sacc. Syll. V, 472. — Wint. Kr. Fl. I, 529.

3. **Russula albo-nigra** Fr. Ep. 439. — Oud. Rév. I, 172; N. K. A. 2, III, 144. — Sacc. Syll. V, 454. — Wint. Kr. Fl. I, 538. — R. lactea Oud. N. K. A. 2, III, 144; Arch. Néerl. XIV, 217.

4. **Russula alutacea** Fr. Ep. 153. — Oud. Rév. I, 180; N. K. A. 2, V, 117 et 358; Arch. Néerl. XIV, 273; Fl. Bat. tab. 1660. — Sacc. Syll. V, 479. — Wint Kr. Fl. I, 526.

5. **Russula aurata** Fr. Ep. 152. — Oud. Rév. I, 179; N. K. A. 2, V, 358; Arch. Néerl. XIV, 273. — Sacc. Syll. V, 477. — Wint. Kr. Fl. I, 527. — R. aurea N. K. A. 1, V, 295.

***Russula aurea** N. K. A. 1, V, 295. — Voir: *R. aurata.*

6. **Russula azurea** Bresad. — Oud. Rév. I, 177; N. K. A. 2,

VI, 123. — Sacc. Syll. V, 470. — Wint. Kr. Fl. I, 539.

7. **Russula caerulea** Fr. Ep. 443. — Oud. Rév. I, 173; Arch. Néerl. XIV, 271. — Sacc. Syll. V. 459. — Wint. Kr. Fl. I, 535.

8. **Russula cyanoxantha** Fr. Ep. 446. — Oud. Rév. I, 175; N. K. A. 2, IV, 219. — Sacc. Syll. V. 465. — Wint. Kr. Fl. I, 532.

9. **Russula decolorans** Fr. Ep. 451. — Oud. Rév. I, 179. — Sacc. Syll. V. 476. — Wint. Kr. Fl. I. 527.

10. **Russula delica** Fr. Ep. 440. — Oud. Rév. I, 172; N. K. A. 1, V, 295; 2, V, 358; Arch. Néerl. XIV, 271. — Sacc. Syll. V, 455. — Wint. Kr. Fl. I. 538.

11. **Russula depallens** Fr. Ep. 442. — Oud. Rév. I, 173; N. K. A. 2, III, 244; Arch. Néerl. XIV, 271. — Sacc. Syll. V, 458. — Wint. Kr. Fl. I. 536.

12. **Russula drimeia** Cooke. — Oud. Rév. I, 173; N. K. A. 2, VI, 22. — Sacc. Syll. V. 459 (drymeja!).

13. **Russula elephantina** Fr. Ep. 440. — Oud. Rév. I, 172; N. K. A. 2, V, 167. — Sacc. Syll. V, 455. — Wint. Kr. Fl. I, 537.

14. **Russula emetica** Fr. Ep. 448. — Oud. Rév. I. 177; T. N. G. XII, 266; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 361; N. K. A. 2, I, 445; Arch. Néerl. XIV, 272; Fl. Bat. tab. 1429. — Sacc. Syll. V, 469. — Wint. Kr. Fl. I, 530.

15. **Russula fallax** Fr. Ep. 449. — Oud. N. K. A. 3, II, 189. — Sacc. Syll. V, 470.

16. **Russula fellea** Fr. Ep. 447. — Oud. Rév. I, 176; N. K. A. 2, IV, 219. — Sacc. Syll. V, 468. — Wint. Kr. Fl. I, 531.

17. **Russula foetens** Fr. Ep. 447. — Oud. Rév. I, 176; N. K. A. 1, V, 295 et 333; 2, I, 445; 2, V, 358; Arch. Néerl. XIV, 272. — Sacc. Syll. V, 476. — Wint. Kr. Fl. I, 531.

18. **Russula fragilis** (P.) Fr. Ep. 450. — Oud. Rév. I, 178; T. N. G. XI, 384; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 361; N. K. A. 2, I, 445; 2, V, 117 et 358; Arch. Néerl. XIV, 273. — Sacc. Syll. V, 472. — Wint. Kr. Fl. I, 529.

19. **Russula furcata** (Lam.) Fr. Ep. 441. — Oud. Rév. I, 173; T. N. G. XII, 266; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 360; N. K. A. 2, I, 445; 2, V, 358; Arch. Néerl. XIV, 271. — Fl. Bat. tab. 1174 (nous semble appartenir à une autre espèce).

20. **Russula heterophylla** Fr. Ep. 446. — Oud. Rév. I. 176. — N. K. A. 2, III, 111; Arch. Néerl. XIV, 272. — Sacc. Syll. V, 465. — Wint. Kr. Fl. I, 532.

21. **Russula integra** (L.) Fr. Ep. 450. — Oud. Rév. I, 179; T. N. G. XI, 483; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 861; N. K. A. 2, I, 445; 2, V, 358; Arch. Néerl. XIV, 273. — Sacc. Syll. V, 475. — Wint. Kr. Fl. I, 528.

*__Russula lactea__ Oud. N. K. A. 2, III, 144; Arch. Néerl. XIV, 271. — Voir: *R. albo-nigra*.

22. **Russula lepida** Fr. Ep. 444. — Oud. Rév. I, 174; N. K. A. 2, V, 358. — Sacc. Syll. V, 461. — Wint. Kr. Fl. I, 534.

23. **Russula Linnaei** Fr. Ep. 144. — Oud. Rév. I, 174; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 360; N. K. A. 2, I, 445; Arch. Néerl. XIV, 272. — Sacc. Syll. V, 462. — Wint. Kr. Fl. I, 534.

24. **Russula nigricans** (Bull.) Fr. Ep. 439. — Oud. Rév. I, 171; T. N. G. XI, 384; Prodr. Fl. Bat. II, 3, 360; N. K. A. 1, V, 295; 2, I, 445; 2, V, 295 et 358; Arch. Néerl. XIV, 270; Fl. Bat. tab. 1350. — Sacc. Syll. V, 453. — Wint. Kr. Fl. I, 538.

25. **Russula nitida** (P.) Fr. Ep. 527. — Oud. Rév. I, 179; T. N. G XI, 384; Prodr. Fl. Bat. II. 3, p. 361; N. K. A. 2, V, 358; Arch. Néerl. XIV, 273. — Sacc. Syll. V, 477. — Wint. Kr. Fl. I, 526.

26. **Russula ochroleuca** (P.) Fr. Ep. 149. — Oud. Rév. I, 178; T. N. G. Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 361; N. K. A. 2, V, 358; Arch. Néerl. XIV, 273. — Sacc. Syll. V, 471. — Wint. Kr. Fl. I, 529.

27. **Russula olivacea** (Schaeff.) Fr. Ep. 145. — Oud. Rév. I, 175; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 361; Arch. Néerl. XIV, 272. — Sacc. Syll. V, 464. — Wint. Kr. Fl. I, 533.

28. **Russula olivascens** Fr. Ep. 441. — Oud. Rév. I, 172. — Sacc. Syll. V, 456. — Wint. Kr. Fl. I, 537.

29. **Russula pectinata** (Bull.) Fr. Ep. 449. — Oud. Rév. I, 178, N. K. A. 2, III, 245; 3, I, 234; Arch. Néerl. XIV, 273. — Sacc. Syll. V, 470. — Wint. Kr. Fl. I, 529.

30. **Russula puellaris** Fr. Ep. 152. — Oud. Rév. I, 179; N. K. A. 2, VI, 23. — Sacc. Syll. V, 478. — Wint. Kr. Fl. I, 526.

31. **Russula purpurea** Gillet. — Oud. Rév. I, 173; N. K. A. 3, I, 233. — Sacc. Syll. V, 458.

32. **Russula rosacea** Fr. Ep. 442. — Oud. Rév. 173; N. K. A. 3, I, 233; Arch. Néerl. XIV, 271. — Sacc. Syll. V, 457. — Wint. Kr. Fl. I, 536.

33. **Russula rubra** (D. C.) Fr. Ep. 444. — Oud. Rév. I, 174;

T. N. G. XI, 384; Prodr. Fl. Bat. II, 3, 360; N. K. A. 2, I, 445; 2, V, 358; Arch. Néerl. XIV, 272. — Sacc. Syll. V, 462. — Wint. Kr. Fl. I, 534.

34. **Russula sororia** G. Larbei. — Fr. Ep. 447. — Oud. Rév. II, p. (3); N. K. A. 3, I, 446. — Sacc. Syll. V, 466.

35. **Russula subfoetens** Smith. — Oud. Rév. I, 176; N. K. A. 2, VI, 23. — Sacc. Syll. V, 467.

36. **Russula vesca** Fr. Ep. 446. — Oud. Rév. I, 175; N. K. A. 2, I, 445; Arch. Néerl. XIV, 272. — Sacc. Syll. V, 465. — Wint. Kr. Fl. I, 532.

37. **Russula veternosa** Fr. Ep. 150. — Oud. Rév. I, 179. — Sacc. Syll. V, 174. — Wint. Kr. Fl. I, 528.

38. **Russula violacea** Quél. — Oud. N. K. A. 3, I, 147. — Sacc. Syll. V, 463.

39. **Russula virescens** (Schaeff.) Fr. Ep. 443. — Oud. Rév. I, 174; N. K. A. 1, V, 333; Arch. Néerl. VIII, 347 et XIV, 271. — Sacc. Syll. V, 460; Wint. Kr. Fl. I, 535.

40. **Russula vitellina** (P.) Fr. Ep. 151. — Oud. N. K. A. 3, II, 189. — Sacc. Syll. V, 181. — Wint. Kr. Fl. I, 521.

41. **Russula xerampelina** (Schaeff.) Fr. Ep. 145. — Oud. Rév. I, 175; N. K. A. 2, VI, 22. — Sacc. Syll. V, 163. — Wint. Kr. Fl. I, 533.

×××× CANTHARELLEAE.

CANTHARELLUS.

1. **Cantharellus aurantiacus** (Wulf.) Fr. Ep. 155; Oud. Rév. I, 181; T. N. G. 3, XI, 384; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 362; N. K. A. 1, V, 295; 2, I, 445 et 358; Arch. Néerl. XIV, 274; Fl. Bat. tab. 719. — Sacc. Syll. V, 483. — Wint. Kr. Fl. I, 523.

2. **Cantharellus bryophilus** (P.) Fr. Ep. 455. — Oud. Rév. I, 182; Prodr. Fl. Bat. II, 4ª, p. 2; Arch. Néerl. XIV, 274. — Sacc. Syll. V, 496. — Wint. Kr. Fl. I, 519.

3. **Cantharellus cibarius** Fr. Ep. 555. — Oud. Rév. I, 181; T. N. G. XI, 384; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 362; N. K. A. 1, V, 295; 2, I, 445; 2, V, 358 et 585; Arch. Néerl. XIV, 273; Fl. Bat. tab. 660. — Oud. Fgi Néerl. exs. n° 213. — Sacc. Syll. V, 182. — Wint. Kr. Fl. I, 523.

4. **Cantharellus cupulatus** Fr. Ep. 158. — Oud. N. K. A. 2, V, 157. — Sacc. Syll. V, 491. — Wint. Kr. Fl. I, 521.

5. **Cantharellus glaucus** (Batsch.) Fr. Ep. 460. — Oud. Rév.

I, 182; Arch. Néerl. XIV, 274. — Sacc. Syll. V, 495. — Wint. Kr. Fl. I, 520.

6. **Cantharellus infundibuliformis** (Scop.) Fr. Ep. 158. — Oud. Rév. II, p. (4); N. K. A. 3, I, 447; Fl. Bat. tab. 1525. — Sacc. Syll. V, 490. — Wint. Kr. Fl. I, 521.

7. **Cantharellus muscigenus** (Bull.) Fr. Ep. 460. — Oud. Rév. I, 182; Prodr. Fl. Bat. II, 3, 362; N. K. A. 1, I, 49; 2, I, 445; 2, V, 359; Arch. Néerl. XIV, 274. — Sacc. Syll. V, 495. — Wint. Kr. Fl. I, 520.

8. **Cantharellus retirugus** (Bull.) Fr. Ep. 460. — Oud. Rév. I, 182; T. N. G. XII, 266; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 362; N. K. A. 2, V, 359; Arch. Néerl. VIII, 347 et XIV, 274. — Sacc. Syll. V, 497. — Wint. Kr. Fl. I, 519.

9. **Cantharellus tubaeformis** (Bull.) Fr. Ep. 457. — Oud. Rév. I, 182; N. K. A. 1, V, 333; 2, VI, 24; Arch. Néerl. VIII, 347 et XIV, 274; Oud. Fgi Neerl. exs. n° 214. — Sacc. Syll. V, 489. — Wint. Kr. Fl. I, 522.

10. **Cantharellus umbonatus** (Gmel.) Fr. Ep. 457. — Oud. Rév. I, 182; Arch. Néerl. II, 30; XIV, 274. — Sacc. Syll. V, 485. — Wint. Kr. Fl. I, 522.

NYCTALIS.

1. **Nyctalis asterophora** Fr. Ep. 463. — Oud. Rév. I, 183; N. K. A. 1, V, 333; Arch. Néerl. VIII, 348 et XIV, 275; Oud. Fgi Neerl. exs. n° 108. — Sacc. Syll. V, 501. — Wint. Kr. Fl. I, 516. — Asterophora agaricoides N. K. A. 1, V, 298.

*ASTEROPHORA.

Asterophora agaricoides Fr. — N. K. A. 1, V, 298. — Voir: *Nyctalis asterophora.*

§ § Tenaces.

× MARASMIEAE.

MARASMIUS.

1. **Marasmius amadelphus** (Bull.) Fr. Ep. 475. — Oud. Rév. I, 191; Arch. Néerl. II, 31; XIV, 276. — Sacc. Syll. V, 531. — Wint. Kr. Fl. I, 507.

2. **Marasmius androsaceus** (L.) Fr. Ep. 477. — Oud. Rév. I,

193; T. N. G. XI, 385; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 363, N. K. A. 2, V, 359; Arch. Néerl. XIV, 277; Oud. Fgi Neerl. exs. n° 217. — Sacc. Syll. V, 543. — Wint. Kr. Fl. I, 504.

3. **Marasmius argyropus** (P.) Fr. Ep. 471. — Oud. Rév. I, 190; T. N. G. XI, 385; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 363; N. K. A. 2, I, 445; 2, V, 359; Arch. Neerl. XIV, 276; Oud. Fgi Neerl. exs n° 109. — Sacc. Syll. V, 521. — Wint. Kr. Fl. I, 509.

4. **Marasmius calopus** (P.) Fr. Ep. 472. — Oud. N. K. A. 3, II, 654. — Sacc. Syll. V, 525. — Wint. Kr. Fl. I, 508.

5. **Marasmius candidus** (Bolton) Fr. Ep. 475. — Oud. Rév. I, 191; Arch. Néerl. XIV, 277. — Sacc. Syll. V, 533. — Wint. Kr. Fl. I, 506.

6. **Marasmius cauliciualis** (Swartz) Fr. Ep. 476. — Oud. Rév. I, 191; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 364; Arch. Néerl. XIV, 277. — Sacc. Syll. V, 536. — Wint. Kr. Fl. I, 505.

7. **Marasmius cohaerens** Cooke. — Oud. N. K. A. 3, II, 655. — Mycena cohaerens (P.) Sacc. Syll. V, 263. — Ag. Myc. cohaerens Fr. Ep. 137. — Wint. Kr. Fl. I, 763.

8. **Marasmius epiphyllus** Fr. Ep. I, 479. — Oud. Rév. I, 191; T. N. G. XI, 385; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 365; N. K. A. 2, V, 359; Arch. Néerl. XIV, 278. — Sacc. Syll. V, 559. — Wint. Kr. Fl. 502.

9. **Marasmius graminum** (Lib.) Berk. et Br. Outl. 222. — Oud. Rév. I, 193; N. K. A. 1, V, 334; Arch. Néerl. VIII, 348 et XIV, 277. — Sacc. Syll. V, 542. — Wint. Kr. Fl. I, 501.

10. **Marasmius oreades** (Bolton) Fr. Ep. 467. — Oud. Rév. I, 189; T. N. G. XI, 385; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 363; N. K. A. 1, V, 295; 2, I, 145; 2, V, 359; Arch. Néerl. XIV, 276; Fl. Bat. tab. 830. — Sacc. Syll. V, 510. — Wint. Kr. Fl. I, 512.

11. **Marasmius perforans** (Hoffm.) Fr. Ep. 478. — Oud. Rév. I, 193; N. K. A. 2, V, 359; Arch. Néerl. XIV, 277; Oud. Fgi Néerl. exs. n° 218. — Sacc. Syll. V, 557; Wint. Kr Fl. I, 503.

12. **Marasmius peronatus** (Bolton) Fr. Ep. 465. — Oud. Rév. I, 189; T. N. G. XI, 385; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 363; N. K. A. 2, V, 359; Arch. Néerl. XIV, 275; Oud. Fgi Neerl. exs. n° 215. — Sacc. Syll. V, 501. — Wint. Kr. Fl. I, 514.

13. **Marasmius plaueus** Fr. Ep. 468. — Oud. Rév. I, 189; Arch. Néerl. II, 31 et XIV, 276. — Sacc. Syll. V, 511. — Wint. Kr. Fl. I, 512.

14. **Marasmius ramealis** (Bull.) Fr. Ep. 475. — Oud. Rév. I, 191; N. K. A. 1, V, 295 et 333; 2, V, 359; Arch. Néerl. XIV, 277. — Sacc. Syll. V, 531. — Wint. Kr. Fl. I, 507.

15. **Marasmius Rotula** (Scopoli) Fr. Ep. 477. — Oud. Rév. I, 193; T. N. G. XI, 385; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 364; N. K. A. 2, I, 445; 2, V, 359; Arch. Néerl. XIV, 277. — Fl. Bat. tab. 1435. — Sacc. Syll. V, 511. — Wint. Kr. Fl. I, 505.

16. **Marasmius saccharinus** (Batsch) Fr. Ep. 479. — Oud. Rév. I, 193; N. K. A. 2, V, 359; Arch. Néerl. II, 31 et XIV, 278. — Sacc. Syll. V, 559. — Wint. Kr. Fl. I, 502.

17. **Marasmius scorodonius** Fr. Ep. 472. — Oud. Rév. I, 191; T. N. G. XII, 267; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 363; N. K. A. 2, I, 445; 2, V, 359; Arch. Néerl. XIV, 276; Oud. Fgi Néerl. exs. n° 216. — Sacc. Syll. V, 525. — Wint. Kr. Fl. I, 509.

18. **Marasmius scorteus** Fr. Ep. 468. — Oud. N. K. A. 3, II, 189. — Sacc. Syll. V, 511. — Wint. Kr. Fl. I, 511.

19. **Marasmius spodoleucus** Berk et Br. in Berk. Outl. 224. — Fr. Ep. 480. — Oud. Rév. I, 194; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 3; N. K. A. 2, V, 359; Arch. Néerl. XIV, 278. — Sacc. Syll. V, 567.

20. **Marasmius urens** (Bull.) Fr. Ep. 465. — Oud. Rév. I, 189; T. N. G. XII, 267; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 363; N. K. A. 2, I, 445; 2, V, 359; Arch. Néerl. XIV, 275. — Sacc. Syll. V, 504. — Wint. Kr. Fl. I, 514.

LENTINUS.

1. **Lentinus jugis** Fr. Ep. 484. — Oud. Rév. I, 196. — N. K. A. 2, III, 144; Arch. Néerl. XIV, 278. — Sacc. Syll. V, 594. — Wint. Kr. Fl. I, 499.

2. **Lentinus lepideus** Fr. Ep. 481. — Oud. Rév. I, 195; T. N. G. XI, 385; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 365; Arch. Néerl. XIV, 278; Fl. Bat. tab. 1565.

3. **Lentinus suffrutescens** (Brot.) Fr. Ep. 584. — Oud. Rév. I, 195. — N. K. A. 2, V, 157 et 2, VI, 21; Arch. Néerl. XIV, 278; Fl. Bat. tab. 948. — Sacc. Syll. V, 594. — Wint. Kr. Fl. 499.

4. **Lentinus tigrinus** (Bull.) Fr. Ep. 131. — Oud. Rév. I, 195; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 365; N. K. A. 2, I, 445; 2, V, 360; Arch. Néerl. XIV, 278; Fl. Bat. 1564. — Sacc. Syll. V, 580. — Wint. Kr. Fl. I, 501.

PANUS.

***Panus cochlearis**. — A supprimer.

1. **Panus conchatus** (Bull.) Fr. Ep. 188. — Sacc. Syll. V, 615. — Wint. Kr. Fl. 596. — Oud. N. K. A. 3, I, tab. IV et V, f. 2; 3, III, 1082.

2. **Panus stipticus** (Bull.) Fr. Ep. 189. — T. N. G. XI, 185; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 365; N. K. A. 1, V, 295; 2. I. 445; 2, V, 369; Arch. Néerl. XIV, 279; Fl. Bat. tab. 805. — Sacc. Syll. V, 622. — Wint. Kr. Fl. I, 495.

×× LENZITEAE.

LENZITES.

1. **Lenzites abietina** (Bull.) Fr. Ep. 495. — Oud. Rév. I, 199; T. N. G. XI, 385; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 366; N. K. A. 2, I, 146; 2, V, 360 et 586; Arch. Néerl. XIV, 280. — Sacc. Syll. V, 640. — Wint. Kr. Fl. I, 490.

2. **Lenzites betulina** (L.) Fr. Ep. 493. — Oud. Rév. I, 198; T. N. G. XI, 385; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 366; N. K. A. 2, I, 445; 2, V, 360 et 586; Arch. Néerl. XIV, 279; Fl. Bat. tab. 790. — Sacc. Syll. V, 638. — Wint. Kr. Fl. I, 492.

3. **Lenzites flaccida** (Bull.) Fr. Ep. 493. — Oud. Rév. I, 199; N. K. A. 2, III, 245; Arch. Néerl. XIV, 280. — Sacc. Syll. V, 638. — Wint. Kr. Fl. I, 492.

4. **Lenzites Pinastri** Kalchbrenner Icones sel. Hymenomycetum Hungariae I, 1873, p. 49 et tab. XXX f. 3. — Fr. Ep. 495. — Oud. Rév. I, 139. — Oud. Rév. I, 199. — Sacc. Syll. V, 540.

5. **Lenzites sepiaria** (Wulf.) Fr. Ep. 494. — Oud. Rév. I, 199; Prodr. Fl. Bat. II, 2, p. 366; N. K. A. 2, I, 146; 2, V, 360; Fl. Bat. tab. 790. — Sacc. Syll. V; 639. — Wint. Kr. Fl. I, 491.

6. **Lenzites variegata** Fr. Ep. 493. — Oud. Rév. I, 199; T. N. G. XII, 267; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 366; N. K. A. 2, I, 165 et 445; Fl. Bat. tab. 790. — Oud. Herb. Ned. Pl. n° 177. — Sacc. Syll. V, 638. — Wint. Kr. Fl. I, 492.

** Schizophylleae.

SCHIZOPHYLLUM.

1. **Schizophyllum commune** Fr. Ep. 493. — Oud. Rév. I, 199. — Arch. Néerl. II. 31; XIV, 299. — Sacc. Syll. V, 655. — Wint. Kr. Fl. I, 493.

2. Rhodosporae.

VOLVARIA.

1. **Volvaria bombycina** (Schaeff.) Fr. Ep. 182. — Oud. Rév. I, 203; N. K. A. 2, V, 11. — Sacc. Syll. V, 656. — Ag. Volv. bombycina Fr. — Fl. Bat. tab. 1445. — Wint. Kr. I, 730.

2. **Volvaria gloiocephala** (D. C.) Fr. Ep. 183. — Oud. Rév. I, 204. — Sacc. Syll. V, 662. — Ag. Volv. gloioc. Fr. — N. K. A. 2, V, 150 et 348. — Wint. Kr. Fl. I, 729.

3. **Volvaria parvula** (Weinm.) Fr. Ep. 184. — Oud. Rév. I, 204. — Sacc. Syll. V, 663. — Ag. Volv. parv. Fr. — T. N. G. XII, 263; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 330; Arch. Néerl. II, 25; XIV, 234. — Wint. Kr. Fl. I, 729 et 730.

4. **Volvaria speciosa** Fr. Ep. 183. — Oud. Rév. I, 204. — Sacc. Syll. V, 661. — Ag. Volv. speciosa Fr. — T. N. G. XI, 384; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 330, N. K. A. 2, I, 440; 2, V, 348; Arch. Néerl. XIV, 234. — Wint. Kr. Fl. I, 729.

5. **Volvaria Taylori** (Berk.) Fr. Ep. 183. — Oud. Rév. I, 203. — Sacc. Symb. V, 658. — Ag. Volv. Tayl. Fr. — N. K. A. 2, V, 149 et 348.

6. **Volvaria volvacea** (Bull.) Fr. Ep. 182. — Oud. Rév. I, 203. — Sacc. Syll. V, 657. — Ag. Volv. volv. Fr. — T. N. G. XI, 381; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 330; N. K. A. 2, I, 440; 2, V, 348; Arch. Néerl. XIV, 234; Fl. Bat. tab. 937. — Wint. Kr. Fl. I, 730.

PLUTEUS.

1. **Pluteus cervinus** (Schaeff.) Fr. Ep. 185. — Oud. Rév. I, 205. — Sacc. Syll. V, 665. — Ag. Pl. cerv. Fr. — T. N. G. XII, 263; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 330; N. K. A. 2, I, 440 et 2, V, 348; Arch. Néerl. XIV, 235; Fl. Bat. tab. 1405. — Wint. Kr. Fl. I, 728.

2. **Pluteus ephebeus** Fr. Ep. 186. — Oud. Rév. I, 205. — Sacc. Syll. V, 667. — Ag. Pl. epheb. Fr. — N. K. A. 2, V, 150. — Wint. Kr. Fl. I, 727.

3. **Pluteus hispidulus** Fr. Ep. 187. — Oud. Rév. I, 206. — Sacc. Syll. V, 668. — Ag. Plut. hisp. Fr. — N. K. A. 2, V, 464. — Wint. Kr. Fl. I, 727.

4. **Pluteus nanus** (P.) Fr. Ep. 187. — Oud. Rév. I, 206; N. K. A. 2, VI, 12. — Sacc. Syll. V, 672. — Ag. Pl. nan. Fr. — Wint. Kr. Fl. I, 726.

5. **Pluteus semibulbosus** (Lasch) Fr. Ep. 188. — Ond. Rév. I. 206. — Sacc. Syll. V. 674. — Ag. Pl. semib. Fr. — N. K. A. 2, IV, 213. Wint. Kr. Fl. I, 726.

ENTOLOMA.

1. **Entoloma clypeatum** (L.) Fr. Ep. 194. — Ond. Rév. I, 210. — Sacc. Syll. V. 694. — Ag. Ent. clypeatus Fr. — T. N. G. XI, 382; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 331; N. K. A. 2, V, 348; Arch. Néerl. XIV. 236; Fl. Bat. tab. 1275. — Wint. Kr. Fl. I, 721.

2. **Entoloma nidorosum** Fr. Ep. 196. — Ond. Rév. I, 210; N. K. A. 3. II. 655. — Sacc. Syll. V, 697. — Ag. Ent. nidorosus Fr. — N. K. A. 2, IV, 213 et 2, V, 348. — Wint. Kr. Fl. I, 720.

3. **Entoloma nigro-cinnamomeum** (Kalchbr.) Fr. Ep. 195. — Ond. Rév. I. 210. — Sacc. Syll. V, 694. — Ag. Ent. nigro-cinnamoneus Kalchbr. Fr. — N. K. A. 2, III. 241 et V. 150; Arch. Néerl. XIV. 236. — Wint. Kr. Fl. I, 721.

4. **Entoloma Placenta** (Batsch) Fr. Ep. 100. — Ond. Rév. I, 209. — Sacc. Syll. V. 682. — Ag. Ent. Plac Fr. — Prodr. Fl. Bat. II. 3. 331; Arch. Néerl. XIV, 235. — Wint. Kr. Fl. I. 724.

5. **Entoloma prunuloides** Fr. Ep. 189. — Ond. Rév. I. 209.— Sacc. Syll. V, 680. — Ag. Ent. prun. Fr. — Arch. Néerl. II, 25; XIV. 235. — Wint. Kr. Fl. I, 724.

6. **Entoloma rhodopolium** Fr. Ep. 195. — Ond. Rév. I. 210. — Sacc. Syll. V, 694. — Ag. Ent. rhodopolius Fr. — T. N. G. XI, 382; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 331; N. K. A. 2, I, 110; 2. V. 348; Arch. Néerl. XIV. 236; Fl. Bat. tab. 1375. — Wint. Kr. Fl. I. 721.

7. **Entoloma sericellum** Fr. Ep. 194. — Ond. Rév. I. 209; N. K. A. 2, VI. 12. — Sacc. Syll. V. 691. — Ag. Ent. sericellus Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 331; Arch. Néerl. XIV, 235. — Wint. kr. Fl. I, 722.

8. **Entoloma sericeum** (Bull.) Fr. Ep. 196. — Sacc. Syll. V, 896. — Ag. Ent. sericeus Fr. — N. K. A. 2, V. 348. — Wint. Kr. Fl. I. 720.

9. **Entoloma sinuatum** Fr. Ep. 189. — Ond. Rév. I. 209. — Sacc. Syll. V. 680. — Ag. Ent. sinuatus Fr. — Arch. Néerl. II. 25; XIV. 235. — Wint. Kr. Fl. I. 725.

CLITOPILUS.

1. **Clitopilus Orcella** (Bull.) Fr. Ep. 197. — Oud. Rév. I, 211. — Sacc. Syll. V, 699. — Ag. Cl. Orc. Fr. — N. K. A. I, V, 293 et 332; Arch. Néerl. XIV, 236. — Wint. Kr. Fl. I, 719.

2. **Clitopilus Prunulus** (Scop.) Fr. Ep. 197. — Oud. N. K. A. 3, II, 190. — Sacc. Syll. V, 699. — Ag. Clit. Prun. Fr. — Wint. Kr. Fl. I, 719.

LEPTONIA.

1. **Leptonia anatina** (Lasch) Fr. Ep. 201. — Oud. Rév. I, 213. — Sacc. Syll. V, 707. — Ag. Lept. anatinus Fr. — N. K. A. 2, I, 441; 2, V, 348; Arch. Néerl. II, 26; XIV, 236. — Wint. Kr. Fl. I, 715.

2. **Leptonia euchroa** (P.) Fr. Ep. 203. — Oud. Rév. I, 215. — Sacc. Syll. V, 711. — Ag. Lept. euchrous Fr. — N. K. A. 2, V, 150 et 348. — Wint. Kr. Fl. I, 744.

3. **Leptonia Kerverni** Quélet in Gill. Ch. de Fr. 113. — Oud. Rév. I, 214; N. K. A. 2, VI, 13.

4. **Leptonia lampropoda** Fr. Ep. 202. — Oud. Rév. I, 213. — Sacc. Syll. V, 707. — Ag. Lept. lampropus Fr. — N. K. A. 2, III, 142; Arch. Néerl. XIV, 237; Oud. Fgi Neerl. exs. n° 103. — Wint. Kr. Fl. 715.

5. **Leptonia serrulata** (P.) Fr. Ep. 203. — Oud. Rév. I, 214. — Sacc. Syll. V, 710. — Ag. Lept. serrulatus Fr. — N. K. A. 2, II, 143; Arch. Néerl. XIV, 237. — Wint. Kr. Fl. I, 711.

6. **Leptonia solstitialis** Fr. Ep. 202. — Oud. Rév. I, 213; N. K. A. 2, VI, 12. — Sacc. Syll. V, 708. — Ag. Lept. solst. Fr. — N. K. A. 2, IV, 213. — Wint. Kr. Fl. I, 711.

NOLANEA.

1. **Nolanea hirtipes** (Fl. Dan.) Fr. Ep. 209. — Oud. Rév. I, 215; N. K. A. 2, VI, 13. — Sacc. Syll. V, 725. — Ag. Nol. hirt. Fr. — Wint. Kr. Fl. I, 708.

2. **Nolanea pascua** (P.) Fr. Ep. 206. — Oud. Rév. I, 215. — Sacc. Syll. V, 716. — Ag. Nol. pascuus Fr. — T. N. G. XII, 263; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 332; N. K. A. 2, V, 318; Arch. Néerl. XIV, 237. — Wint. Kr. Fl. I, 711.

3. **Nolanea picea** (Kalchbr.) Sacc. Syll. V, 725. — Ag. Nol.

piceus Kalchbr. Ic. Sel. Hym. Hung. 23 et tab. XI, f. 2. — Fr. Ep. 209. — Oud. N. K. A. 3, 1, 232. — Wint. Kr. Fl. 1, 708.

ECCILIA.

1. **Eccilia atrides** (Lasch) Fr. Ep. 212. — Oud. Rév. I, 216. — Sacc. Syll. V, 731. — Ag. Ecc. atr. Fr. — N. K. A. 2, 1, 163 et 441; Arch. Néerl. VIII, 347 et XIV, 237. — Wint. Kr. Fl. 1, 706.

CLAUDOPUS.

1. **Claudopus byssisedus** (P.) Fr. Ep. 214. — Oud. Rév. I, 217. — Ag. Cl. byss. Fr. — N. K. A. 2, V, 150 et 349. — Wint. Kr. Fl. 1, 705.

2. **Claudopus depluens** (Batsch) Fr. Ep. 214. — Oud. Rév. I, 217. — Sacc. Syll. V, 734. — Ag. Cl. depl. Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 338; N. K. A. 2, 1, 441; Arch. Néerl. XIV, 238. — Wint. Kr. Fl. 1, 705.

3. **Claudopus variabilis** (P.) Fr. Ep. 213. — Oud. Rév. I, p. 217. — Sacc. Syll. V, 733. — Ag. Cl. variabilis Fr. — T. N. G. XI, 382; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 338; N. K. A. 2, 1, 441; 2, V, 348; Arch. Néerl. XIV, 238.

3. Ochrosporae.

× AGARICEAE.

PHOLIOTA.

1. **Pholiota adiposa** Fr. Ep. 222. — Oud. Rév. I, 226. — Sacc. Syll. V, 752. — Ag. Phol. adiposus Fr. — N. K. A. 3, 1, 232; Arch. Néerl. XIV, 239. — Wint. Kr. Fl. 1, 698.

2. **Pholiota aurivella** (Batsch) Fr. Ep. 220. — Oud. Rév. I, 226. — Sacc. Syll. V, 748. — Ag. Phol. aurivellus Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 332; N. K. A. 2, 1, 441; 2, V, 349 et 584; Arch. Néerl. XIV, 239; Fl. Bat. tab. 1509. — Wint. Kr. Fl. 1, 700.

3. **Pholiota destruens** (Brondeau) Fr. Ep. 219. — Oud. Rév. I, 226. — Sacc. Syll. V, 746. — Ag. Phol. destruens Fr. — N. K. A. 2, IV, 213 et 2, V, 349; Fl. Bat. tab. 1385. — Wint. Kr. Fl. 1, 701.

4. **Pholiota dura** (Bolt.) Fr. Ep. 216. — Sacc. Syll. V, 738. — Ag. Phol. durus Fr. N. K. A. 3, 1, 233. — Wint. Kr. Fl. 1, 703.

5. **Pholiota crebia** Fr. Ep. 216. — Oud. Rév. I, 224. — Sacc. Syll. V, 737. — Ag. Phol. crebius Fr. — Arch. Néerl. XIV, 238. — Ag. Stropharia crebius Fr. — Fl. Bat. II, 3, p. 340. — Ag. Psalliota Leveillanus Dozij et Molkenboer T. N. G. XII, 277 et Nov. Fg. Spec. Lugd. Bat. 1846.

6. **Pholiota lucifera** (Lasch) Fr. Ep. 222. — Oud. Rév. I, 227. — Sacc. Syll. V, 753. — Ag. Phol. lucifer Fr. — Arch. Néerl. II, 26; XIV, 239. — Wint. Kr. Fl. I, 698.

7. **Pholiota marginata** (Batsch) Fr. Ep. 225. — Oud. Rév. I, 227. — Sacc. Syll. V, 758. — Ag. Phol. marginatus Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 334; Arch. Néerl. XIV, 240. — Wint. Kr. Fl. I, 696.

8. **Pholiota mutabilis** (Schaeff.) Fr. Ep. 225. — Oud. Rév. I, 227. — Sacc. Syll. V, 758. — Ag. Phol. mutabilis Fr. — T. N. G. XI, 382; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 333; N. K. A. 2, I, 441; 2, V, 349; Arch. Néerl. XIV, 240; Fl. Bat. tab. 815 (errore ad Armill. mellean spectat). — Wint. Kr. Fl. I, 697.

9. **Pholiota mycenoides** Fr. Ep. 226. — Oud. Rév. I, 228. — Sacc. Syll. V, 760. — Ag. Phol. mycen. Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 334; Arch. Néerl. XIV, 240. — Wint. Kr. Fl. I, 695.

10. **Pholiota praecox** (P.) Fr. Ep. 217. — Oud. Rév. I, 224. — Sacc. Syll. V, 738. — Ag. Phol. praecox Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 332; N. K. A. 1, V, 332; 2, V, 349; Arch. Néerl. XIV, 238. — Wint. Kr. Fl. I, 703.

11. **Pholiota pumila** Fr. Ep. 226. — Oud. Rév. I, 227. — Sacc. Syll. V, 760. — Ag. Phol. pumilus Fr. — Arch. Néerl. XIV, 240. — Wint. Kr. Fl. I, 696.

12. **Pholiota radicosa** (Bull.) Fr. Ep. 218. — Oud. Rév. I, 225; N. K. A. 3, II, 656. — Sacc. Syll. V, 741. — Ag. Phol. radicosus Fr. — N. K. A. 1, V, 332; 2, V, 349; Arch. Néerl. VIII, 347; XIV, 239. — Wint. Kr. Fl. I, 702.

13. **Pholiota spectabilis** Fr. Ep. 221. — Oud. Rév. I, 226. — Sacc. Syll. V, 751. — Ag. Phol. spect. Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 333; N. K. A. 2, V, 349; Arch. Néerl. XIV, 239; Oud. Fgi Neerl. exs. n° 104. — Wint. Kr. Fl. I, 699.

14. **Pholiota sphaleromorpha** (Bull.) Sacc. Syll. V, 739. — Ph. sphaleromorpha (Bull.) Oud. Rév. I, 225. — Ag. Ph. sphaleromorphus (Bull.) Fr. Ep. 217. — N. K. A. 2, II, 97, Arch. Néerl. XIV, 238. — Wint. Kr. Fl. I, 703.

15. **Pholiota squarrosa** (Müll.) Fr. Ep. 221. — Oud. Rév. I, 226. — Sacc. Syll. V, 749. — Phol. squarrosus Fr. — T. N. G. XI, 382; Prodr. Fl. Bat. 3, II, 333; N. K. A. I, V, 299; 2,

I, 441; 2, V, 349 et 584. — Arch. Néerl. XIV, 239; Fl. Bat. tab. 713. — Wint. Kr. Fl. I, 699.

16. **Pholiota togularis** (Bull.) Fr. Ep. 216. — Oud. Rév. I, 224. — Sacc. Syll. V, 738. — Ag. Phol. tog. Fr. — T. N. G. XII, 263; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 332; Arch. Néerl. XIV, 238. — Wint. Kr. Fl. I, 704.

17. **Pholiota tuberculosa** (Schaeff.) Fr. Ep. 223. — Oud. Rév. I, 227. — Sacc. Syll. V, 754. — Ag. Phol. tuberculosus Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 333; Arch. Néerl. XIV, 239. — Wint. Kr. Fl. 698.

18. **Pholiota unicolor** (Fl. Dan.) Fr. Ep. 225. — Oud. Rév. I, 227. — Sacc. Syll. V, 759. — Ag. Phol. unic. Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 334; Arch. Néerl. XIV, 240; Fl. Bat. tab. 1710. — Wint. Kr. Fl. I, 696.

HEBELOMA.

***Hebeloma auricomum** N. K. A. 2, I, 441. — Voir: *Inocybe*.

1. **Hebeloma capniocephalum** (Bull.) Fr. Ep. 242. — Oud. Rév. I, 211; N. K. A. 2, VI, 13. — Sacc. Syll. V, 802. — Ag. Heb. capniocephalus Fr. — Arch. Néerl. II, 26; XIV, 243.

2. **Hebeloma clavicepS** Fr. Ep. 238. — Oud. Rév. I, 240. — Sacc. Syll. V, 791. — Ag. Heb. clav. Fr. — N. K. A. 2, IV, 214. — Wint. Kr. Fl. I, 686. — Ag. Heb. Clavus Batsch. — T. N. G. XII, 264; Prodr. Fl. Bat. 3, II, 336. — Ag. Heb. firmus Arch. Néerl. XIV, 242.

***Hebeloma Clavus** Fr. — Ag. Heb. Clavus T. N. G. XII, 264; Prodr. Fl. Bat. 3, II, 336. — Voir: H. clavicepS.

3. **Hebeloma crustuliniforme** (Bull.) Fr. Ep. 241. — Oud. Rév. I, 241. — Sacc. Syll. V, 799. — Ag. Heb. crustuliniformis Fr. — T. N. G. XI, 382; Prodr. Fl. Bat. II, 3, 336; N. K. A. I, V, 293; 2, I, 441; 2, V, 350; Arch. Néerl. XIV, 243. — Wint. Kr. Fl. I, 685.

***Hebeloma destrictum** Fr. — Ag. Heb. destrictus (Bull.) Fr. T. N. G. XI, 382; Fl. Bat. 3, II, 335. — Voir: *Inocybe*.

4. **Hebeloma fastibile** Fr. Ep. 237. — Oud. Rév. I, 239. — Sacc. Syll. V, 792. — Ag. Heb. fastibilis Fr. — T. N. G. XII, 264; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 335; N. K. A. 2, I, 441; 2, V, 350 et 584; Arch. Néerl. XIV, 242; Fl. Bat. tab. 1549. — Wint. Kr. Fl. I, 687.

***Hebeloma fastigiatum** Fr. — Ag. Heb. fastigiatus (Schaeff.) Fr. T. N. G. XII, 264; Prodr. Fl. Bat. 3, II, 335. — Voir: *Inocybe*.

***Hebeloma firmum** (P.) Prodr. Fl. Bat. II, 3, 336. — Voir: *Heb. claviceps.*

***Hebeloma geophyllum** Fr. — Ag. Heb. geophyllus (Sow.) Fr. — T. N. G. XI, 382; Prodr. Fl. Bat. 3, II, 335; N. K. A. 2, I, 441. — Voir: *Inocybe.*

***Hebeloma lacerum** Fr. — Ag. Heb. lacerus Fr. — Prodr. Fl. Bat. 3, II, 335. — Voir: *Inocybe.*

***Hebeloma lanuginosum** Fr. — Ag. Heb. lanuginosus (Bull.) Fr. — Prodr. Fl. Bat. 3, II, 335; N. K. A. 2, I, 441. — Voir: *Inocybe.*

5. **Hebeloma longicaudum** (P.) Fr. Ep. 241. — N. K. A. 2, V, 350; 3, I, 451; Oud. Rév. II, p. (7). — Sacc. Syll. V, 800. — Ag. Heb. longicaudus Fr. — Wint. Kr. Fl. I, 684.

***Hebeloma maritimum** Fr. — Ag. Heb. maritimus Fr. N. K. A. 2, I, 441; Arch. Néerl. VIII, 347. — Voir: *Inocybe.*

6. **Hebeloma mesophaeum** Fr. Ep. 240. — Oud. Rév. I, 240 et II, p. (7). — Sacc. Syll. V, 795. — Ag. Heb. mesophaeus Fr. — N. K. A. 2, IV, 214. — Wint. Kr. Fl. I, 685.

id. forma **minor** Cooke. — Oud. N. K. A. 3, I, 451.

7. **Hebeloma mussivum** Fr. Ep. 237. — Oud. Rév. I, 239. — Sacc. Syll. V, 792. — Ag. Heb. mussivus Fr. — T. N. G. XII, 264; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 336; Arch. Néerl. XIV, 242.

8. **Hebeloma petiginosum** Fr. Ep. 243. — Oud. Rév. I, 241. — Sacc. Syll. V, 808. — Ag. Heb. petiginosus Fr. — N. K. A. 1, I, 441; Arch. Néerl. XIV, 243. — Wint. Kr. Fl. I, 683.

***Hebeloma rimosum** Fr. — Ag. Heb. rimosus Fr. — Prodr. Fl. Bat., 3, IV, 335; N. K. A. 2, I, 441. — Voir: *Inocybe.*

9. **Hebeloma sinapizans** Fr. Ep. 240. — Oud. Rév. I, 241. — Sacc. Syll. V, 799. — Ag. Heb. sinap. Fr. — N. K. A. 1, I, 441; 2; I, 441; 2, V, 350; Arch. Néerl. XIV, 242.

10. **Hebeloma sinuosum** Fr. Ep. 237. — Oud. Rév. I, 239. — Sacc. Syll. V, 792. — Ag. Heb. sinuosus Fr. — N. K. A. 2, I, 441; Arch. Néerl. XIV, 242. — Wint. Kr. Fl. I, 687.

11. **Hebeloma versipelle** Fr. Ep. 239. — Oud. Rév. I, 240. — Sacc. Syll. V, 794. — Ag. Heb. versipellis Fr. — N. K. A. 2, I, 165; Arch. Néerl. VIII, 347 et XIV, 242. — Wint. Kr. Fl. I, 686.

INOCYBE.

1. **Inocybe asinina** (Kalchbr.) Fr. Ep. 230. — Oud. Rév. I, 233. — Sacc. Syll. V, 771. — Ag. Inoc. asininus Fr. — N. K. A. 2, IV, 214.

2. **Inocybe auricoma** (Batsch) Fr. Ep. 233. — Oud. Rév. I, 236. — Sacc. Syll. V, 777. — Ag. Inoc. auricomus Fr. — N. K. A. 2, I, 16 et 441; Arch. Néerl. VIII; 347; XIV, 241.

3. **Inocybe capucina** Fr. Ep. 230. — Oud. Rév. I, 233. — Sacc. Syll. V, 772. — Ag. Inoc. capucinus Fr. — N. K. A. 2, V, 150.

4. **Inocybe carpta** (Scop.) Fr. Ep. 230. — Oud. Rév. I, 233. — Sacc. Syll. V, 769. — Ag. Inoc. carptus Fr. — Arch. Néerl. II, 26; XIV, 241; Oud. Fgi Neerl. exs. n° 105. — Wint. Kr. Fl. I, 692.

5. **Inocybe deglubens** Fr. Ep. 231. — Oud. Rév. I, 234. — Sacc. Syll. V, 769. — Ag. Inoc. degl. Fr. — Arch. Néerl. II, 26; XIV, 241. — Wint. Kr. Fl. I, 692.

6. **Inocybe descissa** Fr. Ep. 233. — Oud. Rév. I, 235. — Sacc. Syll. V, 777. — Ag. Inoc. descissus Fr. — N. K. A. 2, V, 151. — Wint. Kr. Fl. I, 690.

7. **Inocybe destricta** Fr. Ep. 232. — Oud. Rév. I, 235. — Sacc. Syll. V, 776. — Ag. Inoc. destrictus Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 335; N. K. A. 2, V, 350; Arch. Néerl. XIV, 241. — Wint. Kr. Fl. I, 690.

8. **Inocybe fastigiata** (Schaeff.) Fr. Ep. 231. — Oud. Rév. I, 235. — Sacc. Syll. V, 779. — Ag. Inoc. fastigiatus Fr. — Wint. Kr. Fl. I, 691. — Ag. Hebeloma fastigiatus T. N. G. XII, 264; Prod. Fl. Bat. II, 3, p. 335; N. K. A. 2, V, 349; Arch. Néerl. XIV, 241.

9. **Inocybe fibrosa** (Sow.) Fr. Ep. 231. — Oud. Rév. I, 234. — Sacc. Syll. V, 779. — Ag. Inoc. fibrosus Fr. — N. K. A. 2, V, 151. — Wint. Kr. Fl. I, 691.

10. **Inocybe flocculosa** (Berk.) Fr. Ep. 229. — Oud. Rév. I, 233. — Sacc. Syll. V, 768. — Ag. Inoc. flocculosus Fr. — N. K. A. 2, IV, 214.

11. **Inocybe geophylla** (Sow.) Fr. Ep. 235. — Oud. Rév. I, 236 et II, p. 61. — Sacc. Syll. V, 785. — Ag. Inoc. geophyllus N. K. A. 2, V, 350 et 3, I, 233; Arch. Néerl. XIV, 241; Fl. Bat. tab. 1534. — Wint. Kr. Fl. I, 688. — Hebeloma geophyllum N. K. A. 2, I, 441.

var: **pileo lutescente** Bull. — Oud. N. K. A. 3, I, 451.

12. **Inocybe Godeyi** Gill. — Sacc. Syll. V, 778. — Ag. Inocybe Godeyi N. K. A. 2, V, 250.

13. **Inocybe lacera** Fr. Ep. 229. — Oud. Rév. I, 233. — Sacc. Syll. V, 767. — Ag. Inoc. lacerus Fr. — N. K. A. 2, V, 319;

Arch. Néerl. XIV, 241; Oud. Fgi. Neerl. exs. n° 206. — Ag. Hebeloma lacerus Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 335. — Wint. Kr. Fl. I, 693.

14. **Inocybe lanuginosa** (Bull.) Fr. Ep. 227. — Oud. Rév. I. 232. — Sacc. Syll. V, 765. — Ag. Inoc. lanuginosus Fr. — N. K. A. 2, V, 349; Arch. Néerl. XIV, 240. — Wint. Kr. Fl. I, 694. — Ag. Hebeloma lanuginosus Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 335; N. K. A. 2, I, 141.

15. **Inocybe lucifuga** Fr. Ep. 234. — Oud. Rév. I, 236. — Sacc. Syll. V, 783. — Ag. Inoc. lucif. Fr. — N. K. A. I, V, 350 et 164; Fl. Bat. tab. 1465. — Wint. Kr. Fl. I, 689.

16. **Inocybe maritima** Fr. Ep. 229. — Oud. Rév. I, 232. — Sacc. Syll. V, 771. — Ag. Inoc. maritimus Fr. — Arch. Néerl. XIV, 240. — Wint. Kr. Fl. I, 693. — Ag. Hebeloma maritimus Fr. — N. K. A. 2, I, 165 et 441; 3, I, 233; Arch. Néerl. VIII, 347.

17. **Inocybe obscura** (P.) Fr. Ep. 231. — Oud. Rév. I, 234. — Sacc. Syll. V, 770. — Ag. Inoc. obscurus Fr. — N. K. A. 2. V. 150. Wint.; Kr. Fl. I, 692.

18. **Inocybe plumosa** (Bolt.) Fr. Ep. 228. — Oud. Rév. I, 232; N. K. A. 2, VI, 13. — Sacc. Syll. V, 763. — Ag. Inoc. plumosus Fr. — Wint. Kr. Fl. 694.

19. **Inocybe rimosa** (Bull.) Fr. Ep. 232. — Oud. Rév. I. 235. — Sacc. Syll. V, 775. — Ag. Inoc. rimosus Fr. — N. K. A. 2, V, 350; Arch. Néerl. XIV, 214. — Wint. Kr. Fl. I, 691. — Ag. Hebel. rim. T. N. G. XI, 382; Prodr. Fl. 3, II, p. 395; N. K. A. 2, I, 441.

20. **Inocybe scabella** Fr. Ep. 235. — Oud. Rév. I, 236. — Sacc. Syll. V, 787. — Ag. Inoc. scabellus Fr. — Arch. Néerl. II, 26; XIV, 242. — Wint. Kr. Fl. I, 688.

21. **Inocybe strigiceps** Fr. Ep. 256. — Oud. Rév. I, 236. — Sacc. Syll. V, 791. — Ag. Inoc. strigiceps Fr. Arch. Néerl. XIV, 242. — Wint. Kr. Fl. I, 687. — Ag. Flammula strigiceps Arch. Néerl. II, 27.

FLAMMULA.

1. **Flammula gummosa** (Lasch.) Fr. Ep. 247. — N. K. A. 3, II, 657. — Sacc. Syll. V, 817. — Ag. Fl. gummosus Fr. — Arch. Néerl. II, 27; XIV, 243. — Wint. Kr. Fl. I, 682.

2. **Flammula helomorpha** Fr. Ep. 252. — Oud. Rév. I, 243. — Sacc. Syll. V, 828. — Ag. Fl. helomorphus Fr. — Arch. Néerl. II, 27; XIV, 244. — Wint. Kr. Fl. I, 678.

3. **Flammula inaurata** (Smith) Ond. N. K. A. 3, I, 454. — Sacc. Syll. V, 820.

4. **Flammula lenta** (P.) Fr. Ep. 246. — Ond. Rév. I, 243. — Sacc. Syll. V, 815. — Ag. Fl. lentus Fr. — N. K. A. 2, I, 312; 2, I, 441, et 2, V, 350; Arch. Néerl. VIII, 347 et XIV, 243. — Wint. Kr. Fl. I, 682.

***Flammula mucosa** Ond. Rév. I, 243. — Voir: *Fl. spumosa.*

5. **Flammula penetrans** Fr. Ep. 251. — Ond. Rév. I, 243. — Sacc. Syll. V, 823. — Ag. Fl. penetrans Fr. — N. K. A. 2, V, 350; Arch. Néerl. II, 27; XIV, 244; N. K. A. II, 190. — Wint. Kr. Fl. I, 680.

6. **Flammula sapinea** Fr. Ep. 251. — Ond. N. K. A. 3, I, 452 et Rév. II, p. (8). — Sacc. Syll. V, 824. — Ond. Hedw. 1898, p. 186. — Ag. Fl. sapineus Fr. — Wint. Kr. Fl. I, 679.

7. **Flammula spumosa** Fr. Ep. 247. — Ond. N. K. A. 3, II, 190. — Sacc. Syll. V, 817. — Ag. Fl. spumosus Fr. — Wint. Kr. Fl. I, 682.

NAUCORIA.

1. **Naucoria abstrusa** Fr. Ep. 257. — Ond. Rév. I, 245. — Sacc. Syll. V, 836. — Ag. Nauc. abstrusus Fr. — N. K. A. 2, V, 152 et 350.

2. **Naucoria escharoides** Fr. Ep. 264. — Ond. Rév. I, 246. — Sacc. Syll. V, 865. — Ag. Nauc. eschar. Fr. — N. K. A. 2, V, 165. — Ag. Nauc. eschar. Fr. — Wint. Kr. Fl. I, 670.

***Naucoria furfuracea** (P.) Fr. — Ag. N. furf. T. N. G. XII, 264; Prodr. Fl. Bat. II, 3, 336. — Voir: *Tubaria.*

3. **Naucoria melinoides** (Bull.) Fr. Ep. 257. — Ond. Rév. I, 245. — Sacc. Syll. V, 836. — Ag. Nauc. melin. Fr. — Arch. Néerl. II, 27; XIV, 244. — Wint. Kr. Fl. I, 675.

4. **Naucoria nucea** (Bolton) Fr. Ep. 258. — Ond. Rév. I, 246. — Sacc. Syll. V, 839. — Ag. Nauc. nuceus Fr. — N. K. A. 2, II, 176; Arch. Néerl. XIV, 244.

5. **Naucoria pediades** Fr. Ep. 260. — Ond. Rév. 246. — Sacc. Syll. V, 844. — Ag. Nauc. pediades Fr. — N. K. A. 2, V, 350; Arch. Néerl. II, 37; XIV, 244; Ond. Fgi Néerl. exs. n° 207. — Wint. Kr. Fl. I, 673.

6. **Naucoria scorpioides** Fr. Ep. 262. — Ond. Rév. I, 246. — Sacc. Syll. V, 848. — Ag. Nauc. scorp. Fr. — N. K. A. I, V, 293; Arch. Néerl. XIV, 245.

7. **Naucoria segestria** Fr. Ep. 265. — Ond. Rév. I, 246. —

Sacc. Syll. V, 857. — Ag. Nauc. segestrius Fr. — N. K. A. 2, II, 98; Arch. Néerl. XIV, 245. — Wint. Kr. Fl. I, 670.

8. **Naucoria semiorbicularis** (Bull.) Fr. Ep. 260. — Oud Rév. I, 246. — Sacc. Syll. V, 844. — Ag. Nauc. semiorb. Fr. — T. N. G. XII, 264; Prod. Fl. Bat. II, 3, p. 337; N. K. A. 2, V, 351; Arch. Néerl. XIV, 245. — Wint. Kr. Fl. I, 673.

9. **Naucoria sideroides** (Bull.) Fr. Ep. 258. — Oud. Rév. I, 246. — Sacc. Syll. V, 840. — Ag. Nauc. sider. Fr. — N. K. A. 2, III, 241; Arch. Néerl. XIV, 244. — Wint. Kr. Fl. I, 674.

GALERA.

1. **Galera Bryorum** (P.) Fr. Ep. 385. — Oud. Rév. I, 249. — Sacc. Syll. V, 868. — Ag. Gal. Br. Fr. — Prod. Fl. Bat. II, 3, p. 337; Arch. Néerl. XIV, 246. — Wint. Kr. Fl. I, 666.

2. **Galera Hypnorum** (Batsch) Fr. Ep. 270. — Oud. Rév. I, 249. — Sacc. Syll. V, 868. — Ag. Gal. Hypn. Fr. — T. N. G. XI, 382; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 337; N. K. A. 2, V, 351; Arch. Néerl. XIV, 246. — Wint. Kr. Fl. I, 665.

3. **Galera muiophila** (Lasch) Fr. Ep. 270. — Oud. Rév. I, 249. — Sacc. Syll. V, 869. — T. N. G. X, 382; Prodr. Fl Bat. II, 3, p. 337; N. K. A. 2, V, 351; Arch. Néerl. XIV, 246. — Wint. Kr. Fl. I, 665.

4. **Galera siligenea** Fr. Ep. 267. — Oud. Rév. I, 249. — Sacc. Syll. V, 862. — Ag. Gal. siligeneus Fr. — Arch. Néerl. II, 28; XIV, 245. — Wint. Kr. Fl. I, 668.

5. **Galera Sphagnorum** (P.) Fr. Ep. 271. — Oud. Rév. I, 249. — Sacc. Syll. V, 869. — Ag. Gal. Sphagn. Fr. — Arch. Néerl. XIV, 246. — Sacc. Syll. I, 666.

6. **Galera tenera** (Schaeff.) Fr. Ep. 267. — Oud. Rév. I, 249. — Sacc. Syll. V, 860. — Ag. Gal. tener. Fr. — T. N. G. XII, 264; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 337; N. K. A. 2, V, 351; Arch. Néerl. XIV, 245. — Wint. Kr. Fl. I, 668.

TUBARIA.

1. **Tubaria furfuracea** (P.) Fr. Ep. 272. — Oud. Rév. I, 250. — Sacc. Syll. V, 872. — Ag. Tub. furfuraceus Fr. — N. K. A. 2, V, 351; Arch. Néerl. XIV, 246; Wint. Kr. Fl. I, 663; Ag. Naucoria furf. T. N. G. XII, 264; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 336.

2. **Tubaria heterosticha** Fr. Ep. 273. — Oud. Rév. I, 250. — Sacc. Syll. V, 873. — Ag. Tub. heterosticha. — N. K. A. 2, V, 152.

3. **Tubaria muscorum** Fr. Ep. 274. — Oud. Rév. I, 251. — Sacc. Syll. V, 874. — Ag. Tub. musc. Fr. — N. K. A. 2, V, 152.

4. **Tubaria pellucida** (Bull.) Fr. Ep. 273. — Oud. Rév. I, 251. — Sacc. Syll. V, 873. — Ag. Tub. pellucidus Fr. — Arch. Néerl. XIV, 246. — Wint. Kr. Fl. I, 662. — Ag. Galera pellucidus Bull. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 337.

CREPIDOTUS.

1. **Crepidotus alveolus** (Lasch) Fr. Ep. 275. — Sacc. Syll. V, 877. — Oud. N. K. A. 3, II, 658. — Ag. Crep. alv. Fr. — Wint. Kr. Fl. I, 661.

***Crepidotus depluens** (Batsch) Fr. — N. K. A. 2, I, 111; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 338. — Voir: *Claudopus*.

2. **Crepidotus haustellaris** Fr. Ep. 276. — Oud. Rév. I, 251. — Sacc. Syll. V, 881. — Ag. Crep. haust. Fr. — T. N. G. XII, 264; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 338; Arch. Néerl. XIV, 247. — Wint. Kr. Fl. I, 661.

3. **Crepidotus mollis** (Schaeff.) Fr. Ep. 275. — Oud Rév. I, 251. — Sacc. Syll. V, 877. — Ag. Crep. mollis Fr. — N. K. A. 2, V, 351; Arch. Néerl. II, 28; XIV, 246. — Fl. Bat. tab. 1335. — Wint. Kr. Fl. I, 661.

***Crepidotus variabilis** (P.) Fr. — N. K. A. 2, I, 111; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 338. — Voir: *Claudopus*.

BOLBITIUS.

1. **Bolbitius Boltonii** (P.) Fr. Ep. 333. — Oud. Rév. I, 281. — Sacc. Syll. V, 1074. — N. K. A. 2, V, 154. — Wint. Kr. Fl. I, 622.

2. **Bolbitius hydrophilus** (Bull.) Fr. Ep. 333. — Oud. Rév. I, 280; N. K. A. 2, V, 354; Arch. Néerl. XIV, 258. — Wint. Kr. Fl. I, 622; Ag. hydrophilus Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 342; Fl. Bat. tab. 1225. — Hypholoma hydrophilum (Bull.) Sacc. Syll. V, 1011.

3. **Bolbitius tener** Berk. — Fr. Ep. 335. — Oud. Rév. I, 281. — Arch. Néerl. II, 29; XIV, 258. — Sacc. Syll. V, 1076.

4. **Bolbitius vitellinus** Fr. Ep. 333. — Oud. Rév. I, 181. — T. N. G. XII, 265; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 350; Arch. Néerl. XIV, 258; N. K. A. 2, V, 351. — Sacc. Syll. V, 1074. — Wint. Kr. Fl. I, 622.

CORTINARIUS.

1. **Cortinarius albo-violaceus** (P.) Fr. Ep. 361. — Oud. Rév. I, 272; T. N. G. XI, 383; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 352; N. K. A. 2, V, 355; Arch. Néerl. XIV, 260; Fl. Bat. tab. 1589. — Sacc. Syll. V, 925. — Wint. Kr. Fl. I, 601.

2. **Cortinarius arenatus** (P.) Fr. Ep. 365. — Oud. N. K. A. 3, II, 658. — Sacc. Syll. V, 934. — Wint. Kr. Fl. I, 598.

3. **Cortinarius argentatus** (P.) Fr. Ep. 360. — Oud. Rév. I, 272; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 351; Arch. Néerl. XIV, 260. — Sacc. Syll. V, 924. — Wint. Kr. Fl. I, 602.

4. **Cortinarius armeniacus** (Schaeff.) Fr. Ep. 387. — Oud. Rév. I, 278; T. N. G. XI, 383; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 353; N. K. A. 2, V, 355; Arch. Néerl. XIV, 263. — Sacc. Syll. V, 965. — Wint. Kr. Fl. I, 583.

5. **Cortinarius armillatus** Fr. Ep. 378. — Oud. Rév. I, 276; N. K. A. 2, VI, 15; Fl. Bat. tab. 1510. — Sacc. Syll. V, 952. — Wint. Kr. Fl. I, 589.

6. **Cortinarius azureus** Fr. Ep. 368. — Oud. Rév. I, 274; T. N. G. XI, 383; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 352; N. K. A. 2, I, 443; Arch. Néerl. XIV, 261. — Sacc. Syll. V, 938. — Wint. Kr. Fl. I, 596.

7. **Cortinarius bivelus** Fr. Ep. 375. — Oud. Rév. I, 275; N. K. A. 2, I, 443; Arch. Néerl. XIV, 262. — Sacc. Syll. V, 948. — Wint. Kr. Fl. I, 591.

8. **Cortinarius bolaris** (P.) Fr. Ep. 364. — Oud. Rév. I, 273; N. K. A. 2, IV, 217; 3, I, 233. — Sacc. Syll. V, 931. — Wint. Kr. Fl. I, 599.

9. **Cortinarius brunneo-fulvus** Fr. Ep. 381. — Oud. Rév. I, 277; Arch. Néerl. XIV, 262. — Sacc. Syll. V, 957. — Wint. Kr. Fl. I, 587.

10. **Cortinarius bulbosus** (Sowerby) Fr. Ep. 375. — Oud. Rév. I, 275; N. K. A. 2, VI, 15. — Sacc. Syll. V, 948. — Wint. Kr. Fl. I, 591.

11. **Cortinarius Bulliardi** (P.) Fr. Ep. 363. — Oud Rév. I, 273. — Sacc. Syll. V, 930. — Wint. Kr. Fl. I, 599.

12. **Cortinarius callisteus** Fr. Ep. 363. — Oud Rév. I, 273; N. K. A. 2, V, 151 et 355. — Sacc. Syll. V, 930. — Wint. Kr. Fl. I, 600.

13. **Cortinarius camphoratus** Fr. Ep. 362. — Oud. Rév. I, 273; N. K. A. 2, V, 585 et VI, 11. — Sacc. Syll. V, 926. — Wint. Kr. Fl. I, 600.

14. **Cortinarius camurus** Fr. Ep. 367. — Oud. Rév. I, 271; N. K. A. 2, VI, 15. — Sacc. Syll. V, 936.

15. **Cortinarius caninus** Fr. Ep. 368. — Oud. Rév. I, 274; N. K. A. 2, III, 244; Arch. Néerl. XIV, 261. — Sacc. Syll. V, 937. — Wint. Kr. Fl. I, 596.

16. **Cortinarius castaneus** (Bull.) Fr. Ep. 391. — Oud. Rév. I, 278; N. K. A. 3, I, 233; Arch. Néerl. II, 29; XIV, 263. — Sacc. Syll. V, 971. — Wint. Kr. Fl. I, 581.

17. **Cortinarius cinereo-violaceus** Fr. Ep. 361. — Oud. Rév. I, 272; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 351; N. K. A. 2, V, 355; Arch. Néerl. XIV, 260; Fl. Bat. tab. 844. — Wint. Kr. Fl. I, 601.

18. **Cortinarius cinnabarinus** Fr. Ep. 370. — Oud. Rév. I, 274; Arch. Néerl. II, 29; XIV, 261. — Sacc. Syll. V, 940. — Wint. Kr. Fl. I, 595.

19. **Cortinarius cinnamomeus** (L.) Fr. Ep. 370. — Oud. Rév. I, 274; T. N. G. XI, 383; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 352; N. K. A. 1, V, 291; 2, I, 143; 2, V, 355; Arch. Néerl. XIV, 261; Fl. Bat. tab. 1160. — Sacc. Syll. V, 941. — Wint. Kr. Fl. I, 594.

β. **semisanguineus** Fr. S. M. I, 229 et Ep. 370 — Oud. N. K. A. 1, V, 291. — Sacc. Syll. V, 942.

20. **Cortinarius claricolor** Fr. Ep. 336. — Oud. Rév. II, p. 9; N. K. A. 3, I, 454. — Sacc. Syll. V, 890. — Wint. Kr. Fl. I, 620.

21. **Cortinarius collinitus** (P.) Fr. Ep. 351. — Oud. Rév. I, 271; T. N. G. XII, 265; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 351; N. K. A. 1, XV, 291; 2, I, 143; 2, V, 355; Arch. Néerl. VIII, 347 et XIV, 260. — Sacc. Syll. V, 916. — Wint. Kr. Fl. I, 605.

22. **Cortinarius colus** Fr. Ep. 391. — Oud. Rév. I, 279; N. K. A. 2, VI, 19. — Sacc. Syll. V, 972.

23. **Cortinarius croceoconus** Fr. Ep. 371. — Oud. Rév. I, 275; N. K. A. 2, IV, 217. — Sacc. Syll. V, 942. — Wint. Kr. Fl. I, 594.

24. **Cortinarius croceo-fulvus** (D. C.) Fr. Ep. 379. — Oud. N. K. A. 3, I, 455. — Sacc. Syll. V, 953.

25. **Cortinarius croceus** Fr. Ep. 371. — Oud. Rév. I, 275; Arch. Néerl. II, 29; XIV, 261; Fgi Neerl. exs. n° 211. — Sacc. Syll. V, 942. — Cort. cinnamomeus var. crocens Fr. — Wint. Kr. Fl. I, 594.

26. **Cortinarius cyanites** Fr. Ep. 360. — Oud. Rév. I, 272; N. K. A. 2, IV, 217; Fl. Bat. tab. 1315. — Sacc. Syll. V, 925. — Wint. Kr. Fl. I, 602.

27. **Cortinarius dilutus** (P.) Fr. Ep. 389. — Oud. Rév. I, 278;

T. N. G. XII, 265; Prodr. Fl. Bat. II, 3, 353; N. K. A 2, V, 355; Arch. Néerl. XIV, 263. — Sacc. Syll. V, 967. — Wint. Kr. Fl. 582.

28. **Cortinarius duracinus** Fr. Ep. 388. — Oud. Rév. I, 278; N. K. A. 2, VI, 18. — Sacc. Syll. V, 966. — Wint. Kr. Fl. I, 582.

29. **Cortinarius elatior**. Fr. Ep. 355. — Oud. Rév. I, 272; N. K. A. 2, IV, 510; Fl. Bat. tab. 1680. — Sacc. Syll. V, 917. — Wint. Kr. Fl. I, 605.

30. **Cortinarius emollitus** Fr. Ep. 350. — Oud. Rév. I, 271, N. K. A. 2, V, 154 et 354. — Sacc. Syll. V, 910.

31. **Cortinarius crugatus** Fr. Ep. 389. — Oud. N. K. A. 3. II, 658. — Sacc. Syll. V, 967. — Wint. Kr. Fl. I, 582.

32. **Cortinarius evernius** Fr. Ep. 377. — Oud. Rév. I, 276; N. K. A. 2, I, 113; Arch. Néerl. XIV, 262. — Sacc. Syll. V, 851. — Wint. Kr. Fl. 590.

33. **Cortinarius fasciatus** Fr. Ep. 399. — Oud. Rév. I, 279; N. K. A. 2, VI, 20; 3, I, 233. — Sacc. Syll. V, 982. — Wint. Kr. Fl. I, 576.

34. **Cortinarius firmus** Fr. Ep. 386. — Oud. N. K. A. 3, II, 191. — Sacc. Syll. V, 964. — Wint. Kr. Fl. I, 584.

35. **Cortinarius flabellus** Fr. Ep. 384. — Oud. N. K. A. 3, II, 658. — Sacc. Syll. V, 961. — Wint. Kr. Fl. I, 586.

36. **Cortinarius flexipes** (P.) Fr. Ep. 384. — Oud. Rév. I, 277. — Sacc. Syll. V, 961. — Wint. Kr. Fl. I, 586.

37. **Cortinarius fucatophyllus** (Lasch) Fr. Ep. 372. — Oud. Rév. I, 275; N. K. A. 2, IV, 217. — Sacc. Syll. V, 913. Wint. Kr. Fl. I, 593.

38. **Cortinarius glandicolor** Fr. Ep. 382. — Oud. Rév. I, 277; Arch. Néerl. XIV, 262. — Sacc. Syll. V, 957. — Cort. gentilis Fr. b. glandicolor Rab. — N. K. A. 2, I, 443.

39. **Cortinarius haematochelis** Fr. Ep. 378. — Oud. Rév. I, 276. — Sacc. Syll. V, 953.

40. **Cortinarius hemitrichus** (P.) Fr. Ep. 385. — Oud. Rév. I, 277. — N. K. A. 2. VI, 18. — Sacc. Syll. V, 963. — Wint. Kr. Fl. I, 584.

41. **Cortinarius hinnuleus** (Sow.) Fr. Ep. 380. — Oud. Rév. I, 276; N. K. A. 2, VI, 16. — Sacc. Syll. V. 955. — Wint. Kr. Fl. I, 588.

42. **Cortinarius illuminus** Fr. Ep. 388. — Oud. N. K. A. 3, II, 659. — Sacc. Syll. V, 967.

43. **Cortinarius incisus** (P.) Fr. Ep. 384. — Oud. Rév. I, 277;

Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 352; N. K. A. 2. V, 355; Arch. Néerl. XIV, 263. — Sacc. Syll. V. 961. — Wint. Kr. Fl. I, 585.

14. **Cortinarius jubarinus** Fr. Ep. 393. — Oud. N. K. A. 3, II, 191. — Sacc. Syll. V, 975. — Wint. Kr. Fl. 580.

15. **Cortinarius largus** (Buxbaum) Fr. Ep. 339. — Oud. Rév. I, 271; N. K. A. I, V, 294; 3, I, 233; Arch. Néerl. XIV, 258. — Sacc. Syll. V, 893. — Wint. Kr. Fl. I, 618.

16. **Cortinarius leucopus** (Bull.) Fr. Ep. 395. — Oud. Rév. I, 279; N. K. A. 2, VI, 19. — Sacc. Syll. V, 978. — Wint. Kr. Fl. I, 578.

17. **Cortinarius mucidus** Fr. Ep. 355. — Oud. Rév. I, 271; N. K. A. 2, V, p. 154; 3, I, 233. — Sacc. Syll. V, 917. — Wint. Kr. Fl. I, 605.

18. **Cortinarius nemorensis** Fr. Ep. 339. — Oud. N. K. A. 2, VI, 283. — Sacc. Syll. V, 893.

19. **Cortinarius ochrolemeus** (Schaeff.) Fr. Ep. 366. — Oud. Rév. I, 274; N. K. A. 2, VI, 14. — Sacc. Syll. V, 935. — Wint. Kr. Fl. I, 597.

20. **Cortinarius opimus** Fr. Ep. 359. — Oud. Rév. I, 272; N. K. A. 2, III, 244; Arch. Néerl. XIV, 260. — Sacc. Syll. V, 923. — Wint. Kr. Fl. I, 602.

21. **Cortinarius perisceles** Fr. Ep. 383. — Oud. Rév. I, 277. — Sacc. Syll. V, 960.

22. **Cortinarius pholideus** Fr. Ep. 361. — Oud. Rév. I, 273; N. K. A. 2, VI, 11; Fl. Bat. tab. 1149. — Sacc. Syll. V, 933. — Wint. Kr. Fl. I, 599.

23. **Cortinarius purpurascens** Fr. Ep. 265. — Oud. Rév. I, 271; N. K. A. 2, V, 154. — Sacc. Syll. V, 902. — Wint. Kr. Fl. I, 613.

24. **Cortinarius rapaceus** Fr. Ep. 343. — Oud. N. K. A. 2, VI, 284. — Sacc. Syll. V, 898.

25. **Cortinarius raphanoides** (P.) Fr. Ep. 373. — Oud. Rév. I, 275; N. K. A. 2, I, 443; 2, V, 355; Arch. Néerl. XIV, 261. — Sacc. Syll. V, 945. — Wint. Kr. Fl. I, 592.

26. **Cortinarius rigens** (P.) Fr. Ep. 395. — Oud. Rév. I, 279; N. K. A. I, V, 294; Arch. Néerl. XIV, 263. — Sacc. Syll. V, 977. — Wint. Kr. Fl. I, 579.

27. **Cortinarius rigidus** (Scop.) Fr. Ep. 386. — Oud. Rév. I, 277; N. K. A. 2, VI, 18. — Sacc. Syll. V, 963. — Wint. Kr. Fl. I, 504.

Cortinarius rubellus Cooke. — Oud. N. K. A. 2, VI, 17. — Voir: *C. armillatus*.

58. **Cortinarius scandens** Fr. Ep. 396. — Oud. Rév. I, 279; N. K. A. 2, V, 19. — Sacc. Syll. V, 978.

59. **Cortinarius subferrugineus** (Batsch) Fr. Ep. 387. — Oud. Rév. I, 278; T. N. G. XII, 265; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 353; N. K. A. 2, I, 443; 2, V, 355; Arch. Néerl. XIV, 263. — Sacc. Syll. V, 965. — Wint. Kr. Fl. I, 583.

60. **Cortinarius subpurpurascens** Fr. Ep. 346. — Oud. Rév. I, 271. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 351; N. K. A. 2, I, 443; Arch. Néerl. XIV, 259. — Sacc. Syll. V, 903. — Wint. Kr. Fl. I, 613.

61. **Cortinarius tophaceus** Fr. Ep. 363. — Oud. Rév. I, 273; Arch. Néerl. XIV, 261. — Sacc. Syll. V, 929.

62. **Cortinarius tortuosus** Fr. Ep. 389. — Oud. Rév. I, 278; N. K. A. 2, V, 467. — Sacc. Syll. V, 967. — Wint. Kr. Fl. I, 582.

63. **Cortinarius torvus** Fr. Ep. 375. — Oud. Rév. I, 276; N. K. A. 2, V, 155 et 255; Fl. Bat. tab. 1615. — Sacc. Syll. V, 950. — Wint. Kr. Fl. I, 590.

64. **Cortinarius uraceus** Fr. Ep. 393. — Oud. Rév. I, 279; N. K. A. 2, VI, 19. — Sacc. Syll. V, 974. — Wint. Kr. Fl. I, 580.

65. **Cortinarius urbicus** Fr. Ep. 375. — Oud. Rév. I, 275; N. K. A. 2, VI, 16. — Sacc. Syll. V, 949.

66. **Cortinarius vibratilis** Fr. Ep. 358. — Oud. Rév. I, 272; N. K. A. I, V, 333. — Sacc. Syll. V, 922. — Wint. Kr. Fl. I, 603.

***Cortinarius violacco-cinereus** (P.) Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 351; N. K. A. I, V, 294. — Voir: *C. cinereo-violaceus.*

×× PAXILLEAE.

PAXILLUS.

1. **Paxillus atrotomentosus** (Batsch.) Fr. Ep. 403. — Oud. Rév. I, 253; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 354; N. K. A. 2, I, 443; 2, V, 356; Arch. Néerl. XIV, 265; Fl. Bat. tab. 1499. — Oud. Fgi Neerl. exs. n° 107. — Sacc. Syll. V, 988. — Wint. Kr. Fl. I, 572.

2. **Paxillus giganteus** (Sow.) Fr. Ep. 401. — Oud. Rév. I, 253; N. K. A. 2, VI, 21; Fl. Bat. tab. 1454. — Sacc. Syll. V, 983. — Wint. Kr. Fl. I, 574.

3. **Paxillus grisco-tomentosus** (Secret.) Fr. Ep. 404. — Oud. Rév. I, 254; N. K. A. 2, IV, 217. — Sacc. Syll. V, 988. — Wint. Kr. Fl. I, 572.

4. **Paxillus involutus** (Batsch.) Fr. Ep. 403. — Oud. Rév. I, 253; T. N. G. XI, 383; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 353; N. K. A. 2, I, 143; 2, V, 353 et 585; Arch. Néerl. XIV, 264. — Fl. Bat. tab. 453 et 754. — Sacc. Syll. V, 987. — Wint. Kr. Fl. I, 573.

5. **Paxillus panuoides** Fr. Ep. 404. — Oud. Rév. I, 254; Arch. Néerl. II, 30; XIV, 265; Fl. Bat. tab. 1340; Oud. Fgi Néerl. exs. n° 212. — Sacc. Syll. V, 989. — Wint. Kr. Fl. I, 571.

6. **Paxillus sordarius** (P.) Fr. Ep. 401. — Oud. Rév. I, 253; N. K. A. I, V, 294; Arch. Néerl. XIV, 264. — Sacc. Syll. V, 984. — Wint. Kr. Fl. I, 574.

3. Melanosporae.

AGARICUS.

1. **Agaricus arvensis** Schaeff. — Oud. Rév. I, 285. — Sacc. Syll. V, 994. — Ag. Psalliota arv. Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 339; N. K. A. 2, V, 351; Fl. Bat. tab. 735. — Wint. Kr. Fl. I, 659.

2. **Agaricus campestris L.** — Ag. campester Sacc. Syll. V, 997. — Oud. Rév. I, 285. — Ag. Psall. campestris Fr. — T. N. G. XI, 382; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 338; N. K. A. 2, I, 141; 2, V, 35 et 584; Arch. Néerl. XIV, 247; Fl. Bat. tab. 735. — Wint. Kr. Fl. I, 658.

2". **Agaricus candicans** Ag. camp. d. candicans v. d. Bosch. Prodr. Fl. Bat. 3, II, p. 339. — Oud. Rév. I, 286.

3. **Agaricus cretaceus** (Fr.) Sacc. Syll. V, 995. — Ag. Psall. cretaceus Fr. Ep. 279. — Fl. Bat. tab. 1675. — Wint. Kr. Fl. I, 659.

***Agaricus Leveillanus** — Ag. Psall. Leveillanus Dozij et Molk. T. N. G. XII, 277. — Voir: *Pholiota erebia.*

4. **Agaricus pratensis** Schaeff. — Oud. Rév. I, 285. — Sacc. Syll. V, 997. — Ag. Psall. prat. (Schaeff.) Fr. Ep. 279; N. K. A. 2, V, 152. — Wint. Kr. Fl. I, 659.

5. **Agaricus praticola** Vitt. Descr. dei funghi mangarecci tab. 7. — Ag. Psall. campestris Fr. a. praticola Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 339; N. K. A. 2, I, 142; 2, V, 351 et 584. — Wint. Kr. Fl. I, 658. — Sacc. Syll. V, 998.

6. **Agaricus rusiophyllus** Lasch. — Oud. Rév. I, 286. — Sacc. Syll. V, 1007. — Ag. Psall. rusiophyllus Fr. Ep. 282. — Wint. Kr. Fl. I, 657. — Ag. Hypholoma rusiophyllus N. K. A. 2. IV, 509.

7. **Agaricus silvaticus** Schaeff. — Oud. Rév. I, 286. — Sacc. Syll. V, 1000. — Ag. Psall. silv. Fr. Ep. 281. — Arch. Néerl. II, 28; XIV, 247. — Wint. Kr. Fl. I, 658.

8. **Agaricus silvicola** Vitt. Eghi mang. tab. 8. — Sacc. Syll. V, 998. — Ag. Psall. camp. d. silvicola (Vitt.) Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 339; T. N. G. XI, 382; N. K. A. 2, I, 442; 2, V, 351; Fl. Bat. tab. 1640. — Wint. Kr. Fl. I, 658.

9. **Agaricus subgibbosus** Fr. — Oud. N. K. A. I, I, 49; 3, II, 191. — Sacc. Syll. V, 1006.

10. **Agaricus vaporarius** Krombh. Schw. tab. 26 f. 14 et 15. — Ag. camp. vaporarius (Krombh.) Prodr. Fl. Bat. 3, II, p. 339. — Sacc. Syll. V, 998. — Wint. Kr. Fl. I, 658.

11. **Agaricus villaticus** Brondeau Cryptogames de l'Agenais; Agen, 1828—30, tab. 7. — Sacc. Syll. V, 999. — Ag. camp. var. villatica Fr. Ep. 280. — Oud. Rév. I, 285.

STROPHARIA.

1. **Stropharia aeruginosa** (Curtis) Fr. Ep. 281. — Oud. Rév. I, 288. — Ag. Stroph. aeruginosus Fr. — T. N. G. XII, 264; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 339; N. K. A. I, V, 293; 2, I, 442; 2, V, 351; Arch. Néerl. XIV, 247; Fl. Bat. tab. 815. — Sacc. Syll. V, 1013. — Wint. Kr. Fl. I, 656.

2. **Stropharia albo-cyanea** (Desm.) Fr. Ep. 284. — Oud. N. K. A. 3, II, 191. — Sacc. Syll. V, 1013. — Ag. Stroph. albo-cyaneus Fr. — Fl. Bat. tab. 1644. — Wint. Kr. Fl. I, 656.

3. **Stropharia inuncta** Fr. Ep. 284. — Oud. Rév. I, 289. — Sacc. Syll. V, 1014. — Ag. Stroph. inunctus Fr. — N. K. A. 2, V, 165. — Wint. Kr. Fl. I, 655.

***Stropharia Leveilliana.** — Ag. Stroph. Leveillianus Dozij et Molk. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 340. — Voir: *Pholiota erebia.*

4. **Stropharia melanosperma** (Bull.) Oud. — Ag. Stroph. melanospermus Wint. Kr. Fl. I, 655. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 340. — Stropharia melasperma Oud. Rév. I, 289. — Ag. Stroph. melasperma Fr. Ep. 285. — Arch. Néerl. XIV, 248. — Oud. Fgi Néerl. exs. n° 208.

5. **Stropharia merdaria** Fr. Ep. 286. — Oud. Rév. I, 290. — Sacc. Syll. V, 1020. — Ag. Stroph. merdarius Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 340; N. K. A. 2, V, 152; Arch. Néerl. XIV, 248. — Wint. Kr. Fl. I, 654.

6. **Stropharia semiglobata** (Batsch) Fr. Ep. 287. — Oud. Rév. I, 290. — Sacc. Syll. V, 1022. — Ag. Stroph. semiglobatus Fr.

Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 340; N. K. A. 2, I, 442; 2, V, 351; Arch. Néerl. XIV, 248. — Wint. Kr. Fl. I, 653.

7. **Stropharia squamosa** (P.) Fr. Ep. 285. — Oud. Rév. I, 289; N. K. A. 2, VI, 14. — Sacc. Syll. V, 1015. — Ag. Stroph. squamosus Fr. — Arch. Néerl. XIV, 248; Fl. Bat. tab. 815. — Wint. Kr. Fl. I, 655. — Ag. Stroph. squarrosus (errore!) Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 340.

8. **Stropharia stercoraria** Fr. Ep. 287. — Oud. Rév. I, 290. — Sacc. Syll. V, 1021. — Ag. Stroph. stercorarius Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 340; N. K. A. I, V, 351; Arch. Néerl. XIV, 248. — Wint. Kr. Fl. I, 654.

HYPHOLOMA.

1. **Hypholoma appendiculatum** (Bull.) Fr. Ep. 296. — Oud. Rév. I, 298. — Ag. Hyph. appendiculatus Fr. — N. K. A. 2, V, 352; Arch. Néerl. II, 28 et XIV, 250. — Wint. Kr. Fl. I. 649.

2. **Hypholoma Candolleanum** Fr. Ep. 295. — Oud. Rév. I, 298. — Sacc. Syll. V, 1038. — Ag. Hyph. Candolleanus Fr. — T. N. G. XII. 264. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 342; N. K. A. 2, V, 352; Arch. Néerl. XIV, 250. — Wint. Kr. Fl. I, 649.

3. **Hypholoma capnoides** Fr. Ep. 291. — Oud. in Herb. et N. K. A. 3, III, 1084. — Sacc. Syll. V, 1028. — Wint. Kr. Fl. I, 652.

4. **Hypholoma coronatum** Fr. Ep. 295. — Oud. Rév. I, 297. — Sacc. Syll. V. 1038. — Ag. Hyph. coronatus Fr. — N. K. A. 2, III, 242; Arch. Néerl. XIV, 249.

5. **Hypholoma dispersum** Fr. Ep. 292. — Oud. Rév. I, 295. — Sacc. Syll. V, 1031. — Ag. Hyp. dispersus Fr. — N. K. A. 3, IV, 215. — Wint. Kr. Fl. I, 651.

6. **Hypholoma elacodes** (Paulet) Fr. Ep. 291. — Oud. Rév. I, 295. — Sacc. Syll. V, 1029. — Ag. Hyph. elacodes Fr.— T. N. G. XII, 264; Prodr. Fl. Bat. 3, II, p. 341; N. K. A. 2, V, 352; Arch. Néerl. XIV, 249. — Wint. Kr. Fl. I, 651.

7. **Hypholoma epixanthum** (Paulet) Fr. Ep. 291. — Oud. Rév. I, 295; N. K. A. 2, VI, 14. — Sacc. Syll. V, 1029. — Ag. Hypholoma epixantinus Fr. — Wint. Kr. Fl. I, 651.

8. **Hypholoma fasciculare** (Hudson) Fr. Ep. 291. — Oud. Rév. I, 295. — Sacc. Syll. V. 1029. — Ag. Hyph. fascicularis Fr. — T. N. G. XI. 382; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 341; N. K. A. 2, I, 442; 2, V, 352; Arch. Néerl. XIV, 249; Fl. Bat. tab. 824. — Wint. Kr. Fl. I, 651.

***Hypholoma hydrophilum** (Bull.) Fr. — Ag. Hyph. hydrophilus Fr. — Voir: *Bolbitius*.

9. **Hypholoma intonsum** (Pass.) Fr. Ep. 294. — Oud. Rév. I, 296. — Sacc. Syll. V, 1036. — Ag. Hyph. intonsus Fr. — N. K. A. 2, III, 242; Arch. Néerl. XIV, 249. — Wint. Kr. Fl. I, 649.

10. **Hypholoma lacrymabundum** Fr. Ep. 293. — Oud. Rév. I, 296. — Sacc. Syll. V, 1033. — Ag. Hyph. lacrymabundus Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 342; N. K. A. 2, I, 442; 2, V, 352; Arch. Néerl. XIV, 249. — Wint. Kr. Fl. I, 650.

11. **Hypholoma leucotephrum** (B. Br.) Fr. Ep. 296. — Oud. Rév. I, 298. — Sacc. Syll. V, 1040. — N. K. A. 2, V, 510.

***Hypholoma rusiophyllum** (P.) Fr. Ep. 290. — N. K. A. 2, IV, 509. — Voir: *Agaricus*.

12. **Hypholoma silaceum** (P.) Fr. Ep. 290. — Oud. Rév. II, p. (9); id. Hedw. 1898, p. 186; id. N. K. A. 3, I, 455. — Sacc. Syll. V, 1027. — Wint. Kr. Fl. I, 652.

13. **Hypholoma Storea** Fr. Ep. 293. — Oud. Rév. I, 296. — Sacc. Syll. V, 1033. — Ag. Hyph. St. Fr. — Ach. Néerl. XIV, 249.

14. **Hypholoma sublateritium** (Schaeff.) Fr. Ep. 290. — Oud. Rév. I, 294. — Sacc. Syll. V, 1028. — Ag. Hyph. sublateritius Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 341; N. K. A. I, I, 49; I, V, 293; 2, I, 442; 2, V, 352; Arch. Néerl. XIV, 248. — Wint. Kr. Fl. I, 652.

15. **Hypholoma velutinum** (P.) Fr. Ep. 293. — Oud. Rév. I, 296. — Sacc. Syll. V, 1034. — Ag. Hyph. velutinus Fr. — T. N. G. XII, 264; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 342; N. K. A. 2, I, 442; 2, V, 352 et 584; Fl. Bat. tab. 769; Arch. Néerl. XIV, 249. — Wint. Kr. Fl. I, 650.

PANAEOLUS.

1. **Panaeolus acuminatus** Fr. Ep. 312. — Oud. Rév. I. 320. — Sacc. Syll. V, 1124. — Ag. Pan. acum. Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 345; N. K. A. 2, I, 442; 2, V. 353; Arch. Néerl. XIV, 253. — Wint. Kr. Fl. I, 638.

2. **Panaeolus campanulatus** (L.) Fr. Ep. 311. — Oud. Rév. I, 319. — Sacc. Syll. V, 1121. — Ag. Pan. camp. Fr. — T. N. G. XI, 382; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 345; N. K. A. 2, I, 442; 2, V, 353 et 585; Arch. Néerl. XIV, 253; Fl. Bat. tab. 820. — Wint. Kr. Fl. I, 639.

***Panaeolus fimiputris** Fr. Ep. 310. — Ag. Pan. fim. Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 345; N. K. A. 2, V, 353; Arch. Néerl. XIV, 252. — Voir: *Anellaria*.

3. **Panaeolus fimicola** Fr. Ep. 312. — Oud. Rév. I, 320. — Sacc. Syll. V, 1124. — Ag. Pan. fimic. Fr. — T. N. G. XI, 382; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 345; N. K. A. 2, V, 353; Arch. Néerl. XIV, 253. — Wint. Kr. Fl. I, 638.

4. **Panaeolus papilionaceus** (Bull.) Fr. Ep. 311. — Oud. Rév. I, 319. — Sacc. Syll. V, 1122. — Ag. Pan. pap. Fr. — T. N. G. XI, 382; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 345; N. K. A. 2, V, 353; Arch. Néerl. XIV, 253. — Wint. Kr. Fl. I, 639.

5. **Panaeolus phalaenarum** (Bull.) Fr. Ep. 310. — Sacc. Syll. V, 1119. — Ag. Pan. phal. Fr. — T. N. G. XI, 382. — Wint. Kr. Fl. I, 640.

6. **Panaeolus retirugis** Fr. Ep. 310. — Oud. Rév. I, 319. — Sacc. Syll. V, 1120. — Ag. Pan. ret. Fr. — Wint. Kr. Fl. I, 639. — Psathyra retirugis N. K. A. 2, V, 153.

***Panaeolus separatus** Fr. Ep. 310. — Ag. Pan. sep. Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 344; N. K. A. 2, V, 353; Arch. Néerl. XIV, 252. — Voir: *Anellaria*.

7. **Panaeolus subbalteatus** (B. Br.) Fr. Ep. 312. — Oud. Rév. I, 320. — Sacc. Syll. V, 1124. — Ag. Pan. subb. Fr. — N. K. A. 2, IV, 216.

ANELLARIA.

1. **Anellaria fimiputris** (Bull.) Karst Hattsv. I, 518. — Oud. Rév. I, 321. — Sacc. Syll. V, 1126. — Ag. Panaeolus fimip. Fr. Ep. 310. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 345; N. K. A. 2, V, 353; Arch. Néerl. XIV, 252. — Wint. Kr. Fl. I, 640.

2. **Anellaria separata** (L.) Karst. Hattsv. — Oud. Rév. I, 321. — Sacc. Syll. V, 1125. — Ag. Pan. separatus Fr. Ep. 310. — T. N. G. XII, 265; Prodr. Fl. Bat. II, 3, 344; N. K. A. 2, V, 353; Arch. Neerl. XIV, 252; Fl. Bat. tab. 820. — Wint. Kr. Fl. I, 640.

PSILOCYBE.

1. **Psilocybe ammophila** (Dur. et Lév.) Fr. Ep. 299. — Sacc. Syll. V, 1050. — Oud. N. K. A. 3, II, 859.

***Psilocybe atrorufa** (Schaeff.) Fr. Ep. 300. — Ag. Ps. atrorufus Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 343; N. K. A. 1, I, 49; 2, I, 442; Arch. Néerl. XIV, 250. — Voir: *Deconica*.

***Psilocybe bullacea** (Bull.) Fr. Ep. 299. — Ag. Ps. bullaceus Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 343; N. K. A. 1, I, 49; 2, I, 442; 2, V, 352. — Arch. Néerl. XIV, 250. — Voir: *Deconica*.

2. **Psilocybe callosa** Fr. Ep. 301. — Oud. Rév. I, 300. —

Sacc. Syll. V, 1051. — Ag. Psil. callosus Fr. — N. K. A. 2, I, 442; 2, V, 352; Arch. Néerl. II, 28; XIV, 250. — Wint. Kr. Fl. I, 646.

3. **Psilocybe cernua** (Fl. Dan) Fr. Ep. 302. — Oud. Rév. I, 301. — Sacc. Syll. V, 1053. — Ag. Psil. cernuus Fr. — N. K. A. 2, III, 243; Arch. Néerl. XIV, 251. — Wint. Kr. Fl. I, 645.

***Psilocybe coprophila** Fr. — Ag. Psil. coprophilus Fr. — T. N. G. XII, 264; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 343; Arch. Néerl. XIV, 250. — Voir: *Deconica*.

4. **Psilocybe foeniseeii** (P.) Fr. Ep. 303. — Oud. Rév. 301. — Sacc. Syll. V, 1055. — Ag. Psil. foen. Fr. — N. K. A. 2, V, 352; Arch. Néerl. II, 28; XIV, 251. — Wint. Kr. Fl. I, 644.

5. **Psilocybe hygrophila** Fr. Ep. 302. — Oud. Rév. I, 301. — Sacc. Syll. V, 1053. — Ag. Psil. hygrophilus Fr. — Arch. Néerl. XIV, 251.

6. **Psilocybe polyeephala** (Paulet) Fr. Ep. 302. — Oud. Rév. I, 301. — Sacc. Syll. V, 1053. — Ag. Psil. polycephalus Fr. — Arch. Néerl. XIV, 251; Fl. Bat. tab. 1570 b. — Wint. Kr. Fl. I, 645.

7. **Psilocybe sarcocephala** Fr. Ep. 297. — Oud. N. K. A. 3, II, 659. — Sacc. Syll. V, 1043. — Ag. Psil. sarcocephalus Fr.

8. **Psilocybe semilanceata** Fr. Ep. 301. — Oud. Rév. I, 300. — Sacc. Syll. V, 1051. — Ag. Psil. semilanceatus Fr. — N. K. A. 2, V, 166. — Wint. Kr. Fl. I, 646.

9. **Psilocybe spadicea** (Schaeff.) Fr. Ep. 302. — Oud. Rév. I, 301. — Sacc. Syll. V, 1052. — Ag. Psil. spadiceus Fr. — N. K. A. I, V, 293; 2, I, 442; 2, V, 352; Arch. Néerl. XIV, 251. — Wint. Kr. Fl. I, 645.

10. **Psilocybe uda** (P.) Fr. Ep. 298. — Oud. Rév. I, 300. — Sacc. Syll. V, 1044. — Ag. Psil. udus Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 343; Arch. Néerl. XIV, 250. — Wint. Kr. Fl. I, 648.

PSATHYRA.

1. **Psathyra bifrons** (Berk.) Fr. Ep. 307. — Oud. Rév. I, 306. — Sacc. Syll. V, 1071. — Ag. Ps. bifr. Fr. — N. K. A. 2, III, 243; Arch. Néerl. XIV, 252.

2. **Psathyra conopilea** Fr. Ep. 304. — Oud. Rév. I, 305. — Sacc. Syll. V, 1060. — Ag. Ps. conopileus Fr. — Wint. Kr. Fl. I, 644. — Ag. Ps. conopilus T. N. G. XII, 264; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 343; Arch. Néerl. XIV, 251.

3. **Psathyra corrugis** (P.) Fr. Ep. 305. — Oud. Rév. I, 305. — Sacc. Syll. V, 1061. — Ag. Ps. corr. Fr. — T. N. G. XII, 265. —

Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 343; N. K. A. 2, I, 442; 2, V, 153 et 352; Arch. Néerl. XIV, 251. — Wint. Kr. Fl. I, 644.

4. **Psathyra fibrillosa** (P.) Fr. 308. — Oud. Rév. I, 306. — Sacc. Syll. V, 1071. — Ag. Ps. fibrillosus Fr. — T. N. G. XII, 265; Prodr Fl. Bat. II, 3, p. 344; Arch. Néerl. XIV, 252. — Wint. Kr. Fl. I, 642.

5. **Psathyra gossypina** (Bull.) Fr. Ep. 309. — Oud. Rév. I, 306. — Sacc. Syll. V, 1072. — Ag. Ps. gossypinus Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 344; Arch. Néerl. XIV, 252. — Wint. Kr. Fl. I, 641.

6. **Psathyra gyroflexa** Fr. Ep. 305. — Oud. Rév. I, 305. — Sacc. Syll. V, 1063. — Ag. Ps. gyroflexus Fr. — T. N. G. XII, 265. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 344; Arch. Néerl. 251. — Wint. Kr. Fl. I, 643.

7. **Psathyra obtusata** Fr. Ep. 306. — Oud. Rév. I, 306. — Sacc. Syll. V, 1066. — Ag. Ps. obtusatus Fr. — T. N. G. XII, 265; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 344; N. K. A. 2, V, 352. Arch. Néerl. XIV, 252. — Wint. Kr. Fl. I, 642.

***Psathyra retirugis** N. K. A. 2, V, 153. — Voir: *Panaeolus.*

8. **Psathyra spadiceo-grisea** (Schaeff.) Fr. Ep. 306. — Oud. Rév. I, 305. — Sacc. Syll. V, 1065. — Ag. spad.-griseus Fr. — N. K. A. 2, IV, 216; Fl. Bat. tab. 1489.

PSATHYRELLA.

1. **Psathyrella arata** (Berk.) Fr. Ep. 314. — Oud. Rév. I, 323. — Sacc. Syll. V, 1129. — Ag. Ps. aratus Fr.

2. **Psathyrella atomata** Fr. Ep. 315. — Oud. Rév. I, 323. — Sacc. Syll. V, 1132. — Ag. Ps. atomatus Fr. — T. N. G. XII, 265; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 345; N. K. A. 2, 353; Arch. Néerl. 253. — Wint. Kr. Fl. I, 636.

***Psathyrella digitaliformis** Bull. — T. N. G. XI, 382. — Voir: *Coprinus Digitalis.*

3. **Psathyrella disseminata** (P.) Fr. Ep. 316. — Oud. Rév. I, 324. — Sacc. Syll. V, 1134. — Ag. Ps. disseminatus Fr. — T. N. G. XI, 382; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 346; N. K. A. I, V, 294; 2, I, 442; 2, V, 353; Arch. Néerl. XIV, 254. — Wint. Kr. Fl. I, 635.

4. **Psathyrella gracilis** Fr. Ep. 313. — Oud. Rév. I, 323. — Sacc. Syll. V; 1127. — Ag. Ps. græc. Fr. — Arch. Néerl. XIV. 253. — Wint. Kr. Fl. I, 637.

5. **Psathyrella hiascens** Fr. Ep. 314. — Oud. N. K. A. 3, II,

192. — Sacc. Syll. V, 1129. — Ag. Ps. hiascens Fr. — N. K. A. 2, V, 353. — Wint. Kr. Fl. I, 637.

6. **Psathyrella impatiens** Fr. Ep. 313. — Oud. Rév. I, 323. — Sacc. Syll. V, 1127. — Ag. Ps. imp. Fr. — Oud. Fgi Neerl. exs. n° 210. — Wint. Kr. Fl. I, 637.

7. **Psathyrella prona** Fr. Ep. 315. — Oud. Rév. I, 323. — Sacc. Syll. V, 1131. — Ag. Ps. pronus Fr. — N. K. A. 2, V, 123. — Wint. Kr. Fl. I, 636.

8. **Psathyrella subtilis** Fr. Ep. 316. — Oud. Rév. I, 324. — Sacc. Syll. V, 1135. — Ag. Ps. subt. Fr. — N. K. A. 2, IV, 216. — Wint. Kr. Fl. I, 635.

9. **Psathyrella subatrata** Fr. — Sacc. Syll. V, 1126. — Ag. Ps. subatr. Fr. Ep. 313. — Arch. Néerl. XIV, 250. — Wint. Kr. Fl. I, 637.

DECONICA.

1. **Deconica atrorufa** (Schaeff.) Fr. Ep. 300. — Oud. Rév. I, 303. — Sacc. Syll. V, 1059. — Ag. Dec. atrorufus Fr. — Ag. Psilocybe atrorufus Fr. — N. K. A. 1, I, 49; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 343; Arch. Néerl. XIV, 250; Oud. Fgi Néerl. exs. n° 209. — Wint. Kr. Fl. I, 647.

2. **Deconica bullacea** (Bull.) Fr. Ep. 299. — Oud. Rév. I, 303. — Sacc. Syll, V, 1058. — Ag. Dec. bullaceus Fr. — Ag. Psilocybe bullatus Fr. — N. K. A. 1, I, 49; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 343; Arch. Néerl. XIV, 250. — Wint. Kr. Fl. I, 647.

3. **Deconica coprophila** (Bull.) Fr. Ep. 299. — Oud. Rév. I, 303. — Sacc. Syll. V, 1058. — Ag. Dec. coprophilus Fr. — Ag. Psilocybe coprophilus Fr. — N. K. A. 1, I. 49; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 343; Arch. Néerl. XIV, 250. — Wint. Kr. Fl. I, 647.

4. **Deconica lipophila** Oud. N. K. A. 3, I, 436 (a° 1899). — Sacc. Syll. XVI, 125.

COPRINUS.

1. **Coprinus aphthosus** Fr. Ep. 323. — T. N. G. XII, 265. — Sacc. Syll. V, 1085.

2. **Coprinus atramentarius** (Bull.) Fr. Ep. 322. — Oud. Rév. I, 314; T. N. G. XI, 383; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 347; N. K. A. I, V, 294; 2, I, 443; 2, V, 353; Arch. Néerl. XIV, 254; Fl. Bat. tab. 875. — Sacc. Syll. V, 1081. — Wint. Kr. Fl. I, 632. — C. luridus T. N. G. XII, 265.

3. **Coprinus cinereus** (Schaeff.) Fr. Ep. 324. — Sacc. Syll. V, 1088. — Wint. Kr. Fl. I, 630. — Cop. pullatus Bolt. — T. N. G. XII, 265.

4. **Coprinus comatus** (Fl. Dan.) Fr. Ep. 320. — Oud. Rév. I, 313. — T. N. G. XI, 383; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 346; N. K. A. 2, I, 442; 2, V, 353 et 585; Arch. Néerl. XIV, 254; Fl. Bat. tab. 590. Sacc. Syll. V, 1079. — Wint. Kr. Fl. I, 633.

5. **Coprinus deliquescens** (Bull.) Fr. Ep. 327. — Oud. Rév. I, 316; T. N. G. XI, 382; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 348; N. K. A. 2, V, 354; Arch. Néerl. XIV, 256. — Sacc. Syll. V, 1094. — Wint. Kr. Fl. I, 628.

6. **Coprinus Digitalis** (Batsch) Fr. Ep. 327. — Oud. Rév. I, 316; N. K. A. 2, I, 443; 2, V, 354; Arch. Néerl. II, 29; XIV, 256. — Sacc. Syll. V, 1095. — Wint. Kr. Fl. I, 627. — Psathyrella digitaliformis Bull. — T. N. G. XI, 382.

7. **Coprinus ephemeroides** (Bull.) Fr. Ep. 328. — Oud. Rév. I, 316; N. K. A. 2, IV, 217. — Sacc. Syll. V, 1096. — Wint. Kr. Fl. I, 627.

8. **Coprinus ephemerus** (Bull.) Fr. Ep. 331. — Oud. Rév. I, 317; T. N. G. XII, 265; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 349; N. K. A. 2, V, 354; Arch. Néerl. XIV, 257. — Sacc. Syll. V, 1106. — Wint. Kr. Fl. I, 625.

9. **Coprinus extinctorius** (Bull.) Fr. Ep. 324. — Oud. Rév. I, 314; T. N. G. XII, 265; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 347; N. K. A. 2, V, 353; Arch. Néerl. XIV, 255. — Sacc. Syll. V, 1086. — Wint Kr. Fl. I, 631.

10. **Coprinus fimetarius** (L.) Fr. Ep. 324. — Oud. Rév. I, 315; T. N. G. XII, 265; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 347; N. K. A. 2, V, 153; Arch. Néerl. XIV, 255. — Sacc. Syll. V, 1087. — Wint. Kr. Fl. I, 630.

11. **Coprinus Friesii** Quélet. — Fr. Ep. 331. — Oud. Rév. I, 317; N. K. A. 2, III, 214; Arch. Néerl. XIV, 357. — Sacc. Syll. V, 1106. — Wint. Kr. Fl. I, 625.

12. **Coprinus fuscescens** (Schaeff.) Fr. 322. — Oud. Rév. I, 314; T. N. G. XI, 383; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 347; Arch. Néerl. XIV, 255. — Sacc. Syll. V, 1083. — Wint. Kr. Fl. I, 631.

13. **Coprinus hemerobius** Fr. Ep. 332. — Oud. Rév. I, 317. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 350; Arch. Néerl. XIV, 257. — Sacc. Syll. V, 1114. — Wint. Kr. Fl. I, 624.

14. **Coprinus lagopus** Fr. Ep. 329. — Oud. Rév. I, 316; T. N. G. XI, 382; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 349; N. K. A. 2, I, 443; 2, V, 354; Arch. Néerl. XIV, 256. — Sacc. Syll. V, 1098. — Wint. Kr. Fl. I, 626.

***Coprinus lutidus** T. N. G. XII, 265. — Voir: *C. atramentarius.*

15. **Coprinus micaceus** (Bull.) Fr. Ep. 325. — Oud. Rév. I, 315; T. N. G. XI, 383; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 348; N. K. A. 2, I, 443; 2, V, 354; Arch. Néerl. XIV, 255; Fl. Bat. tab. 820. — Sacc. Syll. V, 1090. — Wint. Kr. Fl. I, 629.

16. **Coprinus niveus** (P.) Fr. 325. — Oud. Rév. I, 315; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 348; N. K. A. 2, I, 443; 2, V, 354; Arch. Néerl. XIV, 255. — Sacc. Syll. V, 1088. — Wint. Kr. Fl. I, 626.

17. **Coprinus ovatus** (Schaeff.) Fr. Ep. 320. — Oud. Rév. I, 314; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 346; N. K. A. 2, I, 443; 2, V, 353; Arch. Néerl. XIV, 254. — Sacc. Syll. V, 1079. — Wint. Kr. Fl. I, 633.

18. **Coprinus plicatilis** (Curtis) Fr. Ep. 331. — Oud. Rév. I, 317; Prodr. Fl. Bat. II, p. 349; N. K. A. 2, I, 443; 2, V, 354 585; Arch. Néerl. XIV, 257. — Sacc. Syll. V, 1108. — Wint. Kr. Fl. I, 624.

***Coprinus pullatus** Berk. — T. N. G. XII, 265. — Voir: *C. cinereus.*

19. **Coprinus radians** (Desm.) Fr. Ep. 326. — Oud. N. K. A. 3, II, 660. — Sacc. Syll. V, 1092.

20. **Coprinus radiatus** (Bolton) Fr. Ep. 330. — Oud. Rév. I, 317; Prodr. Fl. Bat. 3, II, p. 349; N. K. A. 1, I, 49; 2, I, 443; 2, V, 354; Arch. Néerl. XIV, 257. — Sacc. Syll. V, 1101. — Wint. Kr. Fl. I, 626.

21. **Coprinus sobolifèrus** Fr. Ep. 322. — Oud. Rév. I, 314; T. N. G. XI, 383; Prodr. Fl. Bat. 3, II, p. 347; Arch. Néerl. XIV, 255. — Sacc. Syll. V, 1083. — Wint. Kr. Fl. I, 631.

22. **Coprinus sociatus** Fr. Ep. 331. — Oud. Rév. I, 317; T. N. G. XII, 265; Prodr. Fl. Bat. 3, II, p. 349; Arch. Néerl. XIV, 257. — Sacc. Syll. V, 1108. — Wint. Kr. Fl. I, 624.

23. **Coprinus stercorarius** (Bull.) Fr. Ep. 330. — Oud. Rév. I, 317; N. K. A. 2, V, 354; Arch. Néerl. XIV, 257. — Sacc. Syll. V, 1103. — Wint. Kr. Fl. I, 625. — C. stercoreus Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 349; N. K. A. 2, I, 443.

***Coprinus stercoreus** N. K. A. 2, I, 443. — Voir: *C. stercorarius.*

24. **Coprinus tergiversans** Fr. Ep. 325. — Oud. Rév. I, 315; Arch. Néerl. XIV, 255. — Sacc. Syll. V, 1090. — Wint. Kr. Fl. I, 629.

25. **Coprinus tomentosus** (Bull.) Fr. Ep. 325. — Oud. Rév. I, 315; T. N. G. XI, 383; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 348; Arch. Néerl. XIV, 255. — Sacc. Syll. V, 1088. — Wint. Kr. Fl. I, 630.

26. **Caprinus Trappenii** Oud. Arch. Néerl. II, 29. — Fr. Ep. 704; N. K. A. 2, V, 354; Arch. Néerl. XIV, 256; Oud. Rév. I, 316.

27. **Coprinus truncorum** (Schaeff.) Fr. Ep. 326. — Oud. Rév. I, 316; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 348; Arch. Néerl. XIV, 256. — Sacc. Syll. V, 1092. — Wint. Kr. Fl. I, 628.

GOMPHIDIUS.

1. **Gomphidius glutinosus** (Schaeff.) Fr. Ep. 399. — Oud. Rév. I, 325; T. N. G. XII, 266; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 354; N. K. A. I, V, 294; 2, I, 443; 2, V, 355 et 585; Arch. Néerl. XIV, 264; Fl. Bat. tab. 1245. — Sacc. Syll. V, 1137. — Wint. Kr. Fl. I, 575.

2. **Gomphidius gracilis** Berk. — Fr. Ep. 400. — Oud. Rév. I, 326. — N. K. A. 2, VI, 20. — Sacc. Syll. V, 1138.

3. **Gomphidius roseus** Fr. Ep. 400. — Oud. Rév. I, 325; N. K. A. 2, V, 356; Arch. Néerl. XIV, 264; Fl. Bat. tab. 1395. — Sacc. Syll. V, 1138. — G. glut. var. roseus Wint. Kr. Fl. I, 575.

4. **Gomphidius testaceus** Fr. Ep. 400. — Oud. Rév. I, 325; Arch. Néerl. II, 30; PIV, 264. — Sacc. Syll. V, 1138.

5. **Gomphidius viscidus** (L.) Fr. Ep. 400. — Oud. Rév. I, 325; T. N. G. XI, 383; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 354; N. K. A. 2, I, 443; 2, V, 356; Arch. Néerl. XIV, 264; Fl. Bat. tab. 1285. — Sacc. Syll. V, 1138. — Wint. Kr. Fl. I, 575.

† Polyporaceae.

× BOLETEAE.

1. Leucosporae.

GYRODON.

***Gyrodon fusipes** Heufl. Sacc. – Voir: *G. Oudemansii*.

1. **Gyrodon Oudemansii** (Hartsen) Sacc. Syll. VI, 52. — Boletus Oudem. Harts. Fl. Bat. tab. 936; Fr. Ep. 500; Oud. Bot. Zeit. 1878 et N. K. A. 2, III, 144; Arch. Néerl. XIV, 281. — Gyrodon placidus (Bon.) Sacc. Syll. VI, 51. — Oud. Rév. I, 346. — Boletus placidus Bon. Bot. Zeit. 1861, p. 201. — Gyrodon fusipes (Heufler); Sacc. Syll. VIII, 52. — Bol. fusipes Heufl. in Rab. Fgi Eur. n° 712; Fl. Bat. tab. 1650.

***Gyrodon placidus** (Bon.) Sacc. — Oud. Rév. I, 346. — Voir: *G. Oudemansii*.

2. Ochrosporae.

BOLETUS.

***Boletus aurantiacus** Bull. Ch. de Fr. tab. 236 et 489 fig. 2. — T. N. G. XII, 267. — Voir: *B. scaber*.

1. **Boletus badius** Fr. El. I, 126; Ep. 499. — Oud. Rév. I, 339; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 367; N. K. A. 1, V, 296; 2, I, 446; 2, V, 360; Arch. Néerl. XIV, 281; Fl. Bat. tab. 80. — Sacc. Syll. VI, 7. — Wint. Kr. Fl. I, 473.

2. **Boletus bovinus** L. — Fr. Ep. 499. — Oud. Rév. I, 338; N. K. A. 1, V, 295; 2, IV, 221; 2, V, 360; Arch. Néerl. XIV. 281. — Sacc. Syll. VI, 6. — Wint. Kr. Fl. I, 474.

3. **Boletus calopus** Fr. Ep. 506. — Oud. Rév. I, 342; Prodr. Fl. Bat. II, 3, 369; N. K. A. 2, V, 586; Arch Néerl. XIV, 283. — Sacc. Syll. VI, 24. — Wint. Kr. Fl. I, 469.

4. **Boletus castaneus** Bull. — Fr. Ep. 517. — Oud. Rév. I, 346; N. K. A. 2, IV, 221; 2, V, 361; Fl. Bat. 1310. — Sacc. Syll. VI, 45. — Wint. Kr. Fl. I, 460.

5. **Boletus chrysenteron** (Bull.) Fr. Ep. 502. — Oud. Rev. I, 339; T. N. G. XI, 385 Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 368; N. K. A. 1, V, 296; 2, I, 446; 2, V, 360; Arch. Néerl. XIV, 282. — Sacc. Syll. VI, 14. — Wint. Kr. Fl. I, 471.

6. **Boletus cyanescens** Bull. — Fr. Ep. 517. — Oud. Rév. I, 346; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 370; N. K. A. 1, V, 296; 2, I, 446; 2, V, 361 et 586; Arch. Néerl. XIV, 285; Fl. Bat. tab. 770. — Sacc. Syll. VI, 44. — Wint. Kr. Fl. I, 460.

7. **Boletus edulis** Bull. — Fr. Ep. 508. — Oud. Rév. I, 343; T. N. G. XI, 385; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 369; N. K. A. 1, V, 296; 2, I, 446; 2, V, 351 et 586; Arch. Néerl. XIV, 283; Fl. Bat. tab. 739. — Sacc. Syll. VI, 29. — Wint. Kr. Fl. I, 467.

8. **Boletus erythropus** P. — Fr. Ep. 511. — Oud. Rév. I, 343; Arch. Néerl. XIV, 284. — Sacc. Syll. VI, 35.

9. **Boletus felleus** Bull. — Fr. Ep. 516. — Oud. Rév. I, 345; T. N. G. XI, 386; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 370; N. K. A. 2, I, 446; 2, V, 361 et 586; Arch. Néerl. XIV, 284; Fl. Bat. tab. 740. — Sacc. Syll. VI, 43. — Wint. Kr. Fl. I, 461.

10. **Boletus flavidus** Fr. Ep. 498. — Oud. Rév. I, 337; T. N. G. XI, 385; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 367; N. K. A. 2, I, 446; 2, V, 360 et 586; Arch. Néerl. XIV, 281. — Sacc. Syll. VI, 4. — Wint. Kr. Fl. I, 474.

11. **Boletus flavus** With. — Fr. Ep. 497. — Oud. Rév. I, 337;

N. K. A. I, V, 295; 2, V, 360; Arch. Néerl. XIV, 280. — Sacc. Syll. VI, 1. — Wint. Kr. Fl. I, 475.

12. **Boletus fragrans** Vittad. — Fr. Ep. 509. — Oud. Rév. I, 343; — Arch. Néerl. XIV, 283. — Sacc. Syll. VI, 30. — Wint. Kr. Fl. I, 467.

***Boletus fusipes** Heufl. — Fl. Bat. tab. 1650. — Voir: *Gyrodon Oudemansii*.

13. **Boletus granulatus** L. — Fr. Ep. 498. — Oud. Rév. I, 338; T. N. G. XII, 267; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 367; N. K. A. 2, I, 446; 2, V, 360; Arch. Néerl. XIV, 281; Fl. Bat. tab. 1050. — Sacc. Syll. VI, 5. — Wint. Kr. Fr. I, 474.

14. **Boletus hieroglyphicus** Rostk. — Fr. Ep. 521. — Oud. Rév. I, 366; Arch. Néerl. II, 31; XIV, 285. — Sacc. Syll. VI, 48. — Wint. Kr. Fl. I, 478.

15. **Boletus impolitus** Fr. Ep. 500. — Oud. Rév. I, 343; Arch. Néerl. II, 32; XIV, 283; Fl. Bat. tab. 1195. — Sacc. Syll. VI, 30. — Wint. Kr. Fl. I, 466.

16. **Boletus lupinus** Fr. Ep. 511. — N. K. A. 3, II, 193. — Sacc. Syll. VI, 34. — Wint. Kr. Fl. I, 465.

17. **Boletus luridiformis** Rostk. Fr. Ep. 512. — Oud. Rév. I, 344; N. K. A. 2, IV, 221. — Sacc. Syll. VI, 36. — Wint. Kr. Fl. I, 464.

18. **Boletus luridus** Schaeff. — Fr. Ep. 511. — Oud. Rév. I, 343; T. N. G. XI, 485; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 369; N. K. A. 2, I, 446; 2, V, 361 et 586; Arch. Néerl. XIV, 283; Fl. Bat. tab. 899. — Sacc. Syll. VI, 34. — Wint. Kr. Fl. I, 465.

19. **Boletus luteus** L. — Fr. Ep. 497. — Oud. Rév. I, 337; T. N. G. XI, 485; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 367; N. K. A. I, V, 295; 2, I, 446; 2, V, 360 et 586; Arch. Néerl. XIV, 280; Fl. Bat. tab. 1035. — Sacc. Syll. VI, 3. — Wint. Kr. Fl. I, 475.

20. **Boletus Meijeri** Rostk. — Fr. Ep. 512. — Oud. N. K. A. 3, II, 661. — Sacc. Syll. VI, 36. — Wint. Kr. Fl. I, 464.

***Boletus Oudemansii** Hartsen. — Arch. Néerl. XIV, 281. — Voir: *Gyrodon*.

21. **Boletus pachypus** Fr. Ep. 506. — Oud. Rév. I, 342; N. K. A. 2, V, 361; Arch. Néerl. XIV, 283. — Sacc. Syll. VI, 24. — Wint. Kr. Fl. I, 468.

22. **Boletus parasiticus** Bull. — Fr. Ep. 505. — Oud. Rév. I, 342; N. K. A. 2, I, 446; 2, V, 361; Arch. Néerl. I, 80; XIV, 282. — Fl. Bat. tab. 1175. — Sacc. Syll. VI, 22. — Wint. Kr. Fl. I, 469.

23. **Boletus piperatus** Bull. — Fr. Ep. 500. — Oud. Rév. I,

339; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 368; N. K. A. 1, 446; Arch. Néerl. XIV, 281. — Sacc. Syll. VI, 8. — Wint. Kr. Fl. I, 472.

24. **Boletus pruinatus** Fr. Ep. 504. — Oud. Rév. I, 341; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 368; N. K. A. 3, II, 662; Arch. Néerl. XIV, 282. — Sacc. Syll. VI, 21. — Wint. Kr. Fl. I, 470. — Boletus radicans N. K. A. 2, IV, 221.

25. **Boletus purpurascens** Rostk. — Fr. Ep. 504. — Oud. Rév. I, 342; N. K. A. 2, VI, 24. — Sacc. Syll. VI, 21. — Wint. Kr. Fl. 470.

26. **Boletus purpureus** Fr. Ep. 511. — Oud. Rév. I, 344; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 369; Arch. Néerl. XIV, 284. — Sacc. Syll. VI, 35. — Wint. Kr. Fl. I, 464.

27. **Boletus radicans** P. — Fr. Ep. 503. — Oud. Rév. I, 340; N. K. A. 2, III, 147; 2, IV, 221; Arch. Néerl. XIV, 282. — Sacc. Syll. VI, 16. — Wint. Kr. Fl. I, 470.

28. **Boletus rubinus** W. Smith. — Fr. Ep. 504. — Oud. Rév. I, 340; N. K. A. 2, III, 148; Arch. Néerl. XIV, 282. — Sacc. Syll. VI, 16.

***Boletus rufus** Schaeff. — Fr. Ep. 515 (sous 75). — N. K. A. 2, I, 446. — Voir: *B. versipellis.*

29. **Boletus Satanas** Lenz. — Fr. Ep. 510. — Oud Rév. I, 343; T. N. G. XII, 267; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 369; N. K. A. 2, I, 446; Arch. Néerl. XIV, 283. — Sacc. Syll. VI, 34. — Wint. Kr. Fl. I, 465.

30. **Boletus scaber** (Bull.) Fr. Ep. 51. — Oud. Rév. I, 345; T. N. G. XI, 386; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 369; N. K. A. I, V, 296; 2, I, 446; 2, V, 361 et 586; Arch. Néerl. XIV, 284; Fl. Bat. tab. 710. — Sacc. Syll. VI, 11. — Wint. Kr. Fl. I, 461. — Bol. aurantiacus Bull. — T. N. G. XII, 267.

31. **Boletus Schoberi** Oud. N. K. A. 2, IV, 220; id. Rév. I, 337. — Sacc. Syll. VI, 25.

32. **Boletus spadiceus** Schaeff. — Fr. Ep. 503. — Oud. Rév. I, 339; Arch. Néerl. II, 31; XIV, 282. — Sacc. Syll. VI, 15. — Wint. Kr. Fl. I, 471.

***Boletus strobilaceus** Scop. — N. K. A. 2, V, 586. — Voir: *Strobilomyces.*

33. **Boletus subtomentosus** L. — Fr. Ep. 503. — Oud. Rév. I, 339; T. N. G. XII, 267; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 368; N. K. A. 2, I, 446; 2, V, 361 et 586; Arch. Néerl. XIV, 282. — Sacc. Syll. VI, 14. — Wint. Kr. Fl. I, 471.

34. **Boletus torosus** Fr. Ep. 507. — N. K. A. 3, II, 193; Fl. Bat. tab. 1620. — Sacc. Syll. VI, 25.

35. **Boletus varieeolor** B. Br. — Fr. Ep. 506. — Oud. Rév. I, 342; N. K. A. 2, II, 176; Arch. Néerl. XIV, 282. — Sacc. Syll. VI, 24.

36. **Boletus variegatus** Sw. — Fr. Ep. 501; Oud. Rév. I, 339; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 368; N. K. A. 2, I, 446; Arch. Néerl. XIV, 281; Oud. Fgi Neerl. exs. n° 219; Fl. Bat. tab. 1355. — Sacc. Syll. VI, 12. — Wint. Kr. Fl. I, 472.

37. **Boletus versicolor** Rostk. — Fr. Ep. 504. — Oud. N. K. A. 2, II, 176; 3, II, 193. — Sacc. Syll. VI, 21. — Wint. Kr. Fl. I, 470.

38. **Boletus versipellis** Fr. Ep. 575. — Oud. Rév. I, 344; N. K. A. 2, I, 446 et 2, V, 158; Arch. Néerl. XIV, 284. — Sacc. Syll. VI, 40. — Wint. Kr. Fl. I, 462. — Bol. rufus Schaeff. — Fr. Ep. 515 (sous 75). — N. K. A. 2, I, 446.

STROBILOMYCES.

1. **Strobilomyces strobilaceus** Berk. — Oud. Rév. I, 349; Oud. N. K. A. 3, II, 665. — Sacc. Syll. VI, 49. — Boletus strobilaceus Scop. — Fr. Ep. 513. — N. K. A. 2, V, 586. — Wint. Kr. Fl. I, 463.

FISTULINA.

1. **Fistulina hepatica** (Huds.) Fr. Ep. 522. — Oud. Rév. I, 350; T. N. G. XII, 268; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 382; N. K. A. 2, I, 447; 2, V, 361 et 587; Arch. Néerl. XIV, 285; Fl. Bat. tab. 1265; Oud. Fgi Néerl. exs. n° 110. — Sacc. Syll. VI, 51. — Wint. Kr. Fl. I, 458.

×× POLYPOREAE.

1. Leucosporae.

POLYPORUS.

***Polyporus abietinus** Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 378; N. K. A. 2, V, 363; Arch. Néerl. XIV, 294. — Wint. Kr. Fl. I, 115. — Voir: *Polystictus*.

1. **Polyporus acanthoides** Fr. Ep. 540. — Oud. Rév. I, 362; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 372; Arch. Néerl. XIV, 288. — Sacc. Syll. VI, 100. — Wint. Kr. Fl. I, 439.

2. **Polyporus adustus** Fr. Ep. 349. — Oud. Rév. I, 364; T.

N. G. XI, 386; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 375; N. K. A. 2, I, 447; 2, V, 362. — Sacc. Syll. VI, 125. — Wint. Kr. Fl. I, 431.

3. **Polyporus albus** Fr. Ep. 549. — Oud. Rév. I, 363; N. K. A. 2, II, 99; Arch. Néerl. XIV, 290; Oud. Fgi Néerl. exs. n° 224. — Sacc. Syll. VI, 122. — Wint. Kr. Fl. I, 432. — Oud. Fgi Neerl. exs. n° 224.

4. **Polyporus alutaceus** Fr. Ep. 545. — Oud, Rév. I, 363. — Sacc. Syll. VI, 109. — Wint. Kr. Fl. I, 436. — P. epileucus N. K. A. 2, IV, 222.

5. **Polyporus amorphus** Fr. Ep. 550. — Oud. Rév. I, 364; N. K. A. I, IV, 134; Arch. Néerl. II, 32; XIV, 290; Oud. Fgi Néerl. exs. n° 290. — Sacc. Syll. VI, 127. — Wint. Kr. Fl. I, 430. — P. roseo-poris N. K. A. 1, V, 296.

***Polyporus annosus** Fr. Ep. 564. — N. K. A. 2, I, 447; Arch. Néerl. II, 32; XIV, 292; Wint. Kr. Fl. I, 420. — Voir: *Fomes*.

***Polyporus applanatus** (P.) Wallr. — Wint. Kr. Fl. I, 425. — Voir: *Fomes*.

6. **Polyporus arcularius** (Batsch) Fr. Ep. 526. — N. K. A. 3, II, 338. — Sacc. Syll. VI, 67. — Wint. Kr. Fl. I, 449.

***Polyporus bathyporus** Rostk. — Wint. Kr. Fl. I, 453. — Voir: *Poria*.

7. **Polyporus betulinus** (Bull.) Er. Ep. 553. — Oud. Rév. I, 368; N. K. A. 2, III, 248; Arch. Néerl. XIV, 291; Fl. Bat. tab. 1585; Oud Fgi Neerl. exs. n° 228. — Sacc. Syll. VI, 139. — Wint Kr. Fl. I, 426.

8. **Polyporus biennis** (Bull.) Fr. Ep. 529. — Oud. N. K. A. 3, II, 193; Sacc. Syll. VI, 77. — Wint. Kr. Fl. I. 447.

9. **Polyporus borealis** (Wahlb.) Fr. Ep. 552. — Oud. Rév. I, 366; N. K. A. 2, III, 246; Arch. Néerl. XIV, 291; Oud. Fgi Neerl. exs. n° 226. — Sacc. Syll. VI, 134. — Wint. Kr. Fl. I, 428.

10. **Polyporus brumalis** (P.) Fr. Ep. 526. — Oud. Rév. I, 359; N. K. A. I, I, 49; 2, I, 446; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 370; Arch. Néerl. XIV, 286; Fl. Bat. tab. 1670. — Sacc. Syll. VI, 63. — Wint. Kr. Fl. I, 450.

11. **Polyporus chioneus** Fr. Ep. 546. — Oud. Rév. I, 363; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 374; Arch. Néerl. XIV, 289. — Sacc. Syll. VI, 14. — Wint. Kr. Fl. I. 435.

***Polyporus conchatus** Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 377; N. K. A. 2, I, 447; 2, V, 363; Arch. Néerl. XIV, 292. — Wint. Kr. Fl. I, 423. — Voir: *Fomes*.

12. **Polyporus confluens** (A. S.) Fr. Ep. 539. — Oud. Rév. I, 362; T. N. G. XI, 386; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 372; Arch.

Néerl. XIV, 288. — Sacc. Syll. VI, 96. — Wint. Kr. Fl. I, 440.

*__Polyporus connatus__ Fr. — Arch. Néerl. II, 32; XIV, 292. — Wint. Kr. Fl. I, 421. — Voir: *Fomes*.

*__Polyporus contiguus__ (P.) Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 379; Arch. Néerl. XIV, 292. — Wint. Kr. Fl. I, 413. — Voir: *Poria*.

*__Polyporus corticola__ Fr. — T. N. G. XII, 268; Prodr. Fl. Bat. II, 3. p. 379; Arch. Néerl. XIV, 296. — Wint. Kr. Fl. I, 406. Voir: *Poria*.

13. __Polyporus croceus__ (P.) Fr. Ep. 548. — Oud. Rév. I, 364; Prodr. Fl. Bat. II, 3. p. 374; N. K. A. 2, I, 447; 2, V, 362; Arch. Néerl. XIV, 289. — Sacc. Syll. VI, 117. — Wint. Kr. Fl. I, 433.

*__Polyporus cryptarum__ (Bull.) Fr. — N. K. A. 2, I, 447; 2, V, 363; Arch. Néerl. VIII, 348; XIV, 293. — Voir: *Fomes*.

14. __Polyporus cuticularis__ (Bull.) Fr. Ep. 551. — Oud Rév. I, 361; N. K. A. 2, IV, 222; 2, V, 362; Arch. Néerl. XIV, 290. — Sacc. Syll. VI, 128. — Wint. Kr. Fl. I, 429.

15. __Polyporus destructor__ (Schrad.) Fr. Ep. 547. — Oud. Rév. I, 363; T. N. G. XII, 267; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 374; N. K. A. 2, I, 447; 2, V. 362; Arch. Néerl. XIV, 289. — Sacc. Syll. VI, 115. — Wint. Kr. Fl. I, 433.

16. __Polyporus elegans__ (Bull.) Fr. Ep. 535. — N. K. A. 3, II. 193. — Sacc. Syll. VI, 85. — Wint. Kr. Fl. I, 443.

*__Polyporus epileucus__ N. K. A. 2, IV, 222. — Voir: *Pol. alutaceus*.

*__Polyporus Evonymi__ Kalchbr. — Wint. Kr. Fl. I, 423. — Voir: *Fomes*.

__Polyporus ferruginosus__ (Schrad.) Fr. Ep. 571. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 379; N. K. A. 2, I. 447; 2, V, 363; Arch. Néerl. XIV, 294. — Wint. Kr. Fl. I. 413. — Voir *Poria*.

*__Polyporus fomentarius__ (L.) Fr. Ep. 558. — T. N. G. XII, 268; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 376; N. K. A. 2, I, 447; 2, V, 362; Arch. Néerl. XIV, 291. — Wint. Kr. Fl. I, 424. — Voir *Fomes*.

*__Polyporus Fibula__ Fr. Ep. 567. — N. K. A. 2, III, 249; Arch. Néerl. XIV, 293. — Wint. Kr. Fl. I, 417. — Voir: *Polystictus*.

17. __Polyporus frondosus__ (Fl. Dan.) Fr. Ep. 549. — Oud. Rév. I, 361; T. N. G. XII, 267; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 372; N. K. A. 2, I, 446; 2, V, 362; Arch. Néerl. XIV, 287; Fl. Bat. tab. 1240. — Sacc. Syll. VI, 95. — Wint. Kr. Fl. I. 441.

*__Polyporus fulvus__ (Scop.) Fr. Ep. 559. — T. N. G. XII, 268; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 377. — Wint. Kr. Fl. I, 424. — Voir: *Fomes*.

18. **Polyporus fumosus** (P.) Fr. Ep. 549. — Oud. Rév. I, 364; T. N. G. XI, 386; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 375; N. K. A., I, V, 296; 2, V, 362; Arch. Néerl. XIV, 290. — Sacc. Syll. VI, 123. — Wint. Kr. Fl. I, 432.

19. **Polyporus giganteus** (P.) Fr. Ep. 540. — Oud. Rév. I, 362; — Prodr. Fl. Bat. II, 3, 372; N. K. A. 2, I, 446; 2, V, 362; Arch. Néerl. XIV, 288; Fl. Bat. tab. 1635. — Sacc. Syll. VI, 99. — Wint. Kr. Fl. I, 440.

***Polyporus hibernicus** (B. Br.) Fr. Ep. 579. — Arch. Néerl. XIV, 295. — Wint Kr. I, 406. — Voir: *Poria.*

***Polyporus hirsutus** (Schrad.) Fr. Ep. 567. — N. K. A. 2, I, 447; 2, V, 363; Arch. Néerl. XIV, 293. — Wint. Kr. Fl. I, 416. — Voir: *Polystictus.*

20. **Polyporus hispidus** (Bull.) Fr. Ep. 551. — Oud. Rév. I, 364; T. N. G. XI, 386; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 175; N. K. A. 2, I, 447; 2, V, 362; Arch. Néerl. XIV, 290. — Sacc. Syll. VI, 129. — Wint. Kr. Fl. I, 430.

***Polyporus igniarius** (L.) Fr. Ep. 559. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 376; N. K. A. 2, I, 447; 2, V, 363; Arch. Néerl. XIV, 292. — Wint. Kr. Fl. I, 424. — Voir: *Fomes.*

21. **Polyporus imberbis** (Bull.) Fr. Ep. 543. — N. K. A. 3, II, 193. — Sacc. Syll. VI, 144. — Wint. Kr. Fl. I. 437.

22. **Polyporus imbricatus** (Bull.) Fr. Ep. 542. — Oud. N. K. A. 3, III, 1085. — Sacc. Syll. VI, 106. — Wint. Kr. Fl. I, 438.

23. **Polyporus intybaceus** Fr. Ep. 538. — Oud. Rév. I, 362. — N. K. A. 2, IV, 222; Fl. Bat. tab. 1270. — Sacc. Syll. VI, 96. — Wint. Kr. Fl. I, 445.

24. **Polyporus kymathodes** Rostk. — Fr. Ep. 550. — Oud. Rév. I, 364; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 375; Arch. Néerl. XIV, 290. — Sacc. Syll. VI, 125. — Wint. Kr. Fl. I, 430.

25. **Polyporus leprodes** Rostk. — Fr. Ep. 535. — Oud. Rév. I, 361; N. K. A. 2, IV, 222. — Sacc. Syll. VI, 81. — Wint. Kr. Fl. I, 444.

***Polyporus lucidus** (Leysser) Fr. Ep. 537. — N. K. A. 2, I, 252; Arch. Néerl. VIII, 348; XIV, 287. — Wint. Kr. Fl. I, 442. — Voir: *Fomes.*

***Polyporus makraulos** Rostk. — Arch. Néerl. XIV, 294. — Wint. Kr. Fl. I, 412. — Voir: *Poria.*

***Polyporus marginatus** Fr. Ep. 561. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 377; N. K. A. 2, I, 447; 2, V, 363; Arch. Néerl. XIV, 292. — Wint. Kr. Fl. I, 422. — Voir: *Fomes.*

***Polyporus Medulla panis** (P.) Fr. Ep. 576. — Prodr. Fl. Bat.

II, 3, p. 379; N. K. A. 2, I, 447; 2, V, 363; Arch. Néerl. XIV, 295. — Wint. Kr. Fl. I. 409. — Voir: *Poria.*

26. **Polyporus mollis** (P.) Fr. Ep. 547. — Oud. Rév. I, 363; T. N. G. XI, 486; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 374; Arch. Néerl. XIV, 289. — Sacc. Syll. VI, 113. — Wint. Kr. Fl. I. 434.

***Polyporus molluscus** (P.) Fr. Ep. 578. — N. K. A. 2, V, 364. — Wint. Kr. Fl. I, 108. — Voir: *Poria.*

***Polyporus mucidus** (P.) Fr. Ep. 577. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 379; N. K. A. 1, I, 50 et 2, V, 364; Arch. Néerl. XIV, 295. — Wint. Kr. Fl. I, 409. — Voir: *Poria.*

***Polyporus Necsii** Fr. Ep. 564. — N. K. A. 2, III, 249; Arch. Néerl. XIV, 292. — Wint. Kr. Fl. I, 419. — Voir: *Fomes.*

27. **Polyporus nidulans** Fr. Ep. 548. — Oud. Rév. I, 363; T. N. G. XII, 267; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 375; N. K. A. 2, V, 362; Arch. Néerl. XIV, 289. — Sacc. Syll. IX, 170. — Wint. Kr. Fl. I, 432.

***Polyporus nigricans** Fr. Ep. 558. — T. N. G. XII, 268; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 376; Arch. Néerl. XIV, 291. — Wint. Kr. Fl. I, 424. — Voir: *Fomes.*

***Polyporus nitidus** (P.) Fr. Ep. 574. — Wint. Kr. Fl. I, 411. — Voir: *Poria.*

28. **Polyporus nummularius** (Bull.) Fr. Ep. I, 536. — Oud. Rév. I, 361; T. N. G. XII, 267; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 372; N. K. A. 2, I, 446; Arch. Néerl. XIV, 287. — Sacc. Syll. VI, 85. — Wint. Kr. Fl. I, 443.

***Polyporus obdueens** P. — Fr. Ep. 577. — T. N. G. XII, 268; N. K. A. 2, I, 447; 2, V, 364; Arch. Néerl. XIV, 295. — Wint. Kr. Fl. I, 108. — Voir: *Poria.*

29. **Polyporus pallescens** Fr. Ep. 546. — Oud. Rév. I, 363; N. K. A. 2, I, 312; Arch. Néerl. VIII, 348; XIV, 289. — Sacc. Syll. VI, 111. — Wint. Kr. Fl. I; 435.

***Polyporus perennis** (L) Fr. Ep. 531. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 371; N. K. A. 2, V, 361; Arch. Néerl. XIV, 286. — Wint. Kr. Fl. I, 416. — Voir: *Polystictus.*

30. **Polyporus picipes** Fr. Ep. 534. — Oud. Rév. I. 360; T. N. G. XII, 267; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 371; N. K. A. 2, V, 361; Arch. Néerl. XIV, 287; Oud. Fgi Neerl. exs. n° 122. — Sacc. syll. VI, 83. — Wint. Kr. Fl. I, 414.

Polyporus pinicola (Swartz) Fr. Ep. 561. — Wint. Kr. Fl. I, 422. — Voir: *Fomes.*

***Polyporus polymorphus** Rostk. T. N. G. XII, 268. — Wint. Kr. Fl. I, 418. — Voir: *Polystictus.*

***Polyporus populinus** Fr. Ep. 564. — N. K. A. 2, I, 447; Arch. Néerl. XIV, 292. — Wint. Kr. Fl. I, 419. — Voir: *Fomes*.

31. **Polyporus pubescens** (Schum.) Fr. Ep. 553. — Oud. Rév. I, 367; N. K. A. 1, V, 296; Arch. Néerl. XIV, 291. — Sacc. Syll. VI, 135. — Wint. Kr. Fl. I, 128.

***Polyporus purpureus** Fr. Ep. 572. — T. N. G. XII, 268; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 379; Arch. Néerl. XIV, 294. — Wint. Kr. Fl. I, 412. — Voir: *Poria*.

***Polyporus radiatus** (Sow.) Fr. Ep. 565. — N. K. A. 2, V, 363. — Wint. Kr. Fl. I, 418. — Voir: *Polystictus*.

***Polyporus Radula** (P.) Fr. Ep. 578. — T. N. G. XII, 268; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 379; Arch. Néerl. XIV, 295. — Kr. Fl. I, 407. — Voir: *Poria*.

32. **Polyporus resinosus** (Schrad.) Fr. Ep. 554. — Oud. Rév. I, 367; non Rostk.); N. K. A. 2, III, 247; Arch. Néerl. XIV, 291; Oud. Fgi Neerl. exs. n° 227. — Sacc. Syll. V, 137. — Wint. Kr. Fl. I, 427. — P. confluens Rostk. in Sturm Pilze Bd. IV, tab. 34.

***Polyporus Ribis** (Schum.) Fr. Ep. 560. — T. N. G. XII, 268; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 377; N. K. A. 2, I, 447; 2, V, 363; Arch. Néerl. XIV, 292. — Wint Kr. Fl. I, 423. — Voir: *Fomes*.

***Polyporus rosco-poris** Rostk. — N. K. A. 1, V, 296. — Voir: *P. amorphus*.

***Polyporus rufus** (Schrad.) Fr. Ep. 573. — Wint. Kr. Fl. I, 411. — Voir: *Poria*.

***Polyporus salicinus** Fr. Ep. 560. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, 377; N. K. A. 2, V, 263, Arch. Néerl. XIV, 292. — Wint. Kr. Fl. I, 422. — Voir: *Fomes*.

33. **Polyporus salignus** Fr. Ep. 544. — Oud. Rév. I, 369; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 373; N. K. A. 2, I, 447; 2, V, 362; Arch. Néerl. XIV, 288. — Sacc. Syll. VI, 143. — Wint. Kr. Fl. I, 436.

Polyporus sanguinolentus (A. S.) Fr. Ep. 578. — Arch. Néerl. II, 32; XIV, 295; — Wint. Kr. Fl. I, 407. — Voir: *Poria*.

34. **Polyporus Schweinitzii** Fr. Ep. 529. — Oud. Rév. I, 359; N. K. A. 2, III, 245; Arch. Néerl. XIV, 286; Oud. Fgi Neerl. exs. n° 220. — Sacc. Syll. VI, 76. — Wint. Kr. Fl. I, 448.

***Polyporus sinuosus** Fr. Ep. 576. — Wint. Kr. Fl. I, 410. — Voir: *Poria*.

35. **Polyporus spumeus** (Sow.) Fr. Ep. 552. — Oud. Rév. I, 365; N. K. A. 2, VI, 24. — Sacc. Syll. VI, 134. — Wint. Kr. Fl. I, 429.

36. **Polyporus squamosus** (Huds.) Fr. Ep. 532. — Oud. Rév. I, 360; T. N. G. XI, 386; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 371; N. K. A. 2, V, 361 et 586; Arch. Néerl. XIV, 287; Fl. Bat. tab. 730. — Sacc. Syll. VI, 79. — Wint. Kr. Fl. I, 445.

***Polyporus subfusco-flavidus** Rostk. — Fr. Ep. 576. — Wint. Kr. Fl. I, 410. — Voir: *Poria*.

***Polyporus subspadiceus** Fr. Ep. 570. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 378; Arch. Néerl. XIV, 294. — Wint. Kr. Fl. I, 414. Voir: *Poria*.

37. **Polyporus subsquamosus** (L.) Fr. Ep. 523. — Oud. Rév. I, 359; N. K. A. I, V, 296; Arch. Néerl. XIV, 285. — Sacc. Syll. VI, 56. — Wint. Kr. Fl. I, 452.

38. **Polyporus sulphureus** (Bull.) Fr. Ep. 543. — Oud. Rév. I, 362; T. N. G. XI, 386; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 373; N. K. A. 2, I, 146; 2, V, 362; Arch. Néerl. XIV, 288; Fl. Bat. tab. 1255. — Sacc. Syll. VI, 104. — Wint. Kr. Fl. I, 438.

39. **Polyporus tephroleucus** Fr. Ep. 545. — Oud. Rév. I, 362; N. K. A. I, I, 49; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 374; N. K. A. 2, I, 147; 2, V, 362; Arch. Néerl. XIV, 289; Oud. Fgi Neerl. exs. n°. 223. — Sacc. Syll. VI, 108. — Wint. Kr. Fl. I, 436.

40. **Polyporus tomentosus** Rostk. in Sturm Pilze Bd. IV, p. 19 et tab. 81. — Fr. Ep. 526 (sub 16); non Fr. — N. K. A. 3, II, 860.

Polyporus Vaillantii (D. C.) Fr. Ep. 579. — Arch. Néerl. II, 32; XIV, 295. — Wint. Kr. Fl. I, 406. — Voir: *Poria*.

Polyporus vaporarius (P.) Fr. Ep. 579. — N. K. A. 2, I, 147; 2, V, 364; Arch. Néerl. VIII, 348; XIV, 295. — Wint. Kr. Fl. I, 406. — Voir: *Poria*.

11. **Polyporus varius** (P.) Fr. Ep. 535. — Oud. Rév. I, 361; T. N. G. XI, 386; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 371; N. K. A. 2, I, 146; 2, V, 362 et 586; Arch. Néerl. XIV, 287; Fl. Bat. tab. 755. — Sacc. Syll. VI, 84. — Wint. Kr. Fl. I, 443.

Polyporus velutinus (P.) Fr. Ep. 568. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 377; N. K. A. I, I, 50; 2, V, 363; Arch. Néerl. XIV, 293. — Wint. Kr. Fl. I, 416. — Voir: *Polystictus*.

***Polyporus versicolor** (L.) Fr. Ep. 568. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 378; N. K. A. 2, I, 253; 2, I, 147; 2, V, 363; Arch. Néerl. VIII, 348; XIV, 293. — Wint. Kr. Fl. I, 415. — Voir: *Polystictus*.

Polyporus violaceus Fr. Ep. 572. — N. K. A. 2, II, 148; Arch. Néerl. XIV, 291. — Wint Kr. Fl. I, 412. — Voir: *Poria*.

***Polyporus vitreus** (P.) Fr. Ep. 577. — Wint. Kr. Fl. I, 409. — Voir: *Poria*.

***Polyporus vulgaris** Fr. Ep. 577. — N. K. A. 2, V, 364. — Wint. Kr. Fl. I, 408. — Voir; *Poria*.

42. **Polyporus Weinmanni** Fr. Ep. 552. — Oud. Rév. I, 365; N. K. A. 2, III, 246; Arch. Néerl. XIV, 290. — Sacc. Syll. VI, 132. — Wint. Kr. Fl. I, 429.

***Polyporus Wynnei** B. Br. — Wint. Kr. Fl. I, 414. — Voir: *Polystictus*.

***Polyporus zonatus** (Necs) Fr. Ep. 568. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 378; N. K. A. 2, V, 363. Arch. Néerl. XIV, 293. — Wint. Kr. Fl. I, 416. — Voir: *Polystictus*.

POLYSTICTUS.

1. **Polystictus abietinus** (Dicks.) Fr. [1]) et Cooke [2]) — Oud. Rév. I, 378. — Sacc. Syll. VI, 265. — Polyporus arbiet. Fr. Ep. 569. — T. N. G. XI, 386; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 378; N. K. A. 2, V, 363; Arch. Néerl. XIV, 294. — Wint. Kr. Fl. I, 415.

2. **Polystictus Fibula** Fr. et Cooke. — Oud. Rév. I, p. 376. — Sacc. Syll. VI, 239. — Polyporus Fib. Fr. Ep. 567. — N. K. A. 2, III, 249; Arch. Néerl. XIV, 293. — Wint. Kr. Fl. 417.

3. **Polystictus hirsutus** Fr. et Cooke. — Oud. Rév. I, 377. — Sacc. VI, 257. — Polyp. hirs. (Schrad.) Fr. Ep. 567. — N. K. A. 2, I, 447; 2, V, 363; Arch. Néerl. II, 32; XIV; 293. — Wint. Kr. Fl. I, 416.

Polyst. hirs. f^a^ pileo nigricante N. K. A. 3, II, 861.

4. **Polystictus perennis** Fr. et Cooke. — Oud. Rév. I, 376. — Sacc. Syll. VI, 210. — Polyp. perennis (L.) Fr. Ep. 531. — T. N. G. XI, 386; Prodr. Fl. Bat. II, p. 371: N. K. A. 2, I, 446; Arch. Néerl. XIV, 286; Fl. Bat. tab 1280; Oud. Fgi Neerl. exs. tab. 1280. — Wint. Kr. Fl. I, 446.

5. **Polystictus polymorphus** (Rostk.) Fr. et Cooke. — Oud. N. K. A. 3, III, 1086. — Sacc. Syll. VI, 291. — Polyp. polym. Rostk. in Sturm Pilze Bd. IV, p. 115 et tab. 56. — Fr. Ep. 566. — T. N. G. XII, 268. — Wint. Kr. Fl. I, 418.

6. **Polystictus radiatus** (Sow.) Fr. et Cooke. — Oud. N. K. A. 3, II, 664. — Sacc. Syll. VI, 247. — Polyp. radiatus (Sow.) Fr. Ep. 565. — N. K. A. 2, V, 363. — Wint. Kr. Fl. I, 418.

7. **Polystictus velutinus** (P.) Fr. et Cooke. — Oud. Rév. I, 377. — Sacc. Syll. VI, 258. — Polyp. vel. (P.) Fr. Ep. 568. —

---

[1]) E. Fries. Novae Symb. Mycol. p. 51.

[2]) M. C. Cooke. Praecursores ad Monogr. Polypororum, in Grev. 1886, p. 77.

Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 378; N. K. A. I, 50; 2, V, 363; Arch. Néerl. XIV, 293. — Wint. Kr. Fl. I, 416.

8. **Polystictus versicolor** (L.) Fr. et Cooke. — Oud. Rév. I, 377. — Sacc. Syll. VI, 253. — Polyp. versic. (L.) Fr. Ep. 568. — T. N. G. XI, 386; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 378; N. K. A. I, V, 296; 2, I, 447; 2, V, 363 et 586; Arch. Néerl. XIV, 293; Fl. Bat. tab. 1535. — Wint. Kr. Fl. I, 415.

Polyst. versicolor Fr. et Cooke, f^a^ **alba** Oud. Arch. Néerl. VIII, 348 et Rév. I, 377.

9. **Polystictus Wynnei** (B. Br.) Fr. et Cooke. — Oud. N. K. A. 3, II, 664. — Sacc. Syll. VI, 261. — Polyp. Wynnei B. Br. A. N. H. 3, III, 358. — Fr. Ep. 569. — Wint. Kr. Fl. I, 414.

10. **Polystictus zonatus** (Nees) Fr. et Cooke. — Oud. Rév. I, 377. — Sacc. Syll. VI, 260. — Polyp. zon. (Nees) Fr. Ep. 568. — T. N. G. XI, 386; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 378; N. K. A. 2, V, 363; Arch. Néerl. XIV, 293; Fl. Bat. tab. 1505. — Wint. Kr. Fl. I, 416.

FOMES. [1]

1. **Fomes annosus** Fr. et Cooke. — Oud. Rév. I, 374. — Sacc. Syll. VI, 197. — Polyp. annosus Fr. Ep. 561. — N. K. A. 2, I, 447; Arch. Néerl. II, 32; XIV, 292. — Wint. Kr. Fl. I, 419.

2. **Fomes applanatus** (P.) Fr. et Cooke. — Oud. in herb. — Fr. Ep. 557. — Polyp. appl. (P.) Wallr. — Wint. Kr. Fl. I, 425.

3. **Fomes conchatus** (P.) Fr. et Cooke. — Oud. Rév. I, 373. — Sacc. Syll. VI, 174. — Polyp. conch. (P.) Fr. Ep. 560. — Prodr. Fl. Bat. 3, II, 377; N. K. A. 2, I, 447; 2, V, 363; Arch. Néerl. XIV, 292. — Wint. Kr. Fl. I, 423.

4. **Fomes connatus** Fr. et Cooke. — Oud. Rév. I, 374. — Sacc. Syll. VI, 196. — Polyp. conn. Fr. Ep. 563; Arch. Néerl. II, 32; XIV, 292. — Wint. Kr. Fl. I, 421.

5. **Fomes cryptarum** (Bull.) Fr. et Cooke. — Oud. Rév. I, 374. — Sacc. Syll. VI, 205. — Polyp. cryptarum (Bull.) Fr. Ep. 566. — N. K. A. 2, I, 165 et 447; 2, V, 363; Arch. Néerl. VIII, 348 et XIV, 293. — Wint. Kr. Fl. I, 418.

6. **Fomes Evonymi** (Kalchbr.) Fr. et Cooke. — Oud. N. K. A. 3, II, 193. — Sacc. Syll. VI, 182. — Polyp. Evon. Kalchbr.; Fr. Ep. 560. — Wint. Kr. Fl. I, 423.

[1] E. Fries, Novae Symbolae Mycologicae, p. 51.
M. C. Cooke, Praecursores ad Monogr. Polypororum, in Grev. XIII, p. 117.

7. **Fomes fomentarius** (L.) Fr. et Cooke. — Oud. Rév. I, 373. — Polyp. foment. (L.) Fr. Ep. 558; T. N. G. XII, 268; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 376; N. K. A. 2, I, 447; 2, V, 362; Arch. Néerl. XIV, 291. — Wint. Kr. Fl. I, 424.

8. **Fomes fulvus** (Scop.) Fr. et Cooke. — Oud. N. K. A. 3, II, 193. — Sacc. Syll. VI, 182. — Polyp. fulv. (Scop.) Fr. Ep. 559. — T. N. G. XII, 268; Prodr. Fl. Bat. II, p. 377. — Wint. Kr. Fl. I, 424.

9. **Fomes igniarius** (L.) Fr. et Cooke. — Oud. Rév. I, 373. — Sacc. Syll. VI, 180. — Polyp. ign. (L.) — Fr. Ep. 559. — T. N. G. XI, 386; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 376; N. K. A. 2, I, 447; 2; V, 363 et 586; Arch. Néerl. XIV, 292; Fl. Bat. tab. 744. — Wint. Kr. Fl. I, 424.

10. **Fomes lucidus** (Leysser) Fr. et Cooke. — Oud. Rév. I, 372. — Sacc. Syll. VI, 157. — Polyp. lucidus (Leyss.) Fr. Ep. 537. — N. K. A. 2, I, 252; Arch. Néerl. VIII, 348 et XIV, 287; Fl. Bat. tab. 110. — Wint. Kr. Fl. I. 442.

11. **Fomes marginatus** Fr. et Cooke. — Oud. Rév. I, 373. — Sacc. Syll. VI, 168. — Polyp. marg. Fr. Ep. 561. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 377; N. K. A. 2, I, 447; 2, V, 363; Arch. Neerl. XIV, 292. — Wint. Kr. Fl. I, 422.

12. **Fomes Necsii** Fr. et Cooke. — Oud. Rév. I, 374. — Sacc. Syll. VI, 197. — Polyp. Necsii Fr. Ep. 364. — N. K. A. 2, III, 249; Archr Néerl. XIV, 292. — Wint. Kr. Fl. I, 418.

13. **Fomes nigricans** Fr. et Cooke. — Oud. Rév. I, 373. — Sacc. Syll. VI, 680. — Polyp. nigricans Fr. Ep. 558. — T. N. G. XII, 268; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 376; Arch. Néerl. XIV, 291. — Wint. Kr. Fl. I, 424.

14. **Fomes obliquus** (P.) Fr. et Cooke. — Oud. Rév. I, 575. — Sacc. Syll. VI, 206. — Polyp. obl. Fr. 570. Wint. Kr. Fl. I, 414.

15. **Fomes pinicola** (Swartz) Fr. et Cooke. Oud. N. K. A. 3, II, 663. — Sacc. Syll. VI, 167. — Polyp. pinic. Fr. Ep. 561. — Wint. Kr. Fl. I, 422.

16. **Fomes populinus** Fr. et Cooke. — Oud. Rév. I, 374. — Sacc. VI, 197. — Polyp. populinus Fr. Ep. 564. — N. K. A. 2, I, 447; Arch. Néerl. XIV, 292. — Wint. Kr. Fl. I, 419.

17. **Fomes Ribis** (Schum.) Fr. et Cooke. — Oud. Rév. I, 373. — Sacc. Syll. VI, 184. — Polyp. Ribis (Schum.) Fr. Ep. 560. — T. N. G. XII, 268; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 377; N. K. A. 2, I, 447; 2, V, 363 et 586; Arch. Néerl. XIV, 292; Fl. Bat. tab. 745; Oud. Fgi Neerl. exs. n°. 229. — Wint. Kr. Fl. I, 423.

18. **Fomes salicinus** Fr. et Cooke. — Oud. Rév. I, 374. —

Sacc. Syll. VI, 684. — Polyp. salic. Fr. Ep. 561. — T. N. G. XI, 386; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 377; N. K. A. 2, V, 363; Arch. Néerl. XIV, 292; Oud. Fgi Neerl. exs. n° 230. — Wint. Kr. Fl. I, 422.

PORIA. [1]

1. **Poria bathypora** (Rostkov.) Fr. Nov. Symb. — Oud. N. K. A. 3, 1, 457 et Hedw. 1898, p. 187. — Sacc. Syll. VI, 334. — Polyp. bathyporus Bostk. in Sturm Pilze. Bd. IV, p. 121 et tab. 59; Fr. Ep. 580. — Wint. Kr. Fl. I, 453.

2. **Poria bullosa** (Weinm.) Fr. Nov. Symb. — Sacc. VI, 311. — Oud. N. K. A. 3, III, 1086. — Polyp. bullosus Weinm. Fl. Ross. p. 336. — Fr. Ep. 579.

3. **Poria callosa** Fr. Nov. Symb. — Sacc. Syll. VI, 298. — Oud. N. K. A. 3, II, 194. — Polyp. callosus Fr. Ep. 577. — Wint. Kr. Fl. I. 408.

4. **Poria contigua** (P.) Fr. Nov. Symb. — Sacc. Syll. VI, 328. — Oud. Rév. I, 384. — Polyp. contiguus (P.) Fr. Ep. 571. — T. N. G. XI, 386; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 379; Arch. Néerl. XIV, 294. — Wint. Kr. Fl. I, 413.

5. **Poria corticola** Fr. Nov. Symb. — Sacc. Syll. VI, 322. — Oud. Rév. I, 384. — Polyp. corticola Fr. Ep. 580. — T. N. G. XII, 268; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 379; Arch. Néerl. XIV, 296. — Wint. Kr. Fl. I, 406.

6. **Poria ferruginosa** (Schrad.) Fr. Nov. Symb. — Sacc. Syll. VI, 327. — Oud. Rév. I, 384 et Hedw. 1898, p. 187. — Polyp. ferruginosus (Schrad.) Fr. Ep. 571. — T. N. G. XI, 386; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 379; N. K. A. 2, V, 363; Arch. Néerl. XIV, 294. — Wint. Kr. Fl. I, 413.

7. **Poria hibernica** (B. Br.) Fr. Nov. Symb. — Sacc. Syll. VI, 311. — Oud. Rév. I, 383. — Polyp. hibernicus Fr. Ep. 579. — Arch. Néerl. XIV, 295. — Wint. Kr. Fl. I, 406.

8. **Poria laevigata** Fr. Nov. Symb. — Sacc. Syll. VI, 326. — Polyp. laevigatus Fr. Ep. 571. — Oud. N. K. A. 3, II, 861.

9. **Poria makraula** (Rostkov.) Fr. Nov. Symb. — Sacc. Syll. VI, 301. Oud. Rév. I, 382. — Polyp. makraulos Rostkov. in Sturm Pilze Bd. IV, p. 113 et tab. 55. — Arch. Néerl. II, 32; XIV, 294. — Wint. Kr. Fl. I, 412.

10. **Poria Medulla panis** (P.) Fr. Nov. Symb. — Sacc. Syll. VI, 295. — Oud. Rév. I, 381. — Polyp. Med. panis (P.) Fr. Ep.

[1] E. Fries Novae Symbolae Mycologicae. p. 70.

576. — T. N. G. XI, 386; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 379; N. K. A. 2, I, 447; 2, V, 363; Arch. Néerl. XIV, 295. — Wint. Kr. Fl. I, 409.

11. **Poria mollusca** (P.) Fr. Nov. Symb. — Sacc. Syll. VI, 293. — Polyp. molluscus Fr. Ep. 578. — N. K. A. 2, V, 364. — Wint. Kr. Fl. I, 408.

12. **Poria mucida** (P.) Fr. Nov. Symb. — Sacc. Syll. VI, 294. — Oud. Rév. I, 381. — Polyp. mucidus (P.) Fr. Ep. 577. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 379; N. K. A. I, I, 50; 2, V, 364; Arch. Néerl. XIV, 295. — Wint. Kr. Fl. I, 409.

13. **Poria nitida** (P.) Fr. Nov. Symb. — Sacc. Syll. VI, 298. — Oud. Rév. I, 382. — Polyp. nitidus Fr. Ep. 574. — Wint. Kr. Fl. I, 411.

14. **Poria obducens** (P.) Fr. Nov. Symb. — Sacc. Syll. VI, 299. — Oud. Rév. I, 382; N. K. A. 3, III, 1086. — Polyp. obducens Fr. Ep. 577. — T. N. G. XII, 268; Prodr. Fl. Bat. II, 3, 379; N. K. A. 2, I, 447; 2, V, 364; Arch. Néerl. XIV, 295. — Wint. Kr. Fl. I, 408.

15. **Poria Placenta** Fr. Nov. Symb. — Sacc. Syll. VI, 302. — Oud. Rév. I, 382. — Polyp. Pl. Fr. Ep. 572. — N. K. A. 2, V, 159.

16. **Poria purpurea** Fr. Nov. Symb. — Sacc. Symb. VI, 319. — Oud. Rév. I, 384 et N. K. A. 3, II, 665. — Polyp. purpureus Fr. Ep. 572. — T. N. G. XII, 268; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 379; Arch. Néerl. XIV, 294. — Wint. Kr. Fl. I, 412.

17. **Poria Radula** (P.) Fr. Nov. Symb. — Sacc. Syll. VI, 310. — Oud. Rév. I, 383. — Polyp. Radula Fr. Ep. 578. — T. N. G. XII, 268; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 379; Arch. Néerl. XIV, 295. — Wint. Kr. Fl. I, 407.

18. **Poria rufa** (Schrad.) Fr. Ep. Nov. Symb. — Sacc. Syll. VI, 304. — Polyp. rufus Fr. Ep. 573. — Fl. Bat. tab. 1140. Wint. — Kr. Fl. I, 411.

19. **Poria sanguinolenta** (A. S.) Fr. Nov. Symb. — Sacc, Syll. VI, 313. — Oud. Rév. I, 383. — Polyp. sanguinolentus Fr. Ep. 578. — Arch. Néerl. II, 32; XIV, 295. — Wint. Kr. Fl. I, 407.

20. **Poria sinuosa** Fr. Nov. Symb. — Sacc. Syll. VI, 322. — Oud. N. K. A. 3, II, 339. — Polyp. sinuosus Fr. Ep. 576. — Wint. Kr. Fl. I, 410.

21. **Poria subfusco-flavida** (Rostk.) Fr. Nov. Symb. — Sacc. Syll. VI, 325. — Oud. N. K. A. 3, I, 457 et Hedw. 1898, p. 187. — Polyp. subfusco-flavidus Rostk. in Sturm Pilze, Bd. VII, Lief. 27, tab. 11. — Wint. Kr. Fl. I, 410.

22. **Poria subspadicea** Fr. Nov. Symb. Sacc. Syll. VI, 321. — Ond. Rév. I, 384. — Polyp. subspadiceus Fr. Ep. 570. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 378; Arch. Néerl. XIV, 294. — Wint. Kr. Fl. I, 414.

23. **Poria Vaillantii** (D. C.) Fr. Nov. Symb. — Sacc. Syll. VI, 312. — Ond. Rév. I, 383. — Polyp. Vaill. Fr. Ep. 579. — Arch. Néerl. II, 1, 32; XIV, 295. — Wint. Kr. Fl. I, 406.

24. **Poria vaporaria** (P.) Fr. Nov. Symb. — Sacc. Syll. VI, 311. — Ond. Rév. I, 383. — Polyp. vaporarius Fr. Ep. 579; N. K. A. 2, I, 165; 2, V, 364; Arch. Néerl. VIII, 348 et XIV, 295. — Wint. Kr. Fl. I, 406.

25. **Poria violacea** Fr. Nov. Symb. — Sacc. Syll. VI, 319. — Ond. Rév. I, 383. — Polyp. violaceus Fr. Ep. 572. — N. K. A. 2, III, 148; Arch. Néerl. XIV, 291. — Wint. Kr. Fl. I, 412.

26. **Poria vitrea** (P.) Fr. Nov. Symb. — Sacc. Syll. VI, 296. — Ond. Rév. I, 381. — Polyp. vitreus Fr. Ep. 577. — N. K. A. 2, V, 159. — Wint. Kr. Fl. I, 409.

27. **Poria vulgaris** Fr. Nov. Symb. — Sacc. Syll. VI, 292. — Polyp. vulg. Ep. 577. — N. K. A. 2, V, 364. — Wint. Kr. Fl. I, 408.

TRAMETES.

1. **Trametes gibbosa** (P.) Fr. Ep. 583. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 380; N. K. A. 2, V, 364; Arch. Néerl. XIV, 296; Fl. Bat. tab. 1515. — Sacc. Syll. VI, 337. — Wint. Kr. Fl. I, 403.

2. **Trametes hispida** Bagl. — Fr. Ep. 583. — Ond. Rév. I, 386; N. K. A. 2, IV, 223. — Sacc. Syll. VI, 346.

3. **Trametes odora** (L.) Fr. Ep. 584. — Ond. N. K. A. 3, II, 191. — Sacc. Syll. VI, 338. — Wint. Kr. Fl. I, 402.

4. **Trametes protracta** Fr. Ep. 583. — Ond. Rév. I, 386; Arch. Néerl. II, 32; XIV, 296. — Sacc. Syll. VI, 346.

5. **Trametes suaveolens** (L.) Fr. Ep. 584. — T. N. G. XI, 387; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 380; N. K. A. 2, I, 117; 2, V, 384 et 586; Arch. Néerl. XIV, 296; Fl. Bat. tab. 800. — Sacc. Syll. VI, 338. — Wint. Kr. Fl. I, 403.

DAEDALEA.

1. **Daedalea cinerea** Fr. Ep. 588. — T. N. G. XII, 268; N. K. A. 3, II, 662. — Sacc. Syll. VI, 372. — Wint. Kr. Fl. I, 399.

2. **Daedalea confragosa** (Bolt.) Fr. Ep. 587. — Ond. Rév. I, 387; N. K. A. 2, III, 249; Arch. Néerl. XIV, 296. — Sacc. Syll. VI, 372. — Wint. Kr. Fl. I, 399.

3. **Daedalea latissima** Fr. Ep. 589. — Oud. N. K. A. 3, III, 1085. — Sacc. Syll. VI, 383. — Wint. Kr. Fl. 398.

forma **subterranea** Oud. — Polyp. tuberculosus P. — Sacc. Syll. VI, 383, sub. n° 62.

4. **Daedalea Oudemansii** Fr. Ep. 588. — Oud. Rév. I, 387; Arch. Néerl. II, 33; XIV, 297. — Sacc. Syll. VI, 378.

5. **Daedalea quercina** (L.) Fr. Ep. 586. — Oud. Rév. I, 386; T. N. G. XI, 387; XII, 268; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 380; N. K. A. 2, I, 447; 2, V, 364 et 587; Arch. Néerl. XIV, 296; Fl. Bat. tab. 789. — Sacc. Syll. VI, 370. — Wint. Kr. Fl. I, 399.

6. **Daedalea Schulzeri** Poetsch Oost. bot. Zeits. 1879, n° 9. — Oud. N. K. A. 3, II, 194. — Sacc. Syll. VI, 378. — Wint. Kr. Fl. I, 400.

7. **Daedalea unicolor** (Bull.) Fr. Ep. 588. — Oud. Rév. I, 387; T. N. G. XI, 387; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 381; N. K. A. I, V, 296; 2, V, 364; Arch. Néerl. XIV, 297. — Oud. Herb. Ned. Pl. n° 461. — Sacc. Syll. VI, 377. — Wint. Kr. Fl. I, 398.

CERIOMYCES.

1. **Ceriomyces albus** (Cda) Sacc. Syll. VI, 388. — Ptychogaster albus Cda Icon. Fg. II, 24 et tab. XII, fig. 90. — Oud. N. K. A. 2, III, 252; Rév. I, 392.

*PTYCHOGASTER.

***Ptychogaster albus** Cda. — Oud. N. K. A. 2, III, 252; Rév. I, 392. — Voir: *Ceriomyces*. — Cornu, Bull. Soc. bot. de Fr. XXIII. — Séance du 10 Nov. 1876.

MERULIUS.

1. **Merulius aurantiacus** Klotzsch in Hook. Engl. Fl. V, 128. — Fr. Ep. 591. — Oud. Rév. I, 389; N. K. A. 2, V, 160 et 364. — Sacc. Syll. VI, 412. — Wint. Kr. Fl. 397.

***Merulius Carmichaelianus** Oud. N. K. A. 3, I, 458. *A rayer!* Vraisemblablement confondu avec une forme du *Polyporus adustus*.

2. **Merulius Corium** (P.) Fr. Ep. 59. — Oud. Rév. I, 389; Frodr. Fl. Bat. II, 3, p. 381; N. K. A. 2, I, 447; 2, V, 364; Arch. Néerl. XIV, 297. — Sacc. Syll. VI, 413. — Wint. Kr. Fl. 396.

3. **Merulius lacrymans** (Wulf.) Fr. Ep. 594. — Oud. Rév. I,

389; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 381; N. K. A. 2, I, 447, 2, V, 364 et 587; Arch. Néerl. XIV, 298; Fl. Bat. tab. 760. — Sacc. Syll. VI, 419. — Wint. Kr. Fl. I, 394.

4. **Merulius molluscus** Fr. Ep. 592. — Oud. Rév. I, 389. — N. K. A. 2, I, 313 et 447; 2, V, 364; Arch. Néerl. VIII, 349 et XIV. 297. — Sacc. Syll. VI, 416. — Wint. Kr. Fl. I, 396.

5. **Merulius porinoides** Fr. Ep. 593. — Oud. N. K. A. 3, II, 194. — Sacc. Syll. VI, 417. — Wint. Kr. Fl. I, 394.

6. **Merulius pulverulentus** Fr. Ep. 594. — Oud. Rév. I, 390; T. N. G. XI, 387; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 381; Arch. Néerl. XIV, 298; Oud. Herb. v. Ned. Pl. n° 465. — Sacc. Syll. VI, 419.

7. **Merulius rufus** P. — Fr. Ep. 593. — Sacc. Syll. VI; 417. — Wint. Kr. Fl. I, 395. — Oud. in herb.

8. **Merulius serpens** Tode. — Fr. Ep. 593. — Oud. Rév. I, 389; T. N. G. XI, 387; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 381; Arch. Néerl. XIV, 298. — Sacc. Syll. VI, 417. — Wint. Kr. Fl. I, 395.

9. **Merulius tremellosus** Schrad. — Fr. Ep. 591. — Oud. Rév. I, 388; T. N. G. XI, 387; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 381; Arch. Néerl. XIV, 297. — Sacc. Syll. VI, 411. — Wint. Kr Fl. I, 397.

SOLENIA.

1. **Solenia amoena** Oud. N. K. A. 2, V, 160 et 365; Rév. I, 390. — Sacc. Syll. IX, 207.

2. **Solenia anomala** (P.) Fr. Ep. 596. — Oud. Rév. I, 390; N. K. A. 2, V, 364; Arch. Néerl. XIV, 398. — Sacc. Syll. VI, 427. — Wint. Kr. Fl. I, 393. — Peziza poriaeformis D. C. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 402; N. K. A. 2, I, 451.

3. **Solenia candida** P. — Fr. Ep. 596. — Oud. Rév. I, 390; N. K. A. 2, III, 148; Arch. Néerl. XIV, 298. — Sacc. Syll. VI, 424. — Wint. Kr. Fl. I, 392.

Ochrosporae.

PORIA en partie.

†[8] Hydnaceae.

1. Leucosporae.

HYDNUM.

1. **Hydnum argutum** Fr. Ep. 616. — Oud. Rév. I, 405; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 383; N. K. A. 2, V, 365; Arch, Néerl. XIV, 301. — Sacc. Syll. 472. — Wint. Kr. Fl. I, 370.

2. **Hydnum aurantiacum** (Batsch) Fr. Ep. 603. — Oud. Rév. I, 401; N. K. A. 1, V, 334; 2, III, 249; Arch. Néerl. XIV, 299; Oud. Fgi Neerl. exs. n° 112. — Sacc. Syll. VI, 438. — Wint. Kr. Fl. I, 380.

3. **Hydnum Auriscalpium** L. — Fr. Ep. 607. — Oud. Rév. I, 404; T. N. G. XI, 387; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 382; N. K. A. 2, I, 447; 2, V, 365; Arch. Néerl. XIV, 300; Fl. Bat. tab. 1170. — Sacc. Syll. VI, 443. — Wint. Kr. Fl. I, 376.

4. **Hydnum cinereum** Bull. — Fr. Ep. 604. — Oud. Rév. I, 402; N. K. A. 3, I, 234; Arch. Néerl. XIV, 300; Fl. Bat. tab. 1540. — Sacc. Syll. VI, 439. — Wint. Kr. Fl. 379.

5. **Hydnum compactum** P. — Fr. Ep. 603. — Oud. Rév. I, 401; N. K. A. 1, V, 296 et 334; Arch. Néerl. VIII, 350 et XIV, 300; Fl. Bat. tab. 480; Oud. Fgi Néerl. exs. n° 234. — Sacc. Syll. 434. — Wint. Kr. Fl. 377.

6. **Hydnum cyathiforme** Schaeff. — Fr. Ep. 606. — Oud. Rév. I, 404; Arch. Néerl. XIV, 300; Oud. Fgi Néerl. exs. n° 113. — Sacc. Syll. VI, 443. — Wint. Kr. Fl. I, 377. — H. tomentosum Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 382.

7. **Hydnum farinaceum** P. Fr. Ep. 616. — Oud. Rév. I, 404; T. N. G. XII, 268; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 382; N. K. A. 2, I, 448; 2, V, 365; Arch. Néerl. XIV, 301. — Sacc. Syll. VI, 472. — Wint. Kr. Fl. I, 370.

8. **Hydnum ferrugineum** Fr. Ep. 603. — Oud. Rév. I. 402; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 382; N. K. A. 2, V, 365; Arch. Néerl. XIV, 299; Fl. Bat. tab. 1530. — Sacc. Syll. VI, 438. — Wint. Kr. Fl. I, 380.

***Hydnum ferruginosum** Fr. Ep. 613. — Wint. Kr. Fl. I, 372. — Voir: *Caldesiella*, p. 125.

9. **Hydnum fragile** Fr. Ep. 599. — Oud. Rév. I, 400; N. K. A. 2, V, 468; Fl. Bat. tab. 1470. — Sacc. Syll. VI, 134. — Wint. Kr. Fl. I, 383.

10. **Hydnum fusco-atrum** Fr. Ep. 612. — Oud. N. K. A. 3, II, 667. — Sacc. Syll. VI, 168. — Wint. Kr. Fl. I, 372.

11. **Hydnum graveolens** Delastre. — Fr. Ep. 605. — Oud. Rév. II, 404; N. K. A. 2, I, 165; Arch. Néerl. VIII, 349 et XIV, 300. — Sacc. Syll. VI. 442; Wint. Kr. Fl. I, 372.

12. **Hydnum imbricatum** L. — Fr. Ep. 598. — Oud. Rév. I, 399. — Prodr. Fl. Bat. II 3, p. 382; N. K. A. 1, V, 296; 2, V, 587; Arch. Néerl. XIV, 299; Oud. Fgi Néerl. exs. n° 231. — Sacc. Syll. VI, 430. — Wint. Kr. Fl. I, 384.

13. **Hydnum laevigatum** Swartz. — Fr. Ep. 599. — Oud. Rév. I,

109; N. K. A. 1, V. 334; Arch. Néerl. VIII, 349; XIV, 299. — Sacc. Syll. VI, 433. — Wint. Kr. Fl. I, 384.

14. **Hydnum luteo-carneum** Secrétan Mycogr. Suisse, Hydn. n° 26. — Oud. N. K. A. 3, II, 665. — H. Schiedermayeri Heufl. Oest. Zool. bot. Zeits. 1870, p. 33—38; Fr. Ep. 609. — Sacc. Syll VI, 450. — Wint. Kr. Fl. I, 375.

15. **Hydnum melaleucum** Fr. Ep. 606. — Oud. Rév. I, 101; N. K. A. 2, I, 165; 2, V, 365; Arch. Néerl. VIII, 350 et XIV, 300; Fl. Bat. tab. 480; Oud. Fgi Néerl. exs. n° 234. — Sacc. Syll. VI, 443. — Wint. Kr. Fl. I, 377.

16. **Hydnum membranaceum** Bull. — Fr. Ep. 613. — N. K. A. 2, III, 250; 3, II, 194. — Sacc. Syll. VI, 442. — Wint. Kr. Fl. I, 372.

17. **Hydnum nigrum** Fr. Ep. 605. — Oud. Rév. I, 103; N. K. A. 2, III, 250; XIV, 300. — Sacc. Syll. VI, 442. — Wint. Kr. Fl. I, 378.

18. **Hydnum Queletii** Fr. Ep. 605. — Oud. Rév. I, 103; N. K. A. 2, III, 250; Arch. Néerl. XIV, 300. — Sacc. Syll. VI, 441. — Wint. Kr. Fl. I, 378.

19. **Hydnum repandum** L. — Fr. Ep. 601. — Oud. Rév. I, 101; N. K. A. 1, V, 296 et 334; Arch. Néerl. XVI, 299; Fl. Bat. tab. 1130; Oud. Fgi Néerl. exs. n° 232. — Sacc. Syll. VI, 435. — Wint. Kr. Fl. I, 382.

20. **Hydnum rufescens** P. — Fr. Ep. 601. — Oud. Rév. I, 101; T. N. G. XII, 268; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 382; Arch. Néerl. XIV, 299. — Sacc. Syll. VI, 436. — Wint. Kr. Fl. I, 382.

21. **Hydnum scabrosum** Fr. Ep. 599. — Oud. Rév. I, 399; N. K. A. 2, IV, 223; Fl. Bat. tab. 1175. — Sacc. Syll. VI, 431. — Wint. Kr. Fl. I, 383.

Hydnum Schiedermayeri Heufler. — Voir: *H. luteo-carneum.*

22. **Hydnum scrobiculatum** Fr. Ep. 604. — Oud. Rév. I, 102; N. K. A. 2, IV, 224. — Sacc. Syll. VI, 440. — Wint. Kr. Fl. I, 379.

23. **Hydnum squamosum** Schaeff. — Fr. Ep. 598. — Oud. Rév. I, 399; N. K. A. 2, II, 35; Arch. Néerl. VIII, 349 et XIV, 299. — Sacc. Syll. VI, 431. — Wint. Kr. Fl. I, 384.

24. **Hydnum subsquamosum** Batsch. — Fr. Ep. 598. — Oud. Rév. I, 399; N. K. A. 1, V, 334; Arch. Néerl. VIII, 349 et XIV, 299; Fl. Bat. tab. 1161. — Sacc. Syll. VI, 431. — Wint. Kr. Fl. I, 384.

***Hydnum tomentosum** L. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 382. — Voir: *H. cyathiforme.*

25. **Hydnum velutinum** Fr. Ep. 604. — Oud. Rév. I, 402; N. K. A. 2, IV, 223. — Sacc. Syll. VI, 440. — Wint. Kr. Fl. I, 372.

26. **Hydnum viride** (A. S.) Fr. Ep. 614. — Oud. Rév. I, 404; N. K. A. 1, V, 334; Arch. Néerl. 350 et XIV, 301. — Sacc. Syll. VI, 468. — Wint. Kr. Fl. I, 371.

27. **Hydnum zonatum** Batsch. — Fr. Ep. 605. — Oud. Rév. I, 403. — N. K. A. 2, I, 165; 2, I, 447; 2, V, 365; Arch. Néerl. VIII, 349 et XIV, 300; Fl. Bat. tab. 1300; Oud. Fgi Neerl. exs. n° 141. — Sacc. Syll. VI, 441. — Wint. Kr. Fl. I, 378.

CALDESIELLA.

1. **Caldesiella ferruginea** (Fr.) Sacc. Syll. VI, 478. — Oud. N. K. A. 3, III, 1086.

IRPEX.

1. **Irpex candidus** (Ehrenb.) Fr. Ep. 622. — Oud. Rév. I, 408; N. K. A. 2, III, 251; Arch. Néerl. XIV, 303. — Sacc. Syll. VI, 490. — Wint. Kr. Fl. I, 365.

2. **Irpex fusco-violaceus** (Schrad.) Fr. Ep. 620. — Oud. Rév. I, 407; N. K. A. 1, V, 334; Arch. Néerl. II, 33 et XIV, 302; Oud. Fgi Neerl. exs. n° 1. — Sacc. Syll. VI, 483. — Wint. Kr. Fl. I, 366.

3. **Irpex lacteus** Fr. Ep. 621. — Oud. N. K. A. 3, II, 194. — Sacc. Syll. VI, 484. — Wint. Kr. Fl. I, 346.

4. **Irpex obliquus** (Schrad.) Fr. Ep. 622. — Oud. Rév. I, 408; T. N. G. XI, 387; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 383; N. K. A. 2, V, 365; Arch. Néerl. XIV, 302. — Sacc. Syll. VI, 190. — Wint. Kr. Fl. I, 365.

SISTOTREMA.

1. **Sistotrema carneum** Bon. Bot. Zeit, 1857, p. 237. — Fr. Ep. 619. — Oud. Rév. I, 406; N. K. A. 2, I, 166 et 448; 2, V, 365; Arch. Néerl. VIII, 350 et XIV, 302. — Sacc. Syll. VI, 480. — Wint. Kr. Fl. I, 368.

2. **Sistotrema confluens** P. — Fr. Ep. 619. — Oud. Rév. I, 405; N. K. A. 2, I, 448; 2, V, 365; 3, II, 667; Arch. Néerl. VIII, 350 et XIV, 302. — Sacc. Syll. VI, 480. — Wint. Kr. Fl. I, 368.

3. **Sistotrema membranaceum** Oud. Rév. I, 406; Oud. N. K. A.

2, III, 250; 2, VI, 25; 3, II, 667; Arch. Néerl. XIV, 302; Oud. Fgi Néerl. exs. n° 235. — Sacc. Syll. IX, 213. — Wint. Kr. Fl. I, 368.

RADULUM.

1. **Radulum lactum** Fr. Ep. 624. — Oud. Rév. I, 409; N. K. A. 2, III, 251; 2, V, 365; Arch. Néerl. XIV, 303. — Sacc. Syll. VI, 196. — Wint. Kr. Fl. I, 362.

2. **Radulum molariforme** (P.) Oud. N. K. A. 3, II, 340. — Sistotrema molariforme P. Myc. Eur. II, 194 et tab. XXII f. 1. — Radulum molare Fr. El. I, 151 et Ep. 623. — Sacc. Syll. VI, 494. — Wint. Kr. Fl. I, 363.

3. **Radulum orbiculare** Fr. Ep. 623. — Oud. Rév. I, 108, N. K. A. 2, IV, 224. — Sacc. Syll. VI, 193. — Wint. Kr. Fl. I, 364.

4. **Radulum quercinum** Fr. Ep. 623. — Oud. Rév. I, 408; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 383; N. K. A. 2, I, 448; 2, V, 365; Arch. Néerl. XIV, 303. — Sacc. Syll. VI, 194. — Wint. Kr. Fl. I, 363.

PHLEBIA.

1. **Phlebia radiata** Fr. Ep. 625. — Oud. Rév. I, 409; N. K. A. 2, II, 177; 2, V, 365 et 3, III, 1086; Arch. Néerl. XIV, 303. — Sacc. Syll. VI, 198. — Wint. Kr. Fl. I, 362.

2. **Phlebia vaga** Fr. Ep. 625. — Oud. Rév. I, 409; N. K. A. 2, I, 165; Arch. Néerl. VIII, 350 et XIV, 303. — Sacc. Syll. VI, 198. — Wint. Kr. Fl. I, 561.

GRANDINIA.

1. **Grandinia crustosa** (P.) Fr. Ep. 627. — Oud. Rév. I, 409; N. K. A. 2, V, 161 et 366. — Sacc. Syll. VI, 502. — Wint. Kr. Fl. I, 360.

2. **Grandinia granulosa** (P.) Fr. Ep. 626. — Oud in Herb. — Sacc. Syll. VI, 501. — Wint. Kr. Fl. I, 361.

KNEIFFIA.

1. **Kneiffia setigera** Fr. Ep. 628. — Oud. N. K. A. 3, II, 666. — Sacc. Syll. VI, 510. — Wint. Kr. Fl. I, 358.

MUCRONELLA.

1. **Mucronella Ricki** Oud. Beibl. z. bot. Centr. bl. 1902; N. K. A. 3, II, 667.

2. Ochrosporae.

ODONTIA.

1. **Odontia crustulata** Fr. Ep. 628. — Oud. Rév. I, 410; N. K. A. 2, V, 161 et 366.

2. **Odontia hirta** Fuckel. — Fr. Ep. 628. — Oud. Rév. I, 410; N. K. A. 2, V, 468.

†[9] Clavariaceae.

SPARASSIS.

1. **Sparassis crispa** (Wulfen) Fr. Ep. 666. — Oud. N. K. A. 3, II, 195; Fl. Bat. tab. 1690. — Sacc. Syll. VI, 690. — Wint. Kr. Fl. I, 317. — Clavaria crispa Wulf. in Jacq. Miscell. tab. 14 f. 1.

CLAVARIA.

1. **Clavaria abietina** P. — Fr. Ep. 671. — Oud. Rév. I, 437; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 389; N. K. A. 2, I, 449. — Sacc. Syll. VI, 701. — Wint. Kr. Fl. I, 312.

2. **Clavaria amethystina** (Holmsk.) Fr. Ep. 66. — Oud. Rév. I, 435; T. N. G. XII, 269; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 308; Arch. Néerl. XIV, 311. — Sacc. Syll. VI, 693. — Wint. Kr. Fl. I, 316.

3. **Clavaria anomala** Fr. Ep. 674. — Oud. in herb. — Sacc. Syll. VI, 717. — Wint. Kr. Fl. I, 309.

4. **Clavaria apiculata** Fr. Ep. 673. — Oud. N. K. A. 3, II, 670. — Sacc. Syll. VI, 705. — Wint. Kr. Fl. I, 310.

5. **Clavaria argillacea** Fr. Ep. 675. — Oud. Rév. I, 438; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 390; N. K. A. 2, I, 449; 2, V, 368; Arch. Néerl. XIV, 313; Fl. Bat. tab. 814. — Sacc. Syll. VI, 719. — Wint. Kr. Fl. I, 307.

6. **Clavaria aurea** Schaeff. Fr. Ep. 670. — Oud. Rév. I, 437; N. K. A. 1, V, 297; Arch. Néerl. XIV, 312. — Sacc. Syll. VI, 669. — Wint. Kr. Fl. I, 313.

7. **Clavaria Botrytis** P. — Fr. Ep. 667. — Oud. Rév. I, 435; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 387; N. K. A. 2, V, 587; Arch. Néerl. XIV, 311. — Sacc. Syll. VI, 692. — Wint. Kr. Fl. I, 316.

8. **Clavaria byssiseda** P. Fr. Ep. 673. — Oud. Rév. I, 438; T. N. G. XI, 389; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 389; Arch. Néerl. XIV, 313. — Sacc. Syll. VI, 706. — Wint. Kr. Fl. I, 316.

9. **Clavaria caloceriformis** Oud. Beibl. z. bot. Centralbl. 1902; N. K. A. 3, II. 671.

10. **Clavaria cinerea** Bull. — Fr. Ep. 668. — Oud. Rév. I, 436; T. N. G. XI, 388; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 388; N. K. A. 2, V, 368; Arch. Néerl. XIV, 311. — Sacc. Syll. VI, 695. — Wint. Kr. Fl. I, 315.

11. **Clavaria contorta** Holmsk. — Fr. Ep. 677. — Oud. Rév. I, 430; N. K. A. 2, I, 166; 2, V, 368 et 419; Arch. Néerl. VIII, 351 et XIV, 314. — Sacc. Syll. VI, 723. — Wint. Kr. Fl. I, 305.

12. **Clavaria coralloides** L. — Fr. Ep. 668. — Oud. Rév. I, 435; T. N. G. XI, 388; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 388; N. K. A. 2, I, 148; Arch. Néerl. XIV, 311; Fl. Bat. tab. 1115. — Sacc. Syll. VI. 695. — Wint. Kr. Fl. I, 315.

13. **Clavaria crispula** Fr. Ep. 673. — Oud. Rév. I, 438; Arch. Néerl. II, 34 et XIV, 313. — Sacc. Syll. VI, 705. — Wint. Kr. Fl. I, 309.

14. **Clavaria cristata** P. — Fr. Ep. 668. — Oud. Rév. I, 436; T. N. G. XI, 388; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 388; N. K. A. 2, I, 449; Arch. Néerl. XIV, 312; Fl. Bat. tab. 1590. — Sacc. Syll. VI, 694. — Wint. Kr. Fl. I, 315.

15. **Clavaria delicata** Fr. Ep. 670. — Oud. Rév. I, 436, Arch. Néerl. II, 34; XIV, 312. — Sacc. Syll. VI, 699. — Wint. Kr. Fl. I, 313.

16. **Clavaria falcata** P. — Fr. Ep. 678. — Oud. Rév. I, 440; N. K. A. 1, V, 336; 3, II, 672; Arch. Néerl. II, 35; XIV, 314. — Sacc. Syll. VI, 728. — Wint. Kr. Fl. I, 304.

17. **Clavaria fastigiata** L. — Fr. Ep. 667. — Oud. Rév. I, 435; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 388; N. K. A. 2, I, 448; 2, V, 368; Arch. Néerl. XIV, 311; Fl. Bat. tab. 814. — Sacc. Syll. VI, 694. — Wint. Kr. Fl. I, 316.

18. **Clavaria fistulosa** Holmsk. Fl. Dan. tab. 1256; Fr. Ep. 677. — Oud. Rév. I, 439; N. K. A. 1, V, 336; 2, V, 368; Arch. Néerl. VIII, 351 et XIV, 314. — Sacc. Syll. VI, 723. — Wint. Kr. Fl. I, 305.

19. **Clavaria flaccida** Fr. 671. — Oud. Rév. I, 437; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 389; N. K. A. 2, V, 587; Arch. Néerl. XIV, 312. — Sacc. Syll. VI, 702. — Wint. Kr. Fl. I, 311.

20. **Clavaria flava** Schaeff. — Fr. Ep. 666. — N. K. A. 2, I, 448; 2, V, 367 (?). — Sacc. Syll. VI, 692. — Wint. Kr. Fl. I, 317.

21. **Clavaria formosa** P. Ep. 671. — Oud. Rév. I, 437; N. K. A.

I, V, 338; 2, V, 368; Arch. Néerl. VIII, 351; XIV, 312; Fl. Bat. tab. 1305; Oud. Fgi Neerl. exs. n° 115. — Sacc. Syll. VI, 700. — Wint. Kr. Fl. I, 312.

22. **Clavaria fragilis** Holmsk. — Fr. Ep. 675. — Oud. Rév. I, 438; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 390; N. K. A. 2, V, 368; Arch. Néerl. XIV, 314. — Sacc. Syll. VI, 724; Wint. Kr. Fl. I, 307.

23. **Clavaria fuscata** Oud. Arch. Néerl. II, 35; XIV, 314; Rév. I, 439. — Fr. Ep. 678. — Sacc. Syll. VI, 724.

24. **Clavaria fusiformis** Sow. — Fr. Ep. 674. — Oud. Rév. I, 438; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 389; Arch. Néerl. XIV, 313. — Sacc. Syll. VI, 718. — Wint. Kr. Fl. I, 308.

25. **Clavaria Holmskjoldi** Oud. Beibl. z. bot. Centralbl. 1902; id. N. K. A. 3, II, 672.

26. **Clavaria inaequalis** Müll. — Fr. Ep. 674. — Oud. Rév. I, 438; T. N. G. XI, 398; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 389 et 413; N. K. A. 2, V, 368; Arch. Néerl. XIV, 313; Fl. Bat. tab 814. — Sacc. Syll. VI, 719. — Wint. Kr. Fl. I, 308.

27. **Clavaria juncea** (A. S.) Fr. Ep. 677. — Oud. Rév. I, 439; N. K. A. 3, II, 673; Arch. Néerl. XIV, 314. — Sacc. Syll. VI, 724. — Wint. Kr. Fl. I, 305. — Cl. Klotzschii N. K. A. I, V, 335; Arch. Néerl. VIII, 352.

***Clavaria Klotzschii** Lasch. — N. K. A. I, V, 336; Arch. Néerl. VIII, 352. — Voir: *Cl. juncea.*

28. **Clavaria Kromhholzii** Fr. Ep. 669. — Oud. Rév. I, 436; T. N. G. XI, 388; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 388; Arch. Néerl. XIV, 312. — Sacc. Syll. VI, 696. — Wint. Kr. Fl. 314.

29. **Clavaria Kunzei** Fr. Ep. 669. — Oud. Rév. I, 136; T. N. G. XI, 389; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 388; N. K. A. 2, V, 368; Arch. Néerl. XIV, 312. — Sacc. Syll. VI, 696. — Wint. Kr. Fl. I, 314.

30. **Clavaria Ligula** Schaeff. — Fr. Ep. 676. — Oud. N. K. A. 3, II, 673. — Sacc. Syll. VI, 722. — Wint. Kr. Fl. 306.

31. **Clavaria muscoides** L. — Fr. Ep. 667. — Oud. Rév. I, 435; T. N. G. XII, 269; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 388; N. K. A. 2, I, 448; 2, V, 368. — Sacc. Syll. VI, 694. — Wint. Kr. Fl. I, 316.

32. **Clavaria pistillaris** L. — Fr. Ep. 676. — Oud. N. K. A. 3, II, 195. — Sacc. Syll. VI, 722. — Wint. Kr. Fl. I, 306.

33. **Clavaria pyxidata** P. — Fr. Ep. 669. — Oud. Rév. I, 436; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 389; N. K. A. 2, I, 449; Arch. Néerl. XIV, 312. — Sacc. Syll. VI, 698. — Wint. Kr. Fl. I, 314.

34. **Clavaria rosea** Fr. Ep. 674. — Oud. N. K. A. 3, II, 195. — Sacc. Syll. VI, 717. — Wint. Kr. Fl. I, 308.

35. **Clavaria rufescens** Schaeff. — Fr. Ep. 670. — Ond. Rév. I, 437. — Arch. Néerl. II, 34; XIV, 312. — Sacc. Syll. VI, 700. — Wint. Kr. Fl. I, 312.

36. **Clavaria rugosa** Bull. — Fr. Ep. 669. — Oud. Rév. I, 436; T. N. G. XI, 388; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 388; N. K. A. 2, I, 449; Arch. Néerl. XIV, 312; Oud. Herb. Ned. Pl. n° 600. — Sacc. Syll. VI, 696. — Wint. Kr. Fl. I, 414.

37. **Clavaria stricta** P. — Fr. Ep. 673. — Oud. Rév. I, 437. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 389; N. K. A. 1, V, 297; 2, I, 449; 2, V, 368; Fl. Bat. tab. 785; Oud. Herb. v. Ned. Pl. n° 435. — Sacc. Syll. VI, 705. — Wint. Kr. Fl. I, 310.

38. **Clavaria subtilis** P. — Fr. Ep. 669. — Oud. N. K. A. 3, II, 674. — Sacc. Syll. VI, 697. — Wint. Kr. Fl. I, 311.

39. **Clavaria tenuipes** Berk et Br. Ann. Nat. Hist. Ser. 2, Vol. II, n° 369, tab. 9, f. 2. — Oud. N. K. A. 3, III, 1088. — Fr. Ep. 678. — Sacc. Syll. VI, 729.

40. **Clavaria vermiculata** Mich Nova Genera p. 209 et Scop. Carn. II, 483. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 390. — Wint. Kr. Fl. I, 307.

Clavaria vermicularis Fr. Ep. 675. — Oud. Rév. I, 438; Arch. Néerl. XIV, 313. — Voir: *Cl. vermiculata.*

CALOCERA.

Voir sous le chef: **Tremellaceae protoclavarieae.**

TYPHULA.

1. **Typhula elegantula** Karst. Not. Soc. Fenn. XI, 222. — Oud. N. K. A. 3, II, 196. — Sacc. Syll. VI, 748.

2. **Typhula erythropus** (P.) Fr. Ep. 683. — Oud. Rév. I, 441; T. N. G. XI, 389; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 390; Arch. Néerl. XIV, 315. — Sacc. Syll. VI, 744. — Wint. Kr. Fl. I, 382.

3. **Typhula filiformis** (Bull.) Fr. Ep. 685. — Oud. Rév. I, 442; N. K. A. 2, IV, 225. — Sacc. Syll. VI, 749. — Wint. Kr. Fl. I, 299.

4. **Typhula Grevillei** Fr. Ep. 685. — Oud. Rév. I, 442; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 390; N. K. A. 3, II, 675; Arch. Néerl. XIV, 315. — Sacc. Syll. VI, 749. — Wint. Kr. Fl. 299.

5. **Typhula gyrans** (Batsch) Fr. Ep. 684. — Oud. Rév. I, 442; T. N. G. XII, 269; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 390; N. K. A. 2, V, 368; Arch. Néerl. XIV, 315. — Sacc. Syll. VI, 746. — Wint. Kr. Fl. I, 300.

6. **Typhula phacorrhiza** Fr. Ep. 683. — Oud. Rév. I, 441; N. K. A. 1, V, 336; Arch. Néerl. VIII, 352; XIV, 315. — Sacc. Syll. VI, 746. — Wint. Kr. Fl. I, 302.

PISTILLARIA.

1. **Pistillaria Quercus** Oud. N. K. A. 3, II, 674.

2. **Pistillaria quisquiliaris** Fr. Ep. 637. — Oud. Rév. I, 442; N. K. A. 2, I, 166; 2, V, 368; Arch. Néerl. VIII, 352; XIV, 315. — Sacc. Syll. VI, 753. — Wint. Kr. Fl. I, 296.

3. **Pistillaria rosella** Fr. Ep. 688. — N. K. A. 2, VI, 26. — Sacc. Syll. VI, 755.

†[10] Thelephoraceae.

× THELEPHOREAE.

Leucosporae.

CRATERELLUS.

1. **Craterellus cornucopioides** (L.) Fr. Ep. 631. — Oud. Rév. I, 412; N. K. A. 2, III, 251; Arch. Néerl. XIV, 304. — Sacc. Syll. VI, 515. — Wint. Kr. Fl. I, 353.

2. **Craterellus lutescens** (P.) Fr. Ep. 630. — Sacc. Syll. VI, 515. — Wint. Kr. Fl. I, 353. — Crat. sinuosus Oud. Rév. I, 413; N. K. A. 1, V, 335; 2, VI, 25; Arch. Néerl. VIII, 351; XIV, 304.

3. **Craterellus pusillus** Fr. Ep. II, 632. — Oud. N. K. A. 3, III, 1087. — Sacc. Syll. VI, 517. — Wint. Kr. Fl. I, 352.

***Craterellus sinuosus** Voir: *Crat. lutescens.*

STEREUM.

1. **Stereum alneum** Fr. Ep. 644. — Oud. N. K. A. 3, I, 459. — Sacc. Syll. VI, 587. — Wint. Kr. Fl. I, 340.

***Stereum disciforme** (D. C.) Fr. Ep. 642. — T. N. G. XI, 388; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 385; Arch. Néerl. XIV, 306. — Wint. Kr. Fl. 342. — Voir: *Peniophora.*

2. **Stereum frustulosum** (P.) Fr. Ep. 643. — Oud. Rév. I, 418; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 385; Arch. Néerl. XIV, 306. — Sacc. Syll. VI, 572. — Wint. Kr. Fl. I, 342.

3. **Stereum hirsutum** (Willd.) Fr. Ep. 639. — Oud. Rév. I, 418; T. N. G. XI, 388; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 384; N. K. A. 1, V,

297; 2, I, 448; 2, V, 366; Arch. Néerl. XIV, 306. — Oud. Fgi Néerl. exs. n° 238; id. Herb. Ned. Pl. n° 468. — Sacc. Syll. VI, 563. — Wint. Kr. Fl. I, 345.

4. **Stereum lilacinum** P. — Fr. Ep. 639. — T. N. G. XII, 269. — Sacc. Syll. VI, 665.

5. **Stereum ochroleucum** Fr. Ep. 639. — Oud. Rév. I, 417; Arch. Néerl. XIV, 305. — Sacc. Syll. VI, 502. — Wint. Kr. Fl. I, 346. — Corticium ochrol. Fr. — T. N. G. XI, 388; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 385; Arch. Néerl. XIV, 308.

6. **Stereum Pini** Fr. Ep. 643. — Oud. Rév. I, 419; N. K. A. 2, I, 448; Arch. Néerl. XIV, 307. — Sacc. Syll. VI, 574. — Wint. Kr. Fl. I, 341.

7. **Stereum purpureum** P. — Fr. Ep. 639. — Oud. Rév. I, 417; T. N. G. XI, 387; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 384; N. K. A. 2, I, 448; 2, III, 252; 2, V, 366; Arch. Néerl. XIV, 305; Fl. Bat. tab. 1500; Oud. Herb. Ned. Pl. n° 469. — Sacc. Syll. VI, 563. — Wint. Kr. Fl. I, 345.

***Stereum rubiginosum** (Dicks.) Fr. Ep. 641. — T. N. G. XII, 269; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 384; N. K. A. 2, I, 448; 2, V, 366; Arch. Néerl. XIV, 306. — Wint. Kr. Fl. I, 344. — Voir: *Hymenochaete.*

8. **Stereum rugosum** Fr. Ep. 643. — Oud. Rév. I, 418; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 385; Arch. Néerl. XIV, 307. — Sacc. Syll. VI, 572. — Wint. Kr. Fl. I, 342.

9. **Stereum sanguinolentum** (A. S.) Fr. Ep. 640. — Oud. Rév. I, 418; N. K. A. 2, V, 366; Arch. Néerl. II, 33. — Sacc. Syll. VI, 564. — Wint. Kr. Fl. I, 345.

10. **Stereum spadiceum** Fr. Ep. 640. — Oud. Rév. I, 418; N. K. A. I, V, 297; Arch. Néerl. II, 33; XIV, 306; Oud. Fgi Néerl. exs. n° 239; id. Herb. Ned. Pl. n° 467. — Sacc. Syll. VI, 564. — Wint. Kr. Fl. I, 345.

***Stereum tabacinum** (Sow.) Fr. Ep. 641. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 384; N. K. A. 2, I, 448; 2, III, 251; 2, V, 366; Arch. Néerl. XIV, 306. — Wint. Kr. Fl. I, 343. — Voir: *Hymenochaete.*

11. **Stereum vorticosum** Fr. 639. — Oud. in Herb. — Sacc. Syll. VI, 563.

CORTICIUM.

1. **Corticium amorphum** (P.) Fr. Ep. 648. — Oud. N. K. A. 3, II, 196. — Sacc. Syll. VI, 1606. — Wint. Kr. Fl. I, 338. — Aleurodiscus amorphus (P.) Rab. — Oud. Fgi Néerl. exs. n° 285.

2. **Corticium Aurora** Berk. Outl. 276. — Fr. Ep. 657. — Oud. N. K. A. 3, II, 668. — Sacc. Syll. VI, 640.

3. **Corticium caeruleum** (Schrad.) Fr. Ep. 651. — Oud. Rév. I, 422; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 386; Arch. Néerl. XIV, 308. — Sacc. Syll. VI, 614. — Wint. Kr. Fl. I, 335.

4. **Corticium calceum** (P.) Fr. Ep. 652. — Oud. Rév. I, 422; T. N. G. XI, 388; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 386; N. K. A. I, V, 335; 2, V, 367; Arch. Néerl. XIV, 308. — Sacc. Syll. VI, 622. — Wint. Kr. Fl. I, 335.

b. **salicinum** (Wallr.) Fl. Cr. 562, sub Thelephora. N. K. A. I, V, 33.

***Corticium cinereum** Fr. Ep. 654. — T. N. G. XI, 388; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 386; N. K. A. 2, V, 367; Arch. Néerl. XIV, 309. — Voir: *Peniophora.*

5. **Corticium cinnamomeum** (P.) Fr. Ep. 650. — Oud. Rév. I, 422; N. K. A. I, V, 335; Arch. Néerl. VIII, 351; XIV, 308. — Sacc. Syll. VI, 613. — Wint. Kr. Fl. I, 336.

6. **Corticium comedens** (Nees) Fr. Ep. 656. — Oud. Rév. I, 423; N. K. A. 2, V, 367; Arch. Néerl. II, 34; XIV, 309. — Sacc. Syll. VI, 628. — Wint. Kr. Fl. I, 331.

7. **Corticium evolvens** Fr. Ep. 646. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, 385. — Sacc. Syll. VI, 604. — Wint. Kr. Fl. I, 339.

8. **Corticium giganteum** Fr. Ep. 648. — Oud. Rév. I, 421; T. N. G. XI, 388; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 385; N. K. A. 2, V, 366; Arch. Néerl. XIV, 308. — Sacc. Syll. VI, 610. — Wint. Kr. Fl. I, 337.

9. **Corticium incarnatum** Fr. Ep. 654. — Oud Rév. I, 423. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, 386; N. K. A. 2, V, 367; Arch. Néerl. XIV, 309. — Sacc. Syll. VI, 625. — Wint. Kr. Fl. I, 333.

10. **Corticium lacteum** Fr. Ep. 648. — Oud. Rév. I, 422; T. N. G. XI, 388; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 386; N. K. A. 2, I, 448; 2, V, 366; Arch. Néerl. XIV, 308. — Sacc. Syll. VI, 610. — Wint. Kr. Fl. I, 337.

11. **Corticium laeve** P. — Fr. Ep. 649. — Oud. Rév. I, 422; T. N. G. XI, 388; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 386; N. K. A. 2, I, 448; 2, V, 367; Arch. Néerl. XIV, 308. — Sacc. Syll. VI, 611. — Wint. Kr. Fl. I, 336.

12. **Corticium lividum** P. — Fr. Ep. 652. — Oud. Rév. I, 422; N. K. A. 2, V, 367; Arch. Néerl. II, 34; XIV, 308. — Sacc. Syll. VI, 623; Wint. Kr. Fl. I, 334.

13. **Corticium nudum** Fr. Ep. 655. — Oud. Rév. I, 423; N. K. A. 2, V, 367. — Sacc. Syll. VI, 626. — Wint. Kr. Fl. I, 352.

***Corticium ochroleucum** Fr. Ep. I, 557. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 385; Arch. Néerl. IV, 308. — Voir: *Stereum.*

14. **Corticium polygonium** P. — Fr. Ep. 655. — Oud. Rév. I, 423; T. N. G. XI, 188; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 387; N. K. A. 2, V, 367; Arch. Néerl. XIV, 309. — Sacc. Syll. VI, 627. — Wint. Kr. Fl. I, 332.

***Corticium quercinum** (P.) Fr. Ep. 653. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 386; N. K. A. 2, I, 448; 2, V, 367; Arch. Néerl. XIV, 309. — Wint. Kr. Fl. I, 333. — Voir: *Peniophora.*

15. **Corticium radiosum** Fr. Ep. 649. — Oud. Rév. I, 422; T. N. G. XI, 388; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 611; Arch. Néerl. XIV, 308. — Sacc. Syll. VI, 611. — Wint. Kr. Fl. 337.

16. **Corticium roseum** P. — Fr. Ep. 650. — Oud. Rév. I, 422; N. K. A. 2, V, 367. — Sacc. Syll. VI, 611.

***Corticium Sambuci** Fr. Ep. 659. — N. K. A. 2, V, 367; Arch. Nat. II, 34; XIV, 310. — Voir: *Hypochnus.*

17. **Corticium Typhae** (P.) Fuckel Symb. 27. — Fr. Ep. 627. — Oud. Rév. I, 423; N. K. A. I, V, 335; Arch. Néerl. VIII, 351; XIV, 309. — Sacc. Syll. VI, 640. — Wint. Kr. Fl. I, 339.

18. **Corticium sarcoides** Fr. Ep. 647. — N. K. A. 3, II, 861. — Sacc. Syll. VI, 605. — Wint. Kr. Fl. I, 339.

*ALEURODISCUS.

***Aleurodiscus amorphus** (P.) Rab. Fgi Eur. n° 1824. — Oud. Fgi Néerl. exs. n° 285. — Voir: *Corticium amorphum.*

PENIOPHORA.

1. **Peniophora cinerea** (Fr.) Cooke Grev. VIII, 20. — Oud. Rév. I, 424. — Sacc. Syll. VI, 613. — Corticium cinereum Fr. Ep. 654. — T. N. G. XI, 388; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 386; N. K. A. 2, V, 367; Arch. Néerl. XIV, 309. — Wint. Kr. Fl. I, 333.

2. **Peniophora disciformis** (D. C.) Cooke Grev. VIII, 20. — Oud. Rév. I, 424; Sacc. Syll. VI, 642. — Stereum disciforme Fr. Ep. 642; T. N. G. XI, 388; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 386; Arch. Néerl. XIV, 306. — Wint. Kr. Fl. I, 342.

3. **Peniophora quercina** (P.) Cooke Grev. VIII, 20. — Oud. Rév. I, 424. — Sacc. Syll. VI, 641. — Corticium quercinum Fr. Ep. 653; T. N. G. XI, 388; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 386; N. K. A. 2, I, 448; 2, V, 367; Arch. Néerl. XIV, 309; Oud. Herb. Ned. Pl. n° 151. — Wint. Kr. Fl. I, 333.

CYPHELLA.

1. **Cyphella albo-violascens** (A. S.) Karst. Fgi Fenn. exs. n° 715. — Oud. Rév. I, 427. — Sacc. Syll. VI, 669. — Wint. Kr. Fl. I, 326. — Peziza albo-violascens A. S. — T. N. G. XI, 390. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 401.

2. **Cyphella ampla** Lév. — Fr. Ep. 662. — Oud. Rév. I, 427; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 3; N. K. A. 2, I, 448; 2, V, 367; Arch. Néerl. XIV, 10; Oud. Fgi Neerl. exs. n° 114; Fl. Bat. tab. 1074. — Sacc. Syll. VI, 667.

3. **Cyphella Capula** (Holmsk.) Fr. Ep. 664. — Oud. Rév. I, 427; Prodr. Fl. Bat. II, 3, 387; Arch. Néerl. XIV, 310. — Sacc. Syll. VI, 675. — Wint. Kr. Fl. I, 323.

4. **Cyphella fulva** B. Br. A. N. H. 3, VII, 379. — Fr. Ep. 662. — Oud. Rév. I, 427; N. K. A. 2, II, 99; Arch. Néerl. XIV, 310. — Sacc. Syll. VI, 669.

5. **Cyphella galeata** (Schum.) Fr. Ep. 663. — Oud. Rév. I, 429; N. K. A. 1, V, 335; 2, I, 166 et 448; Arch. Néerl. VIII, 351 et XIV, 310. — Sacc. Syll. VI, 682. — Wint. Kr. Fl. I, 324.

6. **Cyphella lacta** Fr. Ep. 664. — Oud. Rév. I, 427; N. K. A. 2, I, 448; 2, V, 367; Arch. Néerl II, 34; XIV, 310. — Sacc. Syll. VI, 675. — Wint. Kr. Fl. I, 323.

***Cyphella Musae** Oud. N. K. A. 2, IV, 211 et V, 161. — Voir: *C. Oudemansii.*

7. **Cyphella muscicola** Fr. Ep. 663. — Oud. Rév. I, 429; N. K. A. 2, I, 448; Arch. Néerl. XIV, 310. — Sacc. Syll. VI, 682. — Wint. Kr. Fl. I, 324.

β. **Intescens** Fr. N. K. A. 2, I, 448.

8. **Cyphella muscigena** (P.) Fr. Ep. 663. — Oud. Rév. I, 429; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 387; N. K. A. 2, I, 488 et 3, III, 1088; Arch. Néerl. XIV, 310. — Sacc. Syll. VI, 681. — Wint. Kr. Fl. I, 324.

9. **Cyphella Oudemansii** Sacc. Syll. VI, 681. — C. Musae Oud. Versl. Med. K. Ak. v. Wet. 2, XVIII, 369; N. K. A. 2, IV, 224; 2, V; 161; Oud. Rév. I, 428.

10. **Cyphella pusilla** Oud. N. K. A. 2, VI, 26. — Sacc. Syll. XI, 132.

11. **Cyphella sulphurea** (Batsch) Fr. Ep. 665. — N. K. A. 3, II, 668. — Sacc. Syll. VI, 679.

12. **Cyphella villosa** (P.) Karst. Mycol. Fenn. III, 325. — Oud. Rév. I, 427. — Sacc. Syll. VI, 678. — Wint. Kr. Fl. I, 323. — Peziza villosa P. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 402; N K. A. 2, I, 451.

2. Ochrosporae.

THELEPHORA.

1. **Thelephora anthocephala** (Bull.) Fr. Ep. 627. — Oud. N. K. A. 3, II, 196. — Sacc. Syll. VI, 528. — Wint. Kr. Fl. I, 350.

2. **Thelephora caryophyllea** (Schaeff.) P. — Oud. Rév. I, 414; T. N. G. XI, 387; Fr. Ep. 631; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 383; N. K. A. 2, I, 148; 2, V, 366; Arch. Néerl. XIV, 304; Fl. Bat. tab. 1260. — Sacc. Syll. VI, 625. — Wint. Kr. Fl. I, 350.

3. **Thelephora cristata** (P.) Fr. Ep. 637. — Oud. Rév. I, 415; N. K. A. 1, V, 335; 2, V, 366; Arch. Néerl. VIII, 531; XIV, 305. — Sacc. Syll. VI, 539. — Wint. Kr. Fl. I, 247.

4. **Thelephora crustacea** Schum. — Fr. Ep. 637. — Oud. in herb. — Sacc. Syll. VI, 541. — Wint. Kr. Fl. I, 346.

5. **Thelephora diffusa** Fr. Ep. 635. — Oud. Rév. I, 415; N. K. A. 2, III, 251; Arch. Néerl. XIV, 304. — Sacc. Syll. VI, 529.

***Thelephora ferruginea** P. — N. K. A. 2, I, 148; Arch. Néerl. II, 33. — Voir: *Hymenochaete tabacina*.

6. **Thelephora intybacea** P. — Fr. Ep. 635. — Oud. Rév. II, p. 710; N. K. A. 3, I, 159. — Sacc. Syll. VI, 536. — Wint. Kr. Fl. 348.

7. **Thelephora laciniata** P. — Fr. Ep. 636. — Oud. Rév. I, 415; N. K. A. 1, V, 290 et 335; Arch. Néerl. XIV, 305; Oud. Fgi Neerl. exs. n° 237; id. Herb. Ned. Pl. n° 470; Fl. Bat. tab. 750 (sous le nom fautif de *Th. terrestris*. — Sacc. Syll. VI, 537. — Wint. Kr. Fl. I, 348.

8. **Thelephora palmata** (Scop.) Fr. Ep. 634. — Oud. Rév. I, 414; N. K. A. 1, V, 335; 2, I, 148; Arch. Néerl. VIII, 315 et XIV, 304; Fgi Néerl. exs. n° 236. — Sacc. Syll. VI, 529. — Wint. Kr. Fl. I, 349.

***Thelephora pannosa** (Sow.) Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 383. — Voir: *Th. Sowerbyi*.

9. **Thelephora radiata** Holmsk. Fr. Ep. 633. — Oud. Rév. I, 414. — Arch. Néerl. II, 33; XIV, 304. — Sacc. Syll. VI, 527. — Wint. Kr. Fl. I, 350.

10. **Thelephora sebacea** P. — Fr. Ep. 637. — N. K. A. 3, II, 669. — Sacc. Syll. VI, 615. — Wint. Kr. Fl. I, 347.

11. **Thelephora Sowerbyi** B. Br. A. N. II, 3, XV, 329. — Fr. Ep. 633. — Oud. Rév. I, 414; Arch. Néerl. XIV, 304. — Sacc. Syll. VI, 522. — Thel. pannosa (Sow.) Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 383.

12. **Thelephora spiculosa** Fr. Ep. 637. — Oud. N. K. A. 3, II, 670. — Sacc. Syll. VI, 539. — Wint. Kr. Fl. 1, 347.

13. **Thelephora terrestris** Ehrh. — Fr. Ep. 635. — Oud. Rév. I, 415; T. N. G. XI, 387; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 384; N. K. A. 2, I, 448; 2, V, 366; Arch. Néerl. XIV, 305. — Sacc. Syll. VI, 536. — Wint. Kr. Fl. 1, 348.

***Thelephora terrestris** Fl. Bat. tab. 750. Voir: — *Th. laciniata.*

HYMENOCHAETE.

1. **Hymenochaete rubiginosa** (Schrad.) Lév. A. S. N. 1846, p. 151. — Oud. Rév. I, 419. — Sacc. Syll. VI, 589. — Stereum rubiginosum Fr. Ep. 641. — T. N. G. XII, 269; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 384; N. K. A. 2, I, 448; 2, V, 366; Arch. Néerl. XIV, 306. — Wint. Kr. Fl. 1, 344.

2. **Hymenochaete tabacina** (Sow.) Lév. A. S. N. 1846, p. 152. — Oud. Rév. I, 419. — Sacc. Syll. VI, 590. — Stereum tabacinum Fr. Ep. 641. — T. N. G. XI, 388; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 384, N. K. A. 2, I, 448; 2, III, 251; 2, V, 366; Arch. Néerl. XIV, 306; Oud. Fgi Neerl. exs. n° 240. — Wint. Kr. Fl. 1, 343. — Thelephora ferruginea P. — N. K. A. 2, I, 448; Arch. Néerl. II, 33.

CONIOPHORA.

1. **Coniophora botryoides** (Schwein.) Oud. N. K. A. 3, II, 667. — Thelephora botr. Schwein. Syn. n° 1050 — Fr. Ep. 660. — Sacc. Syll. VI, 649.

×× HYPOCHNEAE.

HYPOCHNUS.

1. **Hypochnus mollis** Fr. Ep. 660. — N. K. A. 3, II, 197. — Sacc. Syll. VI, 656.

2. **Hypochnus olivaceus** Sacc. Syll. VI, 659. — Oud. N. K. A. 3, II, 197. — A peine Cort. oliv. Fr.

3. **Hypochnus puniceus** (A. S.) Sacc. Syll. VI, 661. — Oud. N. K. A. 3, II, 198. — Corticium puniceum Fr. Ep. 661. — Wint. Kr. Fl. 1, 328; Thelephora puniceа A. S. Consp. 278.

1. **Hypochnus Sambuci** (P.) Sacc. Syll. VI, 656. — Oud. Rév. I, 424. — Corticium Sambuci Fr. Ep. 659. — N. K. A. 2, V, 367; Arch. Néerl. II, 34; XIV, 310. — Wint. Kr. Fl. 1, 328.

5. **Hypochnus subfuscus** Karst. Hattsv. II, 163. — Sacc. Syll. VI, 663. — Oud. in herb.

6. **Hypochnus tristis** Karst. Symb. XI, 71. — Sacc. Syll. VI. 663. — N. K. A. 3, II, 669.

××× EXOBASIDIEAE.

EXOBASIDIUM.

1. **Exobasidium Vaccinii** (Fuck.) Woronin, Verh. Nat. Ges. Freib. IV, Heft 1. — Oud. Rév. I. 125; N. K. A. 2, IV. 511; 2, V. 531. — Sacc. Syll. VI. 664. — Wint. Kr. Fl. I, 322.

†[11] Tremellaceae.

× AURICULARIEAE.

AURICULARIA.

1. **Auricularia mesenterica** (Dicks.) Fr. Ep. 616. Oud. Rév. I. 444; T. N. G. XI. 388; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 391; Arch. Néerl. XIV, 307. — Sacc. Syll. VI. 762. — Wint. Kr. Fl. I, 283.

***Auricularia sambucina** Mart. Erl. 159. — N. K. A. 2, V, 369; Arch. Néerl. XIV, 307. — Wint. Kr. Fl. I, 283. Voir: *Hirneola*.

HIRNEOLA.

1. **Hirneola Auricula Judae** (L.) Berk. Outl. 289. Fr. Ep. 695. — Oud. Rév. I, 145; Fl. Bat. tab. 1465. — Sacc. Syll. VI. 766. — Auricularia sambucina Mart.; N. K. A. 2, V, 369; Arch. Néerl. XIV, 307. — Wint. Kr. Fl. I, 283. — Exidia Aur. Judae Bolt. — T. N. G. XII, 269; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 391.

×× PILACREAE.

PILACRE.

1. **Pilacre Petersii** Berk. Curt. A. N. II. 3, III, n° 824. — Sacc. Syll. IV, 580. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 16.

××× TREMELLEAE.

EXIDIA.

1. **Exidia albida** Bref. Unters. VII, 91. Oud. Rév. I. 446. — Sacc. Syll. VI, 775. — Tremella albida Fr. Ep. 691. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 3; N. K. A. 2, V, 369; Arch. Néerl. XIV, 346.

2. **Exidia glandulosa** (Bull.) Fr. Ep. 691. — Oud. Rév. I, 446; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 39 et 4, 3; N. K. A. 1, I, 50; 2, I, 449; Arch. Néerl. XIV, 317. — Sacc. Syll. VI, 773. — Wint. Kr. Fl. I, 285.

3. **Exidia recisa** (Ditmar) Fr. Ep. 693. — Oud. Rév. I, 446; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 3; N. K. A. 1, V, 336; Arch. Néerl. XIV, 316. — Sacc. Syll. VI, 772. — Wint. Kr. Fl. I, 284.

***Exidia saccharina** Fr. Ep. 694. — N. K. A. 1, V, 337; Arch. Néerl. VIII, 352; XIV, 317. — Voir: *Ulocolla.*

ULOCOLLA.

1. **Ulocolla foliacea** (P.) Bref. Unters. VII, 98. — Oud. Rév. I, 447; Fl. Bat. tab. 1515. — Sacc. Syll. VI, 778. — Tremella foliacea P. Obs. Myc. II, 98. — Fr. Ep. 690. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 392; N. K. A. 2, I, 449; 2, V, 369. — Wint. Kr. Fl. I, 288.

2. **Ulocolla saccharina** (Fr.) Bref. Unters. VII, 87. — Oud. Rév. I, 447. — Sacc. Syll. VI, 777. — Exidia saccharina Fr. Ep. 694. — N. K. A. 1, V, 336; Arch. Néerl. VIII, 352 et XIV, 317. — Wint. Kr. Fl. I, 285.

TREMELLA.

***Tremella albida** Huds Fl. Angl. II, 565. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 3; N. K. A. 2, I, 449; 2, V, 369; Arch. Néerl. XIV, 316. — Wint. Kr. Fl. I, 287. — Voir: *Exidia.*

1. **Tremella aurantia** Schwein. Syn. I, 114. — T. N. G. XII, 269; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 4. — Sacc. Syll. VI, 781. — Wint. Kr. Fl. I, 288.

2. **Tremella fimbriata** P. Obs. Myc. II, 97. — Fr. Ep. 690. — Oud. Rév. I, 448. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 391; N. K. A. 2, I, 449; 2, V, 368. — Sacc. Syll. VI, 780. — Wint. Kr. Fl. I, 288. — Tr. tinctoria P. — N. K. A. 1, I, 50.

***Tremella foliacea** P. Obs. Myc. II, 98. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 392; N. K. A. 2, I, 449; 1, V, 297; 2, V, 369; Arch. Néerl. XIV, 316. — Wint. Kr. Fl. I, 288. — Voir: *Ulocolla.*

3. **Tremella frondosa** Fr. Ep. 690. — Oud. Rév. I, 448; N. K. A. 2, IV, 125. — Sacc. Syll. VI, 780. — Wint. Kr. Fl. I, 288.

4. **Tremella intumescens** Smith Eng. Bot. tab. 1870. — Fr. Ep. 691. — Oud. Rév. I, 448; N. K. A. 2, V, 162 et 369. — Sacc. Syll. VI, 783. — Wint. Kr. Fl. 287.

5. **Tremella lutescens** P. Syn. 622. — Fr. Ep. 690. — Oud.

Rév. I, 448; Prodr. Fl. Bat. II, 4. p. 4; Arch. Néerl. XIV, 316. — Sacc. Syll. VI, 781. — Wint. Kr. Fl. I, 288.

6. **Tremella mesenterica** Retz. Vet. Ak. Handl. 1769, p. 249. — Fr. Ep. 691. — Oud. Rév. I, 448; T. N. G. XI, 389; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 392 et 4, p. 1; N. K. A. 1, V, 297; 2, I, 449; 2, V, 369; Arch. Néerl. XIV, 316; Fl. Bat. tab. 1594 fig. sup.). — Sacc. Syll. VI, 783. — Wint. Kr. Fl. I, 287.

7. **Tremella neglecta** Tul. A. S. N. 1872; p. 222. — Oud. N. K. A. 3, II, 198. — Sacc. Syll. VI, 787.

8. **Tremella sarcoides** (Dickson) Fr S. M. II, 215. — Oud. N. K. A. 3, II, 675; T. N. G. XI, 389. — Sacc. Syll. VI, 792. — Coryne sarcoides Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 392.

***Tremella tinctoria** P. — N. K. A. 1, I, 50. — Voir: *Tr. fimbriata.*

9. **Tremella violacea** Relhan Cant. 442. — Fr. Ep. 692. — Oud. Rév. I, 448; N. K. A. 2, V, 162 et 369. — Sacc. Syll. VI, 785. — Wint. Kr. Fl. I, 286.

*CORYNE.

1. **Coryne sarcoides** Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 392; N. K. A. 2, I, 119. — Voir: *Tremella.*

NAEMATELIA.

1. **Naematelia encephala** Willd. Fr. Ep. 696. — Oud. N. K. A. 3, II, 199. — Sacc. Syll. VI, 793. — Wint. Kr. Fl. I, 282.

2. **Naematelia virescens** (Schum.) Cda Ic. Fg. III, 35. — Fr. Ep. 696. — Oud. Rév. I, 449; N. K. A. 2, V, 369 et 468. — Sacc. Syll. VI, 793. — Wint. Kr. Fl. I, 282.

×××× DACRYMYCETEAE.

DITIOLA.

1. **Ditiola Fagi** Oud. Hedw. XXXVII (1898) p. 313; N. K. A. 3, II, 199. — Sacc. Syll. XVI, 222.

2. **Ditiola radicata** (A. S.) Fr. S. M. II, 170. — Oud. N. K. A. 3, II, 675. — Sacc. Syll. VI, 813. — Wint. Kr. Fl. I, 276.

DACRYOMYCES.

1. **Dacryomyces deliquescens** (Bull.) Duby Bot. Gall. II, 729. — Fr. Ep. 698. — Oud. Rév. I, 450; Arch. Néerl. XIV, 317; id.

Fgi Néerl. exs. n°116. — Sacc. Syll. VI, 798. — Wint. Kr. Fl. I, 277. — Calloria deliq. Tul. — N. K. A. 2, VI, 359. — Dacrymyces tortus Fr. — T. N. G. XII, 269; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 392 et 4, p. 4.

2. **Dacryomyces destructor** Berk. et Ravenel Grev. II, 20. — Oud. N. K. A. 3, III, 1089. — Sacc. Syll. VI, 801.

3. **Dacryomyces hyalinus** Lib. exs. n° 333. — Fr. Ep. 700. — Oud. Rév. I, 150; N. K. A. I, 350; Arch. Néerl. VIII, 352; XIV, 318. — Sacc. Syll. VI, 801. — Wint. Kr. Fl. I, 279.

4. **Dacryomyces nitidus** (Lib.) Coemans Notices, 22. — Oud. Rév. I, 450; N. K. A. I, V, 350; Arch. Néerl. VIII, 352, XIV, 318.

5. **Dacryomyces stillatus** Nees Syst. 89. — Fr. Ep. 669; Oud. Rév. I, 150; T. N. G. XI, 389; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 393 et 4 p. 4; N. K. A. 2, I, 149; Arch. Néerl. XIV, 318. — Sacc. Syll. VI, 798. — Wint. Kr. Fl. I, 278. — Calloria stillata N. K. A. 2, VI, 359.

6. **Dacryomyces succineus** Fr. Ep. 699. — Oud. Rév. I, 450; Arch. Néerl. XIV, 318; Sprée in Rab. Fgi Eur. n° 680. — Sacc. Syll. VI, 801.

***Dacryomyces tortus** Fr. — T. N. G. XII, 269; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 392 et 4, p. 4. — Voir: *D. deliquescens.*

***Dacryomyces Urticae** Fr. S. M. II, 231. — N. K. A. I, I, 50. — Voir: *Cylindrocolla* (Tuberculaceae).

*CALLORIA.

***Calloria stillata** N. K. A. 2, V, 359. — Voir: *Dacryomyces stillatus.*

***Calloria deliquescens** Tul. — N. K. A. 2, VI, 359. — Voir: *Dacryomyces.*

××××× PROTOCLAVARIEAE.

CALOCERA.

1. **Calocera cornea** (Batsch) Fr. Ep. 680. — Oud. Rév. I, 141; T. N. G. XI, 389; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 392; N. K. A. 2, I, 149; 2, V, 369; Arch. Néerl. XIV, 369. — Sacc. Syll. VI, 731. — Wint. Kr. Fl. I, 288.

2. **Calocera palmata** (Schum.) Fr. Ep. 680. — Oud. Rév. I, 440. — N. K. A. 2, IV, 225; 3, II, 861. — Sacc. Syll. VI, 733. — Wint. Kr. Fl. I, 281.

3. **Calocera viscosa** (P) Fr. Ep. 680. — Oud. Rév. I, 140; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 392; Arch. Néerl. XIV, 314; Oud. Fgi. Néerl. exs. n° 241. — Sacc. Syll. VI, 732. — Wint. Kr. Fl. I, 281.

Uredinaceae.

× ENDOPHYLLEAE.

Amerosporae.

ENDOPHYLLUM.

Endophyllum Euphorbiae D. C. — Voir: *Aecidium.*

1. **Endophyllum Sedi** (D. C.) Lév. — Oud. Rév. I, 580; N. K. A. 2, IV, 239. — Sacc. Syll. VII, 767. — Wint. Kr. Fl. I, 580. — F. du *Sedum acre.*

2. **Endophyllum Sempervivi** (A. S.) de Bary. — Oud. Rév. I, 580; N. K. A. 2, VI, 26. — Sacc. Syll. VII, 767. — Wint. Kr. Fl. I, 252. — Caeoma Uredo Sempervivi Lk. — T. N. G. XII, 275. — Uredo Sempervivi A. S. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 175. — F. du *Sempervivum tectorum.*

× × MELAMPSOREAE.

1. Amerosporae.

CRONARTIUM.

1. **Cronartium asclepiadeum** (W.) Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 166; Oud. Rév. I, 509. — Sacc. Syll. VII, 597. — Wint. Kr. Fl. I, 235.

I. *Aecidium*† [1]) (Peridermium Cornui Rostr. et Kleb. Hedw. XXIX, 1890, p. 29; Ber. d. deuts. bot. Ges VIII, 1890, p. (63—66); Zeits. f. Pfl. Krh. II, p. 1—6.

II. *Uredo!* (Uredo Vincetoxici D. C.). — Oud. Rév. I, 510.

III. *Télentospores!* (Caeoma Cronartites Lk. Sp. II, 65. — Oud. Rév. I, 510, (sous III). — Aec. asclepiadeum Wallr.). — Oud. Rév. I, 510.

I. Ecorce du *Pinus silvestris.* — II et III. F. du *Vincetoxicum officinale.* — Kleb. Wirtsw. Rostp. 372.

2. **Cronartium flaccidum** (A. S.) Wint. — Oud. Rév. I, 510. — Sacc. Syll. VII, 598. — Wint. Kr. Fl. I, 236. — Cron. Paeoniae Tul. — N. K. A. 2, I, 88; Oud. Fgi Neerl. exs. n° 268; Oud. Herb. Ned. Pl. n° 187.

I. *Aecidium.* ⊙

[1]) ⊙ Signifie: „inconnu."
† „ : pas encore rencontré dans les Pays-Bas.
! „ : indigène.

II. *Uredo!* (U. Paeoniae Cast. — U. Paeoniarum Desm. — Prod. Fl. Bat. II, 4, p. 175). — Oud. Rév. I, 510.

III. *Télentospores!* (Aecidium Paeoniae Wallr.) — Oud. Rév. I, 510.

II et III. — F. des *Paeonia* cultivés. — Kleb. Wirtsw. Rostp. 373.

***Cronartium Paeoniae** Tul. — N. K. A. 2, I, 88. — Voir: *Cron. flaccidum.*

3. **Cronartium ribicola** Dietr. — Oud. Rév. I, 511; N. K. A. 2, IV, 239 et 515; ibid. 2, V, 631. — Sacc. Syll. VII, 598. — Wint. Kr. Fl. I, 236.

I. *Aecidium!* (Peridermium Strobi Kleb.). — Oud. Rev. I, 511.

II. *Uredo!* Oud. Rév. I, 511.

III. *Télentospores!* Oud. Rév. I, 511.

I. Ecorce du *Pinus Strobus.* — II et III. F. des *Ribes nigrum* et *rubrum.* — Kleb. Wirtsw. Rostp. 382.

MELAMPSORA.

***Melampsora Agrimoniae** (D. C.) Dietel. — Voir: *Pucciniastrum.*

***Melampsora betulina** Wint. — N. K. A. 2, V, 630. — Oud. F. N. exs. n° 12. — Voir: *Melampsoridium.*

***Melampsora Euphorbiae** Tul. — N. K. A. 2, I, 88. — Voir: *M. Helioscopiae.*

1. **Melampsora Helioscopiae** (P.) Cast. Pl. Mars. 205. — Oud. Rév. I, 502; N. K. A. 3, I, 234. — Sacc. Syll. VII, 586. — Wint. Kr. Fl. I, 240. — Mel. Euphorbiae Tul. — N. K. A. 2, I, 88; Oud. Hb. N. Pl. n° 253 (II et III); id. F. N. exs. n° 28 (II).

I. *Caeoma!*

II. *Uredo!* (U. Helioscopiae P. — U. Euphorbiae Helioscopiae et exiguae P. — U. Euphorbiae Rebent. — U. Lecythea Euphorbiae Prodr. Fl. Bat. Bat. II, 4, p. 30; N. K. A. 2, I, 88. — Caeoma Euphorbiacearum T. N. G. XI, 409. — Oud. Rév. I, 502. — Oud. F. N. exs. n° 128.

III. *Télentospores!* (Melampsora Euphorbiae Cast. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 30; N. K. A. 2, I, 88; Oud. Rév. I, 502; Sclerotium herbarum Fr. — T. N. G. XI, 391).

I. F. de *l'Euph. Cyparissias.* — II et III. F. des *Euph. Cyparissias, Esula, exigua, Helioscopia, Peplus.*

2. **Melampsora Hypericorum** (D. C.) Schröt. Brand. u. Rostpilze Schles. I, 26; id. Pilze Schles. I, 363. — Oud. Rév. I, 506. — Sacc. Syll. VII, 591. — Wint. Kr. Fl. I, 241.

I. *Caeoma* ⊙

II. *Uredo!* U. Hypericorum D. C. — Caeoma Hypericorum Lk. — T. N. G. XI. 275; N. K. A. 2, V, 592. — U. Hypericorum Oud. Rév. I, 507; id. F. N. exs. n° 129.

III. *Téleutospores!* (Oud. Rév. I, 507).

II et III. F. des *Hyp. humifusum, montanum, perforatum, pulchrum, quadrangulum.*

3. **Melampsora Lini** Desm. Pl. Cr. de France 1 Série, 1e Ed. n° 2049. — Oud. Rév. I. 503; N. K. A. 2, I, 177; 2, III, 254; 2, V, 588 et 630; Arch. Néerl. VIII, 382; Oud. F. N. exs. n° 11. — Sacc. Syll. VII, 588. — Wint. Kr. Fl. I. 242. — Caeoma Uredo Lini Lk. — T. N. G. XI. 409.

I. *Caeoma* ⊙

II. *Uredo!* U. Lini D. C. — U. Podosporium Lini Prodr. Fl. Bat. II, 1. p. 183; Oud. Rév. I, 503 et F. N. exs. n° 11.

III. *Téleutospores!* Podosporium Lini Lév. — Oud. Rév. I, 503.

II et III. — Parties vertes des *Linum catharticum* et *usitatissimum.*

Le *Melampsora Quercus*, état parfait de l'*Uredo Quercus*, ne compte pas encore parmi les Ch. indigènes de notre pays.

Espèces de **Melampsora**, propres aux espèces de *Salix*.

1. **Melampsora Allii-Fragilis** Klebahn Pringsh. Jahrb. XXXV, p. 671—676; Zeits. f. Pflz. Krankh. XII. p. 2 (extrait); Jahrb. Hamb. wiss. Anstalt XX (II^er Band) p. 5.

I. *Caeoma!* C. Alliorum Lk. Spec. II, 7. — T. N. P. XI. 107; Oud. Rév. I, 587. — C. Allii ursini (D. C.) Wint. Kr. Fl. I, 255. — Uredo Caeoma Alliorum Sacc. Syll. VII, 868.

II. *Uredo* †

III. *Téleutospores* †

I. F. des *Allium Cepa* et *ursinum*. — II et III. F. du *Salix fragilis*. — Kleb. Wirtsw. Rostp. 416.

5. **Melampsora Allii-Salicis-albae** Kleb. Pringsh. Jahrb. XXXV, p. 677—681. Zeits. f. Pflz. Krankh. XII. p. 3 et 5 (extrait); Jahrb. Hamb. wiss. Anst. XX (1902) p. 8.

I. *Caeoma!* C. Alliorum Lk. Spec. II, 7. — T. N. G. XI, 107; Oud. Rév. I. 587. — C. Allii ursini (D. C.) Wint. Kr. Fl. I. 255. — Uredo Caeoma Alliorum Sacc. Syll. VII, 868.

II. *Uredo!* U. epitea Oud. Rév. I, 504 p.p.

III. *Téleutospores!* Melampsora epitea III, Oud. Rév. I, 504 p.p.

I. F. des *Allium Cepa* et *ursinum*. — II et III. F. du *Salix alba*. (Oud. Rév. I, 504, sous Mel. epitea, p. 503); Kleb. Wirtsw. Rostp. 115.

6. **Melampsora Amygdalinae** Kleb. Zeits. f. Pfl. Krkh. 3^er^ Ber., Bd. V; ibid. 7^r^ Ber. Bd. IX. p. 18 et 23; ibid. 10^er^ Ber., Bd. XII, p. 23. — Pringsh. Jahrb. XXXIV, p. 352. — id. Jahrb. Hamb. wiss. Anst. XX, 11^e^ Ber. 1902, p. 4 et 6.

I. *Caeoma!*

II. *Uredo!* — Oud. F. N. exs. n° 15.

III. *Teleutospores!* — Oud. Rév. I, 504, sous *Mel. epitea*.

I, II, III. F. du *Salix amygdalina* (= S. triandra). Espèce autoïque. — Kleb. Wirtsw. Rostp. 113.

7. **Melampsora Larici-Capracarum** Kleb. Zeits. f. Pfl. Krkh. VII, 2 (extr.) et IX, 24 (extr.). — id. Pringsh. Jahrb. XXXIV, 372—376 et XXXV, 685.

I. *Caeoma* †. — C. Laricis Hartig Allg. Forst.- u. Jagd.-Zeit. 1885, p. 326 et Bot. Centrbl. XXIII (1885) p. 24, et XL (1889), p. 310.

II. *Uredo!* U. Caprearum T. N. G. XI, 410; U. Podosporium Capracarum Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 182; Mel. salicina Lév. II. — Oud. F. N. exs., n° 14. — N. K. A. 2, V, 630. — Caeoma Caprearum Schlecht. Fl. Berol. II, 124. — T. N. G. XI, 410.

III. *Teleutospores.* — Oud. Rév. I, 503, sous Mel. farinosa. — N. K. A. 2, V, 630 et Oud. F. N. exs. n° 13, sous Mel. salicina Lév. III; Mel. salicinum Desm. Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 30.

I. Aiguilles du *Larix decidua*. — II. et III. F. des *Salix aurita*, *Capraea* et *stipularis*. — Kleb. Wirtsw. Rostp. 118.

8. **Melampsora Larici-epitea** Kleb. Zeits. f. Pfl. Krkh. IX (1899) p. 12. (Extr.) et XII (1902) p. 19 (Extr.); id. Pringsh. Jahrb. XXXIV, 371 et 376; id. Jahrb. Hamb. wiss. Anst. XX, p. 10.

I. *Caeoma* †. — C. Laricis Hartig.

II. *Uredo!* Oud. F. N. exs. n° 16.

III. *Teleutospores!*

I. Aiguilles du *Larix decidua*. — II et III. F. du *Salix viminalis*. Oud. Rév. I, 504, sous *Mel. epitea*. — Kleb., Wirtsw. Rostp. 120.

9. **Melampsora Orchidi-Repentis** Plowr. Zeits. fr. Pfl. Krkh. I, 131 et VI, 336. — Kleb. Pringsh. Jahrb. XXXIV, 369 et 377. — Mel. Repentis Oud. N. K. A. 3, II, 201.

I. *Caeoma!* — C. Orchidis (Mart.) Oud. Rév. I, 588. — Sacc. Syll. VII, 868. — Wint. Kr. Fl. I, 256.

II. *Uredo!* Melampsora salicina II; N. K. A. 2, V, 630.

III. *Téleutospores* †

I. F. des *Orchis latifolia* et *maculata*. — II et III. F. du *Salix repens*. — Kleb. Wirtsw. Rostp. 426.

10. **Melampsora Ribesii-purpureae** Kleb. Pringsh. Jahrb. XXXV, p. 664. — Zeits. f. Pfl. Krkh. XII, p. 15 (extr.); Jahrb. Hamb. wiss. Ant. XX, p. 16.

I. *Caeoma* †. C. confluens P. Syn. 214 p.p. — Uredo Caeoma confluens Sacc. Syll. 804. — C. Ribis alpini Wint. Kr. Fl. I, 258.

II. *Uredo!* — C. mixtum T. N. G. XI, 410; Oud. Rév. I, 504, sous Mel. mixta.

III. *Téleutospores!* Oud. l. c.

I. F. des *Ribes alpinum* et *Grossularia*. — II et III. F. du *Salix purpurea*. — Kleb. Wirtsw. Rostp. 424.

11.? **Melampsora Ribesii-Viminalis** Kleb. Zeits. f. Pfl. Krkh. IX, p. 13, 15 et 21 (extr.) et XII, p. 14 (extr.); id. Pringsh. Jahrb. XXXIV, 363 et 376; XXXV, 662; id. Jahrb. Hamb. wiss. Anst. XX, p. 16.

I. *Caeoma* † — C. confluens P. Syn. 214, p.p. — Uredo Caeoma confluens Sacc. Syll. VII, 864. — C. Ribis alpini Wint. Kr. Fl. I. 258.

II. *Uredo!* U. epitea T. N. G. XI, 410; Oud. Rév. I, 504; id. F. N. exs. n° 16.

III. *Téleutospores!* Oud. l. c.

I. F. des *Ribes atropurpureum*, *alpinum*, *Grossularia*, *nigrum* et *rubrum*. — II et III. *Salix viminalis*. — Kleb. Wirtsw. Rostp. 419.

12. **Melampsora Vitellinae** (D. C.) Thüm. Hedw. 1879, p. 79 p.p. — Kleb. Zeits. f. Pfl. Krh. V (1895), p. 74 et VI, p. 336. — Oud. Rév. I, 504; N. K. A. 2, II, 183. — Sacc. Syll. VII, 589.

I. *Caeoma* ⊙

II. *Uredo!* U. Vitellinae D. C. Fl. Fr. II, 231. — Oud. Rév. I, 504; N. K. A. 2, V, 589.

III. *Téleutospores!*

II et III. F. du *Salix vitellina*.

Espèces de **Melampsora** propres aux espèces de *Populus*.

13. **Melampsora aecidioides** (D. C.) Schröter Pilze Schles. I, 362. — Kleb. Zeits. f. Pfl. Krkh. 5er Ber. in Bd. VI, p. 12, 17, 336 et 338. — Sacc Syll. VII, 590. — Oud. Rév. I, 505.

I. *Caeoma* † — C. Mercurialis perennis Wint Kr. Fl. I, 257. — Kleb. 6er Ber. in Zeits. f. Pfl. Krkh. Bd. VII, p. 17. — C. aegirinum Lk. Spec. II, 40. — T. N. G. XI, 410.

II. *Uredo!* U. accidioides D. C. Fl. Fr. II, 236. — U. Podosporium accidioides Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 183; U. aegirina, T. N. G. XI, 410; U. populina Lév. — N. K. A. 2, V, 589. — Mel. populina Jacq. II. — N. K. A. 2, V, 630; Oud. Rév. I, 505; id. F. N. exs. n° 18.

III. *Téleutospores!* Oud. Rév. I, 506. — Mel. populina Jacq. III. — N. K. A. 2, V, 630.

I. F. du *Mercurialis perennis*. — II et III. F. des *Populus alba* et *canescens*.

***Melampsora Circaeae** Wint. — Oud. N. K. A. 2, V, 164. — Voir: *Pucciniastrum*.

14. **Melampsora Larici-Tremulae** Kleb. Zeits. f. Pfl. Krkh. VI, 336 et 337; IX, 30; id. Pringsh. Jahrb. XXXIV, 350 et XXXV, 688. — Mel. Tremulae Tul. A. S. N. 4, II, 95. — Oud. Rév. I, 505; N. K. A. 2, II, 183. — Sacc. Syll. VII, 589. — Wint. Kr. Fl. I, 239 (dans une note).

I. *Caeoma* † — C. Laricis Hartig Allg. Forst. u. Jagd. Zeit. 1885; p. 325. — Kleb. 2er Ber. in Zeits. f. Pfl. Krkh. Bd. IV, 12 (Extr.); ibid. Bd. IX (1899) p. 31 et 32 (Extr.); ibid. XII, 25 (Extr.); id. Pringsh. Jahrb. XXXIV, 349, XXXV, 688 et 689.

II. *Uredo!* — U. ovata Strauss Wett. II, 72. — Oud. Rév. I, 505 et F. N. exs. n° 19.

III. *Téleutospores!* — Oud. Rév. I, 505.

I. Aiguilles du *Larix decidua*. — II et III. F. du *Populus Tremula*. — Kleb. Wirtsw. Rostp. 405.

Observation. — Le *Melampsora*, obtenu par l'inoculation des feuilles du *Populus Tremula* avec le *Caeoma Laricis*, s'appelle *Mel. Larici-Tremulae*, tandisque celui, obtenu par l'inoculation avec le *Caeoma Chelidonii* a reçu le nom de *Mel. Magnusiana* Wagner (Zeits. f. Pfl. Krkh. VII, 11 et 17; IX, 32; id. Pringsh. Jahrb. XXXIV, 349; id. Jahrb. Hamb. wiss. Anst. XX, p. 18, et celui, obtenu par l'inoculation avec le *Caeoma Mercurialis perennis: Mel. Rostrupii* Wagn. — Zeits. f. Pfl. Krkh. XII, 26 (Extr.); Pringsh. Jahrb. XXXIV, 349; Jahrb. Hamb. wiss. Anst. XV, p. 18.

15. **Melampsora populina** (Jacq.) Lév. A. S. N. 3, VIII, 375. — Kleb. Zeits. f. Pfl. Krkh. IX (Extr.). — Oud. Rév. I, 506 et Fgi. Neerl. exs. n° 129. — Sacc. Syll. VII, 590. — Wint. Kr. Fl. I, 238. — Lycoperdon populinum Jacq. Collect. V, tab. IX, f. 23.

I. *Caeoma* † — C. Laricis Hartig Bot. Centralbl. Sitz. Ber. d. bot. V. in München, 11 Nov. 1889. — Kleb. 7er Ber. in Zeits. f. Pfl. Krkh. Bd. IX (1899), 27 et 32; 8er Ber. in Pringsh. Jahrb. Bd. XXXIV, 352; 9er Ber. ibid. Bd. XXXV, 691.

II. *Uredo!* U. cylindrica Strauss Wett. II, 92. — Oud. Rév. I, 506; U. Lecythea populina Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 182; Caeoma cylindricum Lk; T. N. G. XI, 409 p.p.

III. *Teleutospores!* Mel. populnea (Jacq.) Cast. Prodr. Fl Bat. II, 1, p. 30. — Oud. F. N. exs. n° 17.

I. Aiguilles du *Larix decidua*. — II et III. F. des *Populus monilifera*, *nigra* et *pyramidalis*.

*Melampsora populnea Cast. Cat. Pl. Mars. 206. — Prodr. Fl. Bat. II, 1, p. 30. — Voir: *Mel. populina*.

*Melampsora Tremulae Tul. — N. K. A. 2, II, 183. — Voir: *Mel. Larici-Tremulae*.

MELAMPSORIDIUM.

I. **Melampsoridium betulinum** (P.) Kleb. Zeits. f. Ptl. Krkh. Bd. IX (1899) p. 7 (Extr.); id. Pringsh. Jahrb. XXXIV, 387; id. Jahrb. Hamb. wiss. Anst. XX, 30. — Melampsora betulina (P.) Desm. Pl. Cr. de Fr. 1re S., 1re Ed. n° 2047; Oud. Rév. I, 507; N. K. A. 2, I, 177; 2, V, 630; Arch. Néerl. 2, VIII, 382. — Sacc. Syll. VII, 592. — Wint. Kr. Fl. I, 238.

I. *Aecidium* † A. Laricis Kleb. 7er Ber. in Zeits. f. Ptl. Krkh. Bd. IX, 1899, p. 4 et 5 (Extr.)

II. *Uredo!* Caeoma Uredo cylindricum T. N. G. XI, 409 p.p.; U. Lecythea betulina Prodr. Fl. Bat. II, 1, p. 182; U. populina var. betulina P. — Oud. Rév. I, 507.

III. *Teleutospores!* Oud. Rév. I, 507.

I. Aiguilles du *Larix decidua*. — F. des *Betula alba*, *nana* et *pubescens*. — Kleb. Wirtsw. Rostp. 101.

MELAMPSORELLA.

*Melampsorella Caryophyllacearum (D. C.) Schröt. — Voir: *M. Cerastii*.

I. **Melampsorella Cerastii** (P.) Wint. Hedw. XIX (1880) p. 56. — Oud. Rév. I, 508; N. K. A. 2, V, 630. — Sacc. Syll. VII, 596. — Melampsora Cerastii Wint. Kr. Fl. I, 242.

I. *Aecidium* † — A. elatinum A. S. — Kleb. Jahrb. Hamb. wiss. Anst. XX, 31. — E. Fischer Zeits. f. Pfl. Krkh. XI, 321 et XII, 193; id. Ber. d. deuts. bot. Ges. XIX (1901), 397.

II. *Uredo!* U. pustulata β. Cerastii P. — Caeoma Caryophyllacearum T. N. G. XI, 108. — U. pustulata a. Caryophyllacearum Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 174. — Melampsorella Caryophyllacearum Schröt. — Oud. F. N. exs. n° 267.

III. *Téleutospores* †

I. Aiguilles de l'*Abies alba*. — II et III. F. des *Cerastium arvense* et *triviale*, et du *Spergularia media*. — Kleb. Wirtsw. Rostp. 396.

2. **Melampsorella Symphyti** (D. C.) Bubak. — Kleb. Wirtsw. Rostp. 401. — Coleosporium Symphyti Fuck. N. K. A. 2, I, 88. — Uredo Symphyti D. C. Encycl. VIII, 232.

I. *Aecidium* † — Aec. columnare Bubak Deuts. bot. Ges. XXI (1903), 356.

II. *Uredo!* Uredo Symphyti D. C. — Voir: sous ce chef.

III. *Téleutospores* †

I. Aiguilles de l'*Abies alba*. — II et III. F. du *Symphytum officinale*.

2. Phragmosporae.

CHRYSOMYXA.

1. **Chrysomyxa Pyrolae** (D. C.) Rostr. Mycol. Not. 126. — Oud. Rév. I, 570. — Sacc. Syll. VII, 761. — Chr. pirolatum Körn. — Wint. Kr. Fl. I, 250. — N. K. A. 2. V, 164 et 631.

I. *Aecidium* ⊙

II. *Uredo!* Oud. Rév. I, 575.

III. *Téleutospores* †

II et III. F. du *Pirola rotundifolia*. — Kleb. Wirtsw. Rostp. 391.

2. **Chrysomyxa Rhododendri** (D. C.) de Bary Bot. Zeit. 1879, p. 809. — Sacc. Syll. VII, 760. — Wint. Kr. Fl. I, 250. — Oud. N. K. A. 3, III, 1090 (Valkenberg; Juill. 1901; Mr. J. Rick S. J.); F. du *Rhod. hirsutum*.

I. *Aecidium* † — A. (Peridermium) abietinum II. A. S. — Kleb. Zeits. f. Pfl. Krkh. I^er Ber. Bd. II, p. 3.

II. *Uredo* † — U. Rhododendri D. C. Fl. Fr. VI. 86.

III. *Téleutospores!*

I. Aiguilles du *Picea excelsa*. — II et III. F. du *Rhododendrum hirsutum*. — Kleb. Wirtsw. Pilze 387.

COLEOSPORIUM.

1. **Coleosporium Campanulae** (P.) Lév. A. S. N. 3, VIII, 373. — Oud. Rév. I, 575; N. K. A. 2, V, 588 et 631. — Sacc. Syll.

VII, 743. —Wint. Kr. Fl. I, 246. — Kleb. Jahrb. wiss. Anst. XX, 25.

I. *Aecidium* ⊙

II. *Uredo!* — U. Campanulae P. — Caeoma Campanularum T. N. G. XI, 108. — U. Coleosporium Campanularum Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 180.

III. *Teleutospores!* Oud. Rév. I, 575.

II et III. F. des *Camp. latifolia* et *Trachelium* (Coleos. Camp. Trachelii Kleb. Wirtsw. Rostp. p. 366); du *Camp. rotundifolia* (Coleosp. Camp. rotundifoliae), et du *Camp. Rapunculus.*

2. **Coleosporium Euphrasiae** (Schum.) Wint. Kr. Fl. I, 246, p.p. — Oud. Rév. I, 573. — Sacc. Syll. VII, 754. — Coleosp. Rhinanthacearum Lév. A. S. N. 3, VIII, 373. — N. K. A. 2, I, 88 et 177; 2, V, 588 et 631; Arch. Néerl. VIII, 382; Oud. F. N. exs. n° 8; id. Herb. Ned. Pl. n° 111.

I. *Aecidium* † — Peridermium Stahlii Kleb. Zeits. f. Pfl. Krkh. 1er Ber. Bd. II, p. 11.

II. *Uredo!* Caeoma Rhinanthacearum T. N. G. XI, 107. — U Rhinanthacearum Prodr. Fl. Bat. II, 1, p. 171; Oud. Rév. I, 573; N. K. A. 2, V, 631.

III. *Teleutospores!* Oud. Rév. I, 573; N. K. A. 2, V, 631.

I. Aiguilles du *Pinus silvestris.* — II et III. F. des *Euphr. verna* (= E. Odontites), Oud. F. N. exs. n° 269, et *officinalis*, et des *Alectorolophus major* Oud. F. N. exs. n° 8, *minor* et *villosus.* — Kleb. Wirtw. Rostp. 369.

3. **Coleosporium Melampyri** (Rebent.) Karst. Mycol. Fenn. IV, 62, p.p. — Oud. Rév. I, 573 n° 3 p.p.; N. K. A. 3, II, 201. — Sacc. Syll. VII, 754 (sub. 5). — Kleb. Zeits. f. Pfl. Krkh. 3er Ber., Bd. V, p. 13—18, et 73; id. 1er Ber., Bd. V, p. 257—260. — Coleosp. Euphrasiae Wint. Kr. Fl. I, 246 p.p. — Coleosp. Rhinanthacearum Lév. — N. K. A. 2, I, 177; Oud. F. N. exs. n° 126, et Herb. Ned. Pl. n° 256.

I. *Aecidium* † Peridermium Sorauer Kleb. Zeits. f. Pfl. Krkh. 3er Ber., Bd. V, p. 18 et 73, et 1er Ber., Bd. V, p. 257—260.

II. *Uredo!* — Caeoma Rhinanthacearum Lk. Spec. II, 12, p.p.

III. *Teleutospores!*

I. Aiguilles du *Pinus silvestris.* — II et III. F. des *Melampyrum arvense* et *pratense.* — Oud. F. N. exs. n° 126. Kleb. Wirtsw. Rostp. 370.

4. **Coleosporium Pulsatillae** (Strauss) Lév. A. S. N. 3, VIII, 1847, p. 273. — Sacc. Syll. VII, 754. — Wint. Kr. Fl. I, 248. — N. K. A. 3, II, 201.

I. *Aecidium* † — Peridermium Jaapii Kleb. Zeits. f. Pfl. Krkh. 10er Ber., Bd. XII, 28—30.

II. *Uredo!* U. Pulsatillae Duby.

III. *Teleutospores!*

I. Aiguilles du *Pinus silvestris.* — II. et III. F. du *Pulsatilla vulgaris.* — Kleb. Wirtsw. Rostp. 372.

***Coleosporium Rhinanthacearum** Fr. — N. K. A. 2, I, 88 et 177; Arch. Néerl. VIII, 382. — Voir: *Col. Euphrasiae* et *Col. Melampyri.*

5. **Coleosporium Senecionis** (P.) Fr. S. V. S. 512. — Sacc. Syll. VII, 751. — Wint. Kr. Fl. I, 248. — Oud. Rév. I, 572; N. K. A. 2, I, 88; 2, V, 117 et 630; Oud. F. N. exs. n° 127; id. Herb. Ned. Pl. n° 145.

I. *Aecidium!* Peridermium oblongisporium Fuck Symb. 42. Kleb. Zeits. f. Pfl. Krkh. 3er Ber., Bd. V, 73. — Oud. l. c.; N. K. A. 3, V, 630.

II. *Uredo!* U. Senecionis P. Syn. 218. — Oud. l. c.; Caeoma Ur. Senecionis T. N. G. XI, 108.

III. *Teleutospores!* Oud. l. c.

I. Aiguilles du *Pinus silvestris.* — II et III. F. des *Sen. aquaticus, Fuchsii* (?), *Jacobaeae, silvaticus* (Oud. F. N. exs. n° 127), *viscosus* et *vulgaris.* — Kleb. Wirtsw. Rostp. 358.

***Colosporium Senecionum** Fuck. — N. K. A. 2, II, 101. — Voir: *Col. Senecionis.*

6. **Coleosporium Sonchi** (P.) Schröt. emend. in Kr. Fl. Schles. I, 368. — Sacc. Syll. VII, 752 (p.p.). — Wint. Kr. Fl. I, 237 (Col. S. arvensis) p.p. — Oud. Rév. I, 574; N. K. A. 2, V, 588 et 631; Oud. F. N. exs. n° 9.

I. *Aecidium* † — Peridermium Fischeri Kleb. Zeits. f. Pfl. Krkh. 3er Ber. Bd. V, 71.

II. *Uredo!* Caeoma Compransor T. N. G. XI, 408 p.p. — U. Coleosp. aureum Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 181; U. Sonchi P.; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 174.

III. *Teleutospores!* Oud. l.c.

I. Aiguilles du *Pinus silvestris.* — II et III. F. des *Sonchus arvensis, asper, oleraceus, palustris.* — Kleb. Wirtw. Rostp. 361.

***Coleosporium Symphyti** Fuck. — N. K. A. 2, I, 88. — Voir: *Melampsorella.*

7. **Coleosporium Tussilaginis** (P.) Lév. Dict. d' Hist. Nat. Art. Urédinées, 19. — Oud. Rév. I, 572. — Sacc. Syll. VII, 752 (sub Col. Sonchi). — Kleb. Zeits. f. Pfl. Krkh. 1er Ber., Bd. II, 2er Ber. Bd. IV, p. 7. — Oud. F. N. exs. n° 10; id. Herb. N. Pl.

n° 256. — Col. Sonchi arvensis (P.) Wint. Kr. Fl. I. 247 (p.p.).

I. *Aecidium* † — Peridermium Plowrightii Kleb. Zeits. f. Pfl. Krkh. 1er Ber., Bd. II. p. 14. — Oud. l. c.

II. *Uredo!* Caeoma Compransor Schlecht. Fl. Berol. II, 119; T. N. G. XI. 108 p.p.; U. Col. Tussilaginis Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 181; Col. Tussilaginis II Oud. F. N. exs. n° 10; Col. Sonchi Wint. II. — N. K. A. 2, V, 631.

III. *Téleutospores!* Oud. l. c. — Col. Sonchi Wint. III; N. K. A. 2, V. 632.

I. Aiguilles du *Pinus silvestris*. — II et III. F. des *Tussilago Farfara* et *Petasites officinalis*. — Kleb. Wirtsw. Rostp. 363.

OCHROPSORA.

1. **Ochropsora Sorbi** (Oud.) Dietel dans Engler et Prantl. Nat. Pfl. Fam. 1er Th., 1e Abth. 5e Bogen 1—3. p. 13. — Kleb. Pringsh. Jahrb. 8er Ber., Bd. XXXIV (1900). p. 383 et 384. — Melampsora Ariae Schlecht. Fuck. Symb. 15. — Oud. Rév. I. 508. — Sacc. Syll. VIII, 592. — Mel. Sorbi Oud. Wint. Kr. Fl. I, 241.

I. *Aecidium* † Aec. elatinum A. S. — Kleb. in Pringsh. Jahrb. 8er Ber. XXXIV (1900). p. 381—386; ibid. XXXV, p. 699; id. Zeits. f. Pfl. Krkh. 2er Ber., Bd. IV, p. 11; 10er Ber. Bd. XII, p. 35. — Aec. leucospermum D. C., sur l'Anemone nemorosa selon Mr. Tranzschel, Centrbl. f. Bacterienkunde 1903. p. 106.

II. *Uredo!* Caeoma Sorbi Oud. N. K. A. 2, I, 177; Arch. Néerl. VIII, 383; F. N. exs. in Rab. F. E. n° 1190.

III. *Téleutospores* † — Melampsora pallida Rostr. Tidsskr. f. Skovbrug II, 153.

F. de l'*Anemone nemorosa!*

I. Aiguilles de l'*Abies alba*. — II et III. F. du *Sorbus Aucuparia*. Kleb. Wirtsw. Rostp. 356.

3. Dictyosporae.

PUCCINIASTRUM.

1. **Pucciniastrum Agrimoniae** (D. C.) Trantzschel Scripta bot. Horti Univ. Imp. Petropol. IV. fasc. 3, p. 399—301. — Magnus Pilzflora v. Franken III, 20. — Thecopsora Agrim. Dietel. Hedw. 1890, p. 155.

I. *Aecidium*. — ⊙

II. *Uredo!* — Uredo Agrim. Magn. in Rab. F. E. n° 2189. — Sacc. Syll. VII, 839. — Wint. Hedw. XIX, 57. — Oud. Rév. I, 586.

2. **Pucciniastrum Circaeae** (Schum.) Spegazz. Decades n° 65. — Oud. Rév. I, 576. — Sacc. Syll. VII, 763. — Melampsora Circaeae Thüm Mycoth. Univ. n° 147. — Wint. Kr. Fl. I, 243. — N. K. A. 2, V, 161 et 630.

I. *Aecidium* ⊙

II. *Uredo!* — U. Circaeae Schum. Saell. II, 228. — Oud. Rév. I, 577.

III. *Téleutospores* †. Oud. Rév. I, 577.

II et III. F. du *Circaea lutetiana.*

3. **Pucciniastrum Epilobii** (P.) Otth Bern. Mitth. 1861, p. 72. — Oud. Rév. I, 576. — Sacc. Syll. VII, 762. — Melampsora Epilobii Wint. Kr. Fl. I, 243.

I. *Aecidium* †. Aec. elatinum A. S. — Kleb. Zeits. f. Pfl. Krh. 7er Ber., Bd. IX (23), p. 9; Pringsh. Jahrb. XXXIV, p. 386 et XXXV, p. 496.

II. *Uredo!* Oud. Rév. I, 576. U. pustulata b. Epilobiorum Prodr. Fl. Bat. II, 1, p. 174.

III. *Téleutospores* †. Oud. Rév. I, 576.

I. Aiguilles de l'*Abies alba.* — II et III. F. de l'*Epilobium angustifolium.* — Kleb. Wirtsw. Rostp. 393.

THECOPSORA.

1. **Thecopsora areolata** (Wallr.) Magn. Bot. Zeit. 1875, p. 501 et Hedw. XIV, 123. — Oud. Rév. I, 577; N. K. A. 2, II, 183 (um). — Sacc. Syll. VII, 764. — Melampsora Padi Wint. Kr. Fl. I, 244. — Thecopsora Padi Plowr. — N. K. A. 2, V, 630. Pucciniastrum Padi (Kze u. Schm.) Dietel. — Kleb. Wirtsw. Rostp. 394.

I. *Aecidium* † — Aec. strobilinum (A. S.) Rees, Rostpilzformen der deuts. Coniferen. [1]) — Kleb. Pringsh. Jahrb. 8er Ber., Bd. XXXIV, p. 378 et XXXV, p. 695.

II. *Uredo!* — U. Padi Kze u. Schm. Exs. n° 187. Prodr. Fl. Bat. II, 1, p. 174; Oud. Rév. I, 577.

III. *Téleutospores* † — Oud. l. c.

I. Ecailles des cônes du Picea excelsa. II et III. F. du *Prunus Padus.*

[1]) Abh. d. nat. Ges. zu Halle XI (1869), p. 105.

Thecopsora Padi Plowr. — N. K. A. 2, V, 630. — Voir: *Th. areolata.*

2. **Thecopsora Pirolae** (Gmel.) Karst Myc. Fenn. IV, 59. — Oud. Rév. I. 578. — Sacc. Syll. VII. 766.

I. *Aecidium* ⊙

II. *Uredo!* U. Pyrolae Mart. Fl. Mosq. 229. — Wint. Kr. Fl. I, 254. — Oud. Rév. I, 578 et F. N. exs. n° 266. — Caeoma Pyrolae Lk. Spec. II, 15. — N. K. A. I, 55.

III. *Teleutospores* †

II et III. F. des *Pirola minor* et *rotundifolia.*

3. **Thecopsora Vaccinii orum** (Lk) Karst. Myc. Fenn. IV. 58. — Oud. Rév. I. 578. — Sacc. Syll. VII, 765. — Melampsora Vaccinii (A. S.) Wint. Kr. Fl. I. 244. — Aecidium Myrtilli Franq. in Prodr. Fl. Bat. II, 4. p. 169.

I. *Aecidium* ⊙

II. *Uredo!* U. Vacciniorum Johnst. Fl. Berwicksh. II, 199. — Oud. Rév. I. 578; N. K. A. 2, II, 38; Arch. Néerl. VIII 383.

III. *Teleutospores* † Oud. l. c.

II. F. des *Pirola minor* et *rotundifolia.*

CALYPTOSPORA.

1. **Calyptospora Göppertiana** Kühn Hedw. 1869, p. 81. — Oud. Rév. I, 579; N. K. A. 2. II, 38. — Sacc. Syll. VII. 766. — Melampsora Göppertiana Wint. Kr. Fl. I, 245.

I. *Aecidium* † — Aec. columnare Alb. et Schwein. Consp. 121.

II. *Uredo* ⊙

III. *Teleutospores!* Oud. l. c.

I. Aiguilles de l'*Abies alba.* — III. Tiges du *Vaccinium Oxycoccos.*

××× PUCCINIEAE.

1. Amerosporae.

UROMYCES.

1. **Uromyces Acetosae** Schröt. Rab. F. E. n° 2080 et Pilze Schles. I, 304. — Oud. Rév. I, 493. — Sacc. Syll. VII, 537. — Wint. Kr. Fl. I, 155.

I. *Aecidium!* Aec. Rumicum P. Syn. 207 p.p.

II. *Uredo!* Caeoma Rumicum T. N. G. XI, 407, p.p. — U. Rumicum Prodr. Fl. Bat. II, 1, p. 176; Oud Rév. I, 493.

III. *Teleutospores!* Oud. l. c.

I, II, III. — F. du *Rumex Acetosa*.

2. **Uromyces Alchemillae** (P.) Lév. A. S. N. 3, VIII, 371. — Oud. Rév. I, 499. — Sacc. Syll. VII, 553. — Wint. Kr. Fl. I, 146.

I. *Aecidium* ⊙

II. *Uredo!* U. Alchemillae Oud. — Prodr. Fl. Bat. I, 4, p. 171. — Oud. l.c.

III. *Téleutospores!* Oud. l.c.

II et III. F. de l'*Alchemilla vulgaris*.

3. **Uromyces ambiguus** (D. C.) Fuck Symb. 64. — Sacc. Syll. VII, 543.

I. *Aecidium* ⊙

II. *Uredo!* U. ambigua D. C. Fl. Fr. VI, 64. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, 173. — Oud. Rév. I. 514, sous 5.

III. *Téleutospores* †

II et III. — F. de l'*Allium Scorodoprasum*.

4. **Uromyces Anthyllidis** (Grev.) Schröt. Hedw. 1875, p. 162, et Pilze Schles. I, 308. — Oud. Rév. I, 498; N. K. A. 2, V, 626. — Sacc. Syll. VII, 551. — Urom. Trifolii N. K. A. 2, I, 176; Arch. Néerl. VIII, 382.

I. *Aecidium* ⊙

II. *Uredo!* U. Anthyllidis Grev. — Oud. l. c.

III. *Téleutospores!* Oud. l. c.

II et III. F. de l'*Anthyllis Vulneraria*.

***Uromyces appendiculatus** (P.) Lév. p.p. — Voir: *Urom. Fabae*, *Phaseoli* et *Pisi*.

5. **Uromyces Bernlae-Scirpi** Kleb. Wirtsw. Pilze 327.

I. *Aecidium!*

II. *Uredo* †

III. *Téleutospores* †

I. F. du *Sium* (*Berula*) *angustifolium*; II et III † sur *Scirpus maritimus*. — Kleb. Wirtsw. Rostp. 327.

6. **Uromyces Betae** (P.) Tul. A. S. N. 4, II, 89. — Oud. Rév. I, 429. — Sacc. Syll. VII, 536. — Wint. Kr. Fl. I, 155. — Caeoma Betarum T. N. G. XI, 407. — Uredo Betae P.: Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 175.

I. *Aecidium* †. Aec. Betae Kühn, Bot. Zeit. 1869, p. 542.

II. *Uredo!* U. Betae P. — Oud. l. c.

III. *Téleutospores!* Oud. l. c.

I, II, III. F. du *Beta vulgaris* L. var.: *Rapa* Dum.

7. **Uromyces Cacaliae** (D. C.) Ung. Einfl. d. Bodens. — Sacc. Syll. VII, 560. — Wint. Kr. Fl. I, 152. — Oud. Rév. I, 500.

I. *Aecidium!*

II. *Uredo* ⊙

III. *Téleutospores!* Caeoma Compransor T. N. G. XI, 408.

Uredo Cacaliae Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 175.

I et III. F. de l'*Adenostyles* (Cacalia) *alpina* cultivé.

8. **Uromyces caryophyllinus** (Schrank) Wint. Kr. Fl. I, 149. — Oud. Rév. I, 197. — Sacc. Syll VII, 515. — Uredo bullatum West. in Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 177.

I. *Aecidium* ⊙

II. *Uredo!* Oud. l. c. p. 198.

III. *Téleutospores!* Oud. l. c. p. 198.

II et III. F. du *Dianthus prolifer.*

9. **Uromyces Dactylidis** Otth Verh. Bern., nat. Ges 1861, p. 85. — Oud. Rév. I, 491; N. K. A. 2, V, 591 et 626. — Sacc. Syll. VII, 540. — Wint. Kr. Fl. I, 161.

I. *Aecidium!* Aec. Ranunculi bulbosi Plowr. Grev. XIII, 53. — Caeoma Ranunculaceatum T. N. G. XI, 410. — Aec. Ranunculacearum N. K. A. 2, V, 591.

II. *Uredo!* Oud. l. c.

III. *Téleutospores!* Puccinella Graminis Fuck. Symb. 61. — N. K. A. 2, III, 154.

I. F. des *Ranunc. bulbosus* et *r. peus.* — Rostr. Hamb. wiss. Anst. XX, p. 37. — II et III. F. du *Dactylis glomerata.* — Kleb. Wirtsw. Rostp. 323.

10. **Uromyces excavatus** (D. C.) Wint. Kr. Fl. I, 144 (sub 185) pp. — Oud. Rév. II, p. 414. — Sacc. Syll. VII, 552 pp.

I. *Aecidium* †

II. *Uredo!* U. excavata D. C. Syn. Pl. 47.

III. *Téleutospores!* U. laevis Körnicke Hedw. 1877, p. 38. — U. scutellatus Oud. F. N. exs. n° 114.

I, II, III. F. de l'*Euphorbia Gerardiana.*

11. **Uromyces Fabae** (Pers.) de Bary A. S. N. 4, XX, 80. — Oud. Rév. I, 188; N. K. A. 2, I, 90 et 2, V, 591. — U. Orobi Wint. Kr. Fl. I, 158. — Sacc. Syll. VII, 531. — N. K. A. 2, V, 625. — Caeoma appendiculatum T. N. G. XI, 109 (p.p.). — Caeoma Leguminosarum T. N. G. XII, 275 (p.p.). — Urom. Leguminosarum Desm. a. Vicіarum et c. Faberum Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 172. — Uredo Leguminum Desm. Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 172. Puccinia Fabae Lk. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 164.

I. *Aecidium!* Aec. Ervi Wallr. — N. K. A. 3, II, 200 et Oud. F. N. exs. n° 216. — Aec. Orobi P. — Oud. Rév. I, 188. — Aec. Viciae Rab. — Oud. Rév. I, 186.

II. *Uredo!* U. Fabae P. — N. K. A. 2, V, 591; Oud.

F. N. exs. n° 51 et n° 247; id. Herb. Nl. Pl. n° 5 (Sur Vicia Faba et Ervum hirsutum).

III. *Téleutospores!* Oud. F. N. exs. n° 112 (Vicia Faba) et n° 247 (Ervum hirsutum); id Herb. Nl. Pl. n° 541.

I. F. des *Ervum hirsutum* et *Orobus tuberosus*. — II et III. F. et tiges des *Ervum hirsutum* et *tetraspermum*, *Orobus tuberosus*, *Vicia Cracca*, *dumetorum*, *Faba*, *sativa*, *sepium*.

12. **Uromyces Ficariae** (Schum.) Lév. Dict. d'Hist. Nat. Art. Uréd. p. 19. — Oud. Rév. I, 501; N. K. A. 2, I, 176; 2, V, 591 et 626; Arch. Néerl. VIII, 381. — Sacc. Syll. VII, 568. Wint. Kr. Fl. I, 141. — Kleb. Jahresb. Hamb. wiss. Anst. XX, 38. — Caeoma Uredo Ficariae T. N. G. XII, 275. Urocystis Ficariae A. S. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, 176.

I. *Aecidium* ⊙

II. *Uredo* (rare; au commencement de l'évolution).

III. *Téleutospores!* Oud. Rév. I, 501.

II et III. — F. du *Ficaria verna*.

Observation. L'Aec. Ficariae fait partie du cycle d'évolution de l'Uromyces Poae.

13. **Uromyces Genistae tinctoriae** (P.) Wint. Kr. Fl. I, 116. — Oud. Rév. I, 498; N. K. A. 2, IV, 514. — Sacc. Syll. VII, 550.

I. *Aecidium* ⊙

II. *Uredo!*

III. *Téleutospores!* — Caeoma apiculatum T. N. G. XI, 409 p.p. — Uredo apiculata Prodr. Fl. Bat. II, 1, p. 172.

II et III. F. des *Cytisus Laburnum* et *sessilifolius*, et *Genista anglica*.

14. **Uromyces Geranii** (D. C.) Oud. et Wartmann Schweiz Krypt. n° 401. — Oud. Rév. I, 491; N. K. A. 2, I, 90 et 176; 2, V, 626; Arch. Néerl. VIII, 382. — Sacc. Syll. VII, 535. — Wint. Kr. Fl. I, 160.

I. *Aecidium!* Aec. Geranii D. C. — N. K. A. 2, I, 173, sous Puccinia; Arch. Néerl. VIII, 375.

II. *Uredo!* U. Geranii D. C. Fl. Fr. VI, 73. — Oud. Herb. Nl. Pl. n° 575.

III. *Téleutospores!* Oud. Herb. Nl. Pl. n°. 575.

I. F. du *Geranium dissectum*. — II et III. F. d'une espèce de *Geranium* cultivée (G. pyrenaicum?)

15. **Uromyces Junci** (Desm.) Tul. A. S. N. 4, II (1854), 116. — Sacc. Syll. VII, 541. — Wint. Kr. Fl. I, 162. — N. K. A. 2, V, 626; 3, II, 200 et 718. — Puccinia Junci Desm. Exs. 1ère S., 1ère Ed. n° 81; 2e Ed. n° 170.

I. *Aecidium!* Aec. zonale Duby. — N. K. A. 2, VI, 284: 3. II. 200.

II. *Uredo!*

III. *Téleutospores!*

I. F. du *Pulicaria dysenterica.* — II et III. F. des *Juncus glaucus* et *lamprocarpos.* — Kleb. Wirtw. Rostp. 329.

***Uromyces Lathyri** Fuck. — N. K. A. 2. II. 182. — Voir: *Urom. Pisi.*

***Uromyces Leguminosarum** Desm. a. et b. — Prodr. Fl. Bat. II, 4. p. 172. — Voir: *Urom. Fabae.*

16. **Uromyces Limonii** (D. C.) Lév. Dict. d'Hist. Nat. Art. Uredo p. 19. — Oud. Rév. I, 489 et F. N. exs. n° 248: N. K. A. 2, III, 251. — Sacc. Syll. VII. 532. — Wint. Kr. Fl. I, 156. — Caeoma sparsum T. N. G. XI, 408. — Puccinia Limonii D. C. Fl. Fr. II, 595.

I. *Aecidium!* Aec. Statices Desm. — Oud. Rév. I. 489: N. K. A. 3. I. 463. — Aec. Limonii Duby.

II. *Uredo!* Urom. Statices Desm. — Oud. Rév. I, 489 et F. N. exs. n° 248. — U. Armeriae Duby.

III. *Téleutospores!* Uredo Limonii Duby. — Oud. F. N. exs. n° 248 (Statice Limonium).

I. II, III. F. de l'*Armeria vulgaris* et du *Statice Limonium.*

17. **Uromyces Maritimae** Plowr. Gard. Chron. 1890, I. p. 682 et 746. — Oud. Rév. I. 496.

I, *Aecidium!* — Aec. Glaucis Dozij et Molk. T. N. G. XII, 286 et tab. VI f. 1—3: Prodr. Fl. Bat. II. 4. p. 167. — Sacc. Syll. VII. 818. — Wint. Kr. Fl. I, 262. — Oud. Rév. I, 496.

II. *Uredo* †

III. *Téleutospores* †

I. F. du *Glaux maritima.* — II et III. F. du *Scirpus maritimus.* — Kleb. Wirtsw. Rostp. 328.

***Uromyces Medicaginis falcatae** (D. C.) Wint. — Voir: *Urom. striatus.*

***Uromyces Orobi** Wint. — N. K. A. 2, V, 625. — Voir: *Urom. Fabae.*

18. **Uromyces Phascoli** (P.) Wint. Kr. Fl. I, 157. — Oud. Rév. I, 490; N. K. A. 2. V, 625. — Sacc. Syll. VII, 335. — Urom. Phaseolorum N. K. A. 2. I. 90. — Caeoma appendiculatum T. N. G. XI. 109 p.p. — Uredo Leguminosarum Prodr. Fl. Bat. II. 4. p. 171.

I. *Aecidium!* Aec. Phascolorum Wallr. N. K. A. 2. I, 90;

Oud. F. N. exs. n° 143 et Herb. Nl. Pl. n° 459; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 168.

I. *Uredo!* U. Phaseolorum D. C. — Oud. F. N. exs. n° 49; Oud. Herb. Nl. Pl. n° 8.

III. *Teleutospores!* Caeoma apiculosum Bon. — Urom. Phaseolorum Oud. F. N. exs. n° 50; Urom. appendiculatus Tul. — Oud. Herb. Nl. Pl. n° 7 et 8.

I, II, III. F. des *Phaseolus compressus* et *nanus*.

***Uromyces Phaseolorum** de Bary. — N. K. A. 2, I, 90. Voir: *Urom. Phaseoli*.

19. **Uromyces Phyteumatum** (D. C.) Fr. S. V. S. 514. — Oud. Rév. I, 500; — N. K. A. 2, I, 176; Arch. Néerl. VIII, 382. — Sacc. Syll. VII, 567. — Wint. Kr. Fl. I, 151.

I. *Aecidium* †

II. *Uredo* ⊙

III. *Teleutospores!*

III. F. du *Phyteuma nigrum*.

20. **Uromyces Pisi** (P.) Wint. Kr. Fl. I, 163. — Oud. Rév. I, 495. — Sacc. Syll. VII, 542. — Urom. Lathyri N. K. A. 2, II, 182. — Caeoma appendiculatum T. N. G. XI, 409 p.p. — Caeoma Uredo Leguminosarum Lk. — T. N. G. XII, 275 p.p.

I. *Aecidium!* — Aec. Cyparissiae D. C.

II. *Uredo!* U. Pisi P.

III. *Teleutospores!* Urom. appendiculatus β. Pisi P.

I. F. de l'*Euphorbia Cyparissias*. — II et III. F. des *Pisum sativum*, *Lathyrus pratensis* et *Vicia Cracca*. — Kleb. Wirtsw. Rostp. 350.

21. **Uromyces Poae** Rab. Unio itin. 1866, n° XXXVIII. — Oud. Rév. I, 494; N. K. A. 2, V, 627. — Sacc. Syll. VII, 541, sub 19. — Wint. Kr. Fl. I, 162.

I. *Aecidium!* Aec. Ficariae P. — Aec. Ranunculacearum Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 167 b. Ficariae P. — Caeoma Ranunculatum T. N. G. XI, 410 p.p.

II. *Uredo!*

III. *Teleutospores!*

I. F. du *Ficaria verna*. — II et III F. du *Poa nemoralis*. — Kleb. Wirtsw. Rostp. 325.

22. **Uromyces Polygoni** (P.) Fuck. Symb. 64. — Oud. Rév. I, 489; N. K. A. 2, V, 625. — Sacc. Syll. VII, 503. — Wint. Kr. Fl. I, 154. — Caeoma Polygonorum T. N. G. XI, 407 p.p. — Uredo Polygonorum Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 172.

I. *Aecidium* † Aec. Avicullariae Kze.

II. *Uredo!* U. Centunmodii Schum. — U. Polygonorum D. C. — Oud. F. N. exs. n° 53.

III. *Téleutospores!* Puccinia aviculariae D. C.

I, II, III. F. du *Polygonum aviculare.*

23. **Uromyces Rumicis** Schum.) Wint. Kr. Fl. I, 145. — Oud. Rév. I, 197; N. K. A. 2, V, 626. — Sacc. Syll. VII, 541. — Caeoma Rumicum T. N. G. XI, 107; Uredo Rumicum Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 176 pp. — Urom. Rumicum Oud. F. N. exs. n° 56.

I. *Aecidium* ⊙ — L'Aecidium, propre aux f. de plusieurs espèces de *Rumex* (*R. crispus* Oud. F. N. exs. n° 54; *R. Hydrolapathum* ibid. n° 55), appartient au cercle biologique du *Puccinia Phragmitis.*

II. *Uredo!* U. bifrons D. C.

III. *Téleutospores!* — *Urom. fraternus* Lasch.

II et III. F. des *Rumex aquaticus, conglomeratus, crispus, Hydrolapathum, obtusifolius.*

24. **Uromyces Salicorniae** (D. C.) de Bary in Rab F. E. n^os^ 1385 et 1386. — Oud. Rév. I, 193. — Sacc. Syll. VII, 538. — Wint. Kr. Fl. I, 156.

I. *Aecidium!* Aec. Salicorniae D. C. — Caeoma Salicorniatum T. N. G. XII, 275.

II. *Uredo* †

III. *Téleutospores* †

I, II, III. F. du *Salicornia herbacea.*

25. **Uromyces Scillarum** (Grev.) Sacc. Syll. VII, 567. — Oud. Rev. I, 500; N. K. A. 2, IV, 515; 2, V, 626. — Wint. Kr. Fl. I, 142.

I. *Aecidium!* ⊙

II. *Uredo* ⊙

III. *Téleutospores!* — Uredo Scillarum Grev. in Hook. Engl. Fl. V, 376.

III. F. de l'*Endymion non scriptus.*

Synonymes: *Uredo Muscari* Duby, *Uredo concentrica* Desm., *Uredo limbata* Rab., *Uromyces concentricus* Lév., *Puccinia Scillarum* Batssh.

26. **Uromyces scutellatus** (Schrank) Lév. A. S. N. 3, VIII, (1873), 371. — Oud. Rév. I, 199 et II, p. 413); N. K. A. 2, II, 183. — Sacc. Syll. VII, 552 p.p. — Wint. Kr. Fl. I, 144 p.p.

I. *Aecidium* †

II. *Uredo!* Mêlé aux télentospores.

III. *Téleutospores!*

I, II, III. F. des *Euphorbia Cyparissias* et *Esula.* — Pour *E. Gerardiana:* voir *Urom. excavatus.*

***Uromyces Sonchi** Oud. Rab. F. E. n° 1592. — Voir: *Puccinia.*

27. **Uromyces striatus** Schröt. Abh. Schles. Ges. naturw. Abth. 1869, p. 11 (extr.) et Pilze Schles. I, 306. — Oud. Rév. I, 195. — Sacc. Syll. VII, 542. — Urom. Medicaginis falcatae Wint. Kr. Fl. I, 159. — Urom. Trifolii N. K. A. 2, II, 101 et 182; Caeoma apiculatum T. N. G. XI, 409.

I. *Aecidium!* Aec. Cyparissiae D. C.

II. *Uredo!*

III. *Télentospores!*

I. F. de l'*Euph. Cyparissias.* — II et III. F. des *Medicago Lupulina* et *sativa.* — Kleb. Wirtsw. Rostp. 330.

28. **Uromyces Trifolii** (A. S.) Lév. A. S. N., 3, VIII, 371. — Oud. Rév. I, 490; N. K. A. 2, I, 176; 2, II, 101; 2, V, 591 et 626; — Sacc. Syll. VII, 534. — Wint. Kr. Fl. I, 159. — Caeoma Trifolii T. N. G. XI, 409; Caeoma Uredo Leguminosarum T. N. G. XII, 275 p.p.; Uromyces Leguminosarum Desm. b. Trifoliorum West. in Prodr. Fl. Bat., II, 4, p. 172.

I. *Aecidium* †. Aec. Trifolii repentis Cast. — Aec. Leguminosarum var. Trifolii D. C.

II. *Uredo!* Ur. Trifolii D. C. — T. N. G. XI, 409; N. K. A. 2, V, 591. — Uredo fallens Desm. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 175.

III. *Télentospores!* Urom. Trifolii Oud. F. N. exs. n° 249. — Pucc. fallens Cooke et Trichobasis fallens Cooke; Urom. apiculata Lév.

I. F. du *Trif. repens.* — II et III. F. des *Trif. pratense, procumbens* et *repens* (Oud. F. N. exs. n° 249) et du *Medicago sativa.*

29. **Uromyces Valerianae** (Schum.) Fuck. Symb. 63. — Oud. Rév. I, 192; N. K. A. 2, V, 626. — Sacc. Syll. VII, 536. — Wint. Kr. Fl. I, 157. — Caeoma Valerianae T. N. G. XI, 409. — Uredo Valerianae Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 173.

I. *Aecidium* †. — Aec. Valerianearum Duby.

II. *Uredo!* Ur. Valerianae Schum. — Oud. F. N. exs. n° 52.

III. *Télentospores!*

I, II, III. F. du *Valeriana officinalis.*

ENUMÉRATION DES ESPÈCES SELON L'ORDRE BIOLOGIQUE.

A. Eu-Uromyces. Formes d'évolution toutes connues.

a. Espèces hétéroïques.

1. **Uromyces Dactylidis** Otth — II et III. Sur. *Dactylis glo-*

merata. — I. (Aecidium), sur *Ranunculus bulbosus* (Aec. Ranunculacearum D. C. p.p.). et *repens*.

2. **Uromyces Junci** Desm. — II et III. — Sur plusieurs espèces de *Juncus*. — I. (Aecidium), sur *Pulicaria dysenterica*.

3. **Uromyces Berulae-Scirpi** (Kleb.) — II et III. Sur. *Scirpus maritimus*. — I. (Aecidium), sur *Sium* (*Berula*) *angustifolium*.

4. **Uromyces maritimus** Plowr. — II et III. Sur *Scirpus maritimus*. — I. (Aecidium), sur *Glaux maritima* (Aec. Glaucis Dozij et Molkb.)

5 **Uromyces Pisi** (P.) de Bary. — II et III. Sur *Lathyrus*, *Pisum*, *Vicia*. — I. (Aecidium), sur *Euphorbia Cyparissias*, *Esula*, et autres (Aec. Cyparissiae).

6. **Uromyces Poae** Rabh. — II et III. Sur plusieurs espèces de *Poa*. — I. (Aecidium), sur *Ficaria verna* (Aec. Ficariae P.).

7. **Uromyces striatus** Schröt. — II et III. Sur *Medicago*, *Onobrychis*, *Trifolium*, *Vicia*. — I. (Aecidium), sur *Euphorbia Cyparissias* (Aec. Cyparissiae D. C.)

b Espèces homoïques.

8. **Uromyces Acetosae** Schröt. — Sur *Rumex Acetosa*.

9. **Uromyces Betae** (P.) Tul. — Sur *Beta vulgaris* L. var. *Rapa* Dum.

10. **Uromyces Ervi** (Wallr.) Plowr. — Sur *Ervum hirsutum*.

11. **Uromyces Fabae** de Bary. — *Vicia Faba*, *sativa*, et plusieurs autres Ervoïdées et Lathyrées.

12. **Uromyces Geranii** (D. C.) Otth et Wartmann. — Espèce de *Geranium* cultivée.

13. **Uromyces Limonii** (D. C.) Lév. — Sur *Armeria vulgaris* et *Statice Limonium*.

14. **Uromyces Phaseoli** de Bary. — Sur *Phaseolus compressus*, *nanus* et autres espèces du même genre.

15. **Uromyces Polygoni** (P.) Fuck. — Sur *Polygonum aviculare*.

16. **Uromyces Salicorniae** (D. C.) de Bary. — Sur *Salicornia herbacea*.

17. **Uromyces Trifolii** (Hedw.) Lév. — Sur *Trifolium repens* et autres espèces du même genre.

18. **Uromyces Valerianae** (Schum.) Fuck. — Sur *Valeriana officinalis*.

B. Uromycopsis. — Aecidium et Téleutospores connus. — Point d'Uredo.

19. **Uromyces Cacaliae** (D. C.) Ung. — Sur *Adenostyles alpina* cultivé.

20. **Uromyces Phyteumatum** (D. C.) Fr. — Sur *Phyteuma nigrum*.

C. Brachyuromyces. — Uredo et Téleutospores connus. — Point d'Aecidium.

21. **Uromyces Alchemillae** (P.) Lév. — Sur *Alchemilla vulgaris.*

22. **Uromyces ambiguus** (D. C.) Fuck. — Sur *Allium Scorodoprasum.*

23. **Uromyces Anthyllidis** (Grev.) Schröt. — Sur *Anthyllis Vulneraria.*

24. **Uromyces caryophyllinus** (Schrank) Wint. — Sur *Dianthus prolifer.*

25. **Uromyces excavatus** (D.C.) Wint. — Sur *Euphorbia Gerardiana.*

26. **Uromyces Ficariae** (Schum.) Lév. — Sur *Ficaria verna.*

27. **Uromyces Genistae tinctoriae** (P.) Wint. — Sur *Cytisus, Colutea, Genista, Sarothamnus.*

28. **Uromyces Rumicis** (Schum.) Wint. — Sur plusieurs espéces de *Rumex.*

29. **Uromyces scutellatus** (Schrank) Lév. — Sur *Euphorbia Cyparissias* et *Esula.*

D. Microuromyces. — Téleutospores seul connues.

30. **Uromyces Scillarum** (Grev.) Wint. — Sur *Endymion non scriptus.*

2. Didymosporées.

PODISOMA.

(Voir: Gymnosporangium).

GYMNOSPORANGIUM.

1. **Gymnosporangium clavariaeforme** (Jacq.) Rees Rostp. formen d. deuts. Coniferen, 69. — Oud. Rév. 1, 563. — Wint. Kr. Fl. I, 233. — Kleb. Jahrb. Hamb. wiss. Anst. XX, p. 55; Wirtsw. Rostp. 339. G. clavariiforme Sacc. Syll. VII, 737. — Podisoma Gymnosporangium Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 393.

I. *Spermogones!*

II. *Aecidium!* Voir: *Roestelia lacerata* Mérat.

III. *Téleutospores!* Rameaux du *Juniperus communis.*

2. **Gymnosporangium confusum** Plowr. Monogr. 232. — Oud. Rév. 1, 564. — Kleb. Wirtsw. Rostp. 338.

I. *Spermogones* †

II. *Aecidium!* Voir: *Roestelia cornuta* (Gmel.) Fr.

III. *Téleutospores!* Rameaux du *Juniperus communis.*

3. **Gymnosporangium juniperinum** (L.) Fr. S. M. III, 506. —

Oud. Rév. I, 564; N. K. A. 2, V, 589. — Sacc. Syll. VII, 758. — Wint. Kr. Fl. I, 204. — Kleb. Wirtsw. Rostp. 345. — Podisoma Gymnosporangium Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 393 p.p. et II, 4, p. 5.

I. *Spermogones* †

II. *Aecidium!* Voir: *Roestelia cornuta* (Gmel.) Fr.

III. *Téleutospores!* Rameaux du *Juniperus communis.*

4. **Gymnosporangium Sabinae** (Dicks.) Wint. Kr. Fl. I, 232. — Oud. Rév. I, 565. — Sacc. Syll. VII, 739. — Kleb. Wirtsw. Rostp. 331. — Podisoma Juniperi Sabinae T. N. G. XI, 405 pp. — Podisoma fuscum Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 393 p.p.; N. K. A. 2, I, 89; Oud. F. N. exs. n° 260. — Podisoma Gymnosporangium Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 393 p.p. et II, 4, p. 5, p.p. — Podisoma Sabinae N. K. A. 2, I, 89; Oud. Herb. M. Pl. n° 101.

I. *Spermogones!*

II. *Aecidium!* Voir: *Roestelia cancellata* (Jacq.) Rebent.

III. *Téleutospores!* Rameaux du *Juniperus Sabina.*

5. **Gymnosporangium tremelloides** Al. Braun (sec. Dietel in Engl. Nat. Pfl. Fam. 1ᵉʳ Th., 1ᵉ Abth., p. 50). — Kleb. Wirtsw. Rostp. 349.

I. *Spermogones* †

II. *Aecidium!* Voir: *Roestelia penicillata* (Müller) Fr.

III. *Téleutospores* † Rameaux du *Juniperus communis.*

PUCCINIA.

1. **Puccinia Absinthii** D. C. Encycl. VIII, 215 et Fl. Fr. VI, 56. — Sydow Monogr. 11. — P. Tanaceti D. C. — Oud. Rév. I, 544. — Sacc. Syll. VII, 637. — Wint. Kr. Fl. I, 209.

I. *Aecidium.* ⊙

II. *Uredo!* — U Artemisiae Rab. Kr. Fl. 12. — Caeoma Artemisiae Lk. — T. N. G. XI, 108. — Caeoma Discoideanum Lk. — N. K. A. 2, II, 182. — Pucc. Artemisiarum Duby, stylosporifera Oud. F. N. exs. n° 132.

III. *Téleutospores!* Pucc. Absinthii D. C. — Pucc. Discoidearum Lk. — T. N. G. XI, 406.

II et III. F. des *Artem. Abrotanum* (II), *Absynthium* (III) et *Dracunculus* (II).

2. **Puccinia Adoxae** D. C. Fl. Fr. II, 220. — Oud. Rév. I, 519; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 164; N. K. A. 2, I, 89; 2, V, 590. — Sacc. Syll. VII, 612. — Wint. Kr. Fl. I, 211. — Plowr. Monogr. 207. — Sydow. Monogr. 153. — N. K. A. 2, V, 627.

I. *Aecidium!* Aec. Adoxae Opiz (1817). — Prodr. Fl. Bat. II, 4, 166. — Aec. albescens Grev. — Oud. Rév. I, 519.

(sous 12); — N. K. A. 2, V, 590 et 627; Caeoma Aec. Adoxae N. K. A. 1, I, 56.

II. *Uredo!* N. K. A. 2, V, 627 (sous Pucc. albescens).

III. *Télentospores!* Pucc. Adoxae Fuck. — N. K. A. 2, I, 89; Oud. Herb. Nl. Pl. n° 6. — Pucc. albescens Grev. — N. K. A. 2, V, 627. — Pucc. Saxifragaccarum N. K. A. 1, I, 56.

I, II, III. F. et pétioles de l'*Adoxa Moschatellina.*

3. **Puccinia Aegopodii** (Schum.) Mart. Fl. Mosq. 226. — Oud. Rév. I, 554; T. N. G. XI, 406; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 163; N. K. A. 2, V, 590 et 629. — Sydow Monogr. 353.

I. *Aecidium.* ⊙

II. *Uredo.* ⊙

III. *Télentospores!* T. N. G. XI, 406; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 163; Oud. F. N. exs. n° 130.

II. F. de l'*Aegopodium Podagraria.*

***Puccinia Aethusae** T. N. G. XI, 406. — Voir: *Pucc. Petroselini.*

4. **Puccinia Agropyri** Ellis Everh. Journ. of Mycol. VII, 131. — Oud. Rév. I, 526.

I. *Aecidium!* Aec. Clematidis D. C. — Oud. l. c. (sous 19). — Sacc. Syll. VII, 774. — Wint. Kr. Fl. I, 270. — Aec. Ranunculaccarum d. Clematidis Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 168.

II. *Uredo* †

III. *Télentospores* †

I. F. du *Clematis Vitalba.* — II (†) et III (†). F. du *Triticum glaucum.*

5. **Puccinia agropirina** Erikss. A. S. N. S, IX (1899), 273. — Kleb. Wirtsw. Rostp. 249.

I. *Aecidium?*

II. *Uredo!*

III. *Télentospores!*

I. ?. — II, III. F. du *Triticum (Agropyrum) repens* (Oud. Rév. I, 529 et Herb.).

6. **Puccinia Agrostidis** Plowr. Gard. Chron. 1890, II, 139 et 1891, I, 683; id. Grev. XXI, 110. — Oud. Rév. I, 528. — Sacc. Syll. XI, 202. — Sydow. Monogr. 717. — Kleb. Wirtsw. Rostp. 275.

I. *Aecidium!* Aec. Aquilegiae P. Icon. pictae 58 et tab. XXIII f. 14. — Oud. Rév. I, 528 (sous 22). — Sacc. Syll. VII, 776. — Wint. Kr. Fl. I, 268. — Aec. Ranunculacearum D. C. c. Aquilegiae Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 168.

II. *Uredo* †

III. *Télentospores!*

I. F. de l'*Aquilegia vulgaris*. — II (†) et III. F. des *Agrostis alba* et *vulgaris*.

***Puccinia albescens** (Grev.) Plowr. — Voir: *Pucc. Adoxae*.

7. **Puccinia Allii** (D. C.) Rud. Linnaea IV, 392. — Oud. Rév. I, 548; T. N. G. XI, 406. — Sacc. Syll. VII, 655. — Wint. Kr. Fl. I, 184. — Sydow Monogr. 614. — Pucc. Alliorum Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 162.

I. *Aecidium* ⊙

II. *Uredo!* U. Alliorum D. C. Fl. Fr. VI, 156 p.p. — Oud. l. c. (sous 19). — Sacc. l. c. (sous 131). — Wint. l. c. (sous. 271).

III. *Télentospores!* Oud. F. N. exs. n° 250.

II et III. F. des *Allium sativum* et *vineale*.

Puccinia Alliorum Cda. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 162. — Voir: *Pucc. Allii*.

***Puccinia Allii-Phalaridis** Kleb. Wirtw. Rostp. 264 — Voir: *Pucc. linearis*.

8. **Puccinia ambigua** (A. S.) Lagerheim in Sydow Uredineen n° 1056 (a° 1897). — Sydow Monogr. 216.

I. *Aecidium!* Aec. Galii var. ambiguum A. S. Consp. 116, a° 1805. — Aec. Galii Cast. Cat. Pl. Mars. 216 (non P.); N. K. A. 2, I, 173; 2, V, 626 p.p.; Arch. Néerl. VIII, 378.

II. *Uredo* ⊙

III. *Télentospores* †

I. F. du *Galium Aparine*. Oud. F. N. exs. n° 37. — III. F. du *Galium Aparine* †

***Puccinia Amphibii** Fuck. — Voir: *Pucc. Polygoni*.

***Puccinia Anemones** T. N. G. XI, 406; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 164. — Voir: *Pucc. fusca*.

9. **Puccinia Angelicae** (Schum.) Fuck. Symb. 52. — Oud. Rév. I, 562; N. K. A. 2, II, 101. — Sacc. Syll. VII, 703. — Sydow Monogr. 356. — Pucc. Umbelliferarum T. N. G. XI, 406 p.p. — Phragmotrichum bullaria Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 160.

I. *Aecidium* ⊙

II. *Uredo* †

III. *Télentospores!* F. de l'*Angelica silvestris*. Oud. F. N. exs. n° 26.

10. **Puccinia annularis** (Strauss) Wint. Kr. Fl. I, 165. — Oud. Rev. I, 561; N. K. A. 2, V, 164 et 629. — Sacc. Syll. VII, 689. — Sydow. Monogr. 300.

I. *Aecidium*. ⊙

II. *Uredo*. ⊙

III. *Téleutospores!* *Pucc. Scorodoniae* Lk; *Pucc. Chamaedryos* Ces.; *Pucc. Teucrii* Fuck. (Tous trois synonymes.)

III. F. du *Teucrium Scorodonia*.

***Puccinia Anthrisci** Thüm. — Oud. Rév. I, 547. — Voir: *Pucc. Chaerophylli*.

11. **Puccinia Apii** Desm. — Sydow Monogr. 369. — N. K. A. 2, V, 627. — Pucc. bullata (P.) Schröt. — Oud. Rév. I, 541. — Sacc. Syll. VII, 631. — Wint. Kr. Fl. I, 192. — Pucc. Umbelliferarum T. N. G. XI, 406 p.p.; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 163; N. K. A. 2, II, 182.

I. *Aecidiolum* †

II. *Aecidium* †

III. *Uredo!* Uredo Apii Wallr; N. K. A. 2, V, 627; Oud. F. N. exs. n° 25. — Caeoma Umbellatarum T. N. G. XI, 408.

IV. *Téleutospores!* Oud. l. c. p. 542.

III et IV. F. de l'*Apium graveolens*.

12. **Puccinia Arenariae** (Schum.) Wint. Kr. Fl. I, 169. — Oud. Rév. I, 556; N. K. A. 2, IV, 511; 2, V, 589 et 629. — Sacc. Syll. VII, 683. — Sydow Monogr. 553. — Pucc. Arenariae serpyllifoliae N. K. A. 2, I, 172; Arch. Néerl. VIII, 375. — Pucc. Saginae N. K. A. 2, I, 176; Arch. Néerl. VIII, 375. — Pucc. Mochringiae N. K. A. 2, I, 90; Arch. Néerl. VIII, 375. — Pucc. Stellariae Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 164. — Pucc. Lychnidearum T. N. G. XI, 406. — Pucc. Dianthi Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 164.

I. *Aecidium* †. — Aec. elatinum A. S. — E. Fischer, Zeits. f. Pfl. Krh. XII, p. 193.

II. *Uredo* ⊙

III. *Téleutospores!*

I. Aiguilles de l'*Abies alba*.

III. F. des *Arenaria serpyllifolia*, *Dianthus barbatus* (Oud. F. N. exs. n° 135), *Dianthus prolifer*, *Melandryum album* et *rubrum* (Oud. F. N. exs. n° 255), *Mochringia trinervis*, *Sagina procumbens* et *subulata*, *Stellaria media*.

***Puccinia Arenariae serpyllifoliae** N. K. A. 2, I, 172. — Voir: *Pucc. Arenariae*.

***Puccinia Dianthi** Prodr. Fl. Bat. II, 1, 164. — Voir: *Pucc. Arenariae*.

***Puccinia Lychnidearum** T. N. G. XI, 406. — Voir: *Pucc. Arenariae*.

***Puccinia Muehringiae** N. K. A. 2, I, 90; Arch. Néerl. VIII, 375. — Voir: *Pucc. Arenariae.*

***Puccinia Saginae** N. K. A. 2, I, 176; Arch. Néerl. VIII, 375. — Voir: *Pucc Arenariae.*

***Puccinia Stellariae** Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 164. — Voir: *Pucc. Arenariae.*

13. **Puccinia argentata** (Schultz) Wint. Kr. Fl. I, 194. — Oud. Rév. I, 545. — Sacc. Syll. VII, 639. — Sydow. Monogr. 450. — Kleb. Wirtsw. Rostp. 323. — Pucc. Nolitangeris N. K. A. 2, I, 176 et 2. V, 590; Arch. Néerl. 375.

I. *Aecidium* †. Aec. Adoxae.

II. *Uredo!* U. Impatientis (Lk.) Rab. Kr. Fl. 5. — Oud l. c. p. 546.

III. *Téleutospores!* Oud. l. c. p. 546.

I. F. de l'*Adoxa Moschatellina*. — II et III. — F. de l'*Impatiens Noli tangere*.

***Puccinia Ari-Phalaridis** Kleb. — Voir: *Pucc. Phalaridis*

11. **Puccinia Arrhenateri** (Kleb.) Erikss. in Cohn's Beitr. Zur Biol. d. Pfl. VIII (1890) Heft I, p. 1 et IX (1891) Heft II et III. — Sydow Monogr. 729. — Kleb. Wirtsw. Rostp. 277. — Pucc. Rubigo vera (D. C.) Wint. Kr. Fl. I, 217 p.p.

I. *Aecidium* † Aec. graveolens Shuttlew. in Cooke. Bull. Soc, bot. de Fr. XXIV (1877), p. 315.

II. *Uredo!* Oud. F. N. exs. n° 13; id. Rév. I, 529. —

III. *Téleutospores!* Oud. F. N. exs. n° 41. et Rév. I, 529.

I. *Aecidium* †? F. des *Berberis vulgaris* et *heteropoda*. — II et III. F. de l'*Arrhenaterum elatius*.

***Puccinia Artemisiarum** Duby. — Voir: Pucc. *Absynthii.*

Puccinia arundinacea Hedw. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 161; N. K. A. 2, V, 591. — Voir *Pucc. Phragmitis.*

15. **Puccinia Asparagi** D. C. Fl. Fr. II, 595. — Oud. Rév. I, 512; N. K. A. 2, V. 627. — Sacc. Syll. VII, 601. — Wint. Kr. Fl. I, 201. — Sydow Monogr. 615.

I. *Aecidium* † Aec. Asparagi Lasch in Klzsch Herb. mycol. n° 1179.

II. *Uredo!* U. Asparagi Lasch in Klzsch Herb. mycol. n° 1180.

III. *Téleutospores!* Oud. l. c. p. 513.

I, II, III. Tiges et ramilles de l'*Asparagus officinalis*.

16. **Puccinia Asteris** Duby Bot. Gall. II, 888. — Oud. Rév. I, 559. — Sacc. Syll. VII, 687 p.p. — Wint. Kr. Fl. I, 167 p.p. —

Sydow Monogr. 16. — Pucc. Tripolii Wallr. Fl. Cr. 223. N. K. A. 2, II, 182 (où par erreur on lit P. Trifolii).

I. *Aecidium*. ⊙

II. *Uredo*. ⊙

III. *Téleutospores!*

III. F. de l'*Aster Tripolium*. — Oud. F. N. exs. n° 139.

17. **Puccinia Bardanae** Cda Ic. Fg. IV, 17. — Sydow Monogr. 113. — Pucc. Hieracii p.p. Oud. Rév. I, 540. — Sacc. Syll. VII, 634. — Pucc. flosculosorum Wint. Kr. Fl. I, 206.

I. *Aecidium* ⊙

II. *Uredo* † U. apiculata β. Arctii Strauss in Wett. II, 98.

III. *Téleutospores!* Oud. l. c. p. 540.

II (†) et III. F. du *Lappa minor*.

18. **Puccinia Bistortae** (Strauss) D. C. Fl. Fr. VI, 61. — Oud. Rév. I, 545. — Sacc. Syll. VII, 638. — Wint. Kr. Fl. I, 186. — Sydow. Monogr. 571. — Pucc. Conopodii-Bistortae Kleb. et Pucc. Angelicae-Bistortae Kleb. — Kleb. Wirtsw. Rostp. 318 et 319. — Pucc. Polygonorum a. Bistortae Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 162.

I. *Aecidium* †

II. *Uredo* † — U. Polygoni var. Bistortae Strauss.

III. *Téleutospores!*

I (†) F. des *Conopodium denudatum* (?), Grev. XXII (1893) p. 45; *Carum Carvi* Kleb. Ber. VIII (1899), in Pringsh. Jahrb. XXXIV, p. 403; *Angelica silvestris* Kleb. Ber. IX (1900), p. 708. — II et III F. du *Polygonum Bistorta*.

19. **Puccinia Bulbocastani** (Cumino) Fuck. Symb. 52. — Sydow Monogr. 363. — Pucc. Bunii (D. C.) Wint. Kr. Fl. I, 197; Oud. Rév. I, 550; Sacc. Syll. VII, 667.

I. *Aecidium!* — Aecidium Bunii D. C. Syn. 51 et Fl. Fr. VI, 96. — Oud. l. c. — Caeoma Buniatum T. N. G. XI, 410. — Aec. Bulbocastani Cumino, Act. Acad. Turin 1804/1805.

II. *Uredo* ⊙

III. *Téleutospores* †

I. F. des *Carum Bulbocastanum*, *Daucus Carota* et *Oenanthe Lachenalii*. (Assertion quelque peu douteuse.)

20. **Puccinia bullata** (P.) Auct. p. p. — Lindroth Umbellif. Ured. 103. — Oud. Rév. I, 541 p.p. — Sacc. Syll. VII, 639 p.p. — Wint. Kr. Fl. I, 191 p.p.

I. *Aecidiolum* †

II. *Aecidium* ⊙

III. *Uredo!* Sous Pucc. Umbelliferarum Oud. N. K. A. 2, II, 182 et F. N. exs. n° 110.

IV. *Téleutospores* †

III. F. du *Thysselinum palustre*.

***Puccinia bullata** N. K. A. 2, V. 590 et 628. — Voir: *Pucc. Conii*.

***Puccinia bullata** Oud. Rév. I. 542. — Pour ce qui concerne l'*Aethusa Cynapium*, voir: *Pucc. Petroselini*; pour ce qui concerne l'*Apium graveolens*, voir: *Pucc. Apii*: pour ce qui concerne le *Conium maculatum*, voir: *Pucc. Conii*.

***Puccinia Bunii** (D. C.) Wint. — Oud. Rév. I, 550. — Voir: *Pucc. Bulbocastani*.

21. **Puccinia Calthae** Lk. Spec. II, 79. — Oud. Rév. I, 513; T. N. G. XI, 405 et 408; N. K. A. 2, V, 627. — Sacc. Syll. VII, 602. — Wint. Kr. Fl. I, 216. — Sydow. Monogr. 540.

I. *Aecidium!* Aec. Calthae Grev. Fl. Edin. 446. — Aec. crassum Schuurmans Stekhoven Kruidk. Handb. II, 194 p.p.

II. *Uredo!* U. Calthae Req. in Duby Bot. Gall. II, 900. — Caeoma U. Calthae T. N. G. XI, 408.

III. *Téleutospores!* Oud. F. N. exs. n° 133.

I, II. III. F. du *Caltha palustris*.

22. **Puccinia Cardnorum** Jacky, Compositarum Pucciniae p. 58 et fig. 13 (1899). — Sacc. Syll. XVI. 297. — Sydow Monogr. 33. — Pucc. Hieracii Oud. Rév. I, 539 p.p.

I. *Aecidiolum!* Sphaeronema Cirsii Lasch in Klotzsch Herb. Mycol. n° 1069. — Aec. Cirsii Sacc. Mich. I. 12. — Uredo suaveolens P. Obs. Mycol. II. 21 p.p. — Oud Rév. I, 538, sous 35; id. F. N. exs. n° 34, sous Pucc. obtegens.

II. *Aecidium* ⊙

III. *Uredo!* U. suaveolens P. Obs. Myc. II, 24, p.p. — N. K. A. 2, I, 90; Prodr. Fl. Bat. II. 4. p. 176. — Caeoma suaveolens Lk. Spec. II, 17; T. N. G. XI. 408. — Oud. Rév. I, 538, sous 335; id. F. N. exs. n° 35.

IV. *Téleutospores!* Oud. Rév. I, 540.

I, III, IV. F. du *Carduus crispus*.

22. **Puccinia Caricis** Schum. Rebent. Fl. Neom. 356. — Oud. Rév. I, 530; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 162; N. K. A. 2, I, 80 et 2, V, 591. — Sacc. Syll. VII, 626. — Wint. Kr. Fl. I, 222. — Sydow Monogr. 648. — Kleb. Wirtsw. Rostp. 293.

I. *Aecidium!* Aec. Urticae Schum. Saell. II. 222. — Prodr. Fl. Bat. II. 4, p. 167; N. K. A. 2, V, 594; Oud. F. N. exs. n° 10; Caeoma Urticatum T. N. G. XI. 111.

II. *Uredo!* U. Caricis Schum. Saell. II, 231 p.p. — T. N. G. XI, 407; Oud. F. N. exs. n° 41 et Herb. Ned. Pl. n° 386. — Caeoma Pseudocyperi T. N. G. XII. 275.

III. *Télentospores!* Oud. l. c. p. 531.

I. F. des *Urtica dioica* et *urens*. — II et III. F. des *Carex laevigata* et *Pseudocyperus* (Oud. F. N. exs. n° 42).

Dans les publications, connues sous les titres de „British Uredineae and Ustilagineae" de Mr. Plowright (1889); „Communications" de Mr. Klebahn: „Zeits. f. Pfl." Krkh. II, 1892, IV, V, VII, IX, XII"; „Hedwigia" 1890; „Pringsh. Jahrb. XXXIV et XXXV"; „Ber. d. deuts. bot. Ges. 1890", etc.; „Monographia Uredinearum de P. et H. Sydow" 1902 et 1903, on trouve mentionnées plusieurs espèces de *Puccinia* sur des Carex indigènes des Pays-Bas, qui n'ont pas encore fait leur apparition dans les travaux de Mycologie de notre patrie. C'est pourquoi nous croyons combler une lacune, en ajoutant à notre énumération actuelle une liste de ces espèces, augmentée des noms de leurs plantes nourricières, et des *Aecidium* avec lesquels elles entretiennent une relation biologique. Ce recueil pourra préparer le chemin pour obtenir des recherches efficaces nouvelles.

Nom des espèces nourricières.	Nom des espèces de Puccinia	Nom des espèces d'Aecidium.
Carex acuta L.	Pucc. Pringsheimiana Sydow Monogr. 652.	Aec. Grossulariae.
Carex acuta L.	Pucc. Ribis nigri-Acutae Sydow ibid.	Aec. Ribis nigri Kleb.
Carex arenaria L.	Pucc. arenariicola Plowr.	Aec. Centaur. nigrae.
Carex arenaria L.	Pucc. Schoeleriana Plowr. et Magnus.	Aec. Jacobaeae Grev. sur Senecio Jacob.
Carex arenaria L.	Pucc. silvatica Schröt.	Aec. Taraxaci Kze u. Schmidt.
Carex brizoides L.	Pucc. silvatica Schröt.	?
Carex Davalliana Sow.	Pucc. dioica Magn.	Aec. Cirsii D. C., sur Cirsium palustre.
Carex dioica L.	Pucc. dioicae Magn.	Aec. Cirsii D. C., sur C. palustre.
Carex divulsa Good.	Pucc. silvatica Schröt.	?
Carex ericetorum Poll.	Pucc. silvatica Schröt.	?
Carex filiformis L.	Pucc. Caricis (Schum.) Rebentisch.	Aec. Urticae D. C. sur U. dioica et urens.

Nom des espèces nourricières.	Nom des espèces de Puccinia.	Nom des espèces d'Aecidium.
Carex flava L.	Pucc. Schroeteriana Kleb.	Aec. Jacobaeae Grev.
Carex fulva Good.	Pucc. paludosa Plowr.	Aec. Pedicul. Libosch.
Carex glauca Scop.	Pucc. silvatica Schröt.	?
Carex Goodenoughii Gay (= C. vulgaris)	Pucc. paludosa Plowr.	Aec. Pedicularis Lib.
	Pucc. Pringsheimiana Kleb.	Aec. Grossul. Gmel.
		Aec. Ribis nigri Kleb.
Carex Goodenoughii	Pucc. Schoeleriana Kleb.	Aec. Jacobaeae Grev.
Carex Goodenoughii	Pucc. silvatica Schröt.	?
Carex hirta L.	Pucc. Caricis (Schum.) Rebent.	Aec. Urticae D. C.
[1]) **Carex leporina** L.	Pucc. silvatica Schröt.	?
Carex levigata Sm.	Pucc. Caricis (Schum.) Rebentisch	Aec. Urticae D. C.
Carex ligerica Gay.	Pucc. ligerica Sydow	?
Carex ligerica Gay.	Pucc. Schoeleriana Kleb.	Aec. Jacobaeae Grev.
Carex ligerica Gay.	Pucc. silvatica Schröt.	?
Carex limosa L.	Pucc. limosae Magn.	?
Carex montana L.	Pucc. aecidii leucanthemi E Fischer.	Aec. Leucanthemi D. C.
Carex montana L.	Pucc. Caricis montanae E. Fischer.	?
Carex montana L.	Pucc. tenuistipes Rostrup	Aec. Centaureae Jaceae.
Carex muricata L.	Pucc. tenuistipes Rostrup	Aec. Centaureae Jaceae.
Carex Oederi Ehrh.	Pucc. silvatica Schröt.	?
Carex ornithopoda W.	Pucc. dioicae Magn.	Aec. Cirsii D. C. sur C. palustre.
Carex pallescens L.	Pucc. silvatica Schröt.	?
Carex paludosa Good.	Pucc. Caricis (Schum.) Rebentisch	Aec. Urticae D. C.
Carex panicea L.	Pucc. silvatica Schröt.	?
Carex paniculata L.	Pucc. Ribis nigri-Paniculatae	Aec. Grossulariae Gmel. p.p.
Carex pilulifera L.	Pucc. silvatica Schröt.	?
Carex praecox Schreb.	Pucc. silvatica Schröt.	?

[1]) *Carex laevigata.* — Voir: *C. levigata.*

Nom des espèces nourricières.	Nom des espèces de Puccinia.	Nom des espèces d'Aecidium.
Carex Pseudo-Cyperus L.	Pucc. Ribesii-Pseudocyperi Kleb. [1])	Aec. Grossulariae Gmel.
Carex pulicaris L.	Pucc. dioicae Magn.	Aec. Cirsii D. C., sur C. palustre.
Carex remota L.	Pucc. silvatica Schröt.	?
Carex riparia Curt.	Pucc. Caricis (Schum.) Rebentisch	Aec. Urticae D. C.
Carex riparia Curt.	Pucc. Magnusii Kleb. in Sydow Mon. p. 652.	Aec. Ribis nigri Kleb.
Carex silvatica Huds.	Pucc. silvatica Schröt.	?
Carex stricta Good.	Pucc. dioicae Magn.	Aec. Cirsii D. C., sur C. palustre.
Carex stricta Good.	Pucc. paludosa Plowr.	Aec. Pedicularis Liboseh.
Carex stricta Good.	Pucc. Pringsheimiana Kleb.	Aec. Grossulariae Gmel. Aec. Ribis nigri Kleb.
Carex vesicaria L.	Pucc. Caricis (Schum.) Rebentisch	Aec. Urticae D. C.
Carex vesicaria L.	Pucc. microsora Körn.	?
Carex vulpina L.	Pucc. Schröteriana Kleb.	Aec. Jacobaeae Grev.
Carex vulpina L.	Pucc. Vulpinae Schröt.	?

23. **Puccinia Centaureae** Mart. Mosq. 226. — Oud. Rév. I, 540; N. K. A. 2, I, 172; 2, II, 182; 3, I, 234; Arch. Néerl. VIII, 278. Sydow Monogr. 39. — Pucc. Hieracii Sacc. Syll. VII, 633 p.p. — Pucc. flosculosorum Wint. Kr. Fl., 206 p.p. — Pucc. conglomerata Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 163.

I. *Aecidiolum* †
II. *Aecidium* †
III. *Uredo!*
IV. *Teleutospores!*

III. F. du *Centaurea nigra*. — IV. F. des *Centaurea nigra* et *Scabiosa*.

24. **Puccinia Chaerophylli** Purton Brit. Pl. III (1821) n° 1553. — Sydow Monogr. 367. — Pucc. Anthrisci Oud Rév. I, 547. — Pucc. reticulata N. K. A. 2, I, 176; Arch. Neerl. VIII, 378.

I. *Aecidium* †. — Aec. Chaerophylli Kirchner.

[1]) Oud. Fgi Neerl. exs. n° 37 et 38.

II. *Uredo!* U. Chaerophylli Kirchn. — U. Anthrisci Oud. Rév. I, 547. — Pucc. reticulata II. Oud. F. N. exs. n° 27. — Caeoma Uredo Umbellatarum T. N. G. XI, 408 p.p.

III. *Téleutospores!* Pucc. Anthrisci Thüm. — Oud. Rév. I, 547, III.

II et III. — F. de l'*Anthriscus silvestris*.

25. **Puccinia Chondrillae** Cda Ic. Fg. V, 15. — N. K. A. 2, I, 89 et 172, 2, II, 101; Arch. Néerl. VIII, 379.

I. *Aecidium!* Aec Prenanthis P. Syn. 208. — Aec. Lactucae Opiz. — N. K. A. 2, I, 172.

II. *Uredo!* U. Prenanthis Schum. Saell. II, 232. — U. Cichoracearum D. C. — N. K. A. 2, I, 172. — Caeoma formosum Schlecht. Fl. Ber. II, 127; Oud. Rév. I, 515, sous II.

III. *Téleutospores!* Oud. l. c. p. 516.

I, II, III. F. du *Lactuca muralis*. — II, sous le nom de Pucc. Chondr. II, dans Oud. F. N. exs. n° 32 et Herb. Ned. Pl. n° 441. — III, sous le nom de Pucc. Chondr. dans Oud. F. N. exs. n° 32 et Herb. Ned. Pl. n° 441.

26. **Puccinia Cicutae** Lasch in Rab. H. M. I, n° 787. — Oud. Rév. I, 516; — Sacc. Syll. VII. 647. — Sydow Monogr. 372. — Pucc. Cicutae majoris Wint. Kr. Fl. I, 192.

I. *Aecidium* †

II. *Uredo!* U. Cynapii β. Cicutae majoris D. C. Fl. Fr. VI, 72. — Pucc. Cicutae II. Oud. F. N. exs. 251.

III. *Téleutospores!* Oud. F. N. exs. n° 252.

II et III. — F. du *Cicuta virosa*.

26. **Puccinia Chrysanthemi** Roze Bull. Soc. Myc. de Fr. 1900, p. 92; id. Journ. Soc. Hort. de Fr. 1900. — Jacky Zeits. f. Pfl. Krkh. 1900, p. 132. — Sacc. Syll. XVI, 296. — Sydow. Monogr. 16.

I. *Aecidium*. — ⊙

II. *Uredo!* U. Chrysanthemi Roze l. c. 78.

III. *Téleutospores!* parmi les Urédospores.

II, III. F. du *Chrysanthemum indicum*, cultivé.

27. **Puccinia Circaeae** P. Disp. meth. 39. — Oud. Rév. I, 559; T. N. G. XI, 406; N. K. A. 2, V, 629. — Sacc Syll. VII, 686. — Wint. Kr. Fl. I, 168. — Sydow Monogr. 422.

I. *Aecidium* † Aec. Circaeae Ces. et Mont. in Mont. Syll. 312 et Rab. H. M. II, n° 372.

II. *Uredo*. — ⊙

III. *Téleutospores!*

I (†) et III. F. du *Circaea lutetiana*.

Puccinia Cirsii Cda. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 164; N. K.

A. 2, I, 173; Arch. Néerl. VIII, 379. — Voir: Pucc. *Cirsii lanceolati.*

28. **Pucc. Cirsii lanceolati** Schröt. Pilze Schles. I, 317. — Oud. Rév. I, 514. — Sacc. Syll. VII, 606. — Sydow Monogr. 51. — Pucc. Cirsii Lasch. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 164; N. K. A. 2, I, 173; Arch. Néerl. VIII, 379. — Pucc. flosculosorum Wint. — N. K. A. 2, V, 628.

I. *Aecidium* †

II. *Uredo!* U. Cirsii Lasch. — N. K. A. 2, I, 173.

III. *Téleutospores!* Oud. l. c. p. 515.

I (†), II et III. F. du *Cirsium lanceolatum.*

***Puccinia Compositarum** T. N. G. XI, 406. — Voir: *Pucc. Picridis*, *P. Sonchi* et *P. Taraxaci.*

***Puccinia conglomerata.** — Voir: *Pucc. Centaureae* et *P. Senecionis.*

29. **Puccinia Conii** (Strauss) Fuck. Symb. 53. — Sydow. Monogr. 375. — Pucc. bullata (P.) Schröt. — Oud. Rév. I, 541; N. K. A. 2, V, 590. — Sacc. Syll. VII, 634. — Wint. Kr. Fl. I, 191.

I. *Aecidium.* — ⊙

II. *Uredo!* U Conii Mart. — U. muricella b. Conii Prodr. II, 4, p. 177.

III. *Téleutospores!* Oud. Rév. I, 542 p.p.

II et III. F. du *Conium maculatum.*

30. **Puccinia Convallariae-Digraphidis** Kleb. 5er Ber. in Zeits. f. Pfl. Krkh. Bd. VI 261 et 8er Ber. in Pringsh. Jahrb. XXXIV, 400; id. Jahrb. Hamb. wiss. Anst. XX, 48; id. Wirtsw. Rostp. 265. — Pucc. Digraphidis Soppitt Journ. of Bot. 1890, p. 213. — Oud. Rév. I, 527 et 586. — Sacc. Syll. IX, 308.

I. *Aecidium!* Aec. Convallariae Schum. Saell. II, 224, in Kleb. Zeits. f. Pfl. Krkh. Bd. II, 26. — Oud. Rév. I, 527 et 586; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 168; N. K. A. 2, I, 88. — Sacc. Syll. VII, 828. — Wint. Kr. Fl. I, 259. — Caeoma Convallariatum Lk. Spec. II, 42. — T. N. G. XI, 440.

II. *Uredo* †

III. *Téleutospores* †

I. F. des *Convallaria majalis*, *Majanthemum bifolium*, *Polygonatum multiflorum* et *officinale.*

II (†) et III (†). F. du *Phalaris arundinacea.*

30. **Puccinia coronata** Cda Ic. Fg. I, 6 p.p. — Oud. Rév. I, 524 p.p.; Arch. Néerl. II, 38; N. K. A. 2, V, 591. — Sacc. Syll. VII, 623 p.p. — Wint. Kr. Fl. I, 218 p.p. — Kleb. Zeits. f. Pfl. Krh. Ier Ber. Bd. II, p. 21—26; id. ibid. 2er Ber. Bd. IV, 129—

136; id. ibid. 3er Ber. Bd. V, 151—152; id. ibid. 4er Ber. Bd. V, 327—333; id. ibid. 5er Ber. Bd. VI, 332—333; id. Wirtsw. Rostp. 254. — Sydow. Monogr. 699.

I. *Aecidium!* Aec. Frangulae Schum. Saell. II, 225. — Oud., Sacc., Wint., Kleb. — aux endroits cités. — Aec. crassum N. K. A. 2, V, 591.

II. *Uredo!* Voir: III.

III. *Télentospores!* Vu l'impossibilité de distinguer l'un de l'autre les *Puccinia coronata* et *coronifera*, même à l'aide du microscope, et que seul des ensemencements sur les feuilles des *Rhamnus cathartica* et *Frangula*, dont les *Aecidium* entretiennent une relation biologique avec ces *Puccinia*, peuvent répandre quelque lumière sur leur différence mutuelle: ensuite, parce que de tels expériments n'ont pas encore été effectués dans notre pays, il va sans dire que nous ne saurions établir, au temps qu'il est, les noms des Graminées, auxquelles il faudrait accorder une place dans l'espace, consacrée aux noms des plantes télentosporifères.

Dans cette condition il nous semble utile de combler cette lacune inévitable par le signalement des espèces de Graminées qui ont été soumises à l'expériment chez l'étranger, et dont il a été prouvé qu'elles ont réagi sur le contact, auquel elles avaient été exposées avec les feuilles du *Rhamnus Frangula*.

Ces espèces sont les *Agrostis vulgaris*, *Arena orientalis* (Oud. F. N. exs. n° 134, II et III) et *sativa*, *Calamagrostis arundinacea* et *lanceolata*, *Dactylis glomerata*, *Festuca silvatica*, *Holcus lanatus* et *mollis*, *Lolium perenne*, *Phalaris arundinacea* et *Trifolium repens*.

***Puccinia coronifera** Kleb. — Voir: *Pucc Lolii* Nielsen.

31. **Puccinia Corrigiolae** Chev. Fl. de Paris I, 120. — Oud. Rév. I, 557; N. K. A. 2, III, 254. — Sacc. Syll. VII, 684. — Sydow Monogr. 557. — Pucc. Arenariae Wint. Kr. Fl. I. 169. — Kleb. Wirtsw. Rostp.

I. *Aecidium*. — ⊙

II. *Uredo*. — ⊙

III. *Télentospores!* Oud. Rév. I, p. 557.

III. F. du *Corrigiola littoralis*.

32. **Puccinia Crepidis** Schröt. Pilze Schles. I, 319. — Oud. Rév. I, 517. — Sacc. Syll. VII, 607. — Sydow Monogr. 64. — Pucc. flosculosorum f. Crepidis tectorum Wint Kr. Fl. I, 206 et 207.

I. *Aecidiolum!*

II. *Aecidium!* Caeoma Aec. Tragopogonatum T. N. G. XI. 110.

III. *Uredo* †

IV. *Téleutospores* †

I et II. F. du *Crepis tectorum*. — III (†) et IV (†). F. des *Crepis tectorum* et *virens*. — Pour le *Cr. biennis* voir: *P. praecox*.

33. **Puccinia Cyani** (Schleich.) Pass. in Rab. F. E. n° 1767. — Sydow Monogr. 38. — Pucc. Hieracii Oud. Rév. I, 339 p.p. — Sacc. Syll. VIII, 633. — Pucc. Centaureae D. C. — N. K. A. 2, II, 182.

I. *Aecidium* ⊙

II. *Uredo* †

III. *Téleutospores!* Oud. Rév. I, 539 Note III, sous *Pucc. suaveolens;* id. F. N. exs. n° 33, sous le nom de *Pucc. Centaureae*.

II (†) et III. F. du *Centaurea Cyanus*.

***Puccinia Dianthi** D. C. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 161. — Voir: *Pucc. Arenariae*.

***Puccinia Digraphidis** Soppitt. — Voir: *Pucc. Convallaria-Digraphidis*.

***Puccinia Discoideárum** Lk. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 163; N. K. A. 2, II, 182. — Voir: *Pucc. Absinthii* et *Pucc. Tanaceti*.

***Puccinia dispersa** Erikss. et Henn. — A. S. N. S, IX (1899), 241—288. — Kleb. Wirtsw. Rostp. 237. — Pucc. Rubigo vera (D. C.) Wint Kr. Fl. I, 217 p. p. — Oud Rév. I, 529 p. p.

I. *Aecidium!* Aec. Asperifolii P. p.p.

II. *Uredo!*

III. *Téleutospores!*

I. F. de l'*Anchusa* (*Lycopsis*) *arvensis*. — II et III. F. du *Secale cereale* (Oud. Rév. I 529, et in Herb.).

34. **Puccinia Endiviae** Pass.; Sacc. Syll. VII, 647. — Sydow Monogr. 19. — Pucc. Chondrillae Cda. — N. K. A. 2, II, 101.

I. *Aecidium* ⊙

II. *Uredo!* Oud. N. K. A., 2, II, 101, sous Pucc. Chondrillae.

III. *Téleutospores* †

II. et III (†). F. du *Cichorium Endivia*.

***Puccinia Epilobii.** — Voir: Pucc. *Epilobii tetragoni*.

35. **Puccinia Epilobii tetragoni** (D. C.) Wint. Kr. Fl. I, 214. — Sydow Monogr. 424. — Pucc. Epilobii D. C. Fl. Fr. VI, 61. — Oud. Rév. I, 517. — Sacc. Syll. VII, 608. — Pucc. pulverulenta N. K. A. 2, V, 591.

I. *Aecidium!* — Aec. Epilobii D. C. Fl. Fr. II, 238. — Caeoma Aec. Epilobiatum T. N. G. XI, 411.

II. *Uredo!* U. pustulata α. Epilobii P. — U. Epolobii D. C.—

Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 172 et 177; N. K. A. 2, V, 591.— Caeoma Epilobii T. N. G. XII, 275.

III. *Téleutospores!* Oud. Rév. I, 518.

I. F. l'*Epil. hirsutum.* — II. F. des *Epil. hirsutum*, *montanum*, *spicatum* et *tetragonum.* — III. F. de l'*Epil. hirsutum.*

36. **Puccinia Eryngii** D. C. Encycl. VIII, 249 et Fl. Fr. VI, 58. — Sydow Monogr. 379. — Lindroth Umbellif.-Uredineen 37. — Pucc. Pimpinellae Oud. Rév. I, 520. — Sacc. Syll. VII, 617. — Wint. Kr. Fl. I, 213.

I. *Aecidium* † *Aec. Pimpinellae* Kirchn. in Lotos VI, 180.

II. *Uredo!* U. Eryngii Chev. Fl. Par. I, 401. — Oud., l. c. p. 521.

III. *Téleutospores!* Oud. l. c. p. 522.

II et III. F. de l'*Eryngium campestre.*

37. **Puccinia expansa** Lk. Spec. II, 75. — Sydow Monogr. 146. **Pucc. conglomerata** (Strauss) Schm. et Kze. — Oud. Rév. I, 551. — Sacc. Syll. VII, 667. — Wint. Kr. Fl. I, 195. — Pucc. glomerata Grev. Arch. Néerl. II, 39.

I. *Aecidium!* Aec. Senecionis Oud. (non Desm.) Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 169 p.p.: N. K. A. 2, I, 178; Arch. Néerl. VIII, 384; Rév. I, 551, sous n° 54.

II. *Uredo!* Trichobasis Cichoraceaeum Lév. — Arch. Néerl. II, 39.

III. *Téleutospores!* Pucc. Senecionis Lib. — Oud. Rév. I, 551, Sous n° 54.

I, II, III. F. du *Senecio aquaticus.*

***Puccinia Fabae** Lk. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 164. — Voir: *Uromyces.*

38. **Puccinia Falcariae** (P.) Fuck. Symb. 52. — Oud. Rév. I, 550. — Wint. Kr. Fl. I, 197. — Sydow Monogr. 380. — Pucc. Sii Falcariae Sacc. Syll. VII, 666.

I. *Aecidium!* Aec. Falcariae P. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 168.

II. *Uredo* ⊙

III. *Téleutospores* †

I et III (†). F. du *Falcaria Rivini.*

39. **Puccinia Festucae** Plowr. Gard. Chron. 1890, II, p. 42 et 139, et 1891, p. 460. — Oud. Rév. I, 541. — Sacc. Syll. XI, 531. — Sydow Monogr. 752. — Kleb. Wirtsw. Rostp. 290.

I. *Aecidium!* Aec. Periclymeni Schum. Saell. II, 225. — Oud. l. c.: Prodr. Fl. Bat. II, 4, 168. — Sacc. Syll. VII, 796. — Wint. Kr. Fl. I, 264.

II. *Uredo* † U. Festucae D. C. Fl. Fr. VI, 82?

III. *Téleutospores* †

I. F. du *Lonicera Periclymenum*; II et III. Festuca duriuscula L. † et ovina L. †

***Puccinia Flosculosorum** Wint. — N. K. A. 2, V, 628. — Voir: *Pucc. Cirsii lanceolati* et *P. obtegens.*

40. **Puccinia fusca** (Relhan) Wint. Kr. Fl. I, 199. — Oud. Rév. I, 553; N. K. A. 2, V, 590 et 629. — Sacc. Syll. VII, 669. — Sydow Monogr. 530. — P. Anemones P. Syn. 226. — T. N. G. XI, 406; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 164.

I. *Aecidium!* Aec. fuscum Relhan Fl. Cantab. Suppl. II. — Caeoma leucospermatum Lk. — T. N. G. XI, 410. — Aec. leucospermum D. C. Fl. Fr. II, 239. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 167.

II. *Uredo!*

III. *Téleutospores!* Oud. l. c. p. 554.

I et III. F. de l'*Anemone nemorosa.*

***Puccinia Galii** (P.) — Voir: *P. punctata.*

***Puccinia Galiorum** Lk. — T. N. G. XII, 275; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 163; N. K. A. 2, I, 173; Arch. Néerl. VIII, 378. — Voir: *Pucc. punctata.*

41. **Puccinia Gentianae** (Strauss) Mart. Fl. Mosq. 226. — Oud. Rév. I, 513; T. N. G. XI, 406; N. K. A. 2, V, 627. — Sacc. Syll. VII, 604. — Wint. Kr. Fl. I, 205. — Sydow Monogr. 340.

I. *Aecidium* † Aec. Gentinae Jacz. Champ. Montr. 163.

II. *Uredo!* U. Gentianae D. C. Fl. Fr. VI, 64. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 173.

III. *Téleutospores!* Oud. l. c. p. 514.

II. F. du *Gentiana Pneumonanthe*; III. F. du *Gentiana Cruciata.*

***Puccinia Geranii** N. K. A. 2, V, 591; Arch. Néerl. VIII, 375. — Voir: Uromyces.

42. **Puccinia Glechomatis** D. C. Fl. Fr. VI, 56. — Oud. Rév. I, 560; T. N. G. XI, 406; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 162, N. K. A. 2, V, 629. — Sacc. Syll. VII, 688. — Sydow. Monogr. 277. — Pucc. verrucosa Wint. Kr. Fl. I, 166.

I. *Aecidium* ⊙

II. *Uredo* ⊙

III. *Téleutospores!* Oud. l. c.

III. F. du *Glechoma hederacea.*

***Puccinia glomerata** Grev. — Arch. Néerl. II, 39. — Voir: *Pucc. expansa.*

43. **Puccinia Graminis** P. Disp. meth. 39. — Oud. Rév. I, 523;

T. N. G. XI, 405; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 161; N. K. A. 2, III, 154; 2, V, 291 et 627. — Sacc. Syll. VII, 622. — Wint. Kr. Fl. I, 217, — Syll. Monogr. 692. — Kleb. Wirtsw. Rostp. 205.

I. *Aecidium!* Aec. Berberidis Gmel. in L. Syst. Nat. II, 1473.— Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 108; N. K. A. 2, V, 591. — Caeoma Berberidatum Lk. Spec. II, 57, T. N. G. XI, 410. — Oud. Fgi Neerl. exs. n° 253.

II. *Uredo!* U. linearis a. frumenti Lamb. Act. Soc. Linn. IV, 193. — Caeoma lineare Lk. Spec. II, 4. — T. N. G. XI, 107. — U. linearis Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 175; Fl. Bat. tab. 880.

III. *Téleutospores!* Oud. l. c. p. 523.

I. F. du *Berberis vulgaris.*

II et III. F. des *Catabrosa aquatica*, *Elymus arenarius*, *Holcus mollis*, *Phragmites communis*, *Secale cereale*, *Triticum repens* et *vulgare.*

***Puccinia Grossulariae** N. K. A. 2, V, 590. — Voir: *Aecidium Grossulariae.*

44. **Puccinia Heraclei** Grev. Scott. Crypt. Fl. tab. 42. — Arch. Néerl. VIII, 375; Lindroth Umbellif.-Ured. 40. — Sydow Monogr. 387. — N. K. A. 2, I, 173, Arch. Néerl. VIII, 375. — Pucc. Pimpinellae Oud. Rév. I, 520—522; — N. K. A. 2, V, 627. — Sacc. Syll. VII, 616. — Wint. Kr. Fl. I, 212.

I. *Aecidium!* Caeoma Aecid. Heraclei Dozij et Molkenboer N. K. A. I, I, 57; 2, I, 173; Arch. Néerl. VIII, 375; Oud. Fgi Neerl. exs. n° 28.

II. *Uredo!* Trichobasis Heraclei Berk. Outl. 332. — Oud. Fgi Neerl. exs. n° 29. — N. K. A. 2, I, 173. — Uredo Heraclei Berk. Engl. Fl. V, 280; Oud. Arch. Néerl. VIII, 375. — Pucc. Pimpinellae II, N. K. A. 2, V, 627.

III. *Téleutospores!* Oud. Fgi Neerl. exs. n° 30. — N. K. A. 2, I, 173 (III); Pucc. Pimpinellae III, N. K. A. 2, V, 627.

I, II, III. F. de l'*Heracleum Sphondylium.*

45. **Puccinia Hieracii** (Schum.) Mart. Mosq. 225. — Oud. Rév. I, 539. — Sacc. Syll. VII, 633. — Wint. Kr. Fl. I, 206. — Sydow Monogr. 95.

Selon les recherches récentes, le *Pucc. Hieracii* d'autrefois range parmi les espèces collectives qu'il faut démembrer en plusieurs autres. Dorénavant le nom de *Pucc. Hieracii* ne devra être appliqué qu'aux Urédinées qui ont pour support les espèces du genre Hieracium lui-même.

Le *Pucc. Hieracii* des auteurs modernes ne semble pas encore

été rencontré dans les Pays-Bas. Les *Pucc. Bardanae* Cda, *Cardu-orum* Jacky et *Pieridis* Raszl., qu'on y rapporta autrefois, comptent aujourd'hui parmi les espèces autonomes, et devront être cherchées dans notre Énumération sous leur propre nom.

46. **Puccinia holcina** Erikss. A. S. N. S, IX (1899), 274. — Kleb. Wirtsw. Rostp. 249.

I. *Aecidium?*

II. *Uredo!*

III. *Teleutospores!*

I. Aecidium? II et III. F. des *Holcus lanatus* et *mollis*. N. K. A. 2, 1, 90 et Oud. Rév. 1, 529.

47. **Puccinia Hydrocotyles** (Lk.) Cooke Grev. IX, 14. — Oud. Rév. 1, 546. — Sacc. VII, 641. — Sydow Monogr. 388.

I. *Aecidium.* — ⊙

II. *Uredo!* U. Hydrocotyles Mont. Prodr. Iles Fern. n° 59 et Fl. Chil. VIII, 50. — Oud. Rév. l. c. et Fgi Neerl. exs. n° 146. — Wint. Kr. Fl. I, 255.

III. *Teleutospores* †

II (†) et III (†) F. du *Hydrocotyle vulgaris.*

18. **Puccinia Hypochoeridis** Oud. N. K. A. 2, 1 (1873) 175; Arch. Néerl. VIII, 359. — Sydow Monog. 100. — Pucc. Hieracii Oud. Rév. I, 539. — Sacc. Syll. VII, 634. — Wint. Kr. Fl. I, 206.

I. *Aecidium.* — ⊙

II. *Uredo!* N. K. A. 2, 1, 175; Oud. Fgi Neerl. exs. n° 136.

III. *Teleutospores!* N. K. A. 2, 1, 175; Oud. Fgi Neerl. exs. n° 136.

II et III. F. des *Hypochoeris glabra* (II) et *radicata* (II et III).

49. **Puccinia Lapsanae** (Schultz) Fuck. Symb. 53. — Oud. Rév. 1, 516; N. K. A. 2, 1, 90; 2, V, 627. — Sacc. Syll. VII, 607. — Sydow Monogr. 112.

I. *Aecidium!* Aec. Lampsanae Schultz Prodr. Fl. Stargard. 454. — Oud. N. K. A. 2, V, 469.

II. *Uredo!* U. Lampsanae Rab. H. M. Ed. 1ª n° 478. — Oud. Herb. v. Ned. Pl. n° 188. — Caeoma Uredo Compransor T. N. G XI, 108 p.p.

III. *Teleutospores!* Oud. Herb. v. Ned. Pl. n° 488.

I, II, III. F. du *Lampsana communis.*

50. **Puccinia Leontodontis** Jacky Compos. Puccin. (1899) p. 75. — Sydow Monogr. 114. — Pucc. Hieracii Oud. Rév. 1, 539 p.p.

I. *Aecidium!* ⊙

II. *Uredo!* U. Apargiae Schleich. in schedulis. — U. Flosculosorum A. S. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 177.

III. *Téleutospores!* Oud. l. c. p. 540.

II, III. F. des *Leontodon autumnalis* et *Thrincia hirta*.

51. **Puccinia Liliacearum** Duby Bot. Gall. II, 891. — Oud. Rév. I, 551; T. N. G. XI, 406; N. K. A. 2, IV, 513 et 2, V, 628. — Sacc. Syll. VII, 668. — Wint. Kr. Fl. I, 194. — Sydow Monogr. 626.

I. *Aecidiolum!* Oud. l. c. p. 552.

II. *Aecidium* †

III. *Uredo.* — ⊙

IV. *Téleutospores!*

I et IV. F. des *Ornithogalum nutans* et *umbellatum*.

52. **Puccinia linearis** Rob. in Desm. A. S. N. 4, IV, 125 (an 1855). — Oud. Rév. I, 525. — Sacc. Syll. VII, 624. — Wint. Kr. Fl. I, 222. — Pucc. Winteriana Magn. — Pucc. Allii.-Phalaridis Kleb. Pringsh. Jahrb. XXXIV, 339; id. Wirtw. Rostp. 264.

I. *Aecidium!* Acc. Allii ursini P. Syn. 210. — Caeoma Alliatum Lk. Spec. II, 43. — T. N. G. XI, 410. — Sacc. l. c. (sous 18). — Wint. Kr. Fl. I. c. (sous 336). — Oud. l. c. (sous 18).

II. *Uredo* †

III. *Téleutospores* †

I. F. de l'*Allium ursinum*. — II (†) et III (†). F. du *Phalaris arundinacea*.

53. **Puccinia Lolii** Nielsen Oest. bot. Zeit. 1901, n° 3. — Pucc. coronifera Kleb. 1er Ber. Zeits. f. Pfl. Krkh. Bd. II, p. 21—26; 2er Ber. ibid. Bd. V, p. 129—136; 3er Ber. ibid. Bd. V, p. 151—158; 4er Ber. ibid. Bd. V, p. 327—353; 5er Ber. ibid. Bd. VI, 331—333. — Kleb. Jahrb. Hamb. wiss. Anst. XX p. 53; id. Wirtw. Rostpilze 257. — Oud. Rév. I, 586 et N. K. A. 3, I, 163. — Sydow Monogr. 701.

I. *Aecidium!* Acc. Cathartici Schum. Saell. II, 225. — Oud. Rév. I, 521, sub 17 et p. 585, sous 6. — Sacc. Syll. VII, 623, sous 17. — Wint. Kr. Fl. I, 218, sous 331.

II. *Uredo* †

III. *Téleutospores!* F. du *Lolium perenne*. — Rencontré ailleurs sur les *Alopecurus pratensis*, *Arrhenaterum elatius*, *Avena sativa*, *Dactylis glomerata*, *Festuca elatior*, *Glyceria aquatica*, *Holcus lanatus* et *mollis*; *Lolium perenne*.

I. F. du *Rhamnus cathartica*; II et III. Plusieurs Graminées.

Puccinia Luzulae Lib. — N. K. A. 2, I, 315; Arch. Néerl. VIII, 380. — Voir: *Pucc. oblongata*.

***Puccinia Lychnidearum** Lk. — Voir: *Pucc. Arenariae.*

54. **Puccinia Magnusiana** Körn. Hedw. XV, 179. — Oud. Rév. I; 535; N. K. A. 2, V, 628. — Sacc. Syll. VII, 631. — Wint. Kr. Fl. I, 221. — Kleb. Wirtsw. Rostp. 285.

I. *Aecidium!* Aec. Ranunculi repentis Plowr. Monogr. 178. — Oud. l. c.

II. *Uredo!* Lecythea Baryi Oud. N. K. A. 2, I, 177; Rab. F. E. n° 1488. — Lecythea Phragmitidis Oud. N. K. A. 2, I, 260 et tab. XI f. 12; Arch. Néerl. VIII, 383, avec fig.

III. *Téleutospores!* Oud. l. c.

I. F. du *Ranunculus repens.* — II et III. F. du *Phragmites communis.*

55. **Puccinia major** Dietel Mitth. Thür. bot. Ver. Neue Folge 1894, Heft. VI. — Sydow Monogr. 66. — Oud. Rév. I, 516, sous 8, pour autant qu'il concerne le *Crepis paludosa.* — Sacc. Syll. XIV, 310.

I. *Aecidium!* Aec. Lampsanae Schultz Fl. Stargard. 454 (p.p.). — Oud. l. c.

II. *Uredo* †

III. *Téleutospores* †

I, II (†), III (†). F. du *Crepis paludosa.*

56. **Puccinia Malvaccarum** Mont. dans Gay Hist. fis. y polit. de Chile VIII, 43 et Syll. 314. — Oud. Bot. Zeit. 1874, p. 742; N. K. A. 3, II, 101; 2, V, 589 et 629; Oud. Rév. I, 558. — Sacc. Syll. VII, 686. — Wint. Kr. Fl. I, 168. — Sydow Monogr. 476.

I. *Aecidium.* — ⊙

II. *Uredo* ⊙

III. *Téleutospores!*

III. F. des *Althaea rosea* (Oud. Fgi Neerl. exs. n° 22), et des *Malva moschata, silvestris* (Oud. Fgi Neerl. exs. n° 23) et *vulgaris.*

57. **Puccinia Menthae** P. Syn. 227. — Oud. Rév. I, 522; T. N. G. XI, 406; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 163; N. K. A. 2, IV, 512; 2, V, 589 et 627. — Sacc. Syll. VII, 617. — Wint. Kr. Fl. I, 204. — Kleb. Zeits. f. Pfl. Krkh. 5er Ber. Bd. VI, 334 et 6er Ber., Bd. VII, 37. — Sydow Monogr. 282.

I. *Aecidiolum* †

II. *Aecidium* † Aec. Menthae D. C. Fl. Fr. VI, 93.

III. *Uredo!* U. Menthae P. Syn. 220. — Oud. l. c.; N. K. A. 2, V, 589 et 627. — U. Labiatarum D. C. a. Menthae P. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 177 et b. Clinopodii Rab. ibid.

IV. *Téleutospores!*

III et IV. F. des *Clinopodium vulgare, Mentha aquatica* (Oud. Fgi Neerl. exs. n° 256. — III), *arvensis* et *viridis*.

58. **Puccinia Millefolii** Fuck. Symb. 55. — Oud. Rév. I, 560; N. K. A. 2, V, 469 et 629. — Sacc. Syll. VII, 687. — Sydow Monogr. 2.

I. *Aecidium*. — ⊙

II. *Uredo*. — ⊙

III. *Téleutospores!*

III. F. de l'*Achillea Millefolium*.

***Puccinia Mochringiae** Fuck. Symb. 51. — N. K. A. 2, I, 90. — Voir: *Puccinia Arenariae*.

59. **Puccinia nemoralis** Juel, Ofvers. af k. V. et Ak. Förh. Stockh. 1894, n° 9. p. 503—508; Kleb. in Pringsh. Jahrb. XXXIV, 402? id. Wirtsw. Rostp. 288 et *Carduus crispus*. — Puccinia Moliniae Oud. Rév. I, 526; N. K. A. 2, V, 591 et 628; 3, II, 201. — Sacc. Syll. VII, 631. — Wint. Kr. Fl. I. 219. — Sydow Mon. 762.

I. *Aecidium!* Aec. Melampyri Kze. u. Schm exs. n° 165. — Oud. Rév. I, 583. — Sacc. Syll. VII, 813. — Wint. Kr. Fl. I, 262. — Caeoma Malampyratum Lk Spec. II, 16. — T. N. G. XI, 410.

II. *Uredo* †

III. *Téleutospores!* F. du *Molinia caerulea*.

I. F. du *Melampyrum pratense!* II (†) et III. F. du *Molinia caerulea*.

60. **Puccinia Myrrhis** A. S. Consp. 296. — Lindroth Umbellif.-Ured. 28. — Pucc. Pimpinellae Oud. Rév. I, 520—522.

I. *Aecidium*. ⊙

II. *Uredo!* Oud. l. c. (p.p.).

III. *Téleutospores!* Oud. l. c. (p.p.)

II, III. F. du *Myrrhis odorata* (cultivé).

***Puccinia nemoralis** Juel. — Voir: Pucc. Moliniae.

***Puccinia Nolitangere** sive **Nolitangeris** Cda. — N. K. A. 2, I, 177; Arch. Néerl. VIII, 375. — Voir: *Puccinia argentata*.

61. **Puccinia oblongata** (Lk.) Wint. Kr. Fl. I, 183 — Oud. Rév. I, 519. — Sacc. Syll. VII. 658. — Sydow Monogr. 646. — Pucc. Luzulae Lib. — N. K. A. 2, I, 315; Arch. Néerl. VIII, 380.

I. *Aecidium*. — ⊙

II. *Uredo!* U. oblongata Grev. Scott. Cr. Fl. tab. 12. — Oud. l. c. — Arch. Néerl. VIII, 381. — U. macrospora Desm. Bull. Soc. bot. de Fr. IV (1857), 757.

III. *Téleutospores* †

II, III †. F. de quelques espèces de *Luzula*. II. F. du *L. pilosa*.

62. **Puccinia obscura** Schröt. in Pass. Fgi Parm. in N. Giornale bot. ital. IX, 256. — Oud. Rév. I, 533. — Sacc. Syll. VII, 629. — Wint. Kr. Fl. I, 183. — Schröt. Pilze Schles. I, 330. — Sydow Monogr. 645. — Kleb. Wirtsw. Rostp. 317.

I. *Aecidium!* Aec. Bellidis Thüm. Fgi austr. n° 635. — Oud. l. c.

II. *Uredo!*

III. *Teleutospores!* Oud. Rév. I, 533.

I. F. du *Bellis perennis*. — II et III. F. du *Luzula multiflora* (II, sous le nom de Pucc. Luzulae II, dans Oud. Fgi Neerl. exs. n° 254. — III, sous le nom de Pucc. Luzulae III, dans Oud. Fgi Néerl. exs. n° 254).

***Puccinia obtegens** (Lk) Tul. A. S. N. IV, 87. — Sydow Monogr. 53. — Voir: *P. suaveolens*.

63. **Puccinia Orchidearum-Phalaridis** Kleb. Zeits. f. Pfl. Krkh. 5er Ber. VI, 268—270; 6er Ber. Bd. VII, 30—33; 7er Ber. Bd. IX, 41—42; id. Pringsh. Jahrb. XXXIV, 399; id. Zeits. f. Pfl. Krkh. 10er Ber., Bd. XII, 43—46; id. Jahrb. Hamb. wiss. Anst. XX, 48; id. Wirtsw. Rostp. 271.

I. *Aecidium!* Aec. Orchidearum Desm. Cat. Pl. omises, 26. — Oud. Rév. I, 536, sous 32; N. K. A. 2, I, 177; Arch. Néerl. VIII, 384.

II. *Uredo* †

III. *Teleutospores* †

I. F. des *Listera ovata*, *Orchis latifolia* et *Orchis maculata*. — II (†) et III (†) F. du *Phalaris arundinacea*.

64. **Puccinia perplexans** Plowr. Quart. Journ. of microsc. Science, New Ser. XXV, 164. — Oud. Rév. I, 536. — Sacc. Syll. VII, 632. — Sydow Monogr. 719. — Kleb. Wirtsw. Rostp. 274.

I. *Aecidium!* — Aec. Ranunculi acris P. Obs. Myc. II, 22. — Oud. l. c. — Caeoma ranunculacearum Lk Spec. II, 54, p. p. — T. N. G. XI, 410.

II. *Uredo* †

III. *Teleutospores* †

I. F. du *Ranunculus acer*. — II (†) et III (†). F. de l'*Alopecurus pratensis*.

65. **Puccinia persistens** Plowr. Monogr. 180. — Oud. Rév. I, 537; N. K. A. 3, II, 201. — Kleb. Wirtsw. Rostp. 291.

I. *Aecidium!* — Aec. Thalictri Grev. Scott. Cr. Fl. tab. 4. — Oud. l. c. — N. K. A. 2, V, 590. — Aec. Thal. flavi Wint. Kr. Fl. I, 269. — Aec. Ranunculacearum var. Thalictri D. C. Fl. Fr. VI, 97. — N. K. A. 2, I, 176; Arch. Néerl. VIII, 381,

II. *Uredo* †

III. *Teleutospores!* Oud. N. K. A. 3, II, 201.

I. F. des *Thalictrum flexuosum* et *minus*. — II (†) F. du *Triticum repens* et de l'*Arrhenaterum elatius* (?). — III. F. du *Triticum repens*.

66. **Puccinia Petroselini** (D. C.) Lindroth: die Umbellif.-Uredineen. 84. — Sydow Monogr. 399. — Pucc. Aethusae Lk (comme synon. du Pucc. bullata Oud. Rév. I, p. 541 et 542; Pucc. Aethusae Lk. — T. N. G. XI, 406.

I. *Aecidium* ⊙

II. *Uredo!* Oud. l. c. p. 542. — U. muricella Wallr. a. Cynapii Rab. — Prodr. Fl. Bat. II. 4, p. 177.

III. *Teleutospores!*

II et III. F. de l'*Aethusa Cynapium*.

67. **Puccinia Phalaridis** Plowr. Journ. Linn. Soc. XXXIV, 88 et Monogr. 166. — Oud. Rév. I, 526. — Sacc. Syll. IX, 313. — Pucc. Ari-Phalaridis Kleb. Zeits. f. Pfl. Krkh. 7er Ber., Bd. IX, 39; id. Wirtw. Rostp. 263.

I. *Aecidium!* Aec. Ari D. C. Cat. Pl. omises, a° 1823, p. 260. — Oud. l. c. — Sacc. Syll. VII. 831. — Wint. Kr. Fl. I, 260. — Caeoma Ari Dozij et Molkb. N. K. A. 1, I, 55.

II. *Uredo* †

III. *Teleutospores* †

I. F. de l'*Arum maculatum*. — Oud. Fgi Neerl. exs. n° 262. — II (†) et III (†). F. du *Phalaris arundinacea*.

68. **Puccinia Phlei pratensis** Eriksson et Hennings Zeits. f. Pfl. Krkh. 1891, p. 41. — Kleb. Wirtsw. Rostp. 235. — Oud. N. K. A. 3. III. 1090 (II = Uredo). — F. du *Phleum pratense*.

69. **Puccinia Phragmitis** (Schum.) Körn. Hedw. XV, 179. — Oud. Rév. I, 533. — Sacc. Syll. VII, 630. — Wint. Kr. Fl. I, 179. — Kleb. Wirtsw. Rostp. 283. — Pucc. arundinacea Hedw. in D. C. Fl. Fr. VI, 59. — Prodr. Fl. Bat. II, IV, 161; N. K. A. 2. I, 89; 2, V. 591 et 628. — Pucc. striola Schlecht. — T. N. G. XI, 405 (pour Lk lisez: Schlecht.).

I. *Aecidium!* — Aec. rubellum α Rumicis Gmel. in L. Syst. Nat. II, 1473. — Fl. Bat. tab. 1140. — Aec. Rumicis P. Syn. 207. — Oud. Fgi Neerl. exs. n° 54 et 55. — Caeoma rubellatum Lk. Spec. II. 44. — T. N. G. XI, 410. — Aec. Rhei West. — Oud. Fgi Neerl. exs. n° 148.

II. *Uredo!* Lecythea Baryi Oud. in Rab. F. E. n° 1488. — Lec. Phragmitidis Oud. N. K. A. 2. I, 200.

III. *Teleutospores!* F. du *Phragm. communis*.

I. F. des *Rumex crispus*, *Hydrolapathum* et *obtusifolium*, et du *Rheum undulatum* (Oud Fgi Neerl. exs. n° 54 et 55 et n° 148). — II. F. du *Phragmites communis* (Oud. Fgi Neerl. exs. n° 47). — III. F. du *Phragm. comm.* (Oud. Fgi Neerl. exs. n° 48 et Herb. Ned. Pl. n° 400).

70. **Puccinia Picridis** Haszl. Brand. u. Rostp. Ungarns, in Acad. Sc. 1877. — Sacc. Syll. VII, 652. — Sydow Monogr. 130. — Pucc. Hieracii Oud. Rév. I, 539 (p.p.); Pucc. Compositarum T. N. G. XI, 406 (p.p.).

I. *Aecidium* ⊙

II. *Uredo!* Oud. l. c. 540.

III. *Teleutospores!* T. N. G. XI, 406 p.p., sous Pucc. Comp.; Oud. l. c. 540.

II et III. F. du *Picris hieracioides*.

71. **Puccinia Pimpinellae** (Strauss) Mart. Mosq. 226. Oud. Rév. I, 520 (p.p.); Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 163; N. K. A. 2, V, 627 (p.p.). — Sacc. Syll. VII, 616 (p.p.). — Wint. Kr. Fl. I, 212 (p.p.). — Sydow Monogr. 408.

I. *Aecidium!* Aec. Pimpinellae Kirchn. Lotos 1856, p. 180. — N. K. A. 2, V, 627. — Kleb. in Pringsh. Jahrb. XXXIV (1899) p. 404.

II. *Uredo!* U. Pimpinellae Ung. Exanth. 247 (non Strauss, quae est Puccinia); N. K. A. 2, V, 627; Oud. l. c. p. 521.

III. *Teleutospores!* Pucc. Pimpinellae Lk. Spec. II, 77. — Oud. l. c. p. 521 (p.p.); N. K. A. 2, V, 627.

I, II, III. F. des *Pimpinella magna* et *Saxifraga*.

72. **Puccinia Poarum** Nielsen Bot. Tidssk. 3, II, 26 (1876). — Oud. Rév. I, 530; N. K. A. 2, V, 591. — Sacc. Syll. VII, 625. — Wint. Kr. Fl. I, 220. — Kleb. Wirtsw. Rostp. 289.

I. *Aecidium!* Aec. Tussilaginis Gmel in L. Syst. Nat. II, 1473. — Oud. l. c.; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 166; N. K. A. 2, V, 591. — Caeoma Compositatum T. N. G. XI, 410 (p.p.)

II. *Uredo* †

III. *Teleutospores* †

I. F. du *Tussilago Farfara*. — Oud. Fgi Neerl. exs. n° 60. — II (†) et III (†). F. de plusieurs espèces de *Poa*.

***Puccinia Polygoni** (P.) Schröt. — Oud. Rév. I, 543; N. K. A. 2, V, 628; 3, I, 234. — Voir: *Pucc. Polygoni amphibii*.

73. **Puccinia Polygoni amphibii** P. Syn. 227. — Wint. Kr. Fl. 185 et 186. — Sydow Monogr. 569. — Kleb. Wirtsw. Rostp. 322. — Pucc. Polygoni (P.) Schröt. Pilze Schles I, 336. — Oud. Rév. I, 543. — Sacc. Syll. VII, 636; N. K. A. 2, V, 628; 3, I,

234. — Pucc. Polygonorum Schlecht. Fl. Berol. II, 132 (p.p.). — T. N. G. XI, 405; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 162; N. K. A. 2, I, 90.

I. *Aecidium* † Aec. sanguinolentum Lindroth, Bot. Notiser 1900, p. 241.

II. *Uredo!* U. Polygonorum D. C. Fl. Fr. VI, 71. — N. K. A. 2, I, 90. — Caeoma U. Polygonorum Lk. Spec. II, 10, p.p. — T. N. G. XI, 407.

III. *Télentospores!* Pucc. Amphibii Fuck., Pucc. Persicariae Mart., Pucc. Polygoni P., Pucc. Polygonorum Auct. plurim.

I. F. des *Geranium palustre* et *pratense*. — II. F. des *Pol. amphibium* (Oud. Fgi Neerl. exs. n° 39, partim, *Pol. Convolvulus*, *Pol. Persicaria*. — III. F. des *Pol. amphibium* (Oud. Fgi Néerl. exs. n° 39, partim, et n° 131, *Pol. Convolvulus*, *dumetorum* et *Persicaria*.

***Puccinia Polygonorum** Schlecht. — T. N. G. XI, 405; Prodr. Fl. Bat. II, 1, p. 162; N. K. A. 2, I, 90. — Voir: *Pucc. Polygoni amphibii*.

74. **Puccinia Porri** (Sow.) Wint. Kr. Fl. I, 200. — Oud. Rév. I, 511; N. K. A. 2, V, 627. — Sacc. Syll. VII, 605. — Sydow Monogr. 610.

I. *Aecidium* †

II. *Uredo* †

III. *Télentospores!*

I (†) II (†). F. de plusieurs espèces d'*Allium*. — III. F. de l'*Allium vineale*.

L'*Uredo ambigua* D. C. appartient au genre *Uromyces*, vu que ses spores ont été décrites comme longuement pédicellées.

75. **Puccinia praecox** Bubak Verh. naturf. Verein Brünn, 1898, p. 1 (extrait). — Sydow Monogr. 67. — Sacc. Syll. XIV, 309. — Pucc. Lapsanae Oud. Rév. I, 516 p.p.

I. *Aecidium* † Aec. praecox Bubak.

II. *Uredo!*

III. *Télentospores* †

I (†); II. Oud. Fgi Neerl. exs. n° 36; III (†). F. du *Crepis biennis*.

***Puccinia Prenanthis** (P. p.p.) Lindroth Acta Soc. pro Fauna et Flora fennica 1901, n° 9. — Oud. Rév. I, 515; N. K. A. 2, V, 590 et 627. — Sacc. Syll. VII, 606. — Wint. Kr. Fl. I, 208. — Sydow. Monogr. 106. — Voir: *Pucc. Chondrillae*.

76. **Puccinia Primulae** (D. C.) Grev. Fl. Edin. 132. — Oud. Rév. I, 519; N. K. A. 2, V, 170 et 627. — Sacc. Syll. VII, 612. — Wint. Kr. Fl. I, 203. — Sydow Monogr. 348.

I. *Aecidium!* Aec. Primulae D. C. Fl. Fr. VI, 90; Fl. Bat. tab. 1930.

II. *Uredo!* U. Primulae D. C. Fl. Fr. VI, 68.

III. *Téleutospores!* Fl. Bat. tab. 1920.

I, II, III. F. du *Primula acaulis* Jacq.

***Puccinia Pruni** A. S. — Oud. Rév. I, 547. — Voir: *Pucc. Pruni spinosae.*

77. **Puccinia Pruni spinosae** P. Syn. 226. — Wint. Kr. Fl. I, 193. — Sydow Monogr. 484. — Pucc. Pruni A. S. Consp. 131. — Oud. Rév. I, 547. — Sacc. Syll. VII, 648. — Pucc. Prunorum Lk Spec. II, 82. — T. N. G. XI, 406. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 164.

I. *Aecidium* ⊙

II. *Uredo!* U. Prunastri D. C. Fl. Fr. VI, 85. — U. Pruni Mont. Syll. 315. — Caeoma porphrogeneta T. N. G. XI, 409.

III. *Téleutospores!* Oud. l. c. p. 548.

II, III. F. du *Prunus domestica* (Oud. Fgi Néerl. exs. n° 24).

***Puccinia Prunorum** Lk. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, 164 et T. N. G. XI, 416. — Voir: *Pucc. Pruni spinosae.*

***Puccinia pulverulenta** Grev. — Voir: *Pucc. Epilobii tetragoni.*

78. **Puccinia punctata** Lk. Obs. Myc. II, 30. — Sydow Monogr. 213. — Pucc. Galii (P.) Schwein. — Oud. Rév. I, 512; N. K. A. 2, V, 626. — Sacc. Syll. VII, 600. — Wint. Kr. Fl. I, 210. — Pucc. Galiorum Lk. Spec. II. 76. — T. N. G. XII, 275; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 163; N. K. A. 2, I, 173; Arch. Néerl. VIII, 328.

I. *Aecidium* †

II. *Uredo!* U. Galii Duby Bot. Gall. II, 896. — N. K. A. 2, I, 173. — Caeoma U. epigallienm T. N. G. XI, 408.

III. *Téleutospores!*

I. (†) F. de plusieurs espèces de *Galium.* — II. F. des *Galium erectum, palustre, uliginosum.* — III. F. du *Galium Mollugo.*

***Puccinia reticulata** de Bary. — N. K. A. 2, I; 177; Arch. Néerl. VIII, 378. — Voir: Pucc. Chaerophylli.

79. **Puccinia Ribis** D. C. Fl. Fr. II, 221. — Oud. Rév. I, 355. — Sacc. Syll. VII, 679. — Sydow Monogr. 496. — Pucc. Grossulariae Wint. Kr. Fl. I, 198.

I. *Aecidium* ⊙

II. *Uredo* ⊙

III. *Téleutospores!*

III. F. du *Ribes rubrum.*

***Puccinia Rubigo vera** (D. C.) Wint. Kr. Fl. I, 217. — Oud. Rév. I, 528, N. K. A. 2, IV, 514; 2, V, 590. — Sacc. Syll. VII, 624. — Pucc. Straminis Fuck. E. F. N. 9. — N. K. A. 2,

I, 90 et 176; Arch. Neerl. VIII, 881. — Pucc. dispersa Erikss. et Henn. p.p. in Sydow. Monogr. 709.

I. *Aecidium!* Aec Asperifolii P. Obs. Myc. I, 97. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 166; N. K. A. 2, I, 176; 2, V, 590; Arch. Néerl. VIII, 381. — Aec. Asperifoliorum N. K. A. 2, III. 254. — Caeoma Borraginatum Lk. Sp. II, 48. — T. N. G. XI, 410.

II. *Uredo!* U. Rubigo vera D. C. Fl. Fr. VI, 83. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 171; N. K. A. 2, I, 90; Arch. Néerl. VIII, 39. — Caeoma Uredo Rubigo Lk. Spec. II, 4. — T. N. G. XI, 407.

III. *Téleutospores!*

I. F. des *Cynoglossum officinale*, *Lycopsis arvensis* et *Symphytum officinale*. — II et III. F. des *Bromus mollis* et *tectorum*, *Holcus mollis*, *Hordeum secalinum* et *vulgare*, *Secale cereale* (Oud. Fgi Neerl. exs. n° 45, II), *Triticum repens*. — Voir: *Pucc. agropyrina*, *Arrhenatari*, *dispersa*, *holcina*, *simplex*, *Symphyti-Bromorum*, *triticina*.

***Puccinia Saginae** Kze. u. Schm. — N. K. A. 2, I, 176. — Voir: *Pucc. Arenariae*.

80. **Puccinia Saxifragae** Schlecht. Fl. Berol. II, 134. — Oud. Rév. I, 554. — Sacc. Syll. VII, 678. — Wint. Kr. Fl. I, 174. — Sydow Monogr. 501. — Pucc. Saxifragarum Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 164.

I. *Aecidium*. — ⊙

II. *Uredo*. — ⊙

III. *Téleutospores!* Oud. l. c. 555.

III. F. d'une espèce de *Saxifraga*.

***Puccinia Saxifragarum** N. K. A. 1, 1, 56. — Voir: *Pucc. Adoxae*.

***Puccinia Saxifragarum** Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 164. — Voir: *Pucc. Saxifragae*.

81. **Pucc. Schoeleriana** Plowr. et Magn. Hedw. 1886 p. 39. — Oud. Rév. I, 532. — Sacc. Syll. VII, 627. — Sydow Monogr. 659. — Kleb. Wirtsw. Rostp. 308.

I. *Aecidium!* Aec. Jacobaeae Grev. Fl. Edin 445. — Aec. Senecionis Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 169 p.p.; N. K. A. 2, I, 88.

II. *Uredo* †

III. *Téleutospores* †

I. F. du *Senecio Jacobaea*. — Oud. Fgi Neerl. exs. n° 59. — II (†) et III (†). F. du *Carex arenaria*.

82. **Puccinia Scirpi** D. C. Fl. Fr. II, 223. — Oud. Rév. I,

549; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 162; N. K. A. 2, III, 154. — Sacc. Syll. VII, 659. — Wint. Kr. Fl. I, 182. — Sydow Mon. 688. — Kleb. Wirtsw. Rostp. 316.

I. *Aecidium.* — † Aec. Nymphoides D. C.

II. *Uredo!* U. Scirpi West. 7e Not. p. 12; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 176; N. K. A. III, 154.

III. *Téleutospores!* Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 162.

I. F. du Limnanthemum nymphaeoides. — II et III. Chaumes du *Scirpus lacustris.*

83. **Puccinia Scorzonerae** (Schum.) Jacky Compos. Pucc. p. 54 (a° 1899). — Sydow Monogr. 141.

I. *Aecidiolum* † Aecidiolum minutellum Spegaz. Mich. I, 477; Sacc. Syll. VII, 774.

II. *Aecidium!* Aec. Cichoraccarum D. C. Fl. Fr. II, 239 p.p. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 166 p.p. — Aec. Tragopogi Oud. Rév. I, 553.

III. *Uredo* †. Uredo Scorzonerae Schum. Saell. II. 229.

IV. *Téleutospores* †

I—IV. F. du *Scorzonera hispanica.*

84. **Puccinia Senecionis** Lib. Crypt. Ard. n° 92. — Sydow Monogr. 143. — Pucc. conglomerata (Strauss) Kze et Schm. — Oud. Rév. I, 551; Arch. Néerl. II, 39; N. K. A. 2, V, 590. — Sacc. Syll. VII, 195. — Wint. Kr. Fl. I, 195.

I. *Aecidium!* Aec. Senecionis Oud., non Desm., lequel appartient au Sen. Jacobaea, et par là au cycle biologique du Pucc. Schoelleriana. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 169 p.p.; N. K. A. 2, I, 178 et 2, V, 590; Arch. Néerl. VIII, 384.

II. *Uredo* ⊙

III. *Téleutospores* †

I et III (†). F. des *Senecio Fuchsii* et *sarracenicus.*

***Puccinia sessilis** Schneid. — Voir: *Pucc. linearis.*

85. **Puccinia simplex** (Körn.) Erikss. et Henn. Zeits. f. Pfl. Krkh. IV (1894), 259. — Kleb. Wirtsw. Rostp. 248.

I. *Aecidium?*

II. *Uredo!* (Oud. Rév. I 529).

III. *Téleutospores!* (Oud. Rév. I, 529).

I? II et III F. des *Hordeum jubatum*, *secalinum* et *vulgare.*

86. **Puccinia Sonchi** Rob. in Desm. A. S. N. 3, XI, 274 et Pl. Crypt. de Fr. 1e S., 1e Ed. n° 1831 et 2e Ed. n° 1531. — Oud. Rév. I, 544 et 584; Prodr. Fl. Bat. II, 4, 164; N. K. A. 2, I, 260 et tab. XI, f. 21; ibid. 2, V, 628; Arch. Néerl. VIII, 379 et tab. XI, f. 21. — Sacc. Syll. VII, 638. — Wint. Kr. Fl.

1, 89. — Sydow Monogr. 154. Pucc. Compositarum Prodr. Fl. Bat. II. 4. p. 163. — Uromyces Sonchi Oud. in Rab. Fgi Eur. n° 1592.

I. *Aecidium Sonchi* Oud. Rév. 1, 584 (non West.). — Caeoma Compositarum T. N. G. 410, p.p. [1])

II. *Uredo!*

III. *Teleutospores!*

I. F. du *Sonchus asper*. — II et III. F. des *Sonchus arvensis* (Oud. Fgi Néerl. exs. n° 137) et *oleraceus*.

87. **Puccinia Spergulae** D. C. Fl. Fr. II, 219. — Oud. Rév. 1, 557; N. K. A. 2, 1, 176 et Arch. Néerl. VIII, 375; Sacc. Syll. VII, 681. — Sydow Monogr. 560.

I. *Aecidium* ⊙

II. *Uredo* ⊙

III. *Teleutospores!*

III. F. du *Spergula arvensis*.

***Puccinia Stellariae** Rab. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 164. — Voir: *Pucc. Arenariae*.

***Puccinia Straminis** de Bary. — N. K. A. 2, 1, 90 et 176: Arch. Néerl. VIII, 381. — Voir: *Pucc. Rubigo vera*.

***Puccinia Striola** Lk. — T. N. G. XI, 405. — Voir: *Pucc Phragmitis*.

88. **Puccinia suaveolens** (P.) Sacc. Syll. VII, 633. — Wint. Kr. Fl. 1, 189. — Magnus Hedw. XLII (1903) 305.

I. *Aecidiolum!* Sphaeronaema Cirsii Lasch Bot. Zeit. 1848, p. 506. — Oud. Hedw. 1898, p. 32.

II. *Aecidium*. — ⊙

III. *Uredo!* U. suaveolens P. Obs. Myc. II, 24 p.p. — Oud. l. c. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, 176; N. A. K. 2, 1, 90. — Caeoma suaveolens Lk. Spec. II, 19. — T. N. G. XI, 408. — Pucc. floseulosorum II. Wint. — N. K. A. 2, V, 628.

IV. *Teleutospores*. — Uredo punctiformis Strauss Wett. II, 103 et fig. 37. — Oud. l. c. p. 539.

I, III, IV. — F. du *Cirsium arvense*. — I in Oud Fgi Neerl. exs. n° 31, sur *Cirsium arvense;* III in Oud. F. N. exs. n° 35; IV, in Oud. Herb. v. Ned. Pl. n° 146, sur *Carduus crispus* et *Cirsium arvense*, sous le nom de *Pucc. obtegens* Tul.

***Puccinia Succisae** Kze u. Schm. — Voir: *Aecidium*.

---

[1]) Selon Mr. Lagerheim l'Aec. Sonchi West. 7e Not. p. 10 (a° 1861) représente l'état Uredo du Pucc. Sonchi (Sydow. Monogr. 155), et la même observation a été suggérée par Sydow lui-même en regard de l'Aec. Sonchi Johnston. — La synonymie de l'Aec. Sonchi Karst. Myc. Fenn. IV, 43 semble douteuse.

89. **Puccinia Symphyti-Bromorum** F. Müller Beitr. bot. Centralbl. 10 (1901), 181. — Kleb. Wirtsw. Rostp. 239.

I. *Aecidium!*

II. *Uredo!*

III. *Téleutospores!*

I. F. du *Symph. off.* (N. K. A. 2, I, 176). — II et III. F. des espèces de *Bromus* (*Br. mollis* et *tectorum*) N. K. A. 2, I, 176 et Herb. meum.

90. **Puccinia Tanaceti** D. C. Fl. Fr. II, 222. — Oud. Rév. I, 544 p.p. — Sacc. Syll. VII, 637 p.p. — Wint. Kr. Fl. I, 209, p.p. — Pucc. Discoidearum Lk Spec. II, 73. — T. N. G. XI, 106; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 163; N. K. A. 2. II, 182 et 2, V, 628.

I. *Aecidium* ⊙

II. *Uredo!*

III. *Téleutospores!*

II et III. F. et rameaux du *Tanacetum vulgare.*

91. **Puccinia Taraxaci** (Rebent.) Plowr. Monogr. 186; Oud. Rév. I, 541 et N. K. A. 3, II, 874. — Sacc. Syll. IX, 305. — Sydow Monogr. 164. — Pucc. flosculorum forma 2. Crepidis tectorum.

I. *Aecidiolum.* — †

II. *Aecidium.* ⊙

III. *Uredo!* U. Chondrillae Oud. F. N. exs. n° 31.

IV. *Téleutospores!* Oud. N. K. A. 3, II, 874.

III et IV. — F. du *Taraxacum officinale.* [1])

92. **Puccinia Thalictri** Chev. Fl. Paris I, 417. — Oud. Rév. I, 556; N. K. A. 2, III, 254; 2, V, 590 et 629. — Sacc. Syll. VII, 680. — Wint. Kr. Fl. I, 177. — Sydow Monogr. 550.

I. *Aecidium* ⊙

II. *Uredo* ⊙

III. *Téleutospores!*

III. F. des *Thalictrum flavum* et *minus.*

93. **Puccinia Thlaspeos** Schub. Fl. Dresd. II, 254. — Oud. Rév. I, 560; Ned. K. A. 2, II, 37. — Sacc. Syll. VII, 688. — Wint. Kr. Fl. I, 170. — Sydow Monogr. 515.

I. *Aecidium.* — ⊙

II. *Uredo.* — ⊙

III. *Téleutospores!*

III. F. du *Thlaspi calaminare.* (Oud. F. N. exs. n° 258).

94. **Puccinia Trailii** Plowr. Monogr. 177. — Oud. Rév. I,

[1]) L'Aecidium Taraxaci Grev. Fl. Edin. p. 444, appartenant au *Pucc. variabilis* Grev., ne s'est pas encore présenté dans les Pays-Bas.

534. — Sacc. Syll. IX, 312. — Kleb. Wirtsw. Rostp. 284.

I. *Aecidium!* Aec. Rumicis Acetosae Oud.

II. *Uredo* †

III. *Teleutospores* †

I. F. du *Rumex Acetosa.* — II (†) et III (†) F. du *Phragmites communis.*

95. **Puccinia Tragopogi** (P.) Wint. Kr. Fl. I, 209. — N. K. A. 2, V, 590. — Sydow Monogr. 167. — Pucc. Tragopogonis Cda. — Oud. Rév. I, 552; N. K. A. 2, II. 101. — Sacc. Syll. VII, 668.

I. *Aecidiolum* †

II. *Aecidium!* Aec. Tragopogi P. Syn. 211. — Oud. l. c. — Aec. Cichoracearum D. C. Fl. Fr. II, 239. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 166; N. K. A. 2, V, 590.

III. *Uredo* ⊙

IV. *Teleutospores!* Oud. l. c. p. 553.

II, IV. F. du *Tragopogon pratensis.* — II. Oud. F. N. exs. n° 138.

***Puccinia Tragopogonis** Cda. — N. K. A. 2. II, 201. — Voir: *Pucc Tragopogi.*

***Puccinia Tripolii** Wallr. — N. K. A. 2, II, 182 (ubi errore legitur „Trifolii"). — Voir: *Pucc. Asteris.*

96. **Puccinia triticina** Erikss. A. S. N. 8, IX (1899), p. 270. — Sydow Monogr. 716. — Kleb. Wirtsw. Rostp. 245. — Pucc. Rubigo vera (D. C.) Wint. p.p.

I. *Aecidium?*

II. *Uredo!* U. triticina Erikss. l. c.

III. *Teleutospores!*

II et III. F. et tiges du *Triticum vulgare.* — II et III. Oud. F. N. exs. n° 46 et Rév. I. 529.

Puccinia Umbelliferarum D. C. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 163; N. K. A. 2, II, 182. — Voir: *Pucc. Apii.*

***Puccinia Vaillantiae** Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 163. — Voir: *Pucc. Valantiae.*

97. **Puccinia Valantiae** P. Obs. Myc. II, 25. — Oud. Rév. I, 558. — Sacc. Syll. VII, 685. — Wint. Kr. Fl. I, 167 (p.p.). — Sydow Monogr. 217.

I. *Aecidium.* — ⊙

II. *Uredo.* — ⊙

III. *Teleutospores!* Pucc. Galii Cruciatae Duby, Bot. Gall. II, 890. — Oud. l.c. — Pucc. Vaillantiae Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 163.

III. F. du *Galium Cruciata.*

***Puccinia variabilis** Oud. Arch. Néerl. II, 39. — Voir: *Pucc. Taraxaci.*

98. **Puccinia Veronicae Anagallidis** Oud. Hedw. XXIV (1885), p. 171; N. K. A. 2, IV, 512; Rév. I, 557. — Sacc. Syll. VII, 718. — Magnus Ber. d. deuts bot. Ges. VIII, 173. — Sydow Monogr. 259. [1])

I. *Aecidium.* ⊙

II. *Uredo.* ⊙

III. *Téleutospores!* F. du *Veronica Anagallidis.*

99. **Puccinia Violae** (Schum.) D. C. Fl. Fr. VI, 62. — Oud. Rév. I, 518. — Sacc. Syll. VII, 609. — Wint. Kr. Fl. I, 215. — Sydow Monogr. 439. — Pucc. Violarum Lk Spec. II, 80. — T. N. G. XI, 406; N. K. A. 2, I, 90; 2, V, 591 et 627.

I. *Aecidium!* Aec. Violae Schum. Saell. II, 224. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 167; N. K. A. 2, V, 591 et 627. — Caeoma Violatum Lk Spec. II, 58. — T. N. G. XI, 411.

II. *Uredo!* — U. Violarum D. C. Fl. Fr. VI, 73. — N. K. A. 2, I, 90.

III. *Téleutospores!* Oud. l. c.

I. F. des *Viola Riviniana* (Oud. F. N. exs. n° 259) et *V. silvatica.* — II et III. F. des *V. arvensis, canina, hirta, palustris* (Oud. F. N. exs. n° 141) et *silvatica.*

***Puccinia Violarum** D. C. — T. N. G. XI, 406; N. K. A. 2, I, 90. — Voir: *Pucc. Violae.*

100. **Puccinia Virgaureae** (D. C.) Lib. Fgi Ard. n° 393. — Oud. Rév. I, 555; N. K. A. 2, II, 37; 2, V, 590; Arch. Néerl. VIII, 130. — Sacc. Syll. VII, 679. — Wint. Kr. Fl. I, 173. — Sydow Monogr. 151.

I. *Aecidium.* — ⊙

II. *Uredo.* — ⊙

III. *Téleutospores!*

III. F. du *Solidago Virgaurea.*

***Puccinia Winteriana** Magnus. — Voir: *Pucc. linearis.*

3. Phragmosporées.

AREGMA.

(Voir: *Phragmidium.*)

PHRAGMIDIUM.

***Phragmidium apiculatum** Rab. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 158. — Voir: *Phr. Sanguisorbae.*

[1]) Selon Mr. Tranzschel (Annal. Mycol. II, n° 2, 1904 p. 157) cette espèce doit être transportée au P. Epilobii tetragoni, vu que le support a été mal défini.

*__Phragmidium asperum__ Tul. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 158; N. K. A. 2, I, 89. — Voir: *Phr. violaceum.*

1. __Phragmidium bullatum__ West. Not. V, 11 et Herb. n° 1069. — Oud. Rév. I, 570; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 158. — Sacc. Syll. VII, 748.

I. *Aecidium.* — ⊙

II. *Uredo.* — ⊙

III. *Téleutospores!*

III. Rameaux du *Rosa Eglanteria.*

__Phragmidium effusum__ Fuck. — Arch. Néerl. II, 38. — Voir: *Phr. Rubi idaei.*

2. __Phragmidium Fragariastri__ (D. C.) Schröt. Kr. Fl. Schles. I, 351. — N. K. A. 3. II, 201. — Sacc. Syll. VII, 742. — Phr. Fragariae D. C. Encycl. VIII, 55. — Wint. Kr. Fl. I, 228.

I. *Aecidium!*

II. *Uredo* †. — U. Potentillae D. C. Enc. VIII. 230 p.p.

III. *Téleutospores!*

I. II (†) et III. F. du *Potentilla Fragariastrum.*

__Phragmidium inerassatum__ Lk. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 157. — Voir: *Phr. subcorticium.*

*__Phragmidium obtusum__ Tul. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 158; N. K. A. 2, I, 89. — Voir: *Phragm. Potentillae.*

3. __Phragmidium Potentillae__ (P.) Karst. Myc. Fenn. IV, 49. — Oud. Rév. I, 567. — Sacc. Syll. VII, 743; Wint. Kr. Fl. I, 229. — Phr. obtusum Kze u. Schm. exs. n° 312. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 158; N. K. A. 2, I, 89. — Phragm. apiculatum Rab. Kr. Fl. 32. — N. K. A. 2, I, 172; Arch. Néerl. VIII, 374.

I. *Aecidium* †

II. *Uredo!* — U. Potentillarum Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 174 p.p.; N. K. A. 2, I, 172. — Caeoma U. Potentillarum, T. N. G. XI, 408; N. K. A. 2, I, 89. — U. Potentillae D. C. N. K. A. 2, V, 589.

III. *Téleutospores!* Pucc. Potentillae P. Syn. 229.

I (†) F. de plusieurs espèces de *Potentilla.* — II, III. F. des *Pot. argentea* Oud. F. N. exs. n° 265, *reptans* et *verna.*

*__Phragmidium Rosarum__ Fuck. — N. K. A. 2, I, 89. — Voir: *Phr. subcorticium.*

1. __Phragmidium Rubi__ (P.) Oud. Rév. I, 569; N. K. A. 2, V, 629. — Sacc. Syll. VII, 745. — Wint. Kr. Fl. I, 230.

I. *Aecidium.* †

II. *Uredo!* — U. Ruborum D. C. Fl. Fr. II, 234, p.p. — U. Lecythea Ruborum Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 181. — Caeoma Ruborum Lk. Spec. II, 30. — T. N. G. XI, 409.

III. *Téleutospores!* Phragm. incrassatum b. Ruborum Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 158.

I. (†) F. de quelques espèces de *Rubus*. — II et III. F. du *Rubus caesius*.

5. **Phragmidium Rubi idaei** (P.) Karst. Myc. Fenn. IV, 52. — Oud. Rév. I, 570. — Sacc. Syll. VII, 748. — Wint. Kr. Fl. I, 231. — Phragm. effusum Auersw. Rab. Herb. Myc. I, n° 1391. — Arch. Néerl. II, 38; N. K. A. 2, V, 630.

I. *Aecidium!*

II. *Uredo!* Caeoma gyrosum Lk. Spec. II, 38. — T. N. G. XI, 409. — U. Lecythea gyrosa Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 182.

III. *Téleutospores!*

I, II et III. F. du *Rubus idaeus*.

6. **Phragmidium Sanguisorbae** (D.C.) Schröt. Pilze Schles. I, 352. — Oud. Rév. I, 367; N. K. A. 2, V, 629. — Sacc. Syll. VII, 742.

I. *Aecidium!*

II. *Uredo!* U. Poterii Spr. — U. Lecythea Poterii Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 182; Caeoma Poterii Schlecht. Fl. Berol. II, 125. — Oud. Rév. I, 567.

III. *Téleutospores!* Phragm. apiculatum Rab. Kr. Fl. 32. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 182.

I, II, III. F. du *Poterium Sanguisorba*.

7. **Phragmidium subcorticium** (Schrank) Wint. Kr. Fl. I, 228. — Oud. Rév. I, 569; N. K. A. 2, V, 589 et 630. — Sacc. Syll. VII, 746. — Aregma Phragmidium β. mucronatum Fr. — T. N. G. XI, 405. — Phragmidium incrassatum Lk. a. Rosarum Wallr. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 158. — Phragm. Rosarum Fuck. — N. K. A. 2, I, 89.

I. *Aecidium!* Caeoma miniatum Schlecht. Fl. Berol. II, 120. — T. N. G. XI, 408 p.p. — U. pingnis D. C.

II. *Uredo!* U. Rosae P. Disp. meth. 13. — U. Lecythea Rosae Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 181. — Caeoma Rosacearum T. N. G. XI, 408.

III. *Téleutospores!*

I, II, III. F. des *Rosa canina*, *pimpinellifolia* et de plusieurs espèces cultivées.

8. **Phragmidium Tormentillae** Fuck Symb. 16. — Oud. Rév. I, 568. — Sacc. Syll. VII, 744. — Phr. obtusum Tul. — Wint. Kr. Fl. I, 229. — N. K. A. 2, I, 89.

I. *Aecidium* †

II. *Uredo!* U. obtusa Strauss Wett. II, 107 p.p.

III. *Téleutospores* †

I (†) F. de quelques espèces de *Potentilla*. — II. F. des *Potentilla procumbens* et *silvestris* (Pot. Tormentilla). — III (†) F. de quelques espèces de *Potentilla*.

9. **Phragmidium violaceum** (Schultz). — Oud. Rév. I, 568; N. K. A. 2, V. 589 et 629. — Sacc. Syll. VII, 744. — Wint. Kr. Fl. I. 231. — Phragm. asperum Wallr. Fl. Cr. II, 188. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 153; N. K. A. 2, I, 89. — Aregma Phragm. a. bulbosum Fr. — T. N. G. XI, 405.

I. *Aecidium* †

II. *Uredo!* U. Ruborum D. C. Fl. Fr. II. 234 p.p. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 181 p. p. — U. gyrosa Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 182, sous le n°. 3650.

III. *Téleutospores!*

I (†) F. de quelques espèces de Rubus. — II et III. F. des *Rubus corylifolius*, *fruticosus*, *vulgaris*. — Oud. F. N. exs. n° 20.

TRIPHRAGMIUM.

1. **Triphragmium Ulmariae** (Schum.) Lk Spec. II, 84. — Oud. Rév. I, 581; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 161; Arch. Néerl. VIII, 374; N. K. A. 2, I, 172; 2. V, 589 et 629. — Sacc. Syll. VII, 768. — Wint. Kr. Fl. I, 225.

I. *Aecidium!* Uredo Ulmariae Schum. Saell. II, 227 p.p. — Caeoma miniatum T. N. G. XI, 408 p.p.

II. *Uredo!* Schum. l. c. p.p. — N. K. A. 2, I, 172. — Caeoma miniatum T. N. G. XI, 408 p.p.

III. *Téleutospores!* Oud. l. c.

I, II, III. F. de l'*Ulmaria pentapetala* (= *Spiraea Ulmaria*).

×××× FORMAE INFERIORES.

1. Amerosporae.

LECYTHEA.

***Lecythea Baryi** Oud. Rab. F. E. n° 1188; Rév. I, 535 sub 31. — Voir: *Puccinia Magnusiana*.

***Lecythea Phragmitidis** Oud. Rab. F. E. n° 1188; N. K. A. 2, I, 260 et Rév. I, 535. — Voir: *Puccinia Magnusiana*.

TRICHOBASIS.

***Trichobasis Cichoracearum** Lév. — Arch. Néerl. II, 39. — Voir. *Puccinia expansa*.

*__Trichobasis Heraclei__ Berk. — Oud. Arch. Néerl. VIII, 375; id. Rév. I, 521 (sub. II). — Voir: *Puccinia Heraclei.*

UREDO.

1. __Uredo accidioides__ D. C. Fl. Fr. II, 236. — Oud. Rév. I, 505 (sous 8); U. Podosporium accidioides Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 183. — F. des *Populus alba* et *canescens.* — Voir: *Melampsora accidioides.*

*__Uredo aegirina__ T. N. G. XI, 410. — Voir: *Melampsora accidioides.*

2. __Uredo Agrimoniae__ (D. C.) Schröt. Pilze Schles. I, 374. — Oud. Rév. I, 586. — Sacc. Syll. VII, 839. — U. Agrim. Eupatoriae D. C. — Wint. Kr. Fl. I, 252. — Caeoma Uredo polymorpha T. N. G. XI, 409. — Uredo Potentillarum D. C. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 174 (p.p.). — Melampsora Agrimoniae Dietel. — Thecopsora Agrimoniae Dietel. — Voir: *Pucciniastrum.*

3. __Uredo Alchemillae__ Oud. (non P.) Rév. I, 499, sous n° 22. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 171. — Voir: *Uromyces.*

4. __Uredo Alliorum__ D. C. Fl. Fr. VI, 82 p.p. — Oud. Rév. I. 548; T. N. G. XI, 407. — Voir: *Pucc. Allii.*

5. __Uredo ambigua__ D. C. Fl. Fr. VI, 64 p.p. — Oud. Rév. I. 514; Prodr. Pl. Bat. II, 4, p. 173. — Voir *Puccinia.*

6. __Uredo Anthrisci__ Oud. Rév. I, 574 et Fgi. Neerl. exs. n°. 27. — Voir: *Pucc. Chaerophylli.*

7. __Uredo Anthyllidis__ Grev. in Hook. Engl. Fl. V, 383 p.p. — Oud. Rév. I, 498. — Voir: *Uromyces.*

*__Uredo apiculata__ T. N. G. XI, 409. — Voir: *Uromyces Genistae tinctoriae* et *Urom. striatus.*

*__Uredo appendiculata__ T. N. G. XI, 409. — Voir: *Uromyces appendiculatus, Pisi* et *Fabae.*

*__Uredo Artemisiae__ T. N. G. XI, 408. — Voir: *Pucc. Tanaceti.*

*__Uredo Arunci__ Fl. Noviom. 159. — Voir: *Caeoma miniatum.*

8. __Uredo Asparagi__ Lasch. — Oud. Rév. I, 513. — Voir: *Puccinia.*

9. __Uredo Betae__ P. Syn. 220. — Oud. Rév. I. 492; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 175. — Voir: *Uromyces.*

*__Uredo Betarum__ T. N. G. XI, 407. — Voir: *U. Betae.*

10. __Uredo (Lecythea) betulina__ Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 182. — Voir: *Melampsoridium betulinum.*

11. __Uredo bifrons__ D. C. Fl. Fr. II, 229. — Oud. Rév. I, 497. — Voir: *Uromyces Rumicis.*

12. __Uredo bullata__ West. 8e Not. p. 9. — Prodr. Fl. Bat. II.

4. p. 177; Oud. Rév. I, 497, sous n° 18. — Voir: *Puce bullata.*

13. **Uredo Cacaliae** D. C. Fl. Fr. VI, 65. — Prodr. Fl. Bat. II. 4, p. 175. — Voir: *Uromyces.*

14. **Uredo Calthae** Requien en Duby Bot. Gall. II, 900. — Oud. Rév. I. 513. — Voir: *Puccinia.*

15. **Uredo Campanulae** P. Syn 217 p.p. — Oud. Rév. I. 575. — Voir: *Coleosporium.*

***Uredo candida** P. Syn. 223. — T. N. G. XI. 409; Oud. Rév. II. 9—11. — Voir: *Cystopus candidus, Portulacae, Lepigoni, Tragopogonis.*

***Uredo Capraearum** T. N. G. XI. 410. — Voir: *Melampsora Larici-Caprearum.*

***Uredo Podosporium Caprearum** Prodr. Fl. Bat. II. 4, p. 182. — Voir: *Melampsora Larici-Caprearum.*

16. **Uredo Caricis** Schum. Saell. II, 231 p.p. — T. N. G. XI. 407; Oud. Rév. I. 531. — U. Caeoma Pseudocyperi Lk — T. N. G. XII, 275. — Voir: *Puccinia.*

***Uredo caries** D. C. Fl. Fr. VI, 78. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, 178. — Voir: *Tilletia Tritici.*

***Uredo Caryophyllacearum** T. N. G. XI, 408. — Oud. Rév. I, 508. — Voir: *Melampsorella Cerastii.*

17. **Uredo Cerastii** P. Syn. 219. — Oud. Rév. I. 508. — Voir: *Melampsorella.*

18. **Uredo Cichoracearum** D. C. — Fl. Fr. II, 229. — Oud. Arch. Néerl. VIII. 379, sous 185. — Voir: *Pucc. Prenanthis.*

19. **Uredo Circaeae** Schum. Saell. II. 228. — Oud. Rév. I, 577. — Voir: *Pucciniastrum.*

20. **Uredo Cirsii** Lasch. Arch. Néerl. VIII, 379. — Voir: *Puccinia.*

21. **Uredo Compransor** Schlecht. — T. N. G. XI. 408 (sub. Caeoma). Voir les espèces de *Coleosporium;* puis *Pucc. Lapsanae* et *Taraxaci* et *Uromyces Cacaliae.*

22. **Uredo cylindrica** Strauss Wett. II. 92. — T. N. G. XI, 409 p.p. — Voir: *Melampsora populina.*

***Uredo cylindrica** T. N. G. XI. 409 p.p. — Voir: *Melampsoridium betulinum.*

23. **Uredo Cynapii** Strauss β. **Cicutae** D. C. Fl. Fr. VI, 72. — Oud. Rév. I, 516 et F. N. exs. n° 251. — Voir: *Puccinia Cicutae.*

24. **Uredo Dianthi** P. Syn. 222 (p.p.). — Oud. Rév. I, 498. — Voir: *Uromyces caryophyllinus.*

***Uredo epigallicus**. — Voir: *Pucc. punctata.*

25. **Uredo Epilobii** D. C. Fl. Fr. VI, 73. — Oud. Rév. I, 518, T. N. G. XII, 275; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 172 et 177; N. K. A. 2, V, 591. — Voir: *Puccinia.*

26. **Uredo epitea** Kze. u. Schm. Myc. Hfte I, 68. — T. N. G. XI, 419; Oud. Rév. I, 504, U. (Lecythea) epitea Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 182. — Voir: *Melampsora Ribesii-viminalis.*

27. **Uredo Eryngii** Chev. Fl. de Paris I, 401. — Oud. Rév. I, 521. — Voir: *Pucc. Pimpinellae.*

***Uredo Euphorbiacearum** T. N. G. XI, 409; U. (Lecythea) Euphorbiae Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 182. — Voir: *Melampsora Euphorbiae.*

28. **Uredo Fabae** P. in Römer neues Mag. I, 92. — Oud. Rév. I, 488. — Voir: *Uromyces.*

29. **Uredo fallens** Desm. Mém. de la Soc. des Sc. etc. de Lille 1845, p. 223 et Pl. Crypt. de Fr. 1ᵉ S., 1ᵉ Ed. n° 1325. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 175. — Voir: *Uromyces Trifolii.*

30. **Uredo farinosa** *α* **Salicis Capreae** P. Syn. 217. — Oud. Rév. I, 502. — Voir: *Melampsora Larici-Capraearum.*

31. **Uredo Festucae** D. C. Fl. Fr. VI, 82? — Oud. Rév. I, 531. — Voir: *Puccinia.*

32. **Uredo Ficariae** Schum. Saell. II, 232. — T. N. G. XII; 275; Oud. Rév. I, 501. — Voir: *Uromyces.*

33. **Uredo Flosculosorum** A. S. Consp. 206 p.p. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 177. — Voir: *Pucc. Leontodontis.*

34. **Uredo Galii** Duby Bot. Gall. II, 896. — Arch. Néerl. VIII, 378; Oud. Rév. I, 512. — Voir: *Puccinia.*

35. **Uredo Gentianae** Strauss Wett. II, 102. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 173; Oud. Rév. I, 514. — Voir: *Puccinia.*

36. **Uredo Geranii** D. C. Fl. Fr. VI, 73. — Oud. Rév. I, 191. — Voir: *Uromyces.*

37. **Uredo gyrosa** Rebent. Fl. Neom. 365. — T. N. G. XI, 409; U. (Lecythea) gyrosa Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 182. — Voir: *Phragmidium Rubi idaei.*

38. **Uredo Helioscopiae** P. Disp. meth. 13. — Oud. Rév. I, 502. — Voir: *Melampsora.*

39. **Uredo Heraclei** Berk. Engl. Fl. Fl. V, 380. — Arch. Néerl. VIII, 375. — Voir: *Puccinia.*

40. **Uredo Hieracii** Schum. Saell. II, 232. — Oud. Rév. I, 539. — Voir: *Puccinia.*

41. **Uredo Hydrocotyles** Mont. Prodr. Iles Ferd. n° 59 et Fl. de Chile VII, 50. — Oud. Rév. I, 546. — Voir *Puccinia.*

42. **Uredo Hypericorum** D. C. Fl. Fr. VI, 81. — Oud. Rév. I, 507. — Voir; *Melampsora.*

43. **Uredo Impatientis** Rab. Kr. Fl. 5. — Arch. Néerl. VIII, 375. — Voir: *Pucc. argentata.*

44. **Uredo Iridis** Plowr. Monogr. 257 (non D. C.). — Oud. N. K. A. 3, II, 718. — Téleutospores inconnues.

45. **Uredo Labiatarum** D. C. a. **Menthae** et b. **Clinopodii** Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 177. — Voir: *Pucc. Menthae.*

46. **Uredo Lapsanae.** — Voir: *Puccinia.*

47. **Uredo Leguminosarum** Lk — T. N. G. XII, 275; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 171. — Voir: Uredo Pisi et Uredo Trifolii; Uromyces Fabae et Urom. Phaseoli.

48. **Uredo Leguminum** Desm. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 172. — Voir: *Urom. Fabae* et *Urom. Phaseoli.*

49. **Uredo linearis** a. **frumenti** Lambert Act. Soc. Linn. Oud. Rév. I, 523. — U. linearis P. — Prodr. Fl. Bat. II, 4. p. 175: — Voir: *Pucc. Graminis.*

50. **Uredo Lini** D. C. Fl. Fr. II, 234. — Oud. Rév. I, 503. — U. Podosporium Lini Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 183. — Voir: *Melampsora.*

51. **Uredo longissima** T. N. G. XI, 107 p.p. — Voir: *Ustilago echinata.*

52. **Uredo macrospora** Desm. Bull. soc. bot. de Fr. IV (1857), 757. — Arch. Néerl. VIII, 381; Oud. Rév. I, 549, sous 50. — Voir *Pucc. Luzulae.*

***Uredo Magnusiana.** — Voir: Lecythea Phragmitidis Oud. sous *Pucc. Magnusiana.*

53. **Uredo Menthae** P. Syn. 220. — N. K. A. 2, V, 589 et 627: Oud. Rév. I, 522. — U. Labiatarum D. C. a. Menthae P. Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 177 et b. Clinopodii Rab. ibid. — Voir: *Pucc. Menthae.*

54. **Uredo miniata** P. Syn. 216. — Oud. Rév. I, 570. — Caeoma. U. miniatum T. N. G. XI, 408. — Voir: *Phragmidium subcorticium* et *Triphragmium Ulmariae.*

55. **Uredo miniata** var. **Lini** P. Syn. 216. — Oud. Rév. I, 503. Voir: *Melampsora Lini.*

56. **Uredo mixta** T. N. G. XI, 110. — Voir *Melampsora Ribesii-Purpureae*

57. **Uredo muricella** Wallr. a Cynapii D. C. — Voir: *Pucc. Petroselini.*

58. **Uredo muricella** Wallr. b. **Conii** Strauss. — Voir: *Pucc. Conii.*

Uredo oblonga Rab. Arch. Néerl. VIII, 380. — Voir: *U. oblongata.*

59. **Uredo oblongata** Grev. Scott. Cr. Fl. tab. 12. — Arch. Néerl. VIII, 380; Oud. Rév. I, 549. — Voir: *Puce. Luzulae.*

60. **Uredo obtusa** Strauss Wett. II, 107 p.p. — Oud. Rév. I, 568. — Voir: *Phragmidium Tormentillae.*

***Uredo Orchidis** Martius Fl. Mosq. 229. — Voir: *Caeoma.*

***Uredo Orchidum** Lk. — T. N. G. XII, 275. — Voir: *Caeoma.*

61. **Uredo Padi** Kze u. Schm. exs. n°. 187. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 174; Oud. Rév. I, 577. — Voir: *Thecopsora Padi.*

62. **Uredo Paeoniae** Cast. Cat. Pl. Mars. 217. — Oud. Rév. I, 510. — Voir: *Cronartium flaccidum.*

***Uredo Paeoniarum** Desm. A. S. N. 3, VIII, 11. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 175. — Voir: *Cronartium flaccidum.*

***Uredo Phaseoli** P. Syn. 222. — Voir: *Uromyces.*

63. **Uredo Phaseolorum** D. C. Encycl. VIII, 221. — Oud. Rév. I, 491. — Voir: *Uromyces Phaseoli.*

64. **Uredo Phragmitis** Schum. Saell. II, 231. — Oud. Rév. I, 534. — Voir: *Puccinia.*

65. **Uredo Pimpinellae** Strauss Wett. II, 102. — Oud. Rév. I, 520. — Voir: *Puccinia.*

66. **Uredo pinguis** D. C. Fl. Fr. II, 235. — Voir: *Phragmidium subcorticium.*

67. **Uredo Pisi** P. Obs. Myc. I, 17. — Oud. Rév. I, 495. — Voir: *Uromyces.*

68. **Uredo Polygoni** var. **Bistortae** Strauss Wett. II, 103, pro maxima parte. — Voir: *Puce. Bistortae.*

69. **Uredo Polygonorum** D. C. Fl. Fr. VI, 71. — T. N. G. XI, 407; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 172; Oud. Rév. I, 543. — Voir: *Puce. Polygoni.*

70. **Uredo polymorpha** T. N. G. XI, 409. Voir: *Uredo Agrimoniae.*

71. **Uredo Polypodii** P. Syn. 217. — Voir: *Uredinopsis filicinus.*

72. **Uredo populina** P. Syn. 219. — Oud. Rév. I, 506. — Voir: *Melampsora.*

73. **Uredo populina** var. **betulina** P. Syn. 219. Oud. Rév. I, 507. — Voir: *Melampsoridium betulinum.*

74. **Uredo Potentillarum** D. C. Fl. Fr. VI, 80. — T. N. G. XI; 408; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 114; Oud. Rév. I, 567, sous 2. — Voir: *Phragmidium Potentillae* et *Uredo Agrimoniae.*

75. **Uredo Poterii** Rab. Kr. Fl. 67. — U. Lecythea Poterii Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 182. — Voir: *Phragmidium Sanguisorbae.*

76. **Uredo Primulae** D. C. Fl. Fr. VI, 68. — Oud. Rév. I, 520. — Voir: *Puccinia.*

77. **Uredo Pruni** Mont. Syll, 315. — Oud. Rév. I. 547. sous 18. — Voir: *Pucc. Pruni spinosae.*

***Uredo Pseudocyperi** T. N. G. XII, 275. — Voir: *U. Caricis.*

78. **Uredo pustulata** *a* **Epilobii** P. Syn. 219. — Oud. Rév. I, 376; U. pust. b. Epilobiorum P. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 174. — Voir: *Puccinia.*

79. **Uredo pustulata** *β.* **Cerastii** P. Syn. 219. — Oud. Rév. I. 508; U. pust. a. Caryophyllacearum P. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 174. — Voir: *Melampsorella Cerastii.*

80. **Uredo Pyrolae** Mart. Fl. Mosq. 229. — N. K. A. I, I, 56; Oud. Rév. I, 578. — Voir: *Thecopsora.*

81. **Uredo Quercus** Brondeau in Duby Bot. Gall. II, 893. — Oud. Rév. I, 587. — Voir: *Melampsora.*

***Uredo (Microbotryum) receptaculorum** D. C. Fl. Fr. VI, 79. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 179. — Voir: *Ustilago Tragopogi.*

82. **Uredo Rhinanthacearum** D. C. Encycl. VIII, 229. — T. N. G. XI, 107. Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 171; Oud. Rév. I: 373. — Voir: *Coleosporium Euphrasiae* et *Melampyri.*

83. **Uredo Rosae** P. Disp. meth. 13. — Oud. Rév. I, 570; Uredo Rosacearum T. N. G. XI, 108; U. Lecythea Ruborum Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 181. — Voir: *Phragmidium subcorticium.*

84. **Uredo Rubigo vera** D. C. Fl. Fr. VI, 83. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 171; Arch. Néerl. VIII, 381; Oud. Rév. I. 529. — Voir: *Puccinia.*

85. **Uredo Ruborum** D. C. Fl. Fr. II, 234 p.p. — T. N. G. XI, 109; Oud. Rév. I, 569; U. Lecythea Ruborum Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 181. — Voir: *Phragmidium Rubi.*

86. **Uredo Rumicum** D. C. Fl. Fr. VI, 66. — T. N. G. XI, 107; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 176. — Voir: *Uromyces Rumicis.*

87. **Uredo Salicorniae** de Bary Rab. F. E. n° 1385. — Voir: *Uromyces.*

88. **Uredo Scirpi** West. 7 Not. p. 12. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 176. Oud. Rév. I, 549. — Voir: *Puccinia.*

89. **Uredo Sempervivi** A. S. Consp. 126. — T. N. G. XII, 275; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 175. — Voir: *Endophyllum.*

90. **Uredo Senecionis** P. Syn. 218. — T. N. G. XI, 108; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 175. Oud. Rév. I, 572. — Voir: *Coleosporium.*

Uredo sitophila Sturm Pilze Bd. I, p. 69, tab. 34. — T. N. G. XI, 107. — Voir: *Tilletia Tritici.*

91. **Uredo Sonchi arvensis** P. Syn. 217. — Oud. Rév. I, 574. — Voir: *Coleosporium Sonchi.*

Uredo Sonchi Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 174. — Voir: *Coleosporium.*

***Uredo sparsa** T. N. G. XI, 408 (U. Caeoma sparsum). — Voir: *Uromyces Limonii*.

92. **Uredo Statices** Desm. Pl. Cr. de Fr. 1e S., 1e Ed. n° 128. — Oud. Rév. I, 489. — Voir: *Uromyces*.

93. **Uredo suaveolens** P. Obs. Myc. II, 24. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 176; Oud. Rév. I, 538. — Voir: *Puce. obtegens*.

***Uredo Symphyti** D. C. Encycl. VIII, 232. — Sacc. Syll. VII, 861. — Wint. Kr. Fl. I, 254. — Oud. Rév. I, 586; T. N. G. XI, 407; Prodr. Fl. II, 4, p. 174; N. K. A. 2, V, 592 et 631; Fgi Neerl. exs. n° 61. — Coleosporium Symphyti Fuck. — N. K. A. 2, I, 88; Oud. Herb. Nederl. Pl. n° 211. — F. du *Symphytum officinale*. — Voir: *Melampsorella*.

94. **Uredo Trifolii** D. C. Encycl. VIII, 223. — T. N. G. XI, 409; Oud. Rév. I, 490. — Voir: *Uromyces*.

95. **Uredo Tussilaginis** P. Syn. 218. — Oud. Rév. I, 573. — Voir: *Coleosporium*.

96. **Uredo Ulmariae** Schum. Saell. II, 227. — Oud. Rév. I, 581. — Voir: *Triphragmium*.

97. **Uredo Umbellatarum** T. N. G. XI, 408. — Voir: *Puce. Apii* et *Chaerophylli*.

98. **Uredo Umbellatarum** Chev. Fl. de Paris I, 398, forma *Heraclei*. — Voir: *Puccinia Heraclei*.

***Uredo utriculosa** Duby Bot. Gall. II, 90 p.p. — T. N. G. XI, 407; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 180. — Voir: *Ustilago*.

99. **Uredo Vaccinionum** Johnst. Fl. Berw. II, 199. — N. K. A. 2, II, 38; Arch. Néerl. VIII, 383; Oud. Rév. I, 578. — Voir: *Thecopsora*.

100. **Uredo Valerianae** Schum. Saell. II, 233. — T. N. G. XI, 409; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 173. — Voir: *Uromyces*.

101. **Uredo Vincetoxici** D. C. Fl. Fr. VI, 85. — Oud. Rév. I, 510. — Voir: *Cronartium asclepiadeum*.

***Uredo violacea** P. Disp. meth. 57. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 179. — Voir: *Ustilago*.

102. **Uredo Violarum** D. C. Fl. Fr. VI, 73. — Oud. Rév. I, 518. — Voir: *Puccinia*.

103. **Uredo Vitellinae** D. C. Fl. Fr. II, 231. — Oud. Rév. I, 504. — Voir: *Melampsora*.

CAEOMA.

***Caeoma aegirinum** Lk. Spec. II, 40. — T. N. G. II, 410. — Voir: *Melampsora aecidioides*.

*Caeoma alliatum Lk Spec. II, 13. — T. N. G. XI, 410. — Voir: *Aec. Allii ursini.*

1. **Caeoma Allii ursini** (D. C.) Wint. Kr. Fl. I, 255. — Caeoma Alliorum Lk. Spec. II, 7. — T. N. G. XI, 407; Oud. Rév. I, 587. — Uredo Caeoma Alliorum (Lk) Sacc. Syll. VII, 868. — F. des *Allium ursinum* et *Cepa.*

*Caeoma Alliorum Lk Spec. II, 7. — T. N. G. XI, 407; Oud. Rév. I, 587. — Voir: *C. Allii ursini.*

*Caeoma apiculatum (Strauss) Schlecht. Fl. Berol. II, 128. — T. N. G. XI, 409. — Voir: *Uromyces Genistae tinctoriae* et *Urom. striatus.*

*Caeoma appendiculatum Schlecht. l. c. 129. — Voir: *Urom. Phaseoli*, *Fabae* et *Pisi.*

*Caeoma Ari Dozij et Molk. N. K. A. 1, I, 56. — Voir: *Aecidium Ari.*

*Caeoma Artemisiae Lk Spec. II, 19. — T. N. G. XI, 408. — Voir: *Puce. Tanaceti.*

*Caeoma Berberidatum Lk Spec. II, 57. — T. N. G. XI, 411. — Voir: *Aecidium Berberidis.*

*Caeoma Betarum Lk Spec. II, 11. — T. N. G. XI, 407. — Voir: *Uromyces Betae.*

*Caeoma Borraginatum Lk Spec. II, 48. — T. N. G. XI, 410. — Voir: *Aec. Asperifolii.*

*Caeoma Buniatum Lk Spec. II, 53. — T. N. G. XI, 410. — Voir: *Aec. Bunii.*

*Caeoma Calthae T. N. G. XI, 108. — Voir: *Puccinia Calthae.*

*Caeoma Campanularum Lk Spec. II, 16. — T. N. G. XI, 108. — Voir: *Coleosporium Campanulae.*

*Caeoma candidum Nees Syst. d. Pilze 15. — T. N. G. XI, 409. — Voir: *Cystopus candidus.*

*Caeoma candidum Nees l. c. var. **grossum** T. N. G. T. N. G. XI, 409. — Voir: *Cystopus Portulacae.*

*Caeoma Caprearum Schlecht. Fl. Berol. II, 124. — T. N. G. XI, 110. — Voir: *Melampsora Larici-Caprearum.*

*Caeoma Caryophyllacearum Lk Spec. II, 26. — T. N. G. XI, 408. — Voir: *Melampsora Cerastii.*

*Caeoma Compositatum Lk Spec. II, 50. — T. N. G. II, 410. — Voir: *Aec. Sonchi*, *Aec. Tripolii* et *Aec. Tussilaginis.*

*Caeoma Compransor Schlecht. Fl. Berol. II, 119. — T. N. G. XI, 108. — Voir: *Coleosp. Sonchi*, *Puce. Lapsanae*, *Puce. Taraxaci*, *Coleosp. Tussilaginis.*

*Caeoma Compransor Schlecht. l. c. — Oud. Rév. I, 500. — Voir: *Uromyces Cacaliae.*

*Caeoma Convallariatum Lk Spec. II, 42. — T. N. G. XI, 410. — Voir: *Aec. Convallariae.*

*Caeoma crassatum Lk Spec. II, 60. — T. N. G. XI, 411. — Voir: *Aec. Rhamni.*

*Caeoma cylindricum Lk Spec. II, 39. — T. N. G. XI, 409. — Voir: *Melampsora betulina* et *Melampsoridium betulinum.*

*Caeoma cylindrites Lk Spec. II, 64. — T. N. G. XI, 411. — Voir: *Aec. Oxyacanthae* et *Roestelia lacerata.*

*Caeoma epigallicum T. N. G. XI, 408. — Voir: *Puccinia Galii.*

*Caeoma Epilobiatum Lk Spec. II, 59. — T. N. G. XI, 411. — Voir: *Aec. Epilobii.*

*Caeoma Epilobii Lk Spec. II, 29. — T. N. G. XII, 275. — Voir: *Pucc. Epilobii tetragoni.*

*Caeoma Euphorbiarum Lk Spec. II, 39. — C. Euphorbiacearum T. N. G. XI, 409. — Voir: *Melampsora Helioscopiae.*

*Caeoma Euphorbiatum Lk Spec. II, 61. — T. N. G. XI, 411. — Voir: *Aec. Cyparissiae.*

2. **Caeoma Evonymi** (Gmel.) Tul. A. S. N. 4, II, 125. — Oud. Rév. I, 588. — N. K. A. 2, I, 177; Arch. Néerl. VIII, 383. — Wint. Kr. Fl. I, 259. — Uredo Caeoma Evonymi. — Sacc. Syll. VII, 867. — F. et ram. de l'*Evonymus europaea.*

*Caeoma Ficariae Schlecht. Fl. Berol. II, 127. — T. N. G. XII, 275. — Voir: *Uromyces.*

*Caeoma Grossulariatum Lk Spec. II, 59. — T. N. G, XI, 411. — Voir: *Aecidium Grossulariae.*

*Caeoma Leguminosarum Lk Spec. II, 34. — T. N. G. XII, 275. — Voir: *Uromyces Fabae* et *Urom. Trifolii.*

*Caeoma leucospermatum Lk Handb. 446. — T. N. G. XI, 410. — Voir: *Aecidium leucospermum.*

*Caeoma Lini Lk Spec. II, 48. — T. N. G. XI, 409. — Voir: *Melampsora.*

*Caeoma longissimum Schlecht. Fl. Berol. II, 129. — T. N. G. XI, 407. — Voir: *Ustilago.*

*Caeoma Melampyratum Lk Spec. II, 46. — T. N. G. XI, 410. — Voir: *Aecidium Melampyri.*

*Caeoma mixtum Lk Spec. II, 40. — T. N. G. XI, 410. — Voir: *Melampsora Ribesii-purpureae.*

2. **Caeoma Orchidis** (Mart.) Wint. Kr. Fl. I, 256. — Oud. Rév. I, 588. — Uredo C. Orchidis Sacc. Syll. VII, 868. — C. Orchidum Lk Spec. II, 9. — T. N. G. XI, 407 et XII, 275. — F. des *Orchis latifolia* et *maculata.*

*Caeoma Orchidum Lk Spec. II, 9. — T. N. G. XI, 407 et XII, 275. — Voir: Caeoma Orchidis.

*Caeoma Polygonorum Lk Spec. II, 10 p.p. — T. N. G. XI, 407 et 489. — Voir: *Pucc. Polygoni* et *Uromyces Polygoni.*

*Caeoma polymorpha T. N. G. XI, 409. — Voir: *Pucciniastrum Agrimoniae.*

*Caeoma Potentillarum Lk Spec. II. 31. — T. N. G. XI, 408. — Voir: *Phragmidium.*

Caeoma Pseudo-Cyperi Lk Spec. II., 6. — T. N. G. XII, 275. — Voir: *Pucc. Caricis.*

Caeoma Pyrolae Lk Spec. II, 15. — N. K. A. 1, I, 56. — Voir: *Thecopsora.*

Caeoma quadrifidum (D. C.) Lk Spec. II, 55. — T. N. G. XII, 111. — Voir: *Aec. punctatum.*

*Caeoma Ranunculaceatum Lk Spec. II, 54. — T. N. G. XI, 410. — Voir: *Aec. Ran. acris* et *bulbosi* et *Aec. Ficariae.*

*Caeoma Rhamnatum Lk Spec. II. 60. — T. N. G. XI, 411. — Voir: *Aec. Frangulae.*

*Caeoma Rhinanthacearum Lk Spec. II, 12. — T. N. G. XI. 107. — Voir: *Coleosporium Euphorbiae* et *Col. Melampyri.*

*Caeoma Roestelites Lk Spec. II, 61. — T. N. G. XI, 111. — Voir: *Roestelia cancellata.*

Caeoma Rosacearum T. N. G. XI. 408. — Voir: *Phragmidium subcorticium.*

*Caeoma rubellatum Lk Spec. II, 14. — T. N. G. XI, 410. — Voir: *Aec. rubellum a Rumicis.*

*Caeoma Ruborum Lk Spec. II. 230. — T. N. G. XI, 409. — Voir: *Phragmidium Rubi.*

Caeoma Rumicum Schlecht Fl. Berol. II, 126. — T. N. G. XI, 407. — Voir: *Urom. Acetosae* et *Urom. Rumicis.*

*Caeoma Sempervivi Lk Spec. II, 27. — T. N. G. XII, 275; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 175. — Voir: *Endophyllum.*

*Caeoma Senecionis Schlecht. Fl. Berol. II, 119. — T. N. G. XI, 108. — Voir: *Coleosporium.*

*Caeoma sparsum Lk Spec. II. 27. — T. N. G. XI, 408. — Voir: *Urom. Limonii.*

*Caeoma suaveolens Lk Spec. II, 19. — T. N. G. XI, 408. — Voir: *Pucc. obtegens.*

*Caeoma Salicorniatum Lk Spec. II. 15. — T. N. G. XII, 275. — Voir: *Urom. Salicorniae.*

*Caeoma sitophilum Lk Spec. II, 2. — T. N. G. XI, 407. — Voir: *Tilletia Tritici.*

*Caeoma Sorbi Oud. Rév. I, 508; N. K. A. 2, 1, 177; Arch. Néerl. VIII, 383. — Voir: *Oehropsora.*

*Caeoma Symphyti Lk Spec. II, 14. — T. N. G. XI, 407. — Voir: *Uredo.*

*Caeoma Tragopogonatum Lk Spec. II, 50. — T. N. G. XI, 410. — Voir: *Aec. Tragopogi.*

*Caeoma Trifolii T. N. G. XI, 409. — Voir: *Uromyces.*

*Caeoma Umbellatarum Lk Spec. II, 23. — T. N. G. XI, 408. — Voir: *Puec. Apii* et *Puec. Anthrisci.*

*Caeoma Urticatum Lk Spec. II, 62. — T. N. G. XI, 411. — Voir: *Aec. Urticae.*

*Caeoma utriculosum Nees Syst. d. Pilze 14. — T. N. G. XI, 407. — Voir: *Ustilago.*

*Caeoma Valerianae Lk Spec. II, 37. — T. N. G. XI, 409. — Voir: *Uromyces.*

*Caeoma Violatum Lk Spec. II, 58. — T. N. G. XI, 411. — Voir: *Aec. Violae.*

AECIDIUM.

*Aecidium Adoxae Graves in Duby Bot. Gall. II, 908. — Oud. Rév. I, 519 (sous 12); N. K. A. I, I, 56; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 166. — Voir: *Aec. albescens.*

1. **Aecidium albescens** Grev. Fl. Edin. 441; Plowr. Monogr. 153. — Oud. Rév. I, 519 (sous 12); N. K. A. 2, V, 590 et 627. — Sacc. Syll. VII, 612 (sous 23). — Wint. Kr. Fl. I, 211 (sous 318). — Sydow Mon. 203 (sous 320). — Aec. Adoxae Graves N. K. A. I, I, 56; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 166.

F. de l'*Adoxa Moschatellina.*

2. **Aecidium Allii ursini** P. Syn. 210. — Oud. Rév. I, 525 (sous 18); Wint. Kr. Fl. I, 222 (sous 336). — Uredo Caeoma Alliorum Lk — Sacc. Syll. VII, 868. — Caeoma alliatum Lk Spec. II, 431. — T. N. G. XI, 410.

F. de l'*Allium ursinum.*

Relation biologique avec le *Puec. Allii-Phalaridis* Kleb., Zeits. f. Pfl. Krh. 7^er Ber. Bd. IX, p. 39 (= Puec. sessilis Schneider et Puec. Winteriana Magnus); id. Wirtsw. Rostp. p. 264, propre au *Phalaris arundinacea.*

†3. **Aecidium Angelicae** Kleb. Pringsh. Jahrb. 708; Jahrb. Hamb. wiss. Anst. XX, 39, et Wirtsw. Rostp. [1]) p. 319, 320 et

[1]) H. Klebahn. Die wirtswechselnden Rostpilze, etc. — Berlin 1904. — Gebr. Borntraeger.

321, ne s'est pas encore présenté dans les Pays-Bas, quoique le Pucc. Bistortae, ne fut-ce qu'une seule fois, ait été rencontré à Leide.

4. **Aecidium Aquilegiae** P. Ic pictae 58 et Tab. XXIII., f. 4. — Oud. Rév. I, 528 (sous 22). — Sacc. Syll VII, 776. — Wint. Kr. Fl. I, 268. — Sydow Mon. 717 (sous 1028). — Aec. Ranunculacearum D. C. e. Aquilegiae Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 168.

F. de l'*Aquilegia vulgaris*.

Relation biologique avec le *Pucc. Agrostidis*, propre à plusieurs espèces d'*Agrostis* (Kleb. Wirtsw. Rostp. p. 275).

5. **Aecidium Ari** D. C. Cat. d. pl. omises a° 1823. p. 26. — Oud. Rév. I, 526 (sous 20) N. K. A. 2, V, 592; Fgi Neerl. exs. n° 262. — Sacc. Syll. VII, 831. — Wint. Kr. Fl. I, 260. — Caeoma Aec. Ari Dozij et Molk. N. K. A., I, 56.

F. de l'*Arum maculatum*.

Relation biol. avec le *Pucc. Ari-Phalaridis* Kleb. (Zeits. f. Pfl. Krh. 7er Ber., Bd. IX, 39; Pringsh. Jahrb. XXXIV, 101 et Wirtw. Rostp. p. 263).

†6. **Aecidium Asparagi** Lasch in Klotzsch Herb. mycol. n° 1179. — Oud. Rév. I, 513 (sous 2). — Sacc. Syll. VII, 601 (sous 2). — Wint. Kr. Fl. 201 (sous 302). — Pas encore observé chez nous, quoique le Pucc. Asparagi ne soit pas absolument rare.

7. **Aecidium Asperifolii** P. Obs. Myc. I, 97. — Oud. Rév. I, 528 (sous 23); Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 166; N. K. A. 2, I, 176; 2, V, 590 et 627; Arch. Néerl. VIII, 381. — Sacc. Syll. VII, 624 (sous 19). — Aec. Asperifoliorum N. K. A. 2, III, 254. — Caeoma Boraginatum Lk Spec. II, 18; T. N. G. XI, 110; Wint. Kr. Fl. I, 218 (sous 330).

F. de plusieurs Boraginées (*Cynoglossum officinale*, *Lycopsis arvensis*, *Symphytum officinale*).

Relation biol. avec le *Pucc. dispersa* Eriks. et Henn. (Zeits. f. Parasitenkunde 1894, p. 257), Kleb. (Wirtsw. Rostp. p. 237), propre à plusieurs Graminées (Sacc. Syll. XI, 204).

†8. **Aecidium Aviculariae** Kunze in Ficinus Fl. Dresden, 129. — Oud. Rév. I, 189 (sous 3). Propre au *Polygonum aviculare*.

Cette Urédinée n'a pas encore été observée chez nous, quoique l'*Uromyces Polygoni* (P.) Fuck., parasitant sur la même plante, y soit assez vulgaire.

9. **Aecidium Bellidis** Thüm. Fgi austr. n° 635. — Oud. Rév. I, 533 (sous 28); N. K. A. 2, V, 628 et 3, III, 1089. — Sacc. Syll. VII, 629 (sous 57). — Sydow Monog. 29 (sous 45).

F. du *Bellis perennis*.

Relation biol. avec le *Puccinia obscura*, venant sur le *Luzula campestris* (Plowr. Journ. Linn. Soc. 1884, p. 511, et Grev. XII, 86; Kleb. Wirtsw. Rostpilze p. 317).

***Aecidium Berberidatum** T. N. G. XI, 411. — Voir: *Aec. Berberidis.*

10. **Aecidium Berberidis** Gmelin in L. Syst. Nat. II, 1473. — Oud. Rév. I, 523 (sous 16); Fgi Neerl. exs. n° 253; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 168; N. K. A. 2, V, 591 et 627. — Caeoma Berberidatum Lk Spec. II, 67. — Acc. Berberidatum T. N. G. XI, 411.

F. du *Berberis vulgaris.*

Relation biol. avec le *Puccinia Graminis*, propre aux Céréales et à plusieurs Graminées. — (Klebahn, Wirtsw. Rostpilze, p. 205—235).

†11. **Aecidium Betae** Kühn Bot. Zeit. 1869, p. 542. — Oud. Rév. I, 492 (sous 7). — Sacc. Syll. VII, 536 (sous 8). — Wint. Kr. Fl. I, 155 (sous 205).

F. du *Beta vulgaris* var. *Rapa.*

Manque jusqu'ici à notre flore, quoique l'*Uromyces Betae* (P.) Tul., avec lequel il se trouve en relation biologique, se présente de temps en temps sur les feuilles de la Betterave cultivée.

***Aecidium Boraginatum** T. N. G. XI, 410. — Voir: *Aec. Asperifolii.*

***Aecidium Buniatum** T. N. G. XI, 410. — Voir: *Aec. Bunii.*

12. **Aecidium Bunii** D. C. Syn. 51 et Fl. Fr. VI, 96. — Oud. Rév. I, 550. — Sacc. Syll. VII, 667. — Wint. Kr. Fl. I, 197. — Sydow Monogr. 363 (sous 572). — Caeoma Buniatum Lk Spec. II, 53. — T. N. G. XI, 410.

F. des *Carum Bulbocastanum*, *Daucus Carota* et *Oenanthe Lachenalii.*

Relation biol. avec le *Puccinia Bunii* (D. C.) Wint., propre au *Carum Bulbocastanum.*

13. **Aecidium Cacaliae** Oud. Rév. I, 500 (sous 23, anonyme). — Sacc. Syll. VII, 561 (sous 76, anonyme. — Wint. Kr. Fl. I, 152 (sous 199, anonyme.

F. de l'*Adenostyles alpinus* cultivé.

14. **Aecidium Calthae** Grev. Fl. Edin. 446. — Oud. Rév. I, 513 (sous 4). — Sacc. Syll. VII, 602 (sous 4). — Wint. Kr. Fl. I, 216 (sous 327).

F. du *Caltha palustris.*

Relation biol. avec le *Puce. Calthae* Lk, propre au *Caltha palustris.*

***Aecidium cancellatum.** — Voir: *Roestelia.*

†15. **Aecidium Cari** Kleb. Zeits. f. Pfl. Krh. 7er Ber., Bd. IX, 46, lignes 8 et 9 d'en bas. — Manque jusqu'à ce jour à notre flore, quoique le *Puccinia Bistortae*, avec lequel il entretient une

relation biologique, ait été rencontré, ne fut ce qu'une seule fois, à Leide.

F. du *Carum Carvi*.

A consulter Oud. Rév. I, 545; Kleb. Zeits. f. Pfl. Krkh. 5er Ber., VI, 329; ibid. 6er Ber., Bd. VII, 39; ibid. 7er Ber., Bd. IX, 43; id. 8er Ber. in Pringsh. Jahrb. XXXIV, 403.

Le *Puce.* du *Polygonum Bistorta* qui engendre un aecidium sur le *Carum Carvi*, reçut tout d'abord le nom de *Puce. Cari-Bistortae* Kleb. (Zeits. f. Pfl. Krkh. 6er Ber., Bd. VII, p. 36), mais se nomme aujourd'hui *Puce. Angelicae-Bistortae* Kleb. (Wirtsw. Rostpilze, 319), parceque l'*Angelica silvestris* a prouvé constituer la plante aecidiifère par excellence du *Polygonum Bistorta*.

***Aecidium cathartieum.** — Voir: *Aec. Rhamni*.

16. **Aecidium Centaureae** D. C. Fl. Fr. II, 241. — Oud. Rév. I, 585; N. K. A. 3, II, 718. — Sacc. Syll. VII, 633 (sous 65). — Plowr. Mon. 171.

F. du *Centaurea nigra*.

Relation biologique avec le *Puce. arenariicola* Plowr., propre au *Carex arenaria* Plowr. l. c. — Kleb. Wirtsw. Rostpilze, p. 308.

***Aecidium Cichoraceaeum** D. C. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 166. — Voir: *Aec. Tragopogi*.

†16. **Aecidium Cirsii lanceolati** Sacc. Syll. VII, 606 (sous 11; anonyme). — Oud. Rév. I, 515 (sous 6; anonyme).

Quoique le *C. lanceolatum* appartienne à notre flore, pourtant l'*Aec.* qui lui est propre n'a pas encore été rencontré chez nous.

Selon Mr. Sydow (Monogr. Uredin. p. 58), le nom de *Puce. C. lanceolati* Schröt. Pilze Schles. I (1889), p. 317, doit être remplacé par celui de *Puce. Cnici oleracei* Desm. Catal. d. Pl. omises (1823) p. 21, distribué dans ses Pl. Crypt. de France 1e Série, 1e Ed. n° 25, parasite du *Cnicus oleraceus*. Au surplus, le *Puce. Cardui* Plowr. Mon. (1889) p. 216, et le *Puce. spectabilis* Otth, Berl. Mitth. (1865) p. 176 et Sacc. Syll. XIV, 311, qui n'en diffèrent pas, devraient être supprimés.

17. **Aecidium Clematidis** D. C. Fl. Fr. II, 243. — Oud. Rév. I, 526 (sous 19). — Sacc. Syll. VII, 711. — Wint. Kr. Fl. I, 270. — Aec. Ranunculacearum d. Clematidis Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 168.

F. du *Clematis Vitalba*.

Relation biol. avec le *Puce. Agropyri* Ellis et Everhard (= Puce. (Clematidi-Agropyri) Kleb. Wirtsw. Rostpilze 292., parasitant sur l'*Agropyrum* (= Triticum) *repens*.

18. **Aecidium columellatum** Schum. Saell. II, 226. — Oud. Rév. I, 571 (anonyme) sous 8. — Wint. Kr. Fl. I, 231.

F. du *Rubus idaeus*.

Relation biol. avec le *Phragmidium Rubi idaei* (P.) Karst., propre au *Rubus idaeus*.

***Aecidium compositatum** T. N. G. XI, 410. — Voir: *Aec. Sonchi*, *Aec. Tripolii* et *Aec. Tussilaginis*.

19. **Aecidium Convallariae** Schum. Saell. II, 224. — Oud. Rév. I, 527; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 168; N. K. A. 2, I, 88; 2, V, 592 et 631; Oud. Herb. Ned. Pl. n° 162). — Sacc. Syll. VII, 828. — Wint. Kr. Fl. I, 259. — Kleb. Zeits. f. Pfl. Krh. 1^er^ Ber., Bd. II, 26; 2^er^ Ber., Bd. IV, 137; 3^er^ Ber., Bd. V, 149; 4^er^ Ber., Bd. V, 263; 8^er^ Ber. Pringsh. Jahrb. XXXIV, 401. — Caeoma Convallariatum Lk Spec. II, 42; T. N. G. XI, 410.

F. du *Convallaria majalis*.

Relation biol. avec le *Puccinia Convallariae-Digraphidis* (Sopp.) Kleb. (Wirtsw. Rostp. p. 265).

***Aecidium cornutum**. — Cf. *Roestelia*.

***Aecidium crassatum** T. N. G. XI, 411. — Voir: *Aec. Frangulae*.

***Aecidium crassum** N. K. A. 2, V, 591. — Voir: *Aec. Frangulae*.

20. **Aecidium Crepidis** Oud. Rév. I, 517 (sous 9; anonyme). — Sacc. Syll. VII, 607 (sous 14; anonyme). — Wint. Kr. Fl. I, 207 (sous 312, forma 2). — Sydow. Monogr. 64 (sous 94). — Aec. Tragopogonatum T. N. G. XI, 410.

F. du *Crepis tectorum*.

Relation biol. avec le *Puccinia Crepidis* Schröt., lequel pourtant ne s'est pas encore présenté à nos recherches.

***Aecidium Crepidis paludosae**. — Voir: *Aec. Lapsanae*.

21. **Aecidium Cyparissiae** D. C. Fl. Fr. II. 240. — Oud. Rév. I, 495 (sous 14). — Sacc. Syll. VI, 543.

F. de l'*Euphorbia Cyparissias*.

Relation biol. avec l'*Uromyces striatus* (Kleb. Wirtsw. Rostp. 331) = U. Medicaginis falcatae (D. C.) Wint., propre aux *Medicago lupulina* et *sativa*.

22. **Aecidium Cyparissiae** D. C. Fl. C. II, 240. — Oud. Rév. I, 495 (sous 13). — Sacc. Syll. VII, 542 (anonyme) sous 21. — Wint. Kr. Fl. I, 163 (sous 218).

F. de l'*Euphorbia Cyparissias*.

Relation biol. avec l'*Uromyces Pisi*, propre aux *Pisum sativum* et *Lathyrus pratensis* (Kleb. Wirtsw. Rostp. p. 330).

***Aecidium Epilobiatum** T. N. G. XI, 411. — Voir: *Aec Epilobii*.

23. **Aecidium Epilobii** D. C. Fl. Fr. II, 238. — Oud. Rév. I, 517 (sous 10). — Sacc. Syll. VII, 608 (sous 17). — Wint. Kr.

Fl. I, 214 (sous 324). — Caeoma Epilobiatum Lk. Spec. II, 59. — T. N. G. XI, 411.

F. de l'*Epilobium hirsutum*.

Relation biol. avec le *Puccinia Epilobii* D. C., propre à plusieurs espèces d'*Epilobium*.

24. **Accidium Ervi** Wallr. Fl. Cr. 247. — Oud. Rév. I, 488 (sous 1) et Fgi Neerl. exs. n° 246; N. K. A. 3, II, 200. — Wint. Kr. Fl. I, 158 (sous 210).

F. du *Vicia* (Ervum) *hirsuta*.

Relation biologique avec l'*Uromyces Fabae* (P.) de Bary, propre aux espèces de *Faba* et de *Vicia*.

25. **Accidium Euphorbiae** Gmel. in L. Syst. Nat. II, 1473. — Oud. Rév. I, 585; N. K. A. 2, V, 588. — Sacc. Syll. VII, 820. — Wint. Kr. Fl. I, 261.

F. de l'*Euphorbia Esula*.

Relation biol. avec l'*Uromyces Pisi*.

***Accidium Euphorbiatum** T. N. G. XI, 411. — Voir: *Aec. Euphorbiae*.

26. **Accidium Falcariae** P. Disp. meth. 12. — Oud. Rév. I, 550, (sous 52); Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 168. — Sacc. Syll. VII, 666 (sous 167). — Wint. Kr. Fl. I, 197 (sous 297). — Sydow Monogr. 380 (sous 592).

F. du *Falcaria Rivini*.

Relation biol. avec le *Puccinia Falcariae* sur la même plante.

27. **Accidium Ficariae** P. Ob. Myc. II, 23. — Oud. Rév. I, 494 (sub 12). — Sacc. Syll. VII, 511 (sous 19). — Wint. Kr. Fl. I, 162 (sous 216). — Aec. Ranunculacearum D. C. b. Ficariae. — Prodr. Fl. Bat. II, p. 167. — Caeoma Ranunculaceatum Lk Spec. II, 54. — T. N. G. XI, 410 p.p. — Kleb. Wirtsw. Rostp. 324.

F. du *Ficaria verna*.

Relation biol. avec l'*Uromyces Poae* Rabenh. (Kleb. l. c.) propre aux *Poa nemoralis, pratensis* et *trivialis*.

28. **Accidium Frangulae** Schum. Saell. II, 225. — Oud. Rév. I, 524 (sous 17); N. K. A. 2, V, 627. — Sacc. Syll. VII, 623 (sous 47). — Wint. Kr. Fl. I, 219 (sous 331). — Aec. crassum P. — Oud. Fgi. Neerl. exs. n° 58. — Caeoma Aec. Rhamnatum Lk Spec. II, 60. — T. N. G. XI. 111. — Caeoma Aec. crassatum T. N. G. XI, 411. — Aec. Rhamni Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 168.

F. du *Frangula Alnus* (= Rhamnus Frangula).

Relation biol. avec le *Puccinia coronata* Cda emend., propre au *Holcus lanatus* L. (Puec. coronata Holci Kleb. Wirtsw. Rostp.

p. 257), et à l'*Agrostis vulgaris* With. (Pucc. coronata Agrostis Erikss.) et d'autres Graminées non encore observées.

A consulter: de Bary Monatsber. Berl. Akad. 1866, p. 205—215 et A. S. N. 5, V, 262. — Kleb. Zeits. f. Pfl. Krh. 1er Ber., Bd. II, p. 21—26 (T. a. p.); ibid. 2er Ber. Bd. IV, p. 129—136; ibid. 3er Ber. Bd. V, p. 151—152; ibid. 4er Ber. Bd. V, p. 327—333; ibid. 5er Ber., Bd. VI, p. 331—333; ibid. 6er Ber., Bd. VII, p. 36. — Sydow Monog. 690. — Kleb. Wirtsw. Rostp. p. 254—257.

***Aecidium fuscum** Relhan. Voir: — *Aec. leucospermum* D. C.

29. **Aecidium Galii** P. Syn. 207. — Oud. Rév. I, 512 (sous I) et Fgi Neerl. exs. n° 37; N. K. A. 2, I, 171; Arch. Néerl. VIII, 378. — Sacc. Syll. VII, 601 (sous I). — Wint. Kr. Fl. I, 210 (sous 317). — Sydow Monog. 213 (sous 334).

F. du *Galium Aparine*.

Relation biol. avec le *Puccinia Galii* (P.) Schwein., propre aux espèces de *Galium*.

30. **Aecidium Gentianae** Sacc. Mycol. Ven. Spec. 1873, p. 82 (anonyme). — Oud. Rév. I, 515 (sous 6; anonyme). — Sacc. Syll. VII, 604 (sous 8; anonyme). — Wint. Kr. Fl. I, 205 (sous 311; anonyme). — Sydow Monogr. p. 340 et 341 (sous Pucc. Gent.).

Pas encore rencontré chez nous, quoique l'*Uredo Gentianae* D. C. et le *Puccinia Gent.* (Strauss) Mart. se présentent quelquefois: le premier sur le *G. Pneumonanthe*, et le second sur le *G. Cruciata*.

31. **Aecidium Geranii** D. C. Fl. Fr. VI, 93. — Oud. Rév. I, 491 (sous 6); N. K. A. 2, I, 173 et 2, V, 591; Arch. Néerl. VIII, 375.

F. du *Ger. dissectum*.

Relation biol. avec l'*Uromyces Geranii* (D. C.) Otth., rencontré sur un exemplaire d'un *Ger.* inconnu cultivé.

***Aecidium glaucatum** Dozij et Molkb. T. N. G. XII, 275. — Voir: *Aec. Glaucis*.

32. **Aecidium Glaucis** Dozij et Molkenboer T. N. G. XII, 286 et tab. VI f. 1—3. — Oud. Rév. I, 496 (sous 16); Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 167. — Sacc. Syll. VII, 818. — Wint. Kr. Fl. I, 262. — Kleb. Wirtsw. Rostp. p. 328 (sous Uromyces Maritimae).

F. du *Glaux maritima*.

Relation biol. avec les *Uromyces Maritimae* Plowr. et *Urom. lineolatus*, venant le premier sur le *Scirpus maritimus* et le second sur le *Sium* (*Berula*) *angustifolium*. — Kleb. Wirtsw. Rostp. p. 328, sub *Uromyces Maritimae*.

34. **Aecidium Grossulariae** P. Syn. 207. — Oud. Rév. I, 583; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 167; N. K. A. 2, V, 590. — Sacc. Syll.

VII, 792. — Caeoma Grossulariatum Lk Spec. II, 59. — T. N. G. XI, 411.

F. du *Ribes Grossularia.*

Relation biol. avec les *Puec. Pringsheimiana* Kleb. et *Puec. Caricis* (Schum.) Rebent., propres aux *Carex acuta* et *C. Goodenoughii.*

A consulter: Klebahn, 2er Ber. in Zeits. f. Pfl. Krkh. Bd. IV, p. 86—88; 3er Ber. ibid. Bd. V, 79; 4er Ber. ibid. V, p. 266—268; 5er Ber. ibid. Bd. VI, p. 324—325; 7er Ber. ibid. Bd. IX, p. 34; 8er Ber. Pringsh. Jahresb. XXXIV, p. 388; Wirtsw. Rostpilze, p. 295—298.

33. **Aecidium Glomeratae** (Grev.) Oud. (anonyme in Arch. Néerl. II, 39).

F. du *Senecio Jacobaea.*

Relation biol. avec le *Puec. glomerata* Oud., propre au *Senecio Jacobaea.*

***Aecidium Grossulariatum** T. N. G. XI, 411. — Voir: *Aec. Grossulariae.*

35. **Aecidium Heraclei** (Dozij et Molkb.) Oud. N. K. A. 2. I, 173; Arch. Néerl. VIII, 375; Oud. Rév. I, 520; id. Fgi Neerl. exs. n° 28. — Caeoma Aec. Heraclei Dozij et Molkb. N. K. A. 1, I, 57.

F. de l'*Heracleum Sphondylium.*

Relation biol. avec le Puccinia Heraclei Grev., propre à l'*Heracleum Sphondylium.* — Sydow Monogr. 387.

36. **Aecidium Jacobaeae** Grev. Fl. Edin. 445. — Oud. Rév. I, 532 (sous 27); Fgi Neerl. exs. n° 59; N. K. A. 2, V, 628. — Sacc. Syll. VII, 627 (sous 52). — Aec. Senecionis Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 169 p.p.; N. K. A. 2, I, 88.

F. du *Senecio Jacobaea.*

Relation biol. avec le *Puec. Schoeleriana* Plowr. et Magn. propre au *Carex arenaria.* — Kleb. Wirtsw. Rostp. 308.

***Aecidium Lactucae.** — Voir: *Aec. Prenanthis.*

37. **Aecidium Lapsanae** Schultz Fl. Starg. 154. — Oud. Rév. I, 516 (sous 8); N. K. A. 2, V, 469. — Sacc. Syll. VII, 607 (sous 13). — Wint. Kr. Fl. I, 206 (sous 312). — Aec. Compositarum β. Crepidis N. K. A. 2. II, 38. — Sydow Monog. 68 et 112.

F. du *Lapsana communis.*

Relation biol. avec le *Puec. Lapsanae* (Schultz) Fuck., propre au *Lapsana communis.*

F. du *Crepis paludosa.*

Relation biol. avec le *Puec. major* Dietel. — Sydow. Monog. p. 66.

***Aecidium Leguminosarum** Rab. — Prodr. Fl. Bat. II, 4. p. 168.

***Aecidium leucospermatum** T. N. G. XI, 410. — Voir: *Aec. leucospermum.*

38. **Aecidium leucospermum** D. C. Fl. Fr. II, 239. — Oud. Rév. I, 553 (sous 57); Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 167. — Sacc. Syll. VII, 669 (sous 172). — Wint. Kr. Fl. I, 199 (sous 300). — Plowr. Monogr. 269. — Caeoma leucospermatum Lk Handb. 446. — T. N. G. XI, 410.

F. de l'*Anemone nemorosa.*

Relation biol. avec l'*Ochropsora Sorbi* (Oud.) Dietel. — Kleb. Wirtsw. Rostp. 356.

39. **Aecidium Limonii** (D. C.) Duby Bot. Gall. II, 904. — Oud. Rév. I, 189 (sous 2); N. K. A. 2, V, 117. — Sacc. Syll. VII, 532 (sous 2). — Wint. Kr. Fl. I, 156 (sous 207). — Aec. Statices Desm. Pl. Cr. du Nord de la Fr. 1^e^ S., 1^e^ Ed. n° 132. — Oud. — N. K. A. 3, I, 463.

F. des *Armeria vulgaris* (= A. longifolia) et *Statice Limonium.*

Relation biol. avec l'*Uromyces Limonii* (D. C.) Lév., propre aux *Armeria vulgaris* et *Statice Limonium.*

†40. **Aecidium Liliacearum** Sacc. Syll. VII, 668 (sous 170; anonyme). — Oud. Rév. I, 551 (sous 55; anonyme). — Wint. Kr. Fl. I, 194 (sous 291; anonyme).

Jusqu'ici étrangère à notre flore, quoique le *Puce.* Liliacearum ait été rencontré plusieurs fois.

41. **Aecidium Melampyri** Kze u. Schm. exs. n° 165. — Oud. Rév. I, 583. — Sacc. Syll. VII, 813. — Wint. Kr. Fl. I, 262. — Caeoma Melampyratum Lk Spec. II, 16? — T. N. G. XI, 410.

F. des *Melampyrum arvense* et *pratense.*

Relation biol. avec le *Puce. nemoralis* Juel (type du *Puce. Moliniae* Tul.), propre au *Molinia caerulea.* — Kleb. Wirtsw. Rostp. 288.

†42 **Aecidium Menthae** D. C. Fl. Fr. VI, 95. — Oud. Rév. I, 522 (sous 15). — Sacc. Syll. VII, 617 (sous 35). — Wint. Kr. Fl. I, 201 (sous 308; anonyme).

Manque jusqu'ici à notre flore, quoique le *Puce. Menthae* ait été rencontré maintes fois à plusieurs endroits.

***Aecidium Mespili** D. C. — Voir: *Roestelia confusa.*

***Aecidium Myrtilli** Franq. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 169. — Voir: *Thecopsora Vacciniorum.*

43. **Aecidium Orchidearum** Desm. Cat. Pl. omises 26. — Oud. Rév. I, 537 (sous 32); N. K. A. 2, I, 177; 2, V, 591 et 628; Arch. Néerl. VIII, 384. — Sacc. Syll. VII, 631 (sous 61). — Wint. Kr. Fl. I, 219 (sous 332). — Aec. Orchideatum T. N. G. XI, 411 et XII, 275.

F. des *Listera ovata*, *Orchis latifolia*, *Orchis maculata*.

Relation biol. avec le Pucc. *Orchidearum-Phalaridis* Kleb. Zeits. f. Pfl. Krkh. 5er Ber. Bd. VI, 269; ibid. 7er Ber., Bd. IX, 41; id. Pringsh. Jahrb. XXXIV, 902; ibid. XXXV, 705; id. Wirtsw. Rostp. p. 271.

***Aecidium Orchideatum** T. N. G. III et XII, 275.

44. **Aecidium Orobi** P. in Römer Neues Mag. I, 92 et Disp. meth. 12. — Oud. Rév. I, 188 (sous 1). — Sacc. Syll. VII, 531 (sous 1). — Wint. Kr. Fl. I, 158 (sous 210). — Aec. Orobi tuberosi P. Syn. 210; Schuurm. Stekh. Handb. II, 196.

F. de l'*Orobus tuberosus*.

Relation biol. avec l'*Uromyces Orobi* (P.) Wint. = Urom. Fabae de Bary, propre à l'*Orobus tuberosus*.

***Aecidium Oxyacanthae** P. — Oud. Rév. I, 563 (sous 1). — Voir: *Roestelia lacerata*.

***Aecidium Paeoniae** Wallr. Fl. Cr. 259. — Oud. Rév. I, 510 (sous 2). — Voir: *Cronartium flaccidum*.

15. **Aecidium Periclymeni** Schum. Saell. II, 226. — Oud. Rév. I, 531 (sous 26); Prodr. Fl. Bat. II, 1, p. 168; N. K. A. 2, V, 592 et 631. — Sacc. Syll. VII, 796. — Wint. Kr. Fl. I, 264.

F. du *Lonicera Periclymenum*.

Relation biol. avec le *Pucc. Festucae*, propre aux Festuca ovina et duriuscula (Kleb. 2er Ber. in Zeits. f. Pfl. Krkh. IV, 138; 3er Ber. ibid. Bd. V, p. 150; id. Wirtw. Rostp. 290.

16. **Aecidium Phaseolorum** Wallr. Fl. Crypt. 256. — Oud. Rév. I, 491 (sous 5); Prodr. Fl. Bat. II, 1, p. 168; N. K. A. 2, I, 90; Fgi Neerl. exs. n. 113. — Sacc. Syll. VII, 535 (sous 6).

F. des *Phaseolus compressus* et *nanus*.

Relation biol. avec l'*Uromyces Phaseoli* (P.) Wint., propre aux espèces de *Phaseolus* indiquées.

***Aecidium Pimpinellae** Kirchner, Lotos VI, 180. — Oud. Rév. I, 520 (sous 14). — Sacc. Syll. VII, 616 (sous 34). — Wint. Kr. Fl. I, 213 (sous 321).

F. de l'*Heracleum Sphondylium*. — Voir: *Aec. Heraclei*.

***Aecidium Pini** P. in Gmel. Syst. 1473. N. K. A. 2, IV, 239. — Voir: *Peridermium oblongisporium* Fuck.

47. **Aecidium Potentillae**, mieux dit „Uredo primaire". — Oud. Rév. I, 567 (sous 2).

F. et tiges de diverses espèces de *Potentilla*.

Relation biol. avec le *Phragmidium Potentillae*, propre aux mêmes espèces hospitalières.

18. **Aecidium Porri** Oud. Rév. I, 514 (sous 5; anonyme). —

Sacc. Syll. VII, 605 (sous 10; anonyme). — Wint. Kr. Fl. I, 200 (sous 301; anonyme).

Jusqu'ici étranger à notre flore, quoique l'*Uredo ambigua* D. C. soit quelquefois rencontré.

49. **Aecidium Prenanthis** P. Syn. 208. — Oud. Rév. I, 515 (sous 7); N. K. A. 2, I, 172 et 2, V, 590. — Sacc. Syll. VII, 606 (sous 12). — Wint. Kr. Fr. I, 208 (sous 314). — Aec. Lactucae Arch. Néerl. VIII, 379.

F. du *Lactuca* (Prenanthes) *muralis*.

Relation biol. avec le *Pucc. Prenanthis* (P.) Kze, propre au *Lactuca muralis*.

50. **Aecidium Primulae** D. C. Fl. Fr. VI, 90. — Oud. Rév. I, 520 (sous 13); N. K. A. 2, V, 163; Fl. Bat. tab. 1390. — Sacc. Syll. VII, 612 (sous 25). — Wint. Kr. Fl. I, 203 (sous 306.)

F. du *Primula acaulis* (= P. grandiflora).

Relation biol. avec le *Puccinia Primulae*, propre au *Pr. acaulis*.

51. **Aecidium punctatum** P. in Usteri Ann. d. Bot. 1796, 20er Stück, p. 135. — Oud. Rév. I, 582. — Sacc. Syll. VII, 775. — Wint. Kr. Fl. I, 269. — Caeoma quadrifidum (D. C.) Lk Spec. II, 55; T. N. G. XII, 411.

F. de l'*Anemone coronaria* cultivé.

52. **Aecidium Pyri** Franq. Prodr. Fl. Bat. II, 1, p. 169. — An Aec. Mespili?

Relation biol. avec le *Gymnosporangium confusum* Plowr?

***Aecidium quadrifidum** D. C. Fl. Fr VI, 90. — Oud. Rév. I, 582; T. N. G. XI, 411. — Voir: *Aec. punctatum* P.

***Aecidium Ranunculacearum** D. C. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 167; N. K. A. 2, I, 176. — Voir: *Aec. Aquilegiae*, *Aec. Clematidis*, *Aec. Ficariae*, *Aec. Ranunculi acris*, *Aec. Ranunculi repentis*, *Aec. Thalictri flexuosi*.

***Aecidium Ranunculaceatum** T. N. G. XI, 410. — Voir: *Aec. Ficariae*, *Aec. Ran. bulbosi*, *Aec. Ran. acris*.

53. **Aecidium Ranunculi acris** P. Syn. 210. — Oud. Rév. I, 536 (sous 33). — Sacc. Syll. VII, 540 (sous 19). — Wint. Kr. Fl. I, 161 (sous 215). — Caeoma Ranunculaceatum Lk Spec. II, 54 (p.p.). — T. N. G. XI, 410.

F. du *Ranunculus acer*.

Relation biol. avec le *Pucc. perplexans*, propre à l'*Alopecurus pratensis*. — A consulter: Plowr. Monogr. 179 et 180; Dietel Hedw. 1889; p. 278; Kleb. Zeits. f. Pfl. Krkh. 10er Ber., Bd. XII, 41; id. Wirtsw. Rostp. 271.

54. **Aecidium Ranunculi bulbosi** Plowr. Grev. XIII, 53. —

Oud. Rév. I, 494 (sous 11). — Caeoma Ranunculaceatum Lk Spec. II. 54. (p.p.). — T. N. G. XI, 410, (p.p.) Aec. Ranunculacearum N. K. A. 2, V, 591.

F. du *Ranunculus bulbosus.*

Relation biol. avec l'*Uromyces Dactylidis* Otth, propre au *Dactylis glomerata.*

55. **Aecidium Ranunculi bulbosi** et **repentis** Plowr. Mon. 178. — Oud. Rév. I, 535 (sous 31).

F. des *Ran. bulbosus* et *repens.*

Relation biol. avec le *Pucc. Magnusiana* Körn., propre au *Phragmites communis.* — Kleb. Wirtsw. Rostp. p. 325.

***Aecidium Rhamnatum** Lk Spec. II, 60. — T. N. G. XI, 411. — Voir: *Aec. Frangulae.*

56. **Aecidium Rhamni** Gmel. in Linn. Syst. Nat. II, 1462. — Oud. Rév. I, 524 (sous 17); Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 168. — Sacc. Syll. VII, 623 (sous 47). — Wint. Kr. Fl. 218 (sous 331).

F. du *Rhamnus cathartica.*

Relation biol. avec le Pucc. coronifera Kleb., propre aux *Holcus lanatus*, *Lolium perenne* et d'autres Graminées. — Kleb. 1^er^ Ber., in Zeits. f. Pfl. Krkh. II, p. 21—26; 2^er^ Ber., ibid. IV, 129—136; 3^er^ Ber. ibid. V, p. 151—152; 4^er^ Ber., ibid. V, p. 327—333; 5^er^ Ber., ibid. VI, p. 331—333; id. Wirtsw. Rostp. 257.

57. **Aecidium Rhei** Oud. Fgi. Neerl. exs. n° 148 et Rév. I, 533 (sous 29).

F. du *Rheum undulatum.*

Relation biol. avec le *Phragm. communis.* — Voir: Plowr. Hedw. 1883, p. 118; Grev. XII, 36; Kleb. Wirtsw. Rostp. 283 et 284.

***Aecidium rubellum** Gmel in Linn. Syst. Nat. II, p. 1473. — Sacc. Syll. 630 (sous 50). — Voir: *Aec. rubellum α Rumicis.*

58. **Aecidium rubellum α Rumicis** Gmel. in Linn. Syst. Nat. II, 1473. — Oud. Rév. I, 533 (sous 29; Fl. Bat. tab. 1440. — Wint. Kr. Fl. I, 221 (sous 335). — Caeoma rubellatum Lk Spec. II, 44. — T. N. G. XI, 410.

F. des *Rumex crispus* (Oud. Fgi Neerl. exs. n° 54), *R. Hydrolapathum* (Oud. ibid. n° 55) et *R. obtusifolius.*

Relation biol. avec le *Puccinia Phragmitis*, propre au *Phragmitis communis* (Schum.) Körn. — A consulter Kleb. Wirtsw. Rostp. 283.

59. **Aecidium Ruborum**, mieux dit: *Urédo primaire.* Oud. Rév. I, 568 et 569.

F. de plusieurs espèces de *Rubus.*

Relation biol. avec les *Phragmidium violaceum* (Schultz) Wint.,

Rubi (P.) Wint et *subcorticium* (Schrank) Wint., propres à diverses espèces de *Rubus*.

***Aecidium Rubi idaei** (P.) Oud. Rév. I, 571 (sous 8; anonyme). — Voir: *Aec. columellatum* Schum.

***Aecidium Rumicis** P. — Voir: *Aec. rubellum* L. *Rumicis*.

60. **Aecidium Rumicis** Grev. f' **Acetosae** Oud. Rév. I, 534. — Sacc. Syll. IX, 313. — Plowr. Monog. 177.

F. du *Rumex Acetosa* L.

Relation biol. avec le *Pucc. Trailii* Plowr. Monog. 177, propre au *Phragmites communis*. — A consulter: Kleb. Zeits. f. Pfl. Krh. 2er Ber., Bd. IV, p. 136; id. Wirtsw. Rostp. 284.

61. **Aecidium Salicorniae** D. C. Fl. Fr. VI, 42. — Oud. Rév. I, 493 (sous 10). — Sacc. Syll. VII, 538 (sous 12). — Wint. Kr. Fl. I, 156 (sous 206). — Caeoma Salicorniatum Lk Spec. II, 45. — T. N. G. XII, 275.

F. du *Salicornia herbacea*.

Relation biol. avec l'*Uromyces Salicorniae*, propre au *Salicornia herbacea*.

***Aecidium Salicorniatum** Lk — T. N. G. XII, 275. — Voir: *Aec. Salicorniae*.

62. **Aecidium Sanguisorbae**, mieux dit: „Urédo primaire". — Oud. Rév. I, 567 (sous 1).

F. du *Poterium Sanguisorba* L.

Relation biol. avec le *Phragmidium Sanguisorbae* (D. C.) Schröt., propre au *Poterium Sanguisorba* L.

63. **Aecidium Scabiosae** Dozij et Molkenboer, N. K. A. 1, I, 56. — Oud. Rév. I, 584 et Fgi Neerl. exs. n° 257. — Sacc. Syll. VII, 798. — Wint. Kr. Fl. I, 264.

F. du *Knautia arvensis* Coult.

64. **Aecidium Scorzonerae** Oud. Rév. I, 551, sous le nom d'*Aec. Tragopogi* P.

F. du *Scorzonera hispanica*.

Relation biol. avec le Puccinia Scorzonerae (Schum.) Jacky Composit. Pucc. (1899), p. 54. — Sydow Monogr. 141.

65. **Aecidium Senecionis** Oud. Rév. I, 551 (sous 54); Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 169 p.p.; N. K. A. 2, I, 178, et 2, V, 590; Arch. Néerl. VIII, 384; Oud. Herb. Ned. Pl. n° 161.

F. du *Senecio aquaticus* Huds.

Relation biol. avec le *Pucc. expansa* Lk. Spec. II, 75, propre au *Senecio aquaticus*. — Sydow Monogr. p. 146.

66. **Aecidium Senecionis** Desm. A. S. N. 2, VI, 243. — Oud. Rév. I, 551 (note au pied de la page); N. K. A. 2, V, 590. —

Sacc. Syll. VI, p. 667 (sous 169). — Wint. Kr. Fl. I, 195 (sous 293).

F. des *Senecio Fuchsii* Gmel. et *S. saracenicus* L.

Relation biol. avec le *Pucc. Senecionis* Lib. Pl. Crypt. Arduennae n° 92; au contraire selon Schröter avec le Pucc. silvatica, propre aux *Carex brizoides* ou *C. silvatica* (Kleb. Wirtsw. Rostp. p. 303).

67. **Aecidium Sii latifolii** (Fiedler) Wint Kr. Fl. I. 265. — Oud. Rév. I, 496 (sous 15); N. K. A. 2, IV, 515. — Sacc. Syll. VII, 792. — Aec. Falcariae D. C. var. Sii latifolii in Klotzsch Herb. Mycol. n° 1176.

F. du *Sium* (Berula) *angustifolium*.

Relation biol. avec l'*Uromyces Scirpi* (Cast.) Lagerh. (= Urom. lineolatus (Desm.) Schröt., propre au *Scirpus maritimus*. — Voir: Kleb. Wirtsw. Rostp. 325.

68. **Aecidium Smilacearum** Oud. — Ne diffère pas, en caractères microscopiques, de l'*Aec. Convallariae*, mais semble différer de celui-ci par sa relation biologique.

F. des *Majanthemum bifolium*, *Polygonatum multiflorum* et *officinale*.

Relation biol. avec le *Pucc. Smilacearum-Digraphidis* Kleb. Wirtsw. Rostp. p. 267.

***Aecidium Sommerfeltii** Johanson. — Voir: *Aec. Thalictri flavi* (D. C.) Wint.

69. **Aecidium Sonchi** Johnst. Fl. Berwsh. II. (1835), 265. — Plowr. Monog. 266. — West. Not. VII (1861), 10. — Oud. Rév. I, 504. — Sacc. Syll. VII, 805. — Sydow Monogr. 154. — Aec. Compositarum T. N. G. XI, 110 p.p.

F. du *Sonchus asper*.

Relation biol. avec le *Pucc. Sonchi* Rob. et Desm. A. S. N. 3, XI, 274. — Oud. Rév. I, 511 et Fgi Neerl. exs. n° 137 (= Uromyces Sonchi Oud. Rab. F. E. n° 1592, propre aux *Sonchus arvensis* et *oleraceus*.

***Aecidium Statices** Desm. — Voir l'Aec. Limonii (D. C.) Duby.

***Aecidium Strobi.** — Voir le *Peridermium Strobi* sous *Cronartium ribicola* Dietr.

70. **Aecidium strobilinum** (A. S.) Rees Rostpilze 105 et tab. II, f. 7—10. — Oud. Rév. I, 582; Arch. Néerl. VIII, 384; Fgi Neerl. exs. n° 263. — Sacc. Syll. VII, 824. — Wint. Kr. Fl. I, 260. — Perichaena strobilina Fr. S. M. III. 190.; T. N. G. XII, 272; Prodr. Fl. Bat. II, 1, p. 22.

Ecailles des cônes du *Picea excelsa*.

Relation biol. avec le *Pucciniastrum Padi* (Kze u Schm.) Dietel, propre au *Prunus Padus* (Kleb. Wirthw. Rostpilze, 394).

71. **Aecidium Thalictri flavi** (D. C.) Wint. Kr. Fl. I, 269. — Oud. Rév. I, 537 (sous 34). — Sacc. Syll, VII, 775 (sous 3). — Aec. Ranunculacearum var. Thalictri flavi D. C. Fl. Fr. VI, 97. — N. K. A. 2, I, 176; Arch. Néerl. VIII, 381. — Aec. Thalictri N. K. A. 2, V, 599.

F. des *Thalictrum flavum* et *minus*(?)

Relat. biol. avec *Puce. borealis* Juel, propre à l'*Agrostis borealis*; *Puce. persistens*, Plowr., propre au *Triticum* (Agropyrum) *repens*; *Puce.* (*Thalictri*) *Elymi* West., propre à l'*Elymus arenarius* (Klebahn Wirtsw. Rostpilze p. 276, 291, 293).

Le *Puccinia persistens* a été mentionné dans le N. K. A. 3, II, 201.

72. **Aecidium Tragopogi** P. Syn. 211. — Oud. Rév. I, 552 (sous 56) et Fgi Neerl. exs. n°. 138. — Wint. Kr. Fl. I, 209 (sous 315). — Aec. Tragopogonis (P.) Cda Ic. Fg. V, 50. — Sacc. Syll. VII, 668 (sous 171). — Sydow. Mon. 168 (sous 261). — Aec. Cichoracearum D. C. Fl. Fr. II. 239. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 166; N. K. A. 2, V, 590.

F. du *Tragopogon pratensis*.

Relation biol. avec le *Puce. Tragopogonis* (P.) Cda, propre au *Tragopogon pratensis*.

***Aecidium Tragopogonatum** T. N. G. XI, 410. — Voir: *Aec. Crepedis*.

73. **Aecidium Trifolii repentis** Cast. — Aec. Leguminosarum a. Trifolii Rab. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 168.

F. d'une espèce de *Trifolium*.

74. **Aecidium Tripolii** Oud. Rév. I, 584. — Plowr. Mon. 182 (anonyme). — Aec. Compositatum T. N. G. XI, 410 p.p.

F. de l'*Aster Tripolium*.

Relation biol. avec le *Puce. extensicola* Plowr., propre au *Carex extensa* (Plowr. Mon. 181. — Kleb. Wirtsw. Rostp. 315.

75. **Aecidium Tussilaginis** Gmel. in L. Syst. Nat. II, 1473. — Oud. Rév. I, 530 (sous 24); Fgi Neerl. exs. n°. 60; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 166; N. K. A. 2, V, 591 et 628. — Sacc. Syll. VII, 625 (sous 50). — Wint. Kr. Fl. I, 220 (sous 333). — Caeoma Compositatum Lk Spec. II, 50 p.p. T. N. G. XI, 410 p.p.

F. du *Tussilago Farfara*.

Relation biol. avec le *Puccinia Poarum* Nielsen (Oud. Rév. I, 530), non encore obervé chez nous, mais propre à plusieurs espèces de *Poa*. — Voir: Kleb. Wirtsw. Rostp. 289.

76. **Aecidium Urticae** Schum. Saell. II, 222. — Oud. Rév. I, 530 (sous 25) et Fgi Néerl. exs. n° 40; Prodr. Fl. Bat. II, 4

p. 167; N. K. A. 2, V. 591 et 628. — Caeoma urticatum Lk Spec. II, 62. — T. N. G. XI, 411.

F. des *Urtica dioica* et *urens*.

Relation biol. avec le *Puce. Caricis* (Schum.) Rebent., propre à plusieurs espèces de *Carex* (C. acuta, Goodenoughii, hirta; stricta? acutiformis? riparia? Pseudocyperus?). — Voir: Kleb. Zeits. f. Pfl. Krkh. 3er Ber. Bd. V, 79; ibid. 6er Ber. Bd. VII, p. 29; ibid. 7er Ber. Bd. IX, p. 37; id. Wirtsw. Rostp. 293.

***Aecidium urticatum** T. N. G. XI, 411. — Voir: *Aec. Urticae*.

†77. **Aecidium Valerianacearum** Duby Bot. Gall. II, 908. — Oud. Rév. I, 192 (sous 8). — Cet Aecidium n'a pas encore été signalé dans les Pays-Bas, quoique l'Uromyces Valerianae, avec lequel il entretient une relation biologique, se présente assez souvent sur le *Valeriana officinalis* dans les lieux marécageux.

Cette expérience, corroborée par le fait que l'inoculation des spores de l'Aec. Valerianae sur des plants du V. officinalis n'a jamais produit aucun effet, autorise le soupçon que cet Aecidium appartient à une Urédinée hétéroïque. Voir: Kleb. 4er Ber. dans Zeits. f. Pfl. Krkh. V, 327.

***Aecidium Viciae** Rab. Kr. Fl. 19. — Voir *Aec. Erri* Wallr.

78. **Aecidium Violae** Schum. Saell. II, 291. — Oud. Rév. I, 518 (sous 11) et Fgi Néerl. exs. n° 259; Prodr. Fl. Bat. II, 1, p. 167; N. K. A. 2, V. 591 et 627. — Sacc. Syll. VII, 609 (sous 18). — Wint. Kr. Fl. I, 215 (sous 326). — Caeoma Violatum Lk Spec. II, 58. — T. N. G. XI, 111.

F. des *Viola Riviniana* et *silvatica*.

Relation biol. avec le *Puce. Violae*, propre aux *Viola arvensis*, *canina*, *hirta*, *palustris*, *silvatica*.

***Aecidium Violatum** T. N. G. XI, 411. — Voir: *Aecid. Violae*.

79. **Aecidium zonale** Duby Bot. Gall. II, 906. — Oud. N. K. A. 2, VI, 284 (sous 7). — Sacc. Syll. VII, 541 (sous 20). — Wint. Kr. Fl. I, 162 (sous 217.)

F. du *Pulicaria dysenterica*.

Relation biol. avec l'Uromyces Junci (Desm.) Tul., propre aux *Juncus glaucus*, *lamprocarpos* et autres.

PERIDERMIUM.

a. Espèces acicoles.

1. **Peridermium oblongisporium** Fuck. Symb. 12. — Oud. Rév. I, 572 (sous 1); N. K. A. 2, I, 178 et 2, V, 630; Arch. Néerl. VIII, 384. — Sacc. Syll. VII, 751 (sous n° 2633). — Wint. Kr.

Fl. I, 248 (sous 381). — Kleb. Wirtsw. Rostp. 377. — Perid. Pini Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 165.

Aiguilles du *Pinus silvestris* L.

Relation biol. avec le *Coleosporium Senecionis* (P.) Fr., propre aux *Senecio aquaticus*, *Fuchsii*, *silvaticus*, *viscosus*, *vulgaris*, (*Jacobaea?*). — Voir: Kleb. 1^er^ Ber., Zeits. f. Pfl. Krh. Bd. II. p. 1 (Tir. à. p.); Ber. d. deuts. bot. Ges. VIII (1890), 59—64 (Gen.-Vers. Heft); Pringsh. Jahrb. XXXV, 692; Wirtsw. Rostp. 358.

2. **Peridermium Fischeri** Kleb. 3^er^ Ber., Zeits. f. Pfl. Krkh. Bd. V, 71. — Kleb. Wirtsw. Rostp. 361.

Aiguilles du *Pinus silvestris* L.

Relation biol. avec le *Coleosporium Sonchi*, propre aux *Sonchus arvensis*, *asper*, *oleraceus*. — Voir: Kleb. 9^er^ Ber., Pringsh. XXXV, 692; id. Wirtsw. Rostp. 364.

3. **Peridermium Jaapii** Kleb., 10^er^ Ber., Zeits. f. Pfl. Krkh.

Aiguilles du *Pinus silvestris* L.

Relation biol. avec le *Coleosporium Pulsatillae* (Strauss) Lév. — Kleb. Wirtsw. Rostp. 372. — Oud. N. K. A. 3, II, 201, propre au *Pulsatilla vulgaris* (= Anemone Pulsatilla).

***Peridermium Pini** Wallr. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 165. — Voir: *Perid. oblongisporium*.

4. **Peridermium Plowrightii** Kleb. 1^er^ Ber., Zeits. f. Pfl. Krkh. Bd. II, 10—16; id. 2^er^ Ber. ibid. Bd. IV, 7—9; id. 3^er^ Ber., ibid. Bd. V, 72; id. Wirtsw. Rostp. 363. — Oud. Rév. I, 572 (sous 2).

Aiguilles du *Pinus silvestris* L.

Relation biol. avec le *Coleosporium Tussilaginis* (P.) Lév., propre au *Tussilago Farfara*.

5. **Peridermium Rostrupii** Kleb. 5^er^ Ber., Zeits. f. Pfl. Krkh. V, 73; id. Wirtsw. Rostp. 366.

Aiguilles du *Pinus silvestris* (?)

Relation biol. avec le *Coleosporium Campanulae Trachelii* Kleb., propre au *Camp. Trachelium*.

6. **Peridermium Sorauerî** Kleb. 3^er^ Ber., Zeits. f. Pfl. Krkh. Bd. V, p. 18 et 73; id. 4^er^ Ber. ibid. Bd. V, 257; id. 5^er^ Ber. ibid. Bd. VI, 335; Pringsh. Jahrb. XXXV, 692; Wirtsw. Rostp. 370.

Aiguilles du *Pinus silvestris* L.

Relation biol. avec le *Coleosporium Melampyri* (Rebent.) Karst., propre au *Melamp. pratense*.

7. **Peridermium Stahlii** Kleb. 1^er^ Ber., Zeits. f. Pfl. Krkh. Bd. II, 14—16 (Tir. à. p.); id. 2^er^ Ber., ibid. Bd. IV, p. 9; id. 3^er^ Ber. Bd. V, 13; id. Wirtsw. Rostp. 369.

Aiguilles du *Pinus silvestris* L.

Relation biol. avec le *Coleosporium Euphrasiae* (Schum.) Wint., propre aux *Alectorolophus major* et *minor* et *Euphrasia officinalis*.

b. Espèces corticoles.

8. **Peridermium Cornui** Rostr. et Kleb. Hedw. 1890, p. 29. — Oud. Rév. I, 510. — Sacc. Syll. IX, 326. — Kleb 1er Ber. Zeits. f. Pfl. Krkh. Bd. II, p. 2; id. 10er Ber., Zeits. f. Pfl. Krh. XII, 32; id. Wirtsw. Rostp. 372.

Ecorce du *Pinus silvestris*.

Relation biol. avec le *Cronartium asclepiadeum*, propre au *Vincetoxicum officinale*.

9. **Peridermium Pini** Wallr. Fl. Cr. II, 262 β. truncicola, p. 263. — Sacc. Syll. VII, 751 (sous n° 2633). — Kleb. 1er Ber., Zeits. f. Pfl. Krkh. Bd. II, p. 1; id. 2er Ber., ibid. Bd. IV, p. 10; id. 6er Ber., ibid. Bd. VII, p. 19; id. 7er Ber., Bd. ibid. IX, p. 3; id. 8er Ber., Pringsh. XXXIV, 385; id. Wirtsw. Rostp. 376. — T. N. G. XII, 275; N. K. A. 2, V, 532.

Ecorce du *Pinus silvestris*.

Relation biol. non encore établie (Kleb. Wirtsw. Rostp. 378).

10. **Peridermium Strobi** Kleb. Hedw. 1888, p. 119; Ber. d. deuts. bot. Ges. VIII (1890) Generalvers. Heft (64): id. Wirtsw. Rostp. 382. — Oud. Rév. I, 511 (sous 3). — Sacc. Syll. VII, 837. — Perid. Pini N. K. A. 2, V, 532.

Ecorce du *Pinus Strobus*.

Relation biol. avec le *Cronartium ribicola* Dietr. Archiv. f. d. Nat. Liv.-, Esth.- u. Kurlands 2, 1, 257. — Oud. Rév. I, 511; N. K. A. 2, IV, 239 et 515. — Sacc. Syll. VII, 598. — Wint. Kr. Fl. I, 236. — Kleb. Wirtsw. Rostp. 382. Kr. Fl. I, 236. — Kleb. Wirtsw. Rostp. 382. F. des *Ribes rubrum* et *nigrum*.

L'existence, dans notre pays, des espèces aïcoles N° 2 à 7 du genre *Peridermium*, et celle de l'espèce corticole *Perid. Cornui*, n'a pas encore été vérifiée, vu que les essais d'ensemencement qui seuls pouvraient en donner la certitude, n'ont pas été exécutés chez nous.

L'introduction de ces espèces dans notre Aperçu se fonde donc sur l'existence dans les Pays-Bas des urédo- et des télentospores avec lesquelles les premières entretiennent une relation biologique, et qui vraisemblablement n'existeraient pas, si les espèces de Peridermium ne fissent pas part de notre flore.

CERATITES.

*Ceratites cylindrites T. N. G. XI, 411. — Voir: *Roestelia confusa* et *lacerata*.

*Ceratites Roestelites T. N. G. XI, 411. — Voir: *Roestelia cancellata*.

CERATITIUM.

(Voir: *Roestelia*.)

ROESTELIA.

1. **Roestelia cancellata** (Jacq.) Rebent. — Oud. Rév. I, 566; Prod. Fl. Bat. II, 4, p. 165; Fl. Bat. II 4, p. 165; N. K. A. 2, I, 89; Oud. Herb. Ned. Pl. n° 212; id. Fgi Neerl. exs. n^os^ 115 et 260. — Sacc. Syll. VII, 739 (sous 3). — Wint. Kr. Fl. I, 233 (sous 353). — Kleb. Wirtsw. Rostp. 331. — Caeoma Roestelites Lk Spec. II, 64. — T. N. G. XI, 411.

F. du *Pirus communis*.

Relation biol. avec le *Gymnosporangium Sabinae* (Dicks.) Wint., propre aux rameaux du *Juniperus Sabina*. — Kleb. Wirtsw. Rostp. 331.

2. **Roestelia confusa**. — Aecidium Mespili D. C. Fl. Fr. VI, 98. — Oud. Rév. I, 564 (sous 2). — Sacc. Syll. VII, 789. — Wint. Kr. Fl. I, 266. — Ceratitium laceratum Rab. f^a^ Mespili Oud. Herb. Ned. Pl. n° 259.

F. du *Mespilus germanica* et du *Cydonia vulgaris*.

Relation biol. avec le *Gymnosporangium confusum* Plowr. Mon. 232, propre au *Juniperus Sabina*. (Kleb. Wirtsw. Rostp. 338.)

3. **Roestelia cornuta** (Gmel.) Fr. S. V. S. 510. — Kleb. Wirtsw. Rostp. 345. — Aec. cornutum Gmel. in Linn. Syst. Nat. II, 1472. — Oud. Rév. I, 565 (sous 3). — Sacc. Syll. VII, 738 (sous 2). — Wint. Kr. Fl. I, 234 (sous 354). — Ceratitium cornutum Rab. Bot. Zeit. 1851, p. 452. — N. K. A. 2, I, 88; Arch. Néerl. II, 39); Oud. Fgi Neerl. exs. n° 57 et n° 147; id. Herb. Ned. Pl. n° 257. — Gymnosporangium clavariaeforme Wint. I, 234. — N. K. A. 2, V, 630.

F. du *Sorbus Aucuparia*.

Relation biol. avec le *Gymnosporangium juniperinum* (L.) Wint., propre au *Juniperus communis*. — Kleb. 10^er^ Ber., Zeits. f. Pfl. Krkh. Bd. XII, 47; id. Wirtsw. Rostp. 345.

4. **Roestelia lacerata** (Jacq.) Mérat Nouv. Pl. des env. de Paris, 1821, I, p. 113. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, 165; Fl. Bat. tab. 1215.

— Aecidium Oxyacanthae P. Syn. 206. — Oud. Rév. I, 563 (sous 1). — Sacc. Syll. VII, 737 (sous 1). — Wint. Kr. Fl. I, 233 (sous 353). — Caeoma cylindrites Lk Spec. II, 64. — T. N. G. XI, 411. — Aec. Pyri Franq. in Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 169. — Ceratitium laceratum Rab. Bot. Zeit. 1851, p. 452. — Oud. Fgi Neerl. exs. n° 261. — Ceratitium laceratum f^a Oxyacanthae Oud. N. K. A. 2, 1, 88; id. Herb. Ned. Pl. n° 258. — Cerat. Mali Fuck. Rhen. n° 1545. — Oud. Arch. Néerl. II, 39.

F. des *Crataegus monogyna* et *Oxyacantha*.

Relation biol. avec le *Gymnosporangium clavariaeforme* (Jacq.) Rees, propre au *Juniperus communis* (Kleb. 10^er Ber. in Zeits. f. Pfl. Krkh. XII, 46; id. Wirtsw. Rostpilze 339.

6. **Roestelia penicillata** (Müll.) Fr. S. V. S. 510. — Sacc. Syll. VII, 737 (sous 1). — Ceratitium Mali Fuck. — Arch. Néerl. II, 39. — Caeoma Roestelites Lk Spec. II, 64. — T. N. G. XI, 411.

F. du *Pirus Malus* (Oud. Rév. I, 563, sous Gymnospor. clavariaeforme II).

Relation biol. avec le *Gymnosporangium tremelloides* Al. Br., propre au *Juniperus communis*. — Voir: Kleb. Wirtsw. Rostp. 349.

Les *Gymnosporangium confusum* Plowr. et *tremelloides* Al. Br. n'ont pas encore été rencontrés dans notre patrie.

AECIDIOLUM.

A l'apparition des *Aecidium*, des *Roestelia*, et d'autres formes de la Section des Urédinées souvent précèdent de fort petites efflorescences cyathi- ou tubiformes (spermogones) innées avec la base dans le tissu du support, et reconnaissables à l'extérieur à une proéminence coniforme ou cylindrique, couronnée d'un pinceau de poils subtils, divergents au sommet, et formant une sorte de tuyau, par lequel s'échappent les spermaties, engendrées par des basidies, cachées dans la partie basilaire de l'organe. Ces spermaties sont représentées par de fort petites cellules, immergées dans une liqueur visqueuse et sucrée, très recherchée par certains insectes.

Le role à jouer par les spermaties n'est pas encore suffisamment illustré.

Les spermogones occupent tantôt la face entière de la feuille, soit sans aucun mélange (*Cirsium arvense*), soit mêlés aux écuelles d'un Aecidium (*Euphorbia Cyparissias*, *Tragopogon pratensis*, *Scorzonera humilis*, *Anemone nemorosa*), mais tantôt forment des groupes p. ou m. serrés, à l'entour desquels on voit bientôt s'élever un cercle compacte d'aecidies (*Ficaria verna*, *Rhamnus cathartica*); enfin, dans

un dernier cas (*Berberis vulgaris*, *Roestelia cancellata*) on voit apparaître des verrues de spermogones à la face de la feuille opposée à celle qui porte les Aecidium, et cela justement aux endroits où ceux-ci sont enclavés.

Unger, en fixant le premier l'attention sur l'existence des spermogones décrits, les nomma *Aecidiolum* (Exantheme der Pfl., 1833, p. 301). et, partant de l'idée qu'ils ne présenteraient aucune différence, quoique produits par des plantes différentes, les réunit sous le titre d'*Aecidiolum exanthematum* [1]). — Aujourd' hui on n'en parle que dans le sens d'organes préliminaires, non dissemblables à celles des Lichens et des Champignons asciférès.

1. **Aecidiolum exanthematum** Unger, Exantheme der Pflanzen, 1833, p. 301. — Sphaeronaema Ari Dozij et Molk., N. K. A. 1, I, 52.

F. de l'*Arum maculatum*.

†[13] Ustilaginaceae.

× USTILAGINEAE.

1. Amerosporae.

USTILAGO.

***Ustilago antherarum** Fr. — T. N. G. XI, 412; N. K. A. 2, V, 592. — Voir: *Ust. violacea*.

1. **Ustilago Avenae** (P.) Jensen, Le Charbon des Céréales 1889, p. 4. — Oud. Rév. I, 594; N. K. A. 3, 1, 234. — Ust. Segetum Ditm. in Sturm Pilze Bd. 1, 67 et tab. 33. — T. N. G. XI, 412; Oud. Fgi Neerl. exs. n° 6. — Sacc. Syll. VII, 461, p.p. — Wint. Kr. Fl. I, 90 p.p. — Uredo segetum P. a. Avenae Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 179. — Ust. Carbo a. Avenae N. K. A. 2, V, 592.

Spicules de l'*Avena sativa*.

2. **Ustilago bromivora** (Tul.) Fisch. de Waldh. Aperçu 22. — Oud. Rév. 1, 597; N. K. A. 2, VI, 26. — Sacc. Syll. VII, 461. — Wint. Kr. Fl. I, 91.

Ovaires du *Bromus mollis*.

***Ustilago Carbo.** — N. K. A. 2, V, 592. — Voir: *Ust. Avenae*, *Hordei* et *Secalis*.

3. **Ustilago echinata** Schröt. Br. u. Rostp. Schles. 4; id. Pilze Schles. 271. — Oud. N. K. A. 3, III, 1091. — Sacc. Syll. VII.

[1]) Non pas *Acc. exanthematicum*, comme l'écrivent plusieurs auteurs.

170. — Wint. Kr. Fl. I, 96. — Caeoma Uredo longissimum T. N. G. XI, 407, p.p.

F. du *Phalaris arundinacea*.

4. **Ustilago grandis** Fr. S. M. III, 518. — Oud. Rév. I, 592. — Sacc. Syll. VII, 453. — Wint. Kr. Fl. I, 87. — Ust. typhoides Berk. Br. A. N. H. 2, V, 463. — Oud. Arch. Néerl. II, 39; N. K. A. 2, V, 632; id. Herb. Ned. Pl. n° 576.

Tiges du *Phragmites communis*.

5. **Ustilago Hordei** Brefeld, Neue Unters. etc., in Nachr. aus dem Klub der Landw. zu Berl. 1888. — Oud. Rév. I, 596. — Ust. segetum Ditm. in Sturm Pilze Bd. I, 67 et tab. 33. — Sacc. Syll. VII, 461 p.p. — Wint. Kr. Fl. I, 90 p.p. — Uredo segetum b. Hordei Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 179. — Ust. Carbo b. Hordei N. K. A. 2, V, 117 et 592.

Ovaires du *Hordeum vulgare*.

6. **Ustilago hypodytes** (Schlecht.) Fr. S. M. III, 518. — Oud. Rév. I, 592; id. Fgi Neerl. exs. n° 122; N. K. A. 2, V, 117, 592 et 632; T. N. G. XI, 111. — Uredo hypodytes Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 180.

Tiges des *Elymus arenarius*, *Phragmites communis*, *Triticum hibernum*, *junceum* et *repens*.

7. **Ustilago longissima** (Sow.) Tul. A. S. N. 3, VII, 76. — Oud. Rév. I, 590; id. Fgi Neerl. exs. n° 1. — Sacc. Syll. VII, 451. — Wint. Kr. Fl. I, 85. — Caeoma Uredo longissimum T. N. G. XI, 407 p.p. — Ust. longissima Prodr. Fl. Bat. II, p. 180.

F. du *Glyceria aquatica* Wahlb.

8. **Ustilago major** Schröt. Pilze Schles. I, 273. — Oud. Rév. I, 601.

Anthères du *Silene Otites*.

9. **Ustilago Maydis** (D. C.) Cda Ic. Fg. V, 3. — Oud. Rév. I; 599; N. K. A. 2, IV, 238. — Sacc. Syll. VII, 472. — Ust. Zeae Mays (D. C.) Wint. Kr. Fl. I, 97.

Inflorescences et autres parties du *Zea Mays* cultivé.

***Ustilago Montagnei** Tul. — N. K. A. 2, I, 315; Arch. Néerl. VIII, 381. — Voir: Cintractia Caricis (P.) Magnus.

10. **Ustilago olivacea** (D. C.) Tul. A. S. N. 3, VI, 88. — Oud. Rév. I, 598; N. K. A. 2, V, 117; 3, I, 234. — Sacc. Syll. VII, 463. — Wint. Kr. Fl. I, 91. — Uredo olivacea D. C. Fl. Fr. VI, 78. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 179.

Ovaires des *Carex arenaria* et *riparia*.

11. **Ustilago perennans** Rostrup Zeits. f. Pfl. Krkh. II, 15. — Oud. Rév. I, 595. — Ust. segetum Sacc. Syll. VII, 461, p.p. —

Wint. Kr. Fl. I, 90 p.p. — N. K. A. 2, IV, 238; Oud. Fgi Neerl. exs. n° 5. — Uredo segetum a. Avenae Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 179.

Ovaires de l'*Arrhenaterum elatius*.

***Ustilago pompholygodes** Lk. — T. N. G. XII, 275. — Voir: *Urocystis Anemones*.

***Ustilago Receptaculorum** Fr. — T. N. G. XI, 411; N. K. A. 2, V, 592. — Voir: *Ust. Tragopogi*.

***Ustilago Salveii** Berk. Br. Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 180. — Voir: *Tilletia striiformis*.

12. **Ustilago Scabiosae** (Sow.) Wint. Kr. Fl. I, 99. — Oud. Rév. I, 601; N. K. A. 2, V, 471 et 622. — Sacc. Syll. VII, 475.

Anthères du *Knautia arvensis*.

13. **Ustilago Scorzonerae** (A. S.) Schröt. Pilze Schles. I, 274. — Oud. Rév. I, 603. — Sacc. Syll. VII, 178. — Ust. Receptaculorum (D. C.) Fr. S. M. III, 518 p.p. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 179.

Réceptacles du *Scorzonera hispanica*.

***Ustilago Secalis** P. — N. K. A. 2, V, 592. — Voir: *Tilletia*.

***Ustilago Segetum** T. N. G. XI, 112; N. K. A. 2, V, 632. — Voir: *Ust. Tritici*.

***Ustilago segetum** N. K. A. 2, IV, 238. Voir: *Ust. perennans*.

14. **Ustilago Sorghi** (Lk) Pass. in Thüm. Herb. oecon. n° 63. — Oud. Rév. I, 593. — Sacc. Syll. VII, 456. — Wint. Kr. Fl. I, 90. — Tilletia Sorghi vulgaris Tul. A. S. N. 3, VII, 116. — Till. Sorghi N. K. A. 2, I, 315; Arch. Nat. VIII, 381.

Ovaires du *Sorghum* cultivé.

15. **Ustilago Tragopogi** (P.) Sacc. Syll. VII, 477. — Oud. Rév. I, 603. — Ust. Tragopogi pratensis Wint. Kr. Fl. I, 101. — Ust. receptaculorum Fr. S. M. III, 518. — T. N. G. XI, 411; N. K. A. 2, V, 592 et 632; Oud. Fgi Neerl. exs. n° 121. — Uredo receptaculorum D. C. Fl. Fr. VI, 79. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 179.

Réceptacles du *Tragopogon pratensis*.

16. **Ustilago Tritici** (P.) Rostrup Kong. Danske Vidensk. Selsk. Forh. 1890, p. 15. — Oud. Rév. 597. — Ust. segetum Ditm. in Sturm Pilze Bd. I, 67 p.p. — Sacc. Syll. VII, 461 p.p. — Wint. Kr. Fl. I, 90 p.p. — N. K. A. 2, V, 632. — Uredo segetum e. Tritici Prodr. Fl. Bat. II, p. 179; Oud. Fgi Neerl. exs. n° 7. — Caeoma Uredo sitophilum Lk. — T. N. G. XI, 407.

Ovaires du *Triticum vulgare*.

***Ustilago typhoides** Berk. Br. — N. K. A. 2, I, 88; Arch. Néerl. II, 39. — Voir: *Ust. grandis*.

17. **Ustilago utriculosa** (Nees) Tul. A. S. N. 3, VII. 102. — Oud. Rév. I, 602; id. Fgi Neerl. exs. n° 3. — Sacc. Syll. VII, 476. — Wint. Kr. Fl. I, 100. — Caeoma Uredo utriculosum T. N. G. XI, 407. — Uredo utriculosa Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 180.

Fruits des *Polygonum Braunii*, *Hydropiper* et *Persicaria*.

18. **Ustilago violacea** (P.) Fuck. Symb. 39. — Oud. Rév. I, 599; N. K. A. 2, V, 161 et 632; 3, I, 234. — Sacc. Syll. VII, 474. — Wint. Kr. Fl. I, 98. — Ust. antherarum D. C. Fl. Fr. VI. 79. — T. N. G. XI. 412; N. K. A. 2, V, 592. — Uredo violacea. P. Disp. meth. 57. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 179.

Anthères des *Malachium aquaticum* et *Melamdryum rubrum*.

19. **Ustilago Tuyckii** Oud. et Beyer. N. K. A. 3, I, 460. — Zitt. Versl. K. Ak. v. Wet. 1894, p. 55. — Oud. Rév. II, p. (10).

Ovaires du *Luzula campestris*.

SPHACELOTHECA.

1. **Sphacelotheca Hydropiperis** (Schum.) de Bary Vergl. Morph. d. Pilze p. 187. — Sacc. Syll. VII, 499. — N. K. A. 3, I, 234 et 462. — Ust. Hydropiperis Wint. Kr. Fl. 94.

Ovaires du *Polygonum Hydropiper*.

CINTRACTIA.

1. **Cintractia Caricis** (P.) P. Magnus Schr. d. naturf. Ges. in Danzig, neue Folge Bd. I, Heft I (1895) et Ustelagineae d. Prov. Brandenburg 79. — Sydow. Hedw. XXXIX. p. 143. — Ustilago Caricis Fuck. Symb. 39. — Oud. Rév. I, 598. — Sacc. Syll. VII, 464. — Wint. Kr. Fl. I, 92. — Uredo urceolorum D. C. Fl. Fr. VI, 78. — Prodr. Fl. Bat. II, 1, p. 179. — Ust. Montagnei Tul. A. S. N. 3, VII, 88. — N. K. A. 2, I, 315; Arch. Néerl. VIII. 381.

Ovaires des *Carex acuta*, *arenaria*, *divulsa* et *Rhynchospora alba* et *fusca*.

2. Dictyosporae.

SOROSPORIUM.

1. **Sorosporium hyalinum** (Fingerh.) Wint. Kr. Fl. I, 105. — Oud. N. K. A. 2, V, 165.

Graines du *Convolvulus* (*Calystegia*) *sepium*.

THECAPHORA.

1. **Thecaphora Ammophilae** Oud. Bot. Zeit. 1878, p. 439; N. K. A. 2, III, 255; Rév. I, 612. — Sacc. Syll. VII, 510.

F. de l'*Ammophila arenaria.*

2. **Thecaphora hyalina** Fingerhut Linnaea X, 230. — Oud. Rév. I, 611. — Sacc. Syll. VII, 508. — Sorosporium hyalinum Wint. Kr. Fl. I, 105. — Oud. N. K. A. 2, V, 165.

Graines du *Convolvulus (Calystegia) sepium.*

×× TILLETIEAE.

1. Amerosporae.

TILLETIA.

***Tilletia Caries** Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 178. — Voir: *Till. Tritici.*

1. **Tilletia Secalis** (Körnicke) Kühn in Fisch. de Waldh. Aperçu, 50. — Sacc. Syll. VII, 482. — Wint. Kr. Fl. I, 110. — Ust. Carbo d. Secalis N. K. A. 2, V. 592.

Ovaires du *Secale cereale.*

***Tilletia Sorghi** Tul. — N. K. A. 2, I, 315; Arch. Néerl. VIII, 381. — Voir: *Ustilago.*

2. **Tilletia striiformis** (West. Not. II, 29) Wint. Kr. Fl. I, 108. — Oud. Rév. I, 605. — Sacc. Syll. VII, 484. — Ust. Salveii B. Br. A. N. H. 2, V, 463. — Uredo Salveii Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 180. — Till. de Baryana Fisch. de Waldh. in Rab. F. E. n° 1097.

F. du *Dactylis glomerata.*

3. **Tilletia Tritici** (Bjerkander) Wint. Kr. Fl. I, 110. — Oud. Rév. I, 604; N. K. A. 2, VI, 632. — Sacc. Syll. VII, 481. — Caeoma sitophilum Lk Spec. II, 2. — T. N. G. XI, 407. — Tilletia Caricis Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 178.

Ovaires du *Triticum vulgare.*

ENTYLOMA.

1. **Entyloma Calendulae** (Oud.) de Bary Bot. Zeit. 1874, p. 102 et 105. — Oud. Rév. I, 608; N. K. A. 2, II, 101; 3, II, 200; Fgi Neerl. exs. n° 123; Rab. F. E. n° 1849. — Sacc. Syll. VII,

492. — Wint. Kr. Fl. I, 114. — Protomyces Calendulae Oud. Arch. Néerl. VIII, 384.

F. des *Calendula officinalis* et *Arnoseris minima*.

***Entyloma Ficariae** Fisch. de Waldh. — N. K. A. 2, III, 154. — Voir: *Ent. Ranunculi*.

2. **Entyloma fuscum** Schröt. in Cohn Biol. Beitr. II, 373. — Oud. N. K. A. 3, III, 1091. — Sacc. Syll. VII, 488. — Wint. Kr. Fl. I, 112.

F. du *Papaver Rhoeas*.

3. **Entyloma Linariae** Schröt. in Cohn Biol. Beitr. II, 371 et Pilze Schles. I, 116. — Oud. N. K. A. 3, II, 330 et 874. — Sacc. Syll. VII, 491. — Wint. Kr. Fl. I, 116.

F. du *Linaria vulgaris*.

4. **Entyloma Lini** Oud. N. K. A. 3, III, 1091.

F. du *Linum usitatissimum*.

5. **Entyloma Matricariae** Rostrup in Thüm. Mycol. Univ. n° 2223. — Oud. N. K. A. 3, II, 718. — Sacc. Syll. VII, 490.

F. du *Matricaria inodora*.

6. **Entyloma microsporum** (Unger) Schröt. Pilze Schles. I, 284. — Oud. Rév. I, 609; N. K. A. 2, IV, 238. — Sacc. Syll. VII, 498. — Wint. Kr. Fl. I, 116. — Ent. Ungerianum de Bary Bot. Zeit. 1874, p. 105.

F. du *Ranunculus repens*.

7. **Entyloma Ranunculi** (Bon.) Wint. Kr. Fl. I, 112. — Oud. Rév. I, 607; N. K. A. 2, V, 632. — Sacc. Syll. VII, 488. — Fusidium Ranunculi Bon. Handb. 13. — Oud. N. K. A. 2, I, 316. — Ent. Ficariae Fisch. de Waldh. Bull. Soc. nat. de Moscou, 1877, II, 4. — Oud. N. K. A. 2, III, 154; id. Fgi Neerl. exs. n° 134 et Rab. F. E. n° 1762. — Ent. verruculosum Fisch. de Waldh. l. c. 5. — Oud. N. K. A. 2, III, 154 et Fgi Neerl. exs. n° 125. — Ent. Ungerianum auct. plurim.

F. des *Ranunculus sceleratus* et *Ficaria verna*.

***Entyloma Ungerianum** de Bary. — N. K. A. 2, IV, 238. — Voir: *Ent. microsporum*.

***Entyloma verruculosum** Fisch. de Waldh. l. c. 5. — Voir: *Ent. Ranunculi*.

MELANOTAENIUM.

1. **Melanotaenium endogenum** (Ung.) de Bary. — Protomyces endogenus Ung. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 183.

Tiges du *Galium Mollugo*.

UROCYSTIS.

1. **Urocystis Agropyri** (Preuss) Schröt. Brand. u. Rostp. Schles. 7; id. Pilze Schles. I, 279. — Oud. Rév. I, 613; N. K. A. 2, III, 255. — Sacc. Syll. VII, 516. — Urocystis occulta (Wallr.) Rab. Kr. Fl. 4. — Wint. Kr. Fl. I, 119 p.p.

F. du *Triticum (Agropyrum) repens.*

2. **Urocystis Anemones** (P.) Rab. F. E. n° 1195. — Oud. Rév. I, 611; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 178. — N. K. A. 2, V, 632. — Sacc. Syll. VII, 518. — Wint. Kr. Fl. I, 123. — Uroc. pompholygodes Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 178. — Ustil. pompholygodes T. N. G. XII, 276.

F. des *Anemone nemorosa*, *Helleborus viridis* et *Ranunculus bulbosus.*

3. **Urocystis Colchici** (Schlecht.) Rab. F. E. n° 396. — Oud. Rév. I, 611; Prodr. Fl. Bat. II, p. 178; N. K. A. 2, IV, 516. — Sacc. Syll. VII, 516. — Wint. Kr. Fl. I, 120 p.p.

F. du *Colchicum autumnale* et tubercules du *Bulbocodium vernum.*

***Urocystis Ficariae** A. S. — Voir: *Uromyces.*

4. **Urocystis occulta** (Wallr.) Schröt. in Rab. F. E. n° 1790. — Oud. Rév. I, 613; N. K. A. 2, III, 254. — Sacc. Syll. VII, 515. — Wint. Kr. Fl. I, 119.

F. du *Secale cereale* et *Triticum vulgare.*

5. **Urocystis sorosporioides** Körn. in Fuck. Symb. Nachtr. III, 10. — Oud. Rév. I, 615; N. K. A. 2, IV, 238 et 632. — Sacc. Syll. VII, 519. — Wint. Kr. Fl. I, 124.

F. des *Thalictrum flexuosum* et *silvaticum.*

6. **Urocystis Violae** (Sow.) Wint. Kr. Fl. I, 122. — Oud. Rév. I, 615, N. K. A. 2, IV, 238. — Sacc. Syll. VII, 519.

F. du *Viola odorata.*

DOASSANSIA.

1. **Doassansia Alismatis** (Nees) Cornu A. S. N. 6, XV, 285. — Oud. N. K. A. 2, VI, 27. — Sacc. Syll. VII, 503.

F. de l'*Alisma Plantago.*

2. **Doassansia Sagittariae** (West.) Fisch. Ber. d. d. bot. Ges. II, 405. — Oud. Rév. I, 610; N. K. A. 2, V; 165. — Sacc. Syll. VII, 503. — Setchell Ann. of Bot. VI, 1. — Protomyces Bizzozerianus Sacc. Mich. I, 14 et Fgi Ital. del. tab. 103. — Oud. N. K. A. 2, IV, 238. — Uredo Sagittariae West. Herb. n° 1777.

F. du *Sagittaria sagittifolia.*

××× GENERA DUBIA.

GRAPHIOLA.

1. **Graphiola Phoenicis** (Mougeot) Poiteau A. S. N. I, III (1824), 473 et tab. 26 f. 2. — Oud. Rév. I, 616; N. K. A. 2, II, 39. — Sacc. Syll. VII, 522.

F. des *Phoenix dactylifera* et *paludosa*.

II. ASCOMYCETAE.

†[14] Perisporiaceae.

× ERYSIPHEAE.

***Podosphaera Kunzei** Lév. A. S. N. 3, XV, 135. — N. K. A. 2, I, 92; Arch. Néerl. VIII, 394. — Voir: P. Oxyacanthae.

1. **Podosphaera Oxyacanthae** (D. C.) Tul. S. F. C. I, 202. — Salmon, Monogr. 29 [1]). — Oud. Rév. II, 79; N. K. A. 2, VI, 170. — Erysiphe clandestina T. N. G. XII, 273. — Podosphaera clandestina Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 30. — Prodosphaera myrtillina (Schub.) Kze. — Oud. Rév. II, 81. — Podos. Kunzei f[a] Vaccinii Myrtilli N. K. A. 2, I, 92; Herb. Ned. Pl. n° 251. — Podos. Kunzei Arch. Neerl. VIII, 394. — Podos. tridactyli N. K. A. 2, I, 181. — Sacc. Syll. I, 2. — Wint. Kr. Fl. II, 29.

F. des *Crataegus monogyna* et *Vacc. Myrtillus*.

β. **tridactyla** (Wallr.) Salmon Mon. 36. — Podosphaera tridactyla (Wallr.) de Bary. — Oud. Rév. II, 81; N. K. A. 2, VI, 169. — Sacc. Syll. I, 2. — Wint. Kr. Fl. II, 28. — F. du *Prunus Padus*.

SPHAEROTHECA.

1. **Sphaerotheca Humuli** (D. C.) Burrel. — Salmon Mon. 45. — Sph. Castagnei Lév. — Oud. Rév. II, 83; N. K. A. 2, V, 593; 2, VI, 170; Oud. Fgi Néerl. exs. n° 72; id. Herb. Ned. Pl. n° 600. — Sacc. Syll. I, 4. — Wint. Kr. Fl. II, 27. — Erys.

[1]) Ernest S. Salmon, F. L. S. — A. Monograph of the Erysiphaceae (Memoirs of the Torrey bot. Club. IX 1900.) New-York.

macularis T. N. G. XI, 400. — Sph. Cast. d. Humuli Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 31. — F. du *Humulus Lupulus*.

Var. **fuliginea** (Schlecht.) Salmon Mon. 49. — Sph. Castagnei Lév. b. c. e. f. Oud. Rév. II, 83; N. K. A. 2, VI, 285; Oud. Fgi Neerl. exs. n° 272. — Sph. Cast. a. Compositarum, b. Veronicarum, c. Plantaginis, d. Humuli, Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 31. — Sph. Erigerontis Oud. Rév. II, 84. — Sph. detonsa Kickx. — Sacc. Syll. I, 4. — F. des *Cucumis sativus* (conidies), *Erigeron acer* et *canadensis*, *Euphrasia officinalis*, *Plantago lanceolata* et *major*, *Senecio vulgaris*, *Taraxacum officinale*, *Veronica longifolia*.

2. **Sphaerotheca pannosa** (Wallr.) Lév. — Salmon Mon. 65. — Oud. Rév. II, 82; Prodr. Fl. Bat. II, 4, 31; N. K. A. 2, V, 593 et VI, 170. — Erysiphe pannosa T. N. G. XI, 400. — Sacc. Syll. I, 3. — Wint. Kr. Fl. II, 26. — Partout où l'on cultive les Roses, à l'état d'*Oidium leucoconium*. Les périthèces, conformément à l'expérience de Mr. Salmon, faite en Angleterre, ne se développent jamais dans nos contrées.

PHYLLACTINIA.

1. **Phyllactinia corylea** (P.) Karst. — Salmon Mon. 224. — Phyll. suffulta (Rebent.) Sacc. I, 5. — Wint. Kr. Fl. II, 42. — Oud. Rév. II, 85; N. K. A. 2, VI, 170. — Phyll. guttata Lév. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 32, a. b. c. d. e. — F. des *Acer campestre*, *Alnus glutinosa*, *Betula alba*, *Corylus Avellana* (Oud. Fgi Neerl. exs. n° 163 et Herb. v. Nederl. Pl. n° 1320), *Fagus silvatica* (Oud. Fgi Neerl. exs. n° 162), *Fraxinus excelsior*.

***Phyllactinia guttata** Lév. Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 32. — Voir: *Ph. corylea*.

UNCINULA.

1. **Uncinula Aceris** (D. C.) Sacc. — Salmon Mon. 90. — Sacc. Syll. I, 8. — Wint. Kr. Fl. II, 41. — Oud. Rév. II, 88; N. K. A. 2, VI, 170. — Unc. bicornis Lév. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 33; N. K. A. 2, I, 92. — Erys. bicornis Fr. — T. N. G. XI, 401. — F. des *Acer. campestre* et *Pseudo-Platanus*.

Var. **Tulasnei** (Fuck.) Salmon Mon. 93. — Unc. Tulasnei Fuck. — N. K. A. 2, VI, 170.

F. de l'*Acer platanoides*.

***Uncinula adunca** Lév. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 33. — Voir: *U. Salicis*.

Uncinula bicornis Fuck. — Prodr. Fl. Bat. II, 1, p. 33; N. K. A. 2, I, 92. — Voir: *U. Salicis.*

2. **Uncinula Prunastri** (D. C.) Sacc. Syll. I, 7. — Wint. Kr. Fl. II, 41. — Salmon Mon. 95. — Oud. Rév. II, 87. — Unc. Wallrothii Lév. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 33. — F. du *Prunus spinosa.*

3. **Uncinula Salicis** (D. C.) Wint. Kr. Fl. I, 40. — Salmon Mon. 81. — Oud. Rév. II, 87. — Unc. adunca Lév. — Sacc. Syll. I, 7. — Unc. adunca Lév. b. Salicis et c. Populi Lév. — Prodr. Fl. Bat. II, 1, p. 33. — F. de plusieurs espèces de *Salix* et *Populus.*

***Uncinula Wallrothii** Lév. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 33. — Voir: *U. Prunastri.*

* CALOCLADIA.

***Calocladia Berberidis** Lév. A. S. N. 3, XV, 159. — Prodr. Fl. Bat. II, 1, p. 34; N. K. A. 2, I, 91. — Voir: *Microsphaera.*

***Calocladia Dubyi** Lév. l. c. 158. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 31. — Voir: *Microsphaera Alni* var. *Lonicerae.*

***Calocladia Ehrenbergii** Lév. l. c. 154. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 34. — Voir: *Microsph. Alni* var. *Lonicerae.*

***Calocladia Grossulariae** Lév. l. c. 160. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 35. — Voir: *Microsph. Grossulariae.*

***Calocladia holosericea** Lév. l. c. 159. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 31. — Voir: *Microsph. holosericea.*

***Calocladia penicillata** Lév. l. c. 155. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 34. — Voir: *Microsph. Alni.*

MICROSPHAERA.

1. **Microsphaera Alni** (Wallr.) Salmon. Mon. 129. — Oud. Rév. II, 90. — Wint. Kr. Fl. II, 38. — Micros. Hedwigii Lév. l. c. p. 155. — N. K. A. 2, VI, 170. — Sacc. Syll. I, 11. — Micros. penicill. (Wallr. Lév. l. c. 155. — Oud. Rév. II, 92; N. K. A. 2, VI, 171. — Erys. penic. β. T. N. G. XI, 401. — Calocladia penic. α. Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 34. — Micros. Hedw. Lév. et penic. Lév. — N. K. A. 2, VI, 170 et 171. — F. de l'*Alnus glutinosa*, *Betula alba*, *Viburnum Lantana* et *Vib. Opulus.*

Var. **Lonicerae** (D. C.) Salmon Mon. 112. — Micros. Lonicerae (D. C.) Wint. Kr. Fl. II, 36. — Oud. Rév. II, 89. — Micros. Dubyi Lév. l. c. 158. — Sacc. Syll. I, 10. — N. K. A. 2, VI, 170. — Calocladia Dubyi Lév. l. c. —

Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 34. — Erys. penic. γ. Lonicerae T. N. G. XI. 401. — Micros. Ehrenb. Lév. l. c. p. 155. — Sacc. Syll. I, 14. — Wint. Kr. Fl. II, 39. — Oud. Rév. II, 93 et Herb. Ned. Pl. n° 335. — Caloel. Ehrenbergii Lév. l. c. 155. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 34; N. K. A. 2, I, 91; Oud Fg. Neerl. exs. n° 154 et Herb. Ned. Pl. n° 335. — F. des *Lonicera Caprifolium, Periclymenum, tataricum* et *Xylosteum*.

2. **Microsphaera Astragali** (D. C.) Salmon Mon. 127. — Oud. Rév. II, 91. — Sacc. Syll. I, 12. — Wint. Kr. Fl, II, 35. — Calocladia holosericea Lév. l. c. 159. — Prodr. Fl. Bat. II, 1, p. 34; N. K. A. 2, I, 181; 2, V, 594. — Erysiphe holosericera Fr. S. M. III, 240. — Oud. Fgi Neerl. exs. n° 159. — F. de l'*Astragalus glycyphyllos*.

3. **Microsphaera Berberidis** (D. C.) Lév. l. c. 159. — Salmon Mon. 123. — Oud. Rév. II, 92; N. K. A. 2, V, 171. — Sacc. Syll. I, 13. — Wint. Kr. Fl. II, 36. — Calocladia Berb. Lév. l. c. 159. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 34; N. K. A. 2, I, 91; Oud. Fgi Neerl. exs. n° 153. — Erys. penicillata α. Berberidis T. N. G. XI, 401. — F. du *Berberis vulgaris*.

4. **Microsphaera Evonymi** (D. C.) Syll. I, 11. — Wint. Kr. Fl. II, 35. — Salmon Mon. 125. — Oud. Rév. II, 90; N. K. A. 2, VI, 170. — F. de l'*Evonymus europaeus*.

5. **Microsphaera Grossulariae** (Wallr.) Lév. l. c. 160. — Salmon Mon 157. — Oud. Rév. II, 90; N. K. A. 2, VI, 170. — Sacc. Syll. I, 12. — Wint. Kr. Fl. II, 37. — Caloel. Gross. Lév. l. c. 160. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 35. — F. du *Ribes Grossularia*.

6. **Microsphaera Mougeotii** Lév. l. c. 158. — Salmon Mon. 159. — Micros. Lycii (Lasch) Sacc. et Roum. — Sacc. Syll. I, 10. — Wint. Kr. Fl. II, 17. — Oud. Rév. II, 89; N. K. A. 2, VI, 170. — F. du *Lycium halimifolium* Mill. (= L. barbarum des aut., non de L.)

ERYSIPHE.

***Erysiphe bicornis** Lk. Spec. Fl. I, 12. — T. N. G. XI, 401. — Voir: *Uncinula Aceris*.

1. **Erysiphe Cichoraccarum** D. C. — Salmon Mon. 193.

Selon Mr. Salmon, cette espèce s'étend sur plusieurs autres, regardées jusqu'ici comme espèces autonomes.

D'accord avec cette interprétation, nous insérons à cette place un Aperçu des Synonymes de l'Erys. Cichoraccarum, distribués dans les publications suivantes:

1. „Révision des Champignons des Pays-Bas."
2. „Tijdschrift voor Natuurlijke Geschiedenis en Physiologie".
3. „Prodromus Florae Batavae II, part. 3 et 4."
4. „Nederlandsch Kruidkundig Archief."
5. „Archives Néerlandaises."

A. Synonymes dans notre „Révision des Champignons des Pays-Bas."

II, 93. *Erysiphe Linkii.*

II, 94. *Erysiphe lamprocarpa.*

II, 96. *Erysiphe horridula.*

B. Synonymes dans le „Tijds. voor Nat. Gesch. en Physiologie.

XI, 401. *Erysiphe communis* δ *Carduaceaeum*, ε. *Asperifoliarum* ϰ *Plantagineaeum.* — *Erysiphe depressa.*

XII, 273. *Erys. communis* ζ *Cichoraceaeum* et η. *Solanaceaeum.*

C. Synonymes dans le „Prodr. Fl. Batavae:"

II, 4, 33: *Uncinula adunca* a. *Artemisiae*, sur l'*Artem. vulgaris.*

II, 4, 35: *Erys. lamprocarpa* a. *Cichoraceaeum* et c. *Plantaginis.*

II, 4, 37: *Erys. Montagnei; Erys. horridula.*

II, 1, 38: *Erys. comm. c. Solaneaeum* et d. *Rubiaceaeum.*

D. Synonymes dans le „Nederl. Kruidk. Archief:" 2, I, 91: *Erys. lamprocarpa* sur *Plantago major* et *maritima.*

2, I, 91, 181 et 263, sur: *Sonchus arvensis.*

2, III, 156: *Erys. Linkii*, sur *Artemisia vulgaris.*

2, VI, 171: *Erys. Linkii*, sur *Tanacetum vulgare*; *Erys. lamprocarpa*, sur *Plantago major*; *Erys. Montagnei*, sur *Lappa officinalis.*

2, I, 181: *Erys. Montagnei*, sur *Senecio silvaticus.*

2, I, 91: *Erys. Montagnei* f^a^ *Lappae*, sur *Lappa minor* (Oud. Herb. Ned. Pl. n° 189).

2, VI, 171: *Erys. horridula*, sur *Symphytum officinale.*

Les plantes-mères, passées sous silence dans les rubriques A, B et C — abstraction faite de celles, nommées sous la rubrique D — sont: pour A: *Hieracium sabaudum* et *Verbascum thapsiforme*; *Echium vulgare* et *Myosotis intermedia;* pour B: *Lappa officinalis* (major) et *tomentosa*, *Scorzonera hispanica* et *Verbascum Thapsus;* pour C: *Scorzonera hispanica*, *Hieracium sabaudum; Lappa tomentosa* et *officinalis; Cirsium; Symphytum officinale*, *Myosotis intermedia*, *Echium vulgare*; *Verbascum Thapsus* et *Galium Aparine.*

Exsiccata. — Oud. Fgi Neerl. exs. n° 75: *Erys. lamprocarpa* sur *Plantago major* et *maritima;* n° 76: *Erys. Montagnei* sur *Lappa officinalis* et *minor;* n° 160: *Erys. horridula* sur *Symph. officinale.* — Id. Herb. v. Nederl. Pl. n° 207 et 208: *Erys. lamprocarpa* sur *Plantago major* et *maritima.*

*__Erysiphe clandestina__ Wallr. — T. N. G. XII, 273. — Voir: *Podosphaera Oxyacanthae.*

*__Erysiphe communis__ Lév. — N. K. A. 2, II, 185. — Voir: *Erys. Polygoni.*

*__Erysiphe communis__ Fr. α **Ranunculaceārum**, β **Leguminosārum** et γ **Rubiacearum** T. N. G. XI, 400 et 401. — Voir: *Erys. Polygoni* B.

*__Erysiphe communis__ Fr. δ **Carduaceārum**, ε **Asperifoliārum** et ϰ **Plantaginearum** T. N. G. XI, 401. — Voir: *Erys. Cichoraceārum* B.

*__Erysiphe communis__ Fr. η **Labiatārum** T. N. G. XI, 401. — Voir: *Erys. Galeopsidis.*

*__Erysiphe depressa__ Lk. — T. N. G. XI, 401; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 37 (sous 2976). — Voir: Erys. Cichoraceārum B. et C.

2. __Erysiphe Galeopsidis__ D. C. — Salmon Mon. 204. — Oud. Rév. II, 95; N. K. A. 2, VI, 171; 3, I, 234. — Erysiphe communis η Labiatārum T. N. G. XI, 401. — Erys. lamprocarpa b. Labiatārum Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 35.

F. des *Ballota nigra*, *Galeopsis ochroleuca* et *Tetrahit*, *Lamium album* et *purpureum*, et *Stachys palustris.*

3. __Erysiphe Graminis__ D. C. — Salmon Mon. 209. — Oud. Rév. II, 98; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 36. — N. K. A. 2, VI, 171. — F. des *Agrostis alba* et *Apera Spica venti.*

*__Erysiphe holosericea__ Fr. — Voir: *Microsphaera Astragali.*

*__Erysiphe horridula__ Lév. — Voir: *Erys. Polygoni.*

*__Erysiphe lamprocarpa__ Lév. — N. K. A. 2, I, 91. — Voir: *Erys. Cichoraceārum.*

*__Erysiphe Linkii__ Lév. — N. K. A. 2, III, 156. — Voir: *Erys. Cichoraceārum.*

*__Erysiphe macularis__ Fr. — T. N. G. XI, 400. — Voir: *Sphaerotheca Humuli.*

*__Erysiphe Martii__ Lév. — N. K. A. 2, II, 158. — Voir: *Erys. Polygoni.*

*__Erysiphe Montagnei__ Lév. — Voir: *Erysiphe Polygoni.*

*__Erysiphe pannosa__ Wallr. — T. N. G. XI, 400. — Voir: *Sphaerotheca.*

*__Erysiphe penicillata__ Schlecht. α **Erys. Berberidis** D. C. — T. N. G. XI, 401. — Voir: *Microsphaera Berberidis.*

*__Erysiphe penicillata__ Schlecht. β. **Erys. Viburni Opuli** Mong. — T. N. G. XI, 401. — Voir: *Microsph. Alni.*

*__Erysiphe penicillata__ Schlecht. γ. **Erys. Lonicerae** D. C. — T. N. G. XI, 401. — Voir: *Microsph. Alni* var. *Lonicerae.*

4. **Erysiphe Polygoni** D. C. — Salmon Mon. 174.

Selon Mr. Salmon, cette espèce embrasse les *Erysiphe Umbelliferarum* de Bary, *Erys. communis* Wallr., *Erys. Martii* Lév. et *Erys. Ulmariae* Desm. qui jusqu'ici avaient été traités en espèces autonomes, en sorte qu'il nous semble convenable d'indiquer à cet endroit les places où les dernières ont été insérées dans les Recueils mycologiques de notre Pays.

A. Synonymes dans notre „Révision des Champ. des Pays-Bas" II, p. 96—99: *Erysiphe Umbelliferarum* de Bary, *Erys. communis* Wallr., *Erys. Martii* Lév. et *Erys. Ulmariae* Desm.

B. Synonymes dans le „Tijdschrift voor Natuurl. Gesch. en Physiologie XI, p. 100—101: *Erys. communis* α *Ranunculacearum* Wallr., β. *Leguminosarum* Wallr., et γ. *Rubiacearum* Fr.

C. Synonymes dans le „Prodromus Florae Batavae" II, 4, p. 36—37: *Erys. Martii* a. *Cruciferarum* Lév., b. *Leguminosarum* Lév., c. *Ulmariae* Lév. *Erys. communis* a. *Ranunculacearum* Duby, b. *Polygonearum* Duby et *Rubiacearum* West.

D. Synonymes du „Nederl. Kruidk. Archief" 1, I, 53: *Erys. communis* Fr. i. *Umbelliferarum*; 2, I, 91: *Erys. communis* f^a^ *Rumicis* et f^a^ *Polygoni* (Oud. Herb. Nederl. Pl. n° 398 et 399); *Erys. Martii* f^a^ *Heraclei* et f^a^ *Pisi* (Oud. Herb. Nederl. Pl. n° 103 et n° 109). — 2, II, 184: *Erys. communis* Lév. et *Erys. Martii* Lév. — 2, III, 256: *Erys. communis.* — 2, V, 594: *Erys. communis* b. *Polygoni* et *Erys. Martii* Lév. — 2, VI, 171: *Erys. communis* Fr., *Erys. Linkii* Lév., *Erys. lamprocarpa* Lév., *Erys. Martii* Lév., *Erys. Montagnei* Lév., *Erys. horridula* Lév., *Erys. Ulmariae* P., et *Erys. Umbelliferarum.*

Plantes-mères dont les feuilles servent de support aux espèces, nommées dans les rubriques A, B, C et D.: *Alyssum calycinum*, *Anthriscus silvestris* et *vulgaris*, *Aquilegia vulgaris*, *Clematis Vitalba*, *Delphinium Ajacis* et *azureum*, *Filipendula Ulmariae*, *Galium Aparine*, *Geranium molle*, *Heracleum Sphondylium*, *Hypericum perforatum*, *Knautia arvensis*, *Lathyrus Nissolia*, *Lupinus luteus*, *Medicago sativa*, *Melilotus alba* et *altissima* (macrorrhiza), *Pisum sativum*, *Polygonum aviculare*, *Ranunculus acer*, *sardous* (Philonotis) et *repens*, *Rumex Acetosella*, *Symphytum officinale*, *Trifolium pratense*, *Vicia* sp.

Exsiccata. — Oud. Fgi Néerl. exs.: n° 73 (*Erys. communis*, sur Clematis Vitalba); n° 74 (*Erys. comm.* sur Pisum sativum); n° 155 (*Erys. comm.* sur Polygonum aviculare); n° 156 (*Erys. comm.* sur Ranunculus acer); n° 157 (*Erys. comm.* sur Delphinium azureum); n° 160 (*Erys. horridula* sur Symph. officinale).

5. **Erysiphe tortilis** (Wallr.) Fr. — Salmon Mon. 213. — Prodr.

Fl. Bat. II, 4, p. 37; N. K. A. 2, I, 91. — Oud. Rév. II, 95. — Sacc. Syll. I, 17. — Wint. Kr. Fl. II, 32. — F. des *Cornus alba* et *sanguinea* (Oud. Fgi Neerl. exs. n° 161; id. Herb. v. Nederl. Pl. n° 18).

×× EUROTIEAE.

EUROTIUM.

1. **Eurotium coriorum** Wallr. — Oud. Rév. II, 102; N. K. A. 2, II, 46; 2, IV, 254; Arch. Néerl. II, 46. — Sacc. Syll. I, 27. — Wint. Kr. Fl. II, 60. — Sur une courroie rebutée.

Eurotium epixylon Schm. et Kunze. — Voir. *Eur. herbariorum.*

2. **Eurotium herbariorum** (Wiggers) Lk. — Oud. Rév. II, 101; T. N. G. XI, 402; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 121; N. K. A. 2, VI, 172. — Sacc. Syll. I, 26. — Wint. Kr. Fl. II, 59. — Sur des plantes d'herbier, gâtées par l'humidité.

a. **epixylon** (Kze u Schm.) West. — Oud. Rév. II, 102; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 121. — Eur. epixylon Kze u. Schm. — Sacc. Syll. I, 27. — T. N. G. XII, 273. — Wint. Kr. Fl. II, 60, sous *Eur. herbariorum.* — Morceaux de bois ramolli.

3. **Eurotium repens** de Bary, Beitr. zur Morph. u. Phys. d. Pilze, 3e Reihe; Eurotium, p. 19. — Oud. Rév. II, 102; N. K. A. 2, VI, 32. — Sacc. Syll. I, 26. — Wint. Kr. Fl. II, 60. — Papier trempé de gelée de groseilles.

KICKXELLA.

1. **Kickxella alabastrina** Coemans, Bull. Soc. bot. de Belg. I, Nov. 1862. et Spicilège mycologique n° 3. — Oud. N. K. A. 2, IV, 251. — Sacc. Syll. II, Addit. ad vol. I, p. 1 (815); id. Syll. IX, 373. — Crottin de cheval.

De cette Périsporiacée nous n'avons rencontré jusqu'ici que le stade conidiifère, connu sous le nom de *Coemansiella alabastrina* Sacc. Syll. IV, p. 56.

××× PERISPORIEAE.

1. Hyalosporae.

ANIXIA.

1. **Anixia cyclospora** (Cooke) Sacc. Syll. I, 36. — Oud. Rév. II, 104. — Orbicula cyclospora Cooke Brit. Fgi 926. — Oud. N. K. A. 2, II, 187. — Bois de Chêne ramolli.

APIOSPORIUM.

1. **Apiosporium Brassicae** (Lib.) Fuck. — Oud. Rév. II, 104. — Sacc. Syll. I, 33. — Wint. Kr. Fl. II, 73. — Perisporium Brassicae Lib. — Prodr. Fl. Bat. II. 4, 38. — Tronçons pourrissants de choux cultivé.

2. **Apiosporium pinophilum** Fuck. — Oud. Rév. II. 103; N. K. A. 2. IV. 255. — Sacc. Syll. I, 30. — Wint. Kr. Fl. II, 72. — Antennaria pinophila Nees. — T. N. G. XI, 400; N. K. A. 2, I, 181. — Aiguilles et rameaux de l'*Abies alba* (Etat conidiifère).

3. **Apiosporium quercicolum** Fuck. — Oud. Rév. II, 104; N. K. A. 2, VI, 172. — Sacc. Syll. I, 31. — Wint. Kr. Fl. II, 72. — F. du *Quercus Robur*.

4. **Apiosporium Rhododendri** Fuck. — N. K. A. 2, VI, 172. — Sacc. Syll. I, 32. — Wint. Kr. Fl. II, 72.

ORBICULA.

***Orbicula cyclospora** Cooke Brit. Fgi 926. — N. K. A. 2, II, 187. — Voir: *Anixia*.

2. Phaeosporae.

CHAETOMIDIUM.

1. **Chaetomidium fimeti** (Fuck.) Zopf, Zur Entw. Ges. der Ascom. p. 53 et 84. — Oud. Rév. II, 106. — Sacc. Syll. I, 39. — Chaetomium fimeti Fuck. Enum. Fg. Nass. 64 et Symb. 90. — N. K. A. 2, IV, 266. — Wint. Kr. Fl. II, 159. — Crottin de lapin.

ASCOTRICHA.

1. **Ascotricha chartarum** Berk. Ann. Nat. Hist. I, I, 257. — Oud. Rév. II, 105. — Sacc. Syll. I, 38. — Chaetomium chartarum (Berk.) Wint. Kr. Fl. II, 157. — Papier imprimé corrompu.

3. Hyalodidymae.

ASTERINA.

1. **Asterina Hederae** Desm. Ch. de Fr. 2e Série n° 774. — N. K. A. 2, II, 248 et 2, III, 151. — Oud. Fgi Néerl. exs. n° 164. — F. du *Hedera Helix*.

2. **Asterina Veronicae** Cooke Grev. V, 122. — Oud. Rév. II, 107; N. K. A. 2, VI, 172. — Wint. Kr. Fl. II, 78. — Dimerosporium abjectum Fuck. — Sacc. Syll. I, 51.

ASTERELLA.

1. **Asterella Himantiae** (P.) Sacc. Syll. IX, 398. — Asterina Himantia Sacc. Syll. I, 761. — Dothidea Himantia Fr. S. M. II, 559. — T. N. G. XI, 396. — Tiges d'Ombellifères robustes desséchées.

4. Phaeophragmiae.

PERISPORIUM.

1. **Perisporium Arundinis** Desm. Exs. 1e S. n° 329. — Oud. Rév. II, 108; N. K. A. 2, VI, 171. — Sacc. Syll. I, 59. — P. vulgare Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 38. — F. du *Phragmites communis*.

2. **Perisporium betulinum** (A. S.) Fr. S. M. II, 62. — Oud. Rév. II, 108; N. K. A. 2, VI, 172. — Sacc. Syll. II, 59. — Wint. Kr. Fl. II, 68. — F. du *Betula alba*.

***Perisporium Brassicae** Lib. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 38. Voir: *Apiosporium*.

3. **Perisporium nitidum** Berk. Enum. Fung. coll. in Portugal. S. — Oud. Rév. II, 108; N. K. A. 2, IV, 225. — Sacc. Syll. I, 57. — F. pourrissantes de *l'Agave americana*.

***Perisporium vulgare** Cda Ic. Fg. II, 27. — Fl. Bat. II, 4, p. 38. Voir: *P. Arundinis*.

×××× CAPNODIEAE.

CAPNODIUM.

1. **Capnodium elongatum** (P.) Berk. et Desm. Journ. Hort. Soc. IV (1849), 251. — Oud. Rév. II, 110; N. K. A. 2, V, 167. — Sacc. Syll. I, 75. — Wint. Kr. Fl. II, 76. — F. du *Persica vulgaris* (état conidien).

2. **Capnodium quercinum** (P.) Berk. et Desm. l. c. p. 252. — Oud. Rév. II, 110. — Sacc. Syll. I, 79. — Wint. Kr. Fl. II, 76. — F. du *Quercus Robur* (état conidien).

3. **Capnodium salicinum** Mont. Syll. 256. — Oud. Rév. II, 109; N. K. A. 2, VI, 172. — Sacc. Syll. I, 57. — Wint. Kr. Fl. II, 75. — C. sphaeroideum Lacr. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 126. — F. et rameaux du *Salix cinerea* (état parfait).

4. **Capnodium Tiliae** (Fuck.) Sacc. Syll. I, 71; Wint. Kr. Fl. II, 73. — Oud. Rév. II, 110. — F. des *Tilia* (état conidien).

ANTENNARIA.

1. **Antennaria pinophila** Lk. Syst. I, 118. — Arch. Néerl. VIII, 393. — Nees. Syst. 279 et fig. 298. — Fr. S. M. III, 231. — Ant. pithyophila Sacc. Syll. I, 80. — F. et ram. d'un *Abies*.

***Antennaria cellaris** Fr. S. M. III, 229. — T. N. G. XI; 400. — Voir: Rhacodium cellare.

†[15] Sphaeriaceae.

× SPHAERELLEAE.

1 Hyalosporae.

CARLIA.

(Synon.: Laestadia).

1. **Carlia carpinea** (Fr.) Kze, Bon., O. Kuntze Revisio Pl. II, 846. — Oud. Rév. II, 196. — Laestadia carpinea Sacc. Syll. I, 426. — Wint. Kr. Fl. II, 398. — Sphaeria carp. Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 67; N. K. A. 1, I, 52. — F. du *Carpinus Betulus*.

2. **Carlia millepunctata** (Desm.) Kze, Bon., O. Kze l. c. — Oud. Rév. II, 196. — Laestadia millep. Sacc. Syll. I, 426. — N. K. A. 2, IV, 520. — F. d'un *Rhododendron* cultivé.

3. **Carlia Rhododendri** (de Not.) Kze, Bon., O. Kze l. c. — Oud. Rév. II, 197. — Laestadia Rhod. Sacc. Syll. I, 428. — Oud. N. K. A. 2, VI, 192. — F. du *Rhod. ferrugineum*.

* LAESTADIA.

(Voir: Carlia).

PHOMATOSPORA.

1. **Phomatospora arenaria** Sacc. Bomm. Rouss. Bull. Soc. r. de Bot de Belgique, XXIX (1890) p. 276. — Oud. Rév. II, 197; N. K. A. 2. IV, 192. — Sacc. Syll. IX, 291. — Chaumes de l'*Elymus arenarius*.

2. Hyalodidymae.

* SPHAERELLA.

(Voir: Mycosphaerella).

Sphaerella Hederae Cooke Brit. Fgi 921. — N. K. A. 2, I, 317. — Voir: *Metasphaeria*.

MYCOSPHAERELLA.

1. **Mycosphaerella acerina** (Wallr.) Johanson et Magnus Oest. bot. Zeits. 1904, n° 6. — Oud. Rév. II, 212. — Sphaerella acerina Fuck. — N. K. A. 2, VI, 191. — Sacc. Syll. I, 536. — Wint. Kr. Fl. II, 382 (sous le n° 3439).

2. **Mycosphaerella allicina** (Fr.) Joh. et Magn. l. c. — Oud. Rév. II, 207. — Sphaerella all. Auersw. — Sacc. Syll. I, 522. — Wint. Kr. Fl. II, 364. — Sphaeria allicina T. N. G. XI, 394; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 54.

3. **Mycosphaerella Armoraciae** (Fuck.) Joh. et Magn. l. c. — Oud. Rév. II, 211. — Sphaerella Armor. Oud. Fgi. Neerl. exs. n° 176. — Sacc. Syll. I, 537. — F. maladives du *Cochlearia Armoracia*.

4. **Mycosphaerella Asteroma** (Fr.) Joh. et Magn. l. c. — Oud. Rév. II, 208. — Sphaerella Ast. Karst. — Sacc. Syll. I, 523. — Wint. Kr. Fl. II, 363. — Dothidea Asteroma Fr. — T. N. G. XI, 396. — F. du *Polygonatum multiflorum* (à l'état imparfait).

5. **Mycosphaerella Atomus** (Desm.) Joh. et Magn. l. c. — Oud. Rév. II, 209. — Sphaerella Atomus Cooke; Sacc. Syll. I, 536; Wint. Kr. Fl. II, 395. — Sphaeria Atomus Kickx; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 68. — F. du *Fagus silvatica*.

6. **Mycosphaerella Aucupariae** (Lasch.) Joh. et Magn. l. c. — Oud. Rév. II, 215. — Sphaerella Auc. Plowr. — Sacc. Syll. I, 537. — Sphaeria Auc. Rab. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 67. — Septoria Auc. Oud. Fgi. Neerl. exs. n° 93. — F. du Sorbus Aucuparia (encore vertes).

7. **Mycosphaerella brassicaecola** (Duby) Joh. et Magn. l. c. — Oud. Rév. II, 218. — Sphaerella brass. Ces et de Not. — Sacc. Syll. I, 502. — Wint. Kr. Fl. II, 371. — N. K. A. 2, VI, 191. — Dothidea brassicae Desm. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 71.

8. **Mycosphaerella brunnecola** (Fr.) Joh. et Magn. l. c. — Oud. Rév. II, 207. — Sphaerella brunn. Cooke. — Sacc. Syll. I, 523. — Wint. Kr. Fl. II, 563. — Sphaeria brunn. Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 67. — F. du *Conallaria majalis* (état stérile).

9. **Mycosphaerella Clematitidis** Oud. Rév. II, 217. — Sphaeria Clematitidis Oud. N. K. A. 2, IV, 521. — Sacc. Syll. Addit. ad vol. I—IV, 407 et IX, 625, où par erreur le nom spécifique à été changé en „Clematitis". Tiges de l'*Aristolochia Clematitis*.

10. **Mycosphaerella Clymenia** (Sacc.) Joh. et Magn. l. c. — Oud. Rév. II, 217. — Sphaerella Cl. Sacc. Syll. I, 492. — N. K. A. 2, IV, 521. — F. du *Lonicera Periclymenum*.

11. **Mycosphaerella Crataegi** (Fuck.) Joh. et Magn. l. c.). — Oud. Rév. II, 215. — Sphaerella Cr. Auersw. — Sacc. Syll. I, 483. — Wint. Kr. Fl. II, 389. — N. K. A. 2, VI, 191. — F. du *Crataegus monogyna*.

12. **Mycosphaerella Cruciferarum** (Fr.) Joh. et Magn. l. c — Oud. N. K. A. 3, II, 708. — Sphaerella Cruc. Sacc. Syll. I, 514. — Wint. Kr. Fl. II, 378. — Sphaeria Crucif. Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 68. — Tiges du *Sisymbrium officinale*.

13. **Mycosphaerella Equiseti** (Fuck.) Oud. N. K. A. 3, II, 872. — Sphaerella Eq. Fuck. — Sacc. Syll. I, 324. — Wint. Kr. Fl. II. 356. — Rameaux de l'*Eq. palustre*.

14. **Mycosphaerella Eryngii** (Duby) Joh. et Magn. — Oud. Rév. II, 213. — Sphaerella Eryngii Cooke. — N. K. A. 2, VI, 191. — Sacc. Syll. I, 511. — Wint. Kr. Fl. II, 367. — Sphaeria Er. Kickx. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 67. — F. des *Eryngium campestre* et *maritimum*.

15. **Mycosphaerella Fragariae** (Tul.) Joh. et Magn. l. c. — Oud. Rév. II, 216. — Sphaerella Frag. Syll. I, 505. — Wint. Kr. Fl. II, 370. — N. K. A. 2, VI, 191. — F. d'espèces de *Fragaria* cultivées.

16. **Mycosphaerella genuflexa** (Auersw.) Joh. et Magn. l. c. — Sphaerella genufl. Auersw. in Rab. Mycol. Eur. Heft V et VI, p. 8 et tab. 7 f. 91. — Oud. N. K. A. 3, II, 713. — Sacc. Syll. I, 486. — Wint. Kr. Fl. II, 381. — F. du *Salix alba*.

17. **Mycosphaerella graminicola** (Fuck.) Oud. Rév. II, 206. — Sphaerella gram. Fuck. — Sacc. Symb. I, 528. — Wint. Kr. Fl. II, 361. — N. K. A. 2, VI, 191. — F. du *Dactylis glomerata*.

18. **Mycosphaerella isariphora** (Desm.) Joh. et Magn. l. c. — Oud. N. K. A. 3, II, 708. — Sphaerella isar. (Desm.) de Not. — Sacc. Syll. I, 510. — Wint. Kr. Fl. II, 370. — F. du *Stellaria Holostea*.

19. **Mycosphaerella latebrosa** (Cooke) Joh. et Magn. l. c. — Oud. N. K. A. 3, I, 175. — Sphaerella lat. Cooke. — Sacc. Syll. I, 482. — Wint. Kr. Fl. II, 391. — F. de l'*Acer Pseudoplatanus*.

20. **Mycosphaerella lineolata** (Roberge) Joh. et Magn. l. c. —

Oud. Rév. II, 206; N. K. A. 3, I, 475. — Sphaerella lineol. Ces. et de Not. — Sacc. Syll. I, 531. — Wint. Kr. Fl. II, 359. — N. K. A. 2, III, 357 et 3, I, 236. — F. du *Psamma littoralis*.

21. **Mycosphaerella maculiformis** (Fr.) Joh. et Magn. l. c. Oud. Rév. II; 212; N. K. A. 2, VI, 191. — Sphaerella macularis (Fr.) Auersw. — Sacc. Syll. I, 488. — Wint. Kr. Fl. II, 380. — Sphaeria macul. Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 61. F. d'*Acer* et de *Populus*.

22. **Mycosphaerella maculiformis** (P.) Joh. et Magn. l. c. — Oud. Rév. II, 209. — Sphaerella maculif. Auersw. — Sacc. Syll. I, 477. — Wint. Kr. Fl. II, 383. — N. K. A. VI, 191. Sphaeria maculif. P. — T. N. G. XI, 395; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 67; N. K. A. 2, I, 92. — F. de plusieurs arbres.

23. **Mycosphaerella melanoplaca** (Desm.) Joh. et Magn. l. c. — Oud. Rév. II, 214. — Sphaerella melanopl. Auersw. — Sacc. Syll. I, 506. — Wint. Kr. Fl. II, 369. — Sphaeria melanopl. Desm. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 68. — F. du *Geum urbanum*.

24. **Mycosphaerella nebulosa** (P.) Joh. et Magn. l. c. — Oud. Rév. II, 213. — Sphaerella neb. Sacc. Syll. I, 515. — Wint. Kr. Fl. II, 375. — Sphaeria neb. P. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 54; N. K. A. I, V, 344. — Tiges de quelques Ombellifères.

25. **Mycosphaerella Passeriniana** (Sacc. Joh. et Magn. l. c. — Oud. Rév. II, 211. — Sphaerella Pass. Sacc. Syll. II, Addit. ad. vol. I, p. XLI. — Sphaeria Cruciferarum Prodr. Fl. Bat. II, p. 68. — Tiges, pédoncules et fruits du *Sisymbrium officinale*.

***Sphaerella perforans** (Desm.) Sacc. Syll. I, 538. — N. K. A. 2, VI, 191. — Ce champignon appartient aux Sphéropsidées, et a été enregistré par nous sous le genre Selenia dans cette famille. — Voir aussi: Oud. Rév. II, 218.

26. **Mycosphaerella polygramma** (Fr.) Joh. et Magn. l. c. — Oud. Rév. II, 214. — Sphaerella polygr. Niessl. — Sacc. Syll. I, 521. — Wint. Kr. Fl. II, 373. — Sphaeria polygr. Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 54. — Tiges de l'*Angelica silvestris*.

27. **Mycosphaerella Polypodii** (Rab.) Joh. et Magn. l. c. — Oud. Rév. II, 205. — Sphaerella Pol. Fuck. — Sacc. Syll. I, 539. — Wint. Kr. Fl. II, 393. — Sphaeria aquilina N. K. A. I, I, 51. — Sphaeria Pol. Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 66. — F. du *Polypodium vulgare*.

28. **Mycosphaerella Pomacearum** Joh. et Magn. l. c. — Sphaerella Pomacearum (Crié) Sacc. Syll. I, 482. — F. du *Cydonia vulgaris* (à l'état imparfait, dans mon herbier).

29. **Mycosphaerella Populi** (Auersw.) Oud. N. K. A. 3, II,

708. — Sphaerella Populi Auersw. in Rab. Mycol. Europ. Heft V et VI, p. 11 et tab 7, f. 93. — Sacc. Syll. I, 488. — Wint. Kr. Fl. II, 379. — F. du *Populus italica*.

30. **Mycosphaerella punctiformis** (P.) Joh. et Magn. l. c. — Oud. Rév. II, 208. — Sphaerella punctif. Rab. — Sacc. Syll. I, 476. — Wint. Kr. Fl. II, 397. — N. K. A. 2, VI, 191. — Sphaeria punctif. P. — T. N. G. XI, 395; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 67. — F. du *Quercus Robur*.

Mycosphaerella Rumicis (Cooke) Joh. et Magn. l. c. — Sphaerella Rumicis Cooke. — N. K. A. 1, 92 et VI, 191; Oud. Herb. Ned. Pl. n° 571. — Voir: *Venturia*.

31. **Mycosphaerella salicicola** (Fr.) Joh. et Magn. l. c. — Oud. Rév. II, 210. — Sphaerella salicicola Fuck. — Sacc. Syll. I, 487. — Wint. Kr. Fl. II, 382 (sous n° 3139) N. K. A. 2, VI, 191. — F. du *Salix pentandra*.

32. **Mycosphaerella Tassiana** Joh. et Magn. — Oud. N. K. A. 2, VI, 191; 3, I, 475. — Sphaerella Tass. de Not. — Sacc. Syll. I, 530. — Wint. Kr. Fl. II, 359; N. K. A. 3, I, 236. — F. du *Psamma littoralis*.

33. **Mycosphaerella smegmatos** (Pass.) Joh. et Magn. l. c. — Oud. Rév. II, 210. — Sphaerella smegm. Pass. — Sacc. Syll. I, 509; N. K. A. 2, V, 179; 2, VI, 191. — F. du *Saponaria officinalis*.

34. **Mycosphaerella Vaccinii** (Cooke) Joh. et Magn. l. c. — Oud. Rév. II, 216. — Sphaerella Vacc. Sacc. Syll. I, 493. — Wint. Kr. Fl. II, 385. — N. K. A. 2, IV, 520. — F. du *Vaccinium Myrtillus*.

Le *Mycosph. perforans* (N. K. A. 2, VI, 191; sous Sphaerella) nous semble une espèce trop douteuse pour être admise dans notre Énumération.

EPICYMATIA.

1. **Epicymatia vulgaris** Fuck. — Oud. Rév. II, 230. — Sacc. Syll. I, 571. — Pharcidia epicymatia Wint. Kr. Fl. I, 312. — Sphaeria lichenicola Sommerf. — T. N. G. XII, 271. — Sphaeria epicymatia Wallr. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 60. — Apothèces des *Lecanora subfusca* et *Physcia parietina*.

STIGMATEA.

1. **Stigmatea Aegopodii** (P.) Oud. Rév. II, 222; Arch. Néerl. I, XI, 52. — Sacc. Syll. I, 545. — Sphaeria Aegopodii P. — T. N. G. XI, 395. — F. de l'*Aegopodium Podagraria*.

2. **Stigmatea Fraxini** Oud. N. K. A. 3, II, 214. — Dothidea Fraxini Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 72.

***Stigmatea Geranii** F. — N. K. A. 2, I, 317; 2, VI, 190; Arch. Néerl. VIII, 407. — Voir: *Venturia.*

3. **Stigmatea Ostruthii** (Fr.) Rév. II, 221; Oud. Arch. Néerl. XI, 52; Versl. Med. K. A. v. W. 2, X (1876), p. 52; Sphaeria Ostruthii Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 68. — F. de l'*Angelica silvestris.*

***Stigmatea Ranunculi** Fr. — Oud. Rév. II, 220; N. K. A. 2, VI, 191. — F. du *Ranunc. repens.* — Voir: *Fabraea litigiosa* (Discomycètes).

4. **Stigmatea Robertiani** Fr. — Oud. Rév. II, 219; N. K. A. 2, VI, 190; Oud. Fgi. Neerl. exs. n° 165. — Sacc. Syll. I, 541. — Wint. Kr. Fl. II, 338. — Dothidea Rob. Fr. S. M. II, 562. — T. N. G. XI, 396; Prodr. Fl. Bot. II, 4, p. 73. — F. du *Geranium Robertianum.*

***Stigmatea Sorbi** Oud. N. K. A. 2, II, 187. — Voir: *Didymosphaeria Aucupariae.*

VENTURIA.

1. **Venturia chlorospora** (Ces.) Karst. Myc. Fenn. II, 189. — Oud. N. K. A. 3, II, 717. — Sacc. Syll. I, 586. — Wint. Kr. Fl. II, 436. — F. du *Pirus Malus.*

2. **Venturia Geranii** (Fr.) Wint. Kr. Fl. II, 431. — Oud. Rév. II, 233. — Stigmatea Ger. Fr. — N. K. A. 2, I, 317; 2, VI, 190; Arch. Néerl. VIII, 107. — Sacc. Syll. I, 541. — Vent. glomerata Cooke. — N. K. A. 2, VI, 186. — F. du *Geranium dissectum.*

***Venturia glomerata** Cooke Grev. III, 69. — N. K. A. 2, VI, 186. — Voir: *Vent. Geranii.*

3. **Venturia ilicifolia** Cooke Brit. Fgi. 924. — Sacc. Syll. I, 588. — Oud. N. K. A. 3, III, 1093. — Niesslia ilicif. (Cooke) Wint. Kr. Fl. II, 197. — F. de l'*Ilex Aquifolium.*

4. **Venturia Kunzei** Sacc. Syll. I, 588. — Oud. Rev. II, 235; N. K. A. 2, VI, 186. — Coleroa Chaetomium Rab. — Wint. Kr. Fl. II, 198. — Dothidea Chaetomium Kze. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 71. — F. des *Rubus caesius* et *idaeus.*

5. **Venturia Myrtilli** Cooke Brit. Fgi. 924. — Oud. Rév. II, 234; N. K. A. 2, IV, 521. — Sacc. Syll. I, 590. — Wint. Kr. Fl. II, 439.

6. **Venturia Potentillae** (Fr.) Cooke Grev. VI, 76. — Oud. Rév. II, 235; N. K. A. 2, VI, 186. — Sacc. Syll. I, 594. —

Coleroa Potent. Wint. Kr. Nl. II, 199. — Dothidea Potentillae Fr. — N. K. A. 1, I, 52; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 71. — F. du *Potent. anserina.*

7. **Venturia Rumicis** (Desm.) Wint. Kr. Fl. II, 135. — Oud. Rév. II, 233. — Sphaerella Rumicis Cooke. — Sacc. Syll. I, 512. — N. K. A. 2, I, 92; 2, VI, 191. — Sphaeria vagans Fr. β. rumicicola T. N. G. XI, 395. — Phyllosticta Rumicis P. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 98.

3. Hyalophragmiae.

SPHAERULINA.

1. **Sphaerulina intermixta** (B. Br.) Sacc. Syll. II, 187; Wint Kr. Fl. II, 104. — N. K. A. 3, I, 236 et 181 et 3, II, 873. — Rameaux du *Rosa rubiginosa.*

2. **Sphaerulina myriadea** (D. C.) Sacc. Syll. II, 186; Wint. kr. Fl. II, 103; Oud. Rév. II, 328. — Sphaeria myriadea D. C. — Prodr. Fl. Bat. 4, II, p. 67. — F. du *Quercus Robur.*

×× PLEOSPOREAE.

1. Hyalosporae.

PHYSALOSPORA.

1. **Physalospora gregaria** Sacc. Syll. I, 135, var. *foliorum* ibid. — N. K. A. 3, I, 474. — F. du *Taxus baccata.*

2. **Physalospora Psammae** Oud. N. K. A. 2, IV, 520 et Rév. II, 198. — Sacc. Syll. IX, 598. — F. du *Psamma littoralis.*

*** HALONIA.**

***Halonia ditopa** Fr. — N. K. A. 1, V, 314. — Voir: *Ditopella fusispora.*

DITOPELLA.

1. **Ditopella fusispora** de Not. — Oud. Rév. II, 199; N. K. A. 2, VI, 190. — Sacc. Syll. I, 450; Wint. Kr. Fl. II, 574. — Halonia ditopa Fr. — N. K. A. 1, V, 344. — Sphaeria ditopa Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 59. — Rameaux de l'*Alnus glutinosa.*

2. Hyalodidymae.

DIDYMELLA.

1. **Didymella aggregata** (Lasch) Sacc. Syll. I, 549. — Oud. Rév.

II, 225. — Sphaeria aggregata West. in Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 52. — Tiges de l'*Euphrasia verna* (= E. Odontites).

Mrs. Rehm (Wint. Kr. Fl. III, 242) et Saccardo (Syll. VIII, 597) ont transporté cette espèce vers les Discomycètes, sous le genre *Scleroderris*.

2. **Didymella cladophila** (Niessl.) Sacc. Syll. I, 545, f^a^ *Ulicis* Oud. N. K. A. 3, II, 868. — Rameaux piquants de l'*Ulex europaeus*.

3. **Didymella commanipula** (B. Br.) Sacc. Syll. I, 556; N. K. A. 3, II, 868. — Didymosphaeria commanipula Niessl.: Wint. Kr. Fl. II, 124. — Tiges d'une espèce de *Scrophularia*.

4. **Didymella culmigena** Sacc. Syll. I, 558. — N. K. A. 3, II, 214. — Gaînes des f. radicales du *Secale cereale*.

5. **Didymella Fuckeliana** (Pass.) Sacc. Syll. I, 556. — N. K. A. 3, II, 701 (Didymosphaeria). — Tiges de l'*Epilobium angustifolium*.

6. **Didymella nigrella** (Fr.) Sacc. Syll. Addenda ad Vol. II, p. XLIV. — N. K. A. 3, I, 476; Oud. Rév. II, 465. — Diaporthe Eup. nigrella Oud. Rév. Pyrén. 44. — Sphaeria nigrella Fr. — N. K. A. 1, I, 51; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 65. — Tiges du *Melandryum album*.

7. **Didymella operosa** (Desm.) Sacc. Syll. I, 554. — Oud. Rév. II, 224; N. K. A. 2, V, 179. — Tiges de l'*Angelica silvestris*.

8. **Didymella proximella** (Karst.) Sacc. Syll. I, 558; Wint. Kr. Fl. II, 123. — N. K. A. 3, I, 236 et 476. — F. d'une espèce de *Carex*.

9. **Didymella Quercus** Oud. N. K. A. 3, II, 869. — F. du *Quercus Robur*.

10. **Didymella Salicis** Grove in Sacc. Syll. IV, 667. — Oud. Rév. II, 224; N. K. A. 2, VI, 190. — F. d'une espèce de *Salix*.

11. **Didymella Sparganii** Oud. N. K. A. 3, II, 869. — F. du *Sparganium ramosum*.

12. **Didymella Taxi** (Grev.) Oud. N. K. A. 3, I, 476. — Sphaerella Taxi Grev.; Sacc. Syll. I, 180. — Aiguilles du *Taxus baccata* var. *sparsifolia*.

13. **Didymella tosta** (B. Br.) Sacc. Syll. I, 556. — Oud. Rév. II, 225; Sphaeria (Diaporthe) tosta Oud. in N. K. A. 2, II, 104. — Tiges de l'*Epilobium hirsutum*.

14. **Didymella vexata** Sacc. Syll. I, 547. — Oud. Rév. II, 223. — Didymosphaeria oblitescens Fuck. — Wint. Kr. Fl. II, 142. — Sphaeria oblitescens N. K. A. 2, II, 186. — Rameaux du *Cornus sanguinea*.

3. Phaeodidymae.

DIDYMOSPHAERIA.

1. **Didymosphaeria Aucupariae** Oud. Hedw. 1898, p. 175; id. Rév. II. 166; id. N. K. A. 3, I, 178. — Stigmatea Sorbi Oud. N. K. A. 2, II, 187. — F. presque détruites du *Sorbus Aucuparia*.

2. **Didymosphaeria conoidea** Niessl. — Oud. Rév. II, 273; N. K. A. 2, VI, 190. — Sacc. Syll. I, 702; Wint. Kr. Fl. II, 116. — Tiges d'un *Urtica*.

3. **Didymosphaeria epidermidis** (Fr.) Fuck. — Oud. Rév. II, 273; N. K. A. 2, VI, 190. Sacc. Syll. I, 709; Wint. Kr. Fl. II, 119. — Sphaeria epid. Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 61. — Rameaux du *Berberis vulgaris*.

Didymosphaeria Fuckeliana Sacc. Fgi ital. del. tab. 135. — N. K. A. 3. II. 701. — Voir: *Didymella*.

4. **Didymosphaeria Rhododendri** Oud. N. K. A. 3, II, 216; Zittingsverl. K. Akad. v. Wet. 30 Juni 1900, p. 111. — Sacc. Syll. XVI, 500. — Rameaux d'une espèce de *Rhod.* cultivée.

4. Hyalophragmeae.

METASPHAERIA.

1. **Metasphaeria acorella** Berl. et Vogl. in Sacc. Syll. Add. ad. vol. I—V, 158. — Oud. N. K. A. 3, I, 481. — F. de l'*Acorus Calamus*.

2. **Metasphaeria Bellynckii** (West.) Sacc. Syll. II, 178. — Oud. Rév. II, 327. — Leptosphaeria Bell., Wint. Kr. Fl. II, 152. — Tiges du *Polygonatum multiflorum*.

3. **Metasphaeria brachytheca** (Berk.) Sacc. Syll. II, 168. — Oud. Rév. II, 325. — N. K. A. 2, VI, 287. — Rameaux du *Rosa rubiginosa*.

1. **Metasphaeria clypeosphaerioides** Bomm. Rouss. Sacc. dans Sacc. Syll. IX, 832. — Oud. Rév. II, 326. — Leptosphaeria clypeosph. N. K. A. 2, VI, 189. — Rameaux du *Rubus idaeus*.

5. **Metasphaeria complanata** (Tode) Sacc. Syll. II, 161. — Sphaeria complanata Tode. — T. N. G. XI, 395. — Tige de plusieurs plantes herbacées.

6. **Metasphaeria conformis** (B. Br.) Sacc. Syll. IX, 834. — Oud. Rév. II, 325; N. K. A. 2. V, 183 et 2, VI, 190. — Rameaux de l'*Alnus glutinosa*.

7. **Metasphaeria corticola** (Fuck.) Sacc. Syll. IX, 836. — Oud.

Rév. II. 324; N. K. A. 2, V, 483 et 2, VI, 190. — Rameaux du *Crataegus monogyna*.

8. **Metasphaeria Cumana** (Sacc. et Speg.) Sacc. Syll. II, 177. — N. K. A. 3, II, 216. — Sur les f. d'un *Carex*.

9. **Metasphaeria Hederae** (Sow.?) Sacc. Syll. II, 169. — Oud. Rév. II, 326; N. K. A. 2, VI, 190. — Leptosphaeria Hederae Wint. Kr. Fl. II, 187. — Sphaerella Hederae Cooke. — N. K. A. 2, I, 217; Arch. Néerl. VIII, 407. — Sphaeria Hederae Sow. — T. N. G. XI, 395. — F. du *Hedera Helix*.

10. **Metasphaeria Iridis** (Desm.) Sacc. Syll. II, 178. — Oud. Rév. II, 327. — Dothidea Iridis Desm. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 72. — F. de l'*Iris Pseudacorus*.

11. **Metasphaeria Juncі** (Oud.) Sacc. Syll. II, 177. — Oud. Rév. II, 326. — Sphaeria Junci Oud. N. K. A. 2, I, 264; Arch. Néerl. VIII, 405. — F. et tiges du *Juncus glaucus*.

12. **Metasphaeria sabuletorum** (B. Br.) Sacc. Syll. II, 180. — Oud. Rév. II, 328. — Sphaeria sabul. B. Br. — N. K. A. 2, III, 257 et 2, VI, 190. — Leptosphaeria sabul. Oud. Fgi Neerl. exs. n° 276. — F. du *Psamma arenaria*.

13. **Metasphaeria Taxi** Oud. N. K. A. 3, II, 217; id. Zitt. Versl. K. Ak. v. Wet. 30 Juin 1890, p. 148. — F. du *Taxus baccata*.

14. **Metasphaeria trichostoma** (Pass.) Sacc. Syll. II, 158. — N. K. A. 3, I, 236. — Tiges mortes du *Lycopsis arvensis*.

15. **Metasphaeria tritorulosa** (B. Br.) Sacc. Syll. II, 157 (errore habet „bitorulosa"). — Sphaeria trit. N. K. A. 2, II, 187. Sur une tige morte.

5. Phacophragmeae.

LEPTOSPHAERIA.

1. **Leptosphaeria acuta** (Moug. Nestl.) Karst. Myc. Fenn. II, 98. — Oud. Rév. II, 293; N. K. A. 2, VI, 188. — Sacc. Syll. II, 11; Wint. Kr. Fl. II, 181. — Sphaeria acuta M. N. — N. K. A. 1, I, 51; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 62; Sphaeria conformis Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 62. — Tige des *Urtica* et de quelques Ombellifères.

2. **Leptosphaeria agnita** (Desm.) Ces. et de Not. Schema Sfer. 236. — Oud. Rév. II, 292; N. K. A. 2, VI, 188. — Sacc. Syll. II, 40; Wint. Kr. Fl. II, 180. — Sphaeria agnita Desm. — N. K. A. 2, II, 101; Oud. Fgi. Neerl. exs. n° 82. — Sphaeria complanata Tode; Oud. Fgi. Neerl. exs. n° 174. — Tiges de l'*Eupatorium cannabinum*.

3. **Leptosphaeria Ammophilae** Rehm. — Oud. Rév. II, 302; N. K. A. 2, VI, 189. — Sacc. Syll. IX, 790; Wint. Kr. Fl. II, 458. — F. du *Psamma littoralis.*

4. **Leptosphaeria arundinacea** (Sow.) Sacc. Syll. II, 62; Wint. Kr. Fl. II, 448. — Oud. Rév. II, 296; N. K. A. 2, VI, 188. — Sphaeria arund. Sow. — T. N. G. XI, 394; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 53. — Chaumes du *Phragmites communis.*

β. Godini (Desm.) Sacc. Syll. II, 63. — Sphaeria Godini Desm. A. S. N. 3, V, 46. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 53.

6. **Leptosphaeria Bardanae** (Wallr.) Sacc. Syll. II, 34; Wint. Kr. Fl. II, 490. — Oud. Rév. II, 289. — Sphaeria Bard. Wallr. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 61. — Tiges du *Lappa tomentosa.*

6. **Leptosphaeria cariciphila** Oud. N. K. A. 3, II, 870. — Bractées du *Carex arenaria.*

***Leptosphaeria Caricis** Oud. N. K. A. 2, VI, 189. — Voir: *L. cariciphila.*

7. **Leptosphaeria Clivensis** (B. Br.) Sacc. Syll. II, 16; Wint. Kr. Fl. II, 463. — Oud. Rév. II, 287. — Sphaeria Cliv. B. Br. — N. K. A. 2, III, 160 et 2, VI, 188. — Tiges du *Senecio Jacobaea.*

***Leptosphaeria clypeosphaerioides** Sacc. — N. K. A. 2, VI, 189. — Voir. *Metasphaeria.*

8. **Leptosphaeria culmifraga** (Fr.) Ces. et de Not. — Oud. Rév. II, 301; N. K. A. 2, VI, 188. — Sacc. Syll. II, 75. — Wint. Kr. Fl. II, 456. — Sphaeria culmif. Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 63. — Chaumes de Graminées.

9. **Leptosphaeria derasa** (B. Br.) Auersw. — Oud. Rév. II, 293; N. K. A. 2, VI, 188 et 3, II, 705. — Sacc. Syll. II, 41; Wint. Kr. Fl. II, 481. — Tiges du *Senecio Jacobaea.*

10. **Leptosphaeria desciscens** Oud. Beibl. z. bot. Centralbl. 1902; id. N. K. A. 3, II, 706. — Tiges de l'*Alisma Plantago.*

11. **Leptosphaeria dolioloides** (Auersw.) Auersw. — Oud. Rév. II, 294; N. K. A. 2, VI, 31. — Sacc. Syll. II, 44; Wint. Kr. Fl. II, 483. — Tiges de l'*Echium vulgare.*

12. **Leptosphaeria Doliolum** (P.) de Not. — Oud. Rév. II, 286; N. K. A. VI, 188. — Sacc. Syll. II, 41; Wint. Kr. Fl. II, 460. — Sphaeria Dol. P. — T. N. G. X, 395; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 62. — Tiges de diff. pl. herb.

13. **Leptosphaeria epicarecta** (Cooke) Sacc. Syll. II, 65; Oud. Rév. II, 297. — F. du *Carex laevigata.*

14. **Leptosphaeria Fuckelii** Niessl. — Sacc. Syll. II, 71. — N. K. A. 3, I, 236 et 480. — Wint. Kr. Fl. II, 453. — F. du *Psamma littoralis.*

15. **Leptosphaeria haematites** (Rob.) Sacc. Syll. II, 36; Wint. Kr. Fl. II, 470. — Oud. Rév. II, 290. — Sphaeria haem. Rob. Desm. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 61. — Ram. du *Clematis Vitalba.*

16. **Leptosphaeria hemicrypta** Oud. N. K. A. 2, IV, 521; id. Rév. II, 300. — Sacc. Syll. IX, 789. — F. d'une espèce de *Carex.*

17. **Leptosphaeria Genistae** Oud. — Zitt. Versl. K. A. v. W. 30 Juin 1900, p. 141. — Sacc. Syll. XIV, 511. — Fruits du *Genista anglica.*

18. **Leptosphaeria hedericola** (Desm.) Sacc. Syll. II, 51. — Sphaeria hedericola Desm. — T. N. G. XI, 395.

19. **Leptosphaeria hydrophila** Sacc. Syll. II, 67. — Oud. N. K. A. 3, I, 479. — Tiges du *Juncus squarrosus.*

20. **Leptosphaeria juncina** (Auersw.) Sacc. Syll. II, 66; Wint. Kr. Fl. II, 449. — N. K. A. 3, II, 870. — Chaumes du *Juncus effusus.*

21. **Leptosphaeria junciseda** Karst. — Oud. Rév. II, 298; N. K. A. 2, VI, 287. — Sacc. Syll. II, 67. — Tiges du *Juncus alpinus.*

22. **Leptosphaeria Leersiae** Pass. — Oud. Rév. II, 296. — Leptos. Leersiana Sacc. Syll. II, 60. — Tiges du *Psamma littoralis.* (= Ammophila arenaria).

***Leptosphaeria Leersiana** Sacc. — N. K. A. 2, VI, 189. — Voir: *L. Leersiae.*

23. **Leptosphaeria Libanotis** (Fuck.) Niessl. — Oud. Rév. II, 288; N. K. A. 2, V, 482. — Sacc. Syll. II, 16; Wint. Kr. Fl. II, 463. — Tige d'Ombellifère.

24. **Leptosphaeria littoralis** Sacc. Syll. II, 78; Wint. Kr. Fl. II, 458. — Oud. Rév. II, 301; N. K. A. 2, IV, 522. — Chaumes du *Psamma littoralis.*

25. **Leptosphaeria luctuosa** Niessl. — N. K. A. 3, II, 217. — Sacc. Syll. II, 72; Wint. Kr. Fl. II, 455. — F. du *Typha latifolia.*

26. **Leptosphaeria maculans** Ces. et de Not. — Oud. Rév. II, 289. — Sacc. Syll. II, 35; Wint. Kr. Fl. II, 174. — Tiges du *Phaseolus nanus.*

27. **Leptosphaeria Menthae** Fautrey et Lamb. — Sacc. Syll. XIV, 566, forma *Origani* Oud. N. K. A. 3, II, 706. — Tiges de l'*Origanum vulgare.*

28. **Leptosphaeria Michoti** (West.) Sacc. Syll. II, 58; Wint. Kr. Fl. II, 444. — Oud. Rév. II, 295; N. K. A. 2, VI, 34 et 188. — Tiges surannées d'un *Carex.*

29. **Leptosphaeria microscopica** Karst. — Oud. N. K. A. 3, I, 480. — Sacc. Syll. II, 59. — L. culmorum Auersw. in Wint. Kr. Fl. II, 445. — Chaumes d'un *Bromus.*

30. **Leptosphaeria modesta** (Desm.) Karst. — Oud. Rév. II, 291; N. K. A. 2, VI, 188. — Sacc. Syll. II, 39; Wint. Kr. Fl. II, 471. — Sphaeria mod. Desm. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 62. — Tiges d'herbes majeures.

31. **Leptosphaeria Nardi** (Fr.) Ces. et de Not. — Oud. Rév. II, 302; N. K. A. 3, I, 479. — Sacc. Syll. II, 72; Wint. Kr. Fl. II, 454. — F. du *Nardus stricta.*

32. **Leptosphaeria nigrans** (Rab.) Ces. et de Not. — Oud. Rév. II, 299. — Sacc. Syll. II, 70; Wint. Kr. Fl. II, 452. — Sphaeria nigrans Rab. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 65. — Gaînes du *Dactylis glomerata.*

33. **Leptosphaeria Periclymeni** Oud. N. K. A. 2, V, 168; id. Rév. II, 291; N. K. A. 2, VI, 189. — Sacc. Syll. IX, 780. — Tiges et ram. du *Lonicera Periclymenum.*

34. **Leptosphaeria Phlogis** Oud. N. K. A. 3, II, 218; id. Zitt. Versl. K. A. v. W. 30 Juin 1900. — Sacc. Syll. XVI, 512. — F. du *Phlox decussata.*

35. **Leptosphaeria platanicola** (Howe) Sacc. — N. K. A. 3, II, 218. — Sacc. (Syll. IX, 780). — Rameaux du *Quercus Robur.*

36. **Leptosphaeria pseudo-Diaporthe** Oud. N. K. A. 2, VI, 34; id. Rév. II, 298. — Sacc. Syll. IX, 323. — Tiges desséchées du *Juncus effusus.*

37. **Leptosphaeria rivularis** Bomm. Rouss. Sacc. in Sacc. Syll. IX, 787. — Oud. N. K. A. 3, I, 480. — Tiges de l'*Alisma Plantago.*

38. **Leptosphaeria Rusci** Wallr.) Sacc. Syll. II, 74; Wint. Kr. Fl. II, 456. — Oud. Rév. II, 300. — Cladodes du *Ruscus aculeatus.* — Sphaeria Rusci Wallr. Arch. Néerl. II, 46.

*Leptosphaeria sabuletorum B. Br. — Voir: *Metasphaeria.*

39. **Leptosphaeria salebricola** Bomm. Rouss. Sacc. in Sacc. Syll. IX, 783. — N. K. A. 3, II, 218. — F. du *Cerastium silvaticum.*

40. **Leptosphaeria sparsa** (Fuck.) Sacc. Syll. II, 77; Wint. Kr. Fl. II, 457. — Oud. N. K. A. 3, II, 707. — Tige d'une Graminée.

41. **Leptosphaeria Stratiotis** Oud. Beibl. z. bot. Centrbl. 1902; id. N. K. A. 3, II, 707. — F. du *Stratiotes aloïdes.*

42. **Leptosphaeria Tritici** Pass. — Sacc. Syll. II, 62. — N. K. A. 3, II, 219. — F. du *Triticum vulgare.*

43. **Leptosphaeria Typhae** Karst. — Oud. N. K. A. 3, II, 707. — Sacc. Syll. II, 64; Wint. Kr. Fl. II, 450. — Gaînes du *Typha latifolia.*

44. **Leptosphaeria Typharum** (Desm.) Karst. — Oud. N. K. A. 3, II, 871. — Sacc. Syll. II, 64; Wint. Kr. Fl. II, 450. — F. desséchées du *Typha latifolia.*

45. **Leptosphaeria vagabunda** Sacc. Syll. II, 31; Wint. Kr. Fl. II, 465. — Oud. Rév. II, 288; N. K. A. 2, V, 482; ibid. 2, VI, 33 et 189; Zitt. Versl. K. A. v. W. 30 Juin: 1900, p. 142. — Rameaux du *Berberis vulgaris*.

46. **Leptosphaeria vagans** Karst. — N. K. A. 3, I, 235 et 479. — Sacc. Syll. II, 59. — F. de l'*Acorus Calamus*.

6. Hyalodictyae.

CATHARINIA.

1. **Catharinia Rubi** Oud. N. K. A. 3, I, 482; Rév. II, 365. — Sacc. Syll. XIV, 611. — Sarments d'une espèce de *Rubus*.

7. Phaeodictyae.

PLEOSPORA.

***Pleospora Acori** Oud. et Destr. N. K. A. 3, I, 482 et Rév. II, p. (12). — F. de l'*Acorus Calamus*. — Voir: *Pl. Berlesii*.

***Pleospora arenaria** Niessl. — N. K. A. 2, VI, 189. — Sur l'*Elymus arenarius*. — Voir: *Pl. vagans* a *arenaria*.

1. **Pleospora Armeriae** (Rab.) Ces. et de Not. — Oud. Rév. II, 353. — Pl. herbarum f^a^ Armeriae Sacc. Syll. II, 247; Wint. Kr. Fl. II, 504. — Sphaeria Arm. Rab. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 64. — Tiges de l'*Armeria globulariaefolia*.

2. **Pleospora Berlesii** Oud. Rev. II, 345 et N. K. A. 3, II, 872. — Sacc. Syll. XIV, 599. — F. de l'*Acorus Calamus* et du *Typha latifolia*.

***Pleospora calvescens** Oud. Rév. II, 344. — Cf. *Pyrenophora pellita*.

3. **Pleospora Gilletiana** Sacc. Syll. II, 256. — N. K. A. 3, II, 219. — Rameaux du *Sarothamnus scoparius*.

4. **Pleospora herbarum** (P.) Rab. — Oud. Rév. II, 350; N. K. A. 2, IV, 522 et VI, 189. — Pl. Leguminum Rab. — N. K. A. 2, VI, 189. — Pl. Armeriae Cda. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 64. — Pleomassaria Rosae Oud. N. K. A. 2, VI, 35 et 185. — Sphaeria herbarum P. — T. N. G. XI, 395, Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 63; N. K. A. 2, III, 160; Oud. in Fgi. Neerl. exs. n° 175, 274 et 275 (sur l'*Alisma Plantago*, l'*Oenothera biennis* et le *Cynogl. off.* — Sacc. Syll. II, 247; Wint. Kr. Fl. II, 504. — Tiges de plusieurs plantes herbacées, (*Alisma Plantago*, *Hypochoeris radicata*, etc.).

5. **Pleospora infectoria** Fuck. — Oud. Rév. II, p. (12); N. K. A. 3, I, 255 et 482. — Sacc. Syll. II, 265; Wint. Kr. Fl. II, 496. — F. du *Psamma littoralis*.

***Pleospora Leguminum** Rab. — N. K. A. 2, VI, 189. — Voir: *Pl. herbarum*.

6. **Pleospora media** Niessl. — N. K. A. 2, VI, 36 et 189; Oud. Rév. II, 347. — Sacc. Syll. II, 244; Wint. Kr. Fl. II, 503. — Tiges de l'*Echium vulgare*.

7. **Pleospora microspora** Niessl. — Oud. Rév. II, 347; N. K. A. 2, VI, 189. — Sacc. Syll. II, 264; Wint. Kr. Fl. II, 497. — Tiges de l'*Elymus arenarius*.

8. **Pleospora moricola** Pass. — Oud. Rév. II, p. (12) (Pl. herbarum Rab. var. muricola); N. K. A. 3, I, 235 et 482. — Jeunes rameaux du *Morus alba*.

9. **Pleospora mucosa** Oud. Rév. II, 348. — Sphaeria mucosa T. N. G. XI, 394; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 52. — A la surface de fruits de *Cucurbitacées*.

10. **Pleospora Negundinis** Oud. N. K. A. 3, II, 219. — Zitt. Versl. K. A. v. W. 30 Juin 1900, p. 148. — Sacc. Syll. XVI, 544. — Rameaux du *Negundo fraxinifolia*.

11. **Pleospora occultata** Oud. N. K. A. 2, VI, 288. — Sacc. Syll. XI, 344. — F. de l'*Elymus arenarius*.

12. **Pleospora orbicularis** Auersw. — Oud. Rév. II, 349; N. K. A. 2, V, 485; ibid 2, VI, 189. — Sacc. Syll. II, 255; Wint. Kr. Fl. II, 508. — Rameaux du *Berberis vulgaris*.

***Pleospora Pisi** (Sacc. Fuck. — N. K. A. 2, VI, 189. — Sphaeria Pisi Sow. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 63. — Tiges du *Pisum sativum*.

13. **Pleospora scirpicola** (D. C.) Karst. — Oud. Rév. II, 348. — Sacc. Syll. II, 265; Wint. Kr. Fl. II, 196. — Sphaeria scirpicola D. C. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 63. — F. et tiges du *Scirpus lacustris*.

15. **Pleospora vagans** a. **arenaria** Niessl. — Oud. Rév. II, 346; N. K. A. 2, VI, 288, et b. **pusilla** Sacc.; N. K. A. 3, I, 235 et 481; ibid. 3, III, 1092. — Sacc. Syll. II, 267; Wint. Kr. Fl. II, 495. — F. et chaumes de l'*Elymus arenarius*.

16. **Pleospora vulgaris** Niessl. a **monosticha** Sacc. Syll. II, 244. — Oud. N. K. A. 3, I, 482. — Tiges d'une Boraginée; b. **distichа** Sacc. ibid; Oud. ibid. — Pédoncules du *Plantago major*.

17. **Pleospora vulgatissima** Speg. — Oud. Rév. II, 353; N. K. A. 2, VI, 189 et 3, I, 482. — Sacc. Syll. II, 250. — Tiges du *Senecio Jacobaea*.

PYRENOPHORA.

1. **Pyrenophora pellita** (Fr.) Sacc. — Oud. Rév. II, 354. — Pleospora calvescens (Fr.) Tul.; Oud. Rév. II, 344. — Sphaeria pellita Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 61. — Tiges des espèces de *Papaver*.

2. **Pyrenophora relicina** (Fuck.) Sacc. Syll. II, 278. — Oud. N. K. A. 3, II, 711. — Chaumes du *Triticum vulgare*.

SCLEROPLEA.

1. **Scleroplea Cliviae** Oud. et van Hall. Zittingsversl. K. A. v. W., 30 Juin 1900; N. K. A. 3, II, 220. — Sacc. Syll. XVI, 548. — F. du Clivia nobilis cultivé.

××× MASSARIEAE.

1. Allantosporae.

ENCHNOA.

1. **Enchnoa infernalis** (Kunze et Fr.) Fuck. — Oud. Rév. II, 463; N. K. A. 3, I, 171. — Sacc. Syll. I, 89; Wint. Kr. Fl. II, 536. — Rameaux d'un *Populus balsamifera*.

2. Phaeodidymae.

MASSARIELLA.

1. **Massariella Curreyi** (Tul.) Sacc. Syll. I, 717; Wint. Kr. Fl. II, 539. — N. K. A. 2, VI, 33 et 185. — Oud. Rév. II, 274. — Rameaux du *Tilia cordata* (= parvifolia).

2. **Massariella Rhododendri** Oud. N. K. A. 2, V, 481 et Rév. II, 274; N. K. A. 2, VI, 185. — Sacc. Syll. IX, 740. — Rameaux d'un *Rhododendron* cultivé.

3. **Massariella Rosae** (Otth) Janczewsky Bull. Herb. Boissier. — Sacc. Syll. XI, 314. — Oud. Rév. II, 275. — Otthia Lisae Sacc. — N. K. A. 2, V, 481. — Ram. du *Berberis vulgaris*.

3. Hyalophragmiae.

MASSARINA.

1. **Massarina eburnea** (Tul.) Sacc. Syll. II, 153. — Oud. Rév. II, 323. — Massaria eburnea Tul. — Wint. Kr. Fl. II, 540. — Rameaux du *Betula alba*.

4. Phaeophragmiae.

MASSARIA.

1. **Massaria Berberidis** Oud. Rév. II, 285. — Sacc. Syll. XIV, 561. — Rameaux du *Berberis vulgaris*.

2. **Massaria Destreae** Oud. N. K. A. 2, V, 481 et Rév. II, 285. — Sacc. Syll. IX, 760. — Rameaux de l'*Acer Pseudo-Platanus*.

3. **Massaria Inquinans** (Tode) Fr. — Oud. Rév. II, 283. — N. K. A. 2, VI, 185. — Rameaux de l'*Acer campestris*.

4. **Massaria macrospora** (Desm.) Sacc. Syll. II, 10. — Oud. Rév. II, 285; N. K. A. 2, VI, 185. — Ecorce du *Betula alba*.

5. **Massaria Pupula** (Fr.) Tul. — Oud. Rév. II, 284; N. K. A. 3, I, 235. — Sacc. Syll. II, 2; Wint. Kr. Fl. II, 544. — Rameaux de l'*Acer Pseudo-Platanus*.

5. Phaeodictyae.

PLEOMASSARIA.

1. **Pleomassaria Ammophilae** Oud. N. K. A. 2, V, 288. — Sacc. Syll. XI, 311. — Tiges du *Psamma littoralis*.

2. **Pleomassaria Carpini** (Fuck.) Sacc. Syll. II, 240; Wint. Kr. Fl. II, 551. — Oud. Rév. II, 312; N. K. A. 2, VI, 185. — Rameaux du *Carpinus Betulus*.

3. **Pleomassaria holoschista** (B. Br.) Sacc. Syll. II, 239. — Oud. N. K. A. 2, V, 484; ibid. 2, VI, 185. — Rameaux de l'*Alnus glandulosa*.

4. **Pleomassaria Rosae** Oud. N. K. A. 2, VI. 35 et 185. — Rameaux d'un Rosier.

5. **Pleomassaria siparia** (B. Br.) Sacc. Syll. II, 239; Wint. Kr. Fl. II, 553. — Oud. Rév. II, 311; N. K. A. 2, V, 483; ibid. 2, VI, 185. — Rameaux du *Betula alba*.

KARSTENULA.

1. **Karstenula Philadelphi** Oud. N. K. A. 2, V, 484. — Sacc. Syll. IX, 873. — Rameaux du *Philadelphus coronarius*.

2. **Karstenula rhodostoma** (A. S.) Speg. — N. K. A. 3, II, 219 et 705. — Sacc. Syll. II, 240; Pleomassaria rhodostoma Wint. Kr. Fl. II, 552. — Rameaux du *Frangula Alnus* (Rhamnus Fr.).

6. Scolecosporae.

THERRYA.

1. **Therrya gallica** Sacc. et Penzig. — Oud. N. K. A. 2, VI, 289; Rév. II, 375. — Sacc. Syll. II, 358. — Branche de Pin.

×××× CLYPEOSPHAERIEAE.

1. Phaeosporae.

ANTHOSTOMELLA.

1. **Anthostomella Genistae** (Crouan) Sacc. Syll. I, 290. — Oud. Rév. II, 167; N. K. A. 2, VI, 190. — Rameaux du *Sarothamnus scoparius*.

2. **Anthostomella lugubris** (Rob. et Desm.) Sacc. Syll. I, 278; Wint. Kr. Fl. II, 558. — Oud. Rév. II, 167; N. K. A. 2, VI, 190. — Sphaeria lug. A. S.; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 65. — F. du *Psamma littoralis* (Ammophila arenaria).

2. Hyalodidymae.

APIOSPORA.

1. **Apiospora Rhododendri** Oud. N. K. A. 2, VI, 289; Rév. II, 218. — Sacc. Syll. XI, 301. — Rameaux d'un *Rhododendron* cultivé.

2. **Apiospora Rosae** Oud. Rév. II, 165; N. K. A. 3, I, 475. — Sacc. Syll. XIV, 534. — Rameaux du *Rosa canina*.

3. Hyalophragmiae.

HYPOSPILA.

1. **Hypospila bifrons** (D. C.) Fr. — Oud. Rév. II, 330; N. K. A. 2, VI, 192. — Sacc. Syll. II, 190; Wint. Kr. Fl. II, 565. — Sphaeria bifrons Kze u. Schm.; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 54. — F. du *Quercus Robur*.

2. **Hypospila Pustula** (P.) Karst. — Oud. Rév. II, 329; N. K. A. 2, VI, 32. — Sacc. Syll. II, 189; Wint. Kr. Fl. II, 564. — Phoma Pustula Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 92. — F. du *Quercus rubra*.

4. Phaeophragmiae.

CLYPEOSPHAERIA.

1. **Clypeosphaeria Notarisii** Fuck. — Oud. Rév. II, 303; N. K. A. 2, VI, 34 et 191. — Sacc. Syll. II, 90; Wint. Kr. Fl. II, 562. — Sphaeria clypeata N. K. A. 1, V, 344; Arch. Néerl. VIII, 407. — Rameaux des *Rubus* et tige de l'*Oenothera biennis*.

5. Scolecosporae.

LINOSPORA.

1. **Linospora Capreae** (D. C.) Fuck. — Oud. Rév. II, 373. — Sacc. Syll. II, 354; Wint. Kr. Fl. II, 567. — Sphaeria saligna Ehrh.; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 66. — F. du *Salix Caprea*.

2. **Linospora populina** (P.) Schröt. — Oud. Rév. II, 373; N. K. A. 2, VI, 184. — Spaeria centhocarpa Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 55. — F. du *Populus Tremula*.

××××× SPHAERIEAE.

1. Hyalosporae.

TRICHOSPHAERIA.

1. **Trichosphaeria pilosa** (P.) Fuck. — N. K. A. 3, II, 213. — Sacc. Syll. I, 452; Wint. Kr. Fl. II, 204. — Ecorce du *Pirus Malus*.

2. **Trichosphaeria superficialis** (Curr.) Sacc. Syll. I, 452. — Oud. Rév. II, 199; N. K. A. 2, V, 478 et 2, VI, 186. — Rameau décortiqué de l' *Acer campestris*.

2. Phaeosporae.

BOMBARDIA.

1. **Bombardia fasciculata** Fr. — Oud. Rév. II, 166; N. K. A. 2, VI, 187. — Sacc. Syll. I, 277; Wint. Kr. Fl. II, 235. — Sphaeria Bombarda Batsch. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 57. — Bois vermoulu d'arbres et de poteaux.

ROSELLINIA.

1. **Rosellinia aquila** (Fr.) de Not. — Oud. Rév. II, 164; N.

K. A. 2, VI, 186. — Sacc. Syll, I, 252; Wint. Kr. Fl. II, 224. — Sphaeria aquila Fr. — N. K. A. I, V, 343; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 55. — B. bissiseda (Tode) Sacc. Syll. I, 252. — Sphaeria byssiseda Tode. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 55. — Rameaux de plusieurs arbres.

2. **Rosellinia Castaneae** Oud. N. K. A. 3, II, 872. — F. du *Castanea vesca.*

3. **Rosellinia Clavariae** (Tul.) Wint. Kr. Fl. II, 230. — N. K. A. 3, II, 213. — Helminthosphaeria Clavariarum (Desm.) Sacc. Syll. I, 230. — Sur *Clavaria cristata.*

4. **Rosellinia ligniaria** (Grev.) Nke. — Oud. Rév. II, 165. — N. K. A. 2, VI, 186. — Sacc. Syll. I, 269; Wint. Kr. Fl. II, 230. — Rameaux du *Calluna vulgaris.*

5. **Rosellinia mammiformis** (P.) Ces. et de Not. — Oud. Rév. II, 165. — Wint. Kr. Fl. II, 226. — Ros. mastoidea Sacc. Syll. I, 258. — Sphaeria mammaeformis P. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, 56. — Bois vermoulu.

6. **Rosellinia pulveracea** (Ehrh.) Fuck. — Oud. N. K. A. 3, II, 712. — Sacc. Syll. I, 264; Winter Kr. Fl. II, 228. — Sphaeria pulveracea Ehrh. Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 58. — Bois ramolli de l'*Aesculus Hippocastanum.*

7. **Rosellinia sordaria** (Fr.) Rehm. — Oud. Rév. II, 165; N. K. A. 2, V, 168; ibid. 2, VI, 186. — Sacc. Syll. I, 270; Wint. Kr. Fl. II, 229. — Rameaux tombés du *Quercus Robur.*

8. **Rosellinia thelena** (Fr.) Anersw. — Oud. Rév. II, 164. — Sacc. Syll. I, 253; Wint. Kr. Fl. II, 225. — Rameaux tombés.

9. **Rosellinia velutina** Fuck. — Oud. N. K. A. 3, II, 713. — Sacc. Syll. I, 272; Wint. Kr. Fl. II, 232. — Bois ramolli de l'*Aesculus Hippocastanum.*

CHAETOMIUM.

1. **Chaetomium bostrychodes** Zopf. — Oud. Versl. en Meded. Kon. Ak. v. Wet. 2, XVIII, 378 et Rév. II, 150. — K. K. A. 2, IV, 266 et VI, 186. — Sacc. Syll. I, 224; Wint. Kr. Fl. II, 155. — Crottin de lapin.

2. **Chaetomium comatum** (Tode) Fr. — Oud. Rév. II, 148; N. K. A. 2, VI, 186. — Sacc. Syll. I, 221; Ch. elatum Kze. u. Schm. — T. N. G. XII, 273; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 39. — Wint. Kr. Fl. II, 157. — Brins de paille pourrissante.

***Chaetomium elatum** Kze. — T. N. G. XII, 273; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 39. — Voir: *Ch. comatum.*

*__Chaetomium fimeti__ Fuck. — N. K. A. 2, IV, 266. — Voir: *Chaetomidium*.

3. __Chaetomium Kunzeanum__ Zopf. — Oud. Rév. II, 149. — Wint. Kr. Fl. II, 156. — Ch. affine Cda. — N. K. A. 2, IV, 266. — Sacc. Syll. I, 223. — Ch. chartarum Ehrb. — Sacc. Syll. I, 223. — N. K. A. 2, IV, 266. — Papier pourrissant et rameaux tombés par terre.

4. __Chaetomium pannosum__ Wallr. — Oud, Rév. II, 150; N. K. A. 2, VI. 186. — Sacc. Syll. I, 221; Wint. Kr. Fl. II, 155. — Rameaux tombés.

5. __Chaetomium spirale__ Zopf. — Oud. Versl. en Meded. Kon. Ak. v. Wet. 2, XVIII, 378; Rév. II, 149; N. K. A. 2, IV, 266. — Sacc. Syll. I, 221; Wint. Kr. Fl. II, 154. — Crottin de lapin.

3. Hyalodidymae.

BERTIA.

1. __Bertia moriformis__ (Tode) de Not. — Oud. Rév. II, 232. — N. K. A. 2, VI, 188. — Sacc. Syll. I, 582; Wint. Kr. Fl. II, 237. — Sphaeria morif P. — T. N. G. XII, 271; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 57. — Bois vermoulu des saules.

MELANOPSAMMA.

1. __Melanopsamma pomiformis__ (P.) Sacc. Syll. I, 575; Wint. Kr. Fl. II, 238. — Oud. Rév. II, 231. — Sphaeria pomif. P. — N. K. A. 1, V, 343; Arch. Néerl. VIII, 405. — Bois pourri de l'*Alnus glutinosa*.

4. Phaeodidymae.

AMPHISPHAERIA.

1. __Amphisphaeria culmicola__ Sacc. Syll. I, 728. — Oud. Rév. II, 275; N. K. A. 2, VI, 188. — Chaumes de l'*Elymus arenarius*.

5. Hyalophragmiae.

ZIGNOËLLA.

1. __Zignoëlla fallax__ Sacc. Syll. II, 218. — Oud. N. K. A. 3, II, 717. — Bois du *Pirus Malus*.

2. __Zignoëlla Hederae__ Lamb. et Fautrey. — N. K. A. 3, II, 217. — Sacc. Syll. XI, 339. — Rameau décortiqué du *Hedera Helix*.

***Zignoëlla insculpta** (Fr.) Sacc. — Oud. Rév. II, 338; N. K. A. 2, VI, 187. — Voir le *Vialaea insculpta*.

3. **Zignoëlla ovoidea** (Fr.) Sacc. Syll. II, 214. — N. K. A. 3, II, 217. — Melanomma ovoidea Fuck. — Wint. Kr. Fl. II, 214. — Bois du *Fagus silvatica*.

4. **Zignoëlla Pulviscula** (Curr.) Sacc. Syll. II, 214. — Oud. Rév. II, 337; N. K. A. 2, VI, 187. — Melanomma pulviscului Wint. Kr. Fl. II, 244. — Rameaux tombés.

MELOMASTIA.

1. **Melomastia Friesii** Nke. — Oud. Rév. II, 336; N. K. A. 2, VI, 188. — Sphaeria mastoidea Fr. — T. N. G. XI, 394; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 58. — Sph. Lonicerae Sow. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 60. — Sph. fraxinicola Curr. — N. K. A. 2, II, 286. — Rameaux des *Salix*, *Populus*, et *Lonicera Periclymenum*.

LASIOSPHAERIA.

1. **Lasiosphaeria biformis** (P.) Sacc. Syll. II, 204; Wint. Kr. Fl. II, 213. — Oud. Rév. II, 335; Sphaeria biformis P. — N. K. A. 1, V, 343. — Dans un terrain sablonneux.

2. **Lasiosphaeria erinita** (P.) Sacc. Syll. II, 201. — Oud. Rév. II, 335. — Sphaeria erin. P. — N. K. A. 1, V, 343; Arch. Néerl. VIII, 405. — Leptospora erin. Fuck. — Wint. Kr. Fl. II, 218. — Bois pourrissant.

3. **Lasiosphaeria hirsuta** (Fr.) Ces. et de Not. — Oud. Rév. II, 332; N. K. A. 2, VI, 185. — Sacc. Syll. II, 191; Wint. Kr. Fl. II, 210. — Sphaeria hirs. Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 56. — Bois vermoulu.

4. **Lasiosphaeria hispida** (Tode) Fuck. — Oud. Rév. II, 332; N. K. A. 2, VI, 185. — Sacc. Syll. II, 194; Wint. Kr. Fl. II, 211. — Rameaux de l'*Alnus glutinosa*.

5. **Lasiosphaeria ovina** (P.) Ces. et de Not. — Oud. Rev. II, 334. — Sacc. Syll. II, 190. — Leptospora ovina Ces. et de Not; Wint. Kr. Fl. II, 215. — Sphaeria ovina P. — Prodr. Fl. Bat. II, p. 56. — Bois pourri.

6. **Lasiosphaeria spermoides** (Hoffm.) Ces. et de Not. — Oud. Rév. II, 333; N. K. A. 2, VI, 185. — Sacc. Syll. II, 198. — Sphaeria sperm. Hoffm. — Prodr. Fl. Bat. II. 4, p. 57. — Leptospora spermoides Fuck. — Wint. Kr. Fl. II, 214. — Bois pourrissant de *Quercus Robur* et d'une espèce de *Salix*.

HERPOTRICHIA.

1. **Herpotrichia Rubi** Fuck. — Oud. N. K. A. 3, II, 704. — Sacc. Syll. II, 212; Wint. Fr. Fl. II, 207. — Tiges pourrissantes du *Rubus idaeus*.

6. Phaeophragmiae.

MELANOMMA.

1. **Melanomma Aspegrenii** (Fr.) Fuck. — Oud. Rév. II, 306. — Sacc. Syll. II, 100; Wint. Kr. Fl. II, 241. — Sphaeria Aspegr. Fr. — N. K. A. 2. II. 186. — Rameaux tombés.

2. **Melanomma Epochnii** (B. Br.) Sacc. Syll. II, 100; Wint. Kr. Fl. II, 241. — Oud. Rév. II, 306; N. K. A. 2, VI. 187. — Sphaeria Fp. B. Br. — N. K. A. 2, II, 186; ibid. 2, VI, 187. — Sur des *Stereum* suramés.

3. **Melanomma Hippophaës** H. Fabre. — Oud. Rév. II, 306; N. K. A. 2, VI, 187; 3, I, 235 et 479. — Sacc. Syll. II, 108; Wint. Kr. Fl. II, 243. — Rameaux du *Hippophaë rhamnoïdes*.

4. **Melanomma Pulvis pyrius** (P.) Fuck. — Oud. Rév. II, 305; N. K. A. 2. VI. 187. — Sacc. Syll. II, 98; Wint. Kr. Fl. II, 240. — Sphaeria P. p. (P.). — T. N. G. XI, 394; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 57. — Bois vermoulu.

5. **Melanomma Rhododendri** Rehm. — Oud. Rév. II, 307; N. K. A. 2, VI, 187. — Sacc. Syll. II, 109; Wint. Kr. Fl. II, 242. — Rameaux du *Rhododendron ponticum* cultivé.

TREMATOSPHAERIA.

1. **Trematosphaeria applanata** (Oud.) Sacc. Syll. II, 120. — Sphaeria applanata Oud. N. K. A. 2, II, 186. — Sph. operculata Alb. Schwein. T. N. G. XI, 394, Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 59. — Amphisphaeria applanata (Fr.) Wint. Kr. Fl. II, 266. — Bois pourri.

2. **Trematosphaeria hendersonioides** Oud. N. K. A. 2. V. 483; Rév. II, 308. — Sacc. Syll. IX, 811. — Bois vermoulu.

3. **Trematosphaeria melina** (B. Br.) Sacc. Syll. II, 118; Wint. Kr. Fl. II, 271. — Oud. N. K. A. 3, II, 714. — Rameaux du *Fraxinus excelsior*.

4. **Trematosphaeria pertusa** (P.) Fuck. — Oud. Rév. II, 308; N. K. A. 2, VI. 187. — Sacc. Syll. II, 115; Wint. Kr. Fl. II, 269. — Sphaeria pertusa P. — T. N. G. XI, 394. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 58. — Bois pourri.

CHAETOSPHAERIA.

1. **Chaetosphaeria callimorpha** (Mont.) Sacc. Syll. II, 95; Wint. Kr. Fl. II, 219. — Oud. Rév. II, 304; N. K. A. 2, V, 482; ibid. 2, VI, 186. — Tiges du *Rubus idaeus*.

7. Phaeodictyae.

TEICHOSPORA.

1. **Teichospora obducens** (Fr.) Fuck. — Oud. Rév. II, 355; N. K. A. 2, VI, 188. — Sacc. Syll. II, 295. — Sphaeria obducens. Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 57. — Strickeria obducens Wint. Kr. Fl. II, 285. — Rameaux décortiqués du *Rubus idaeus*.

PLEOSPHAERIA.

1. **Pleosphaeria hispidula** (Lamb.) Sacc. Syll. II, 306; N. K. A. 3, II, 711. — Bois ramolli d'un *Populus*.

×××××× SORDARIEAE.

1. Phaeosporae.

SORDARIA.

1. **Sordaria anserina** (Rab.) Wint. — Oud. Rév. II, 155; id. Versl. Med. Kon. Ak. v, Wet. 2, XVIII, 384; N. K. A. 2, IV, 268. — Sacc. Syll. I, 238. — Podospora anserina Wint. Kr. Fl. II, 173. — Crottin de lapin.

2. **Sordaria Brassicae** (Kl.) Oud. Rév. II, 154. — Sphaeria Br. N. K. A. 2, I, 264 et Arch. Néerl. VIII, 405. — Sord. lanuginosa Sacc. Syll. I, 237. — Podospora Br. Wint. Kr. Fl. II, 171. — Tronçons de choux.

3. **Sordaria coprophila** (Fr.) Ces. et de Not. — Oud. Rév. II, 151; id. Versl. Med. Kon. Ak. v. Wet. 2, XVIII, 383; id. N. K. A. 2, IV, 267; ibid. 2, VI, 182. — Sacc. Syll I, 230. — Podospora coprophila Wint. Kr. Fl. II, 172. — Bouse de vache.

4. **Sordaria curvula** de Bary. — Oud. Rév. II, 152; id. Versl. Med. Kon. Ak. v. Wet. 2, XVIII, 384; id. N. K. A. 2, IV. 267; ibid. 2, VI, 182. — Sacc. Syll. I, 233. — Podospora curvula Wint. Kr. Fl. II, 174. — Sur le crottin de divers herbivores.

5. **Sordaria decipiens** Wint. — Sacc. Syll. I, 235. — Oud. Rév. II, 153; id. Versl. Meded. Kon. Ak. v. Wet. 2, XVIII,

384; id. N. K. A. 2, IV, 267; ibid. 2, VI, 182. — Podospora dec. Wint. Kr. Fl. 173. — Crottin de lapin.

Sordaria discospora Auersw. — N. K. A. 2, II, 187. — Voir: *Hypocopra*.

6. **Sordaria fimiseda** Ces. et de Not. — Oud. Rév. II, 152, id. Versl. Meded. Kon. Ak. v. Wet. 2, XVIII, 384; N. K. A. 2, IV, 267; ibid. 2, VI, 182. — Sacc. Syll. I, 232. — Podospora fim. Ces.; Wint. Kr. Fl. II, 170. — Crottin de lapin.

7. **Sordaria lignicola** Fuck. — N. K. A. 3, II, 213. Sacc. Syll. I, 236. — Podospora lignicola Wint. Kr. II, 172. — Bois. ramolli.

8. **Sordaria minuta** Fuck. — Oud. Rév. II, 152; Versl. Meded. Kon. Ak. v. Wet. 2, XVIII, 383; N. K. A. 2, IV, 267; ibid. 2, VI, 182. — Sacc. Syll. I, 231. — Podospora minuta Wint. Kr. Fl. II, 174. — Crottin de lapin.

HYPOCOPRA.

1. **Hypocopra bombardoides** (Auersw.) Sacc. Syll. I, 243. — Oud. Rév. II, 158; Versl. Meded. Kon. Ak. v. Wet. 2, XVIII; 385; N. K. A. 2, IV, 270. — Sordaria bomb. Wint. Kr. Fl. II, 168. — Crottin de lapin.

2. **Hypocopra discospora** (Auersw.) Fuck. — Oud. Rév. II, 156; Versl. Meded. Kon. Ak. v. Wet. 2, XVIII, 385; N. K. A. 2, II, 187 et 2, IV, 269; ibid. 2, VI, 182. — Sacc. Syll. I, 240. — Sordaria discospora Wint. Kr. Fl. II, 167. — Sphaeria stercoraria Prodr. Fl. Bat. II, 1, p. 56. — Bouse de vache.

3. **Hypocopra fimicola** (Rob.) Sacc. Syll. I, 240. — Oud. Rév. II, 156; Versl. Meded. Kon. Ak. v. Wet. 2, XVIII, 284; N. K. A. 2, IV, 268; ibid. 2, VI, 182. — Sordaria fim. Ces. et de Not. — Wint. Kr. Fl. II, 166. — Crottin de cheval et de chèvre.

4. **Hypocopra humana** Fuck. — Oud. N. K. A. 2, IV, 268. — Sacc. Syll. I, 240. — Sordaria humana Wint. Kr. Fl. II, 166. — Excréments d'homme.

5. **Hypocopra Karstenii** Oud. N. K. A. 2, IV, 271; id. Rév. II, 159. — Crottin de lapin.

6. **Hypocopra macrospora** (Auersw.) Sacc. Syll. I, 241. — Oud. Rév. II, 157; Versl. Meded. Kon. Ak. v. W. 2, XVIII, 385; N. K. A. 2, IV, 269; ibid. 2, VI, 183. — Sordaria macrospora Anersw. — Wint. Kr. Fl. II, 165. — Crottin de lapin.

7. **Hypocopra maxima** (Niessl.) Sacc. Syll. I, 245. — Oud. Rév. II, 160; Versl. Meded. Kon. Ak. v. Wet. 2, XVIII, 386; N.

K. A. 2, IV, 270; ibid. 2, VI, 183. — Sordaria maxima Wint. Kr. Fl. II, 169. — Crottin de lapin.

8. **Hypocopra microspora** (Plowr.) Sacc. Syll. I, 241. — Oud. Rév. II, 157; Vers. Meded. Kon. Ak. v. Wet. 2, XVIII, 385; N. K. A. 2, IV, 269; ibid. 2, VI, 182. — Crottin de lapin.

9. **Hypocopra minima** (Sacc. et Speg.) Sacc. Syll. I, 244. — Oud. Rév. II, 158; Versl. Meded. Kon. Ak. v. Wet. 2, XVIII, 335; N. K. A. 2, IV, 270; ibid. 2, VI, 183. — Crottin de lapin.

10. **Hypocopra papyricola** (Wint.) Sacc. Syll. I, 245. — Oud. Rév. II, 160; Versl. Meded. Kon. Ak. v. Wet. 2, XVIII, 386; N. K. A. 2, IV, 271. — Sordaria papyricola Wint. Kr. Fl. II, 166. — Papier trempé d'un extrait de fiente.

11. **Hypocopra platyspora** (Plowr.) Sacc. Syll. I, 241. — Oud. Rév. II, 157; Versl. Meded. Kon. Ak. v. Wet. 2, XVIII, 385; N. K. A. 2, IV, 269; ibid. 2, VI, 182. — Crottin de lapin.

12. **Hypocopra Serignanensis** Fabre. — Oud. Rév. II, 159; Versl. Meded. Kon. Ak. v. Wet. 2, XVIII, 386; N. K. A. 2, IV, 270. — Sacc. Syll. I, 244. — Crottin de lapin.

13. **Hypocopra stercoraria** (Sow.) Sacc. Syll. I, 244. — Oud. Rév. II, 159; Versl. Med. Kon. Ak. v. Wetens. 2, XVIII, 385; N. K. A. 2, IV, 270. — Sphaeria sterc. Sow. — T. N. G. XI, 394; Prodr. Fl. Batt. II, 4, p. 56. — Bouse de vache et crottin de lapin.

14. **Hypocopra Winterii** Oud. Hedw. 1882, p. 160; Versl. Meded. Kon. Ak. v. Wet. 2, XVIII, 384; Rév. II, 156; N. K. A. 2, IV, 268. — Sordaria Winterii Oud. Hedw. 1882, p. 123. — Sacc. Syll. IX, 490. — Crottin de chameau.

COPROLEPA.

1. **Coprolepa equorum** (Fuck.) Fuck. — Oud. Rév. II, 161, Versl. Meded. Kon. Ak. v. Wet. 2, XVIII, 386; N. K. A. 2, 271. — Sacc. Syll. I, 249. — Hypocopra equorum Wint. Kr. Fl. II, 178. — Crottin de cheval.

2. **Coprolepa merdaria** (Fr.) Fuck. — Oud. Rév. II, 161; Versl. Meded. Kon. Ak. v. Wet. 2, XVIII, 386; N. K. A. 2, IV, 271; ibid. 2, VI, 182. — Sacc. Syll. I, 248. — Hypocopra merdaria Fr. — Wint. Kr. Fl. II. 178. — Crottin de lapin.

3. **Coprolepa Saccardoi** Oud. Hedw. 1882, p. 161; Rév. II, 162; Versl. Meded. Kon. Ak. v. Wet. 2, XVIII, 386, N. K. A. 2, IV, 271. — Sacc. Syll. IX, 493. — Crottin de lapin.

PHILOCOPRA.

1. **Philocopra dubia** (Hansen) Sacc. Syll. I, 251; Oud. Rév. II, 163; N. K. A. 2, IV, 272; ibid. 2, VI, 183. — Crottin de lapin.

2. **Philocopra Hansenii** Oud. Hedw. 1882, p. 160. — Rév. II, 162; Versl. Meded. Kon. Ak. v. Wet. 2, XVIII, 387; N. K. A. 2, IV, 272. — Sacc. Syll. IX, 494. — Sordaria Hansenii Oud. Hedw. 1882, p. 123. — Crottin de lapin.

3. **Philocopra pleiospora** (Wint.) Sacc. Syll. I, 249. — Oud. Rév. II, 162; N. K. A. 2, IV, 272; ibid. 2, VI, 183. — Crottin de lapin.

2. Phaeodidymae.

DELITSCHIA.

***Delitschia Auerswaldi** Fuck. — N. K. A. 2, IV, 272 et VI, 183. — Voir: *D. didyma.*

1. **Delitschia bisporula** (Cronan) Hansen. — Oud. Rév. II, 277; Versl. Meded. Kon. Ak. v. Wet. 2, XVIII, 387; N. K. A. 2; IV, 272. — Sacc. Syll. I, 732; Wint. Kr. Fl. II, 163. — Crottin de lapin.

2. **Delitschia didyma** Auersw. — Oud. Rév. II, 276; Versl. Meded. Kon. Ak. v. Wet. 2, XVIII, 387; N. K. A. 2, IV, 272; ibid. 2, VI, 183; Sacc. Syll. I, 732; Wint. Kr. Fl. II, 179. — Crottin de lapin.

3. **Delitschia leptospora** Oud. Hedw. XXI (1882) 163; Rév. II, 278; Versl. Meded. Kon. Ak. v. Wet. 2, XVIII, 387; N. K. A. 2, IV, 273; ibid. 2, VI, 183. — Sacc. Syll. II, Addit. ad Vol. I, p. LIII et Syll. IX, 749. — Crottin de lapin.

4. **Delitschia microspora** Oud. Hedw. XXI (1882), 165; Rév. II, 278; Versl. Meded. Kon. Ak. v. Wet. 2, XVIII; N. K. A. 2, IV, 273; ibid. 2, VI, 183. — Crottin de Chèvre.

5. **Delitschia Niesslii** Oud. Hedw. XXI (1882), 163; Rév. II, 278; Versl. Meded. Kon. Ak. v. Wet. 2, XVIII, 388; N. K. A. 2, IV, 273. — Sacc. Syll. IX, 748. — Crottin de lapin.

6. **Delitschia Winterii** (Plowr.) Sacc. Syll. I, 734. — Oud. Rév. II, 277; Versl. Meded. Kon. Ak. v. Wet. 2, XVIII, 734; N. K. A. 2, IV, 273; ibid. 2, VI, 183. — Crottin de lapin.

3. Phaeophragmiae.

SPORORMIA.

1. **Sporormia ambigua** Niessl. — Oud. Rév. II, 310; Versl. Meded. Kon. Ak. v. Wet. 2, XVIII, 390; N. K. A. 2, IV, 275. —

Sacc. Syll. II, 125. — Wint. Kr. Fl. II, 182. — Crottin de lapin.

2. **Sporormia gigantea** Hansen — Oud. Rév. II, 312; N. K. A. 2, IV, 276; ibid. 2, VI, 183. — Sacc. Syll. II, 127. — Wint. Kr. Fl. II, 183. — Crottin de lapin.

3. **Sporormia intermedia** Auersw. — Oud. Rév. II, 311; Versl. Meded. Kon. Ak. v. Wet. 2, XVIII, 390; N. K. A. 2, IV, 275; ibid. 2, VI, 183. — Sacc. Syll. II, 126. — Wint. Kr. Fl. II, 182. — Crottin de plusieurs herbivores.

4. **Sporormia lageniformis** Fuck. — Oud. Rév. II, 310; Versl. Meded. Kon. Ak. v. Wet. 2, XVIII, 390; N. K. A. 2, IV, 276. — Sacc. Syll. II, 125; Wint. Kr. Fl. II, 182. — Crottin de cheval.

5. **Sporormia leptosphaerioides** Speg. — Oud. Rév. II, 312; N. K. A. 2, IV, 276. — Sacc. Syll. II, 128. — Crottin de lapin.

6. **Sporormia megalospora** Auersw. — Oud. Rév. II, 311; Versl. Meded. Kon. Ak. v. Wet. 2, XVIII, 390; N. K. A. 2, IV, 276; idid. 2, VI, 178. — Sacc. Syll. II, 126. — Wint. Kr. Fl. II, 182. — Crottin de lapin.

7. **Sporormia minima** Auersw. — Oud. Rév. II, 309; Versl. Meded. Kon. Ak. v. Wet. 2, XVIII, 390; N. K. A. 2, IV, 275; ibid. 2, VI, 183. — Sacc. Syll. II, 124. — Wint. Kr. Fl. II, 181. — Crottin de lapin.

8. **Sporormia pentamera** Oud. N. K. A. 2, IV, 276; Rév. II, 212. — Sacc. Syll. IX, 818. — Crottin de lapin.

9. **Sporormia pulchra** Hansen. — Oud. Rév. II, 313; Versl. Meded. Kon. Ak. v. Wet. 2, XVIII, 390; N. K. A. 2, IV, 276. — Sacc. Syll. II, 131. — Crottin de lapin.

10. **Sporormia variabilis** Wint. Kr. Fl. II, 184. — Sacc. Syll. II, 129. — Oud. Rév. II, 313; Versl. Meded. Kon. Ak. v. Wet. 2, XVIII, 390; N. K. A. 2, IV, 276 et 2, VI, 183. — Crottin de lapin.

××××××× CUCURBITARIEAE.

1. Allantosporae.

COELOSPHAERIA.

***Coelosphaeria cupularis.** — Voir: *Nitschkia.*

NITSCHKIA.

1. **Nitschkia cupularis** (P.) Karst. — Oud. Rév. II, 116. — Wint. Kr. Fl. II, 311. — Spaeria cup. Prodr. Fl. Bat. II, 4,

p. 52. — Coelosphaeria cup. Sacc. Syll. I, 91. — Rameaux de l'*Ulmus campestris*.

2. **Nitschkia tristis** (P.) Fuck. — Oud. Rév. II, 117. — Wint. Kr. Fl. II, 312. — Sphaeria tristis P. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 55. — Sphaeria cupularis Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 50 (objets appartenant aux rameaux de Sambucus). — Coelosphaeria tristis Sacc. Syll. I, 92. — Branches du Sambucus nigra et bois de l'*Acer Pseudo-Platanus*.

2. Hyalosporae.

BOTRYOSPHAERIA.

1. **Botryosphaeria Dothidea** (Mougeot) Ces. et de Not. — Oud. Rév. II, 200. — Sacc. Syll. I, 160. — Wint. Kr. Fl. II, 801. — Sphaeria Dothidea (Moug.) Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p, 52; N. K. A. I, V, 314. — Rameaux du *Robinia Pseudo-Acacia*, du *Fraxinus excelsior* et d'une espèce de *Rosa*.

3. Hyalodidymae.

LIZONIA.

1. **Lizonia halophila** Sacc. Bomm. Rouss. — Sacc. Syll. IX, 680. — N. K. A. 3, I, 235 et 177. — F. desséchées de l'*Immadenia* (Honckenya) *peploides*.

4. Phaeodidymae.

OTTHIA.

1. **Otthia Crataegi** Fuck. — Oud. Rév. II, 279; N. K. A. 2, VI, 174. — Sacc. Syll. I, 735. — Wint. Kr. Fl. II, 313. — R. du *Crataegus monogyna*.

Otthia Lisae Sacc. — N. K. A. V, 181 et 2, VI, 175. — Voir: *Massarietta Rosae*.

2. **Otthia populina** (P.) Fuck. — Oud. Rév. II, 279; N. K. A. 2, VI, 174. — Sacc. Syll. I, 736. — Wint. Kr. Fl. II, 315. — Rameaux d'une espèce de *Populus*.

3. **Otthia Syringae** (Fr.) Niessl. — Oud. Rév. II, 280. — Sacc. Syll. I, 737. — Sphaeria Syr. Fr. — N. K. A. 1, I, 51; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 60. — Rameaux du *Syringa vulgaris*.

5. Phaeodictyae.

CUCURBITARIA.

1. **Cucurbitaria Berberidis** (P.) Gray. — Oud. Rév. II, 356; N. K. A. 2, VI, 174. — Sacc. Syll. II, 308. — Wint. Kr. Fl. II, 319. — Sphaeria Berb. P. — N. K. A. 1, I, 51; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 51. Rameaux du *Berberis vulgaris.*

2. **Cucurbitaria Destreae** Oud. N. K. A. 2, VI, 288; Rév. II, 361. — Sacc. Syll. XI, 318. — Rameaux d'un *Rhododendron* cultivé.

3. **Cucurbitaria elongata** (Fr.) Grev. — Oud. Rév. II, 358; N. K. A. 2, VI, 174; ibid. 3, I, 235. — Sacc. Syll. II, 309. — Wint. Kr. Fl. II, 322. — Sphaeria el. Fr. — N. K. A. 1, V, 344; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 52. — Rameaux du *Robinia Pseudo-Acacia.*

4. **Cucurbitaria Evonymi** Cooke. — Oud. Rév. II, 360; N. K. A. 2, VI, 174. — Sacc. Syll. II, 320. — Wint. Kr. Fl. II, 323. — Rameaux de l'*Evonymus europaea.*

5. **Cucurbitaria Laburni** (P.) Ces. et de Not. — Oud. Rév. II, 357; N. K. A. 2, VI, 174. — Sacc. Syll. II, 308. — Wint. Kr. Fl. II, 320. — Sphaeria Laburni P. — T. N. G. XII, 271; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 51. — Rameaux du *Cytisus Laburnum.*

***Cucurbitaria macrospora** Desm. N. K. A. 2, I, 183. — Arch. Néerl. VIII, 404. — Voir: *Massaria.*

6. **Cucurbitaria occultata** Oud. Arch. Néerl. I, VIII, 104; id. Rév. II, 360. — Sacc. Syll. II, 317. — C. rugosa (Wallr.) Oud. N. K. A. 2, I, 183. — Rameaux du *Syringa vulgaris.*

7. **Cucurbitaria Rhamni** (Nees) Fr. — N. K. A. 3, II, 219 et 690. — Sacc. Syll. II, 315. — Wint. Kr. Fl. II, 325. — Rameaux du *Frangula Alnus* (Rh. Frangula).

***Cucurbitaria rugosa** Wallr. — N. K. A. 2, I, 183. — Voir: *C. occultata.*

8. **Cucurbitaria salicina** Fuck. — Oud. Rév. II, 360; N. K. A. 2, VI, 174. — Sacc. Syll. II, 320. — Wint. Kr. Fl. II, 327. — Rameaux d'une espèce de *Salix.*

9. **Cucurbitaria Sorbi** Karst. — Oud. Rév. II, 359; N. K. A. 3, I, 235 et 482. — Sacc. Syll. II, 314. — Rameaux du *Pirus (Sorbus) aucuparia.*

10. **Cucurbitaria Spartii** (Nees) Ces. et de Not. — Oud. Rév. II, 359; N. K. A. 2, VI, 174. — Sacc. Syll. II, 312. — Wint. Kr. Fl. II, 323. — Sphaeria Spartii Nees. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 52. — Rameaux du *Sarothamnus scoparius.*

†[16] Ceratostomaceae.

1. Hyalosporae.

CERATOSTOMELLA.

1. **Ceratostomella cirrhosa** (P.) Sacc. Syll. I, 408. — Wint. Kr. Fl. II, 250. — Oud. Rév. II, 191; N. K. A. 2, VI, 183. — Sphaeria cirrhosa P. — N. K. A. 1, V, 344; Arch. Néerl. VIII, 406. — Bois de Pin vermoulu.

2. **Ceratostomella rostrata** (Fr.) Sacc. Syll. I, 408. — Sphaeria rostrata Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 59. — Ram. pourrissants de Hêtre et de Boulean.

3. **Ceratostomella subpilosa** (Fuck.) Sacc. Syll. I, 411. — Wint. Kr. Fl. II, 251. — Oud. N. K. A. 3, II, 689. — Morceau de bois de Saule pourri.

GNOMONIELLA.

1. **Gnomoniella amoena** (Nees) Sacc. Syll. I, 414. — Oud. Rév. II, 192; N. K. A. 2, VI, 184. — Gnomonia amoena Ces et de Not. — Wint. Kr. Fl. II, 578. — Pétioles de l'*Aesculus Hippocastanum*.

2. **Gnomoniella devexa** (Desm.) Sacc. Syll. I, 417. — Oud. Rév. II, 193; N. K. A. 2, VI, 184. — Gnomonia devexa Auersw. — Wint. Kr. Fl. II, 581. — Tiges pourrissantes d'une espèce de *Polygonum*.

3. **Gnomoniella Euphorbiae** (Fuck.) Sacc. Syll. I, 418. — Oud. Rév. II, 194. — Sphaeria (Plagiostoma) Euphorbiae Oud. N. K. A. 2, II, 103. — Plagiostoma Euphorbiae Fuck. in Oud. Fgi. Neerl. exs. n° 81. — Gnomonia Euph. Wint. Kr. Fl. II, 585. — Tiges desséchées du l'*Tithymalus palustor* (Euph. pal.).

4. **Gnomoniella fasciculata** (Fuck.) Sacc. Syll. I, 415. — Oud. N. K. A. 3, II, 703. — Gnomonia fasciculata Fuck. — Wint. Kr. Fl. II, 578. — F. pourrissantes du *Quercus Robur*.

5. **Gnomoniella fimbriata** (P.) Sacc. Syll. I, 419. — Oud. Rév. II, 194; N. K. A. 2, VI, 184. — Mamiania fimbr. Ces. et de Not. — Wint. Kr. Fl. II, 669. — Dothidea fimbriata Kickx. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 71. — Feuilles du *Carpinus Betulus*.

6. **Gnomoniella melanostyla** (D. C.) Sacc. Syll. I, 419. — Oud. N. K. A. 3, II, 704. — Cryptoderis melanostyla Wint. Kr. Fl. II, 592. — F. du *Tilia cordata* (= T. parvif.).

7. **Gnomoniella tubiformis** (Tode) Sacc. Syll. I, 413. — Oud.

Rév. II, 191; N. K. A. 2, VI, 184. — Gnomonia tub. Auersw. — Wint. Kr. Fl. II, 577. — Sphaeria tubaeformis Tode. — T. N. G. XI, 395; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 66. — F. de l'*Alnus glutinosa*.

8. **Gnomoniella vulgaris** (Ces. et de Not.) Sacc. Syll. I, 116. — Oud. Rév. II, 193. — Gnomonia vulgaris Ces. et de Not. — Wint. Kr. Fl. II, 583. — Sphaeria Gnomon Tode. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 66. — F. du *Corylus Avellana*.

2. Phaeosporae.

CERATOSTOMA.

1. **Ceratostoma piliferum** (Fr.) Fuck. — Oud. Rév. II, 148; id. Versl. Meded. Kon. Ak. v. Wet. 2, XVIII, 383; N. K. A. 2, IV, 266. — Sacc. Syll. I, 219. — Ceratostomella pilifera Wint. Kr. Fl. II, 252. — Sphaeria dryina Buse N. K. A. 1, V, 344; Arch. Néerl. VIII, 106. — Bois de Pin ramolli.

3. Hyalodidymae.

GNOMONIA.

1. **Gnomonia Aesculi** Oud. N. K. A. 3, II, 703. — Pétioles de l'*Aesculus rubicunda*.

2. **Gnomonia Cerastis** (Riess) Ces. et de Not. — Oud. Rév. II, 228. — Sacc. Syll. I, 569. — Wint. Kr. Fl. I, 583. — Sphaeria setacea a. petiolicola Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 66. — Pétioles de l'*Acer Pseudo-Platanus* et de l'*Aesculus Hippocastanum*.

3. **Gnomonia curvirostra** (Sow.) Sacc. Syll. I, 570. — Oud. Rév. II, 229; N. K. A. 2, VI, 184. — Sphaeria curv. Fr. — N. K. A. 2, III, 257. — Tiges desséchées du *Silphium perfoliatum*.

4. **Gnomonia errabunda** (Rob. et Desm.) Auersw. — Oud. N. K. A. 3, II, 703. — Sacc. Syll. I, 568. — Wint. Kr. Fl. II, 587. — F. du *Fagus silvatica*.

5. **Gnomonia erythrostoma** (P.) Auersw. — Oud. Rév. II, 227; id. Versl. Meded. Kon. Ak. v. Wet. 2, XVII, 383; id. N. K. A. 2, IV, 272. — Sacc. Syll. I, 566. — Wint. Kr. Fl. II, 586. — F. du *Prunus avium*.

***Gnomonia Rubi** Wint. — N. K. A. 2, VI, 286. — Voir: *Gn. tetraspora*.

6. **Gnomonia setacea** (P.) Ces. et de Not. — Oud. Rév. II, 227; N. K. A. 2, VI, 184. — Sacc. Syll. I, 563. — Wint. Kr. Fl. II, 582. — Sphaeria setacea Fr. — N. K. A. 1, V, 344; Prodr. Fl.

Bat. II, 4, p. 66. — F. et pétioles des *Quercus*, *Castanea* et *Acer*.

7. **Gnomonia tetraspora** Wint. var. Rubi Rehm. — Oud. Rév. II, 226. — Sacc. Syll. I, 562. — Gn. Rubi Wint. Kr. Fl. I, 586. — Oud. N. K. A. 2, VI, 286. — Tiges d'une espèce de *Rubus*.

***Gnomonia tubiformis** Auersw. — N. K. A. 2, V, 595. — Voir: *Gnomoniella*.

4. Hyalophragmeae.

CERATOSPHAERIA.

1. **Ceratosphaeria lampadophora** (B. Br.) Niessl. — N. K. A. 3, II, 216. — Sacc. Syll. II, 227. — Wint. Kr. Fl. II, 258. — Rameaux du *Corylus Avellana*.

5. Scolecosporae.

RHAPHIDOSPORA.

Rhaphidospora erythrospora Riess. — N. K. A. 2, I, 265. — Voir: *Ophiobolus*.

***Rhaphidophora acuminata** (Sow.) de Not. — Voir: Ophiobolus.

OPHIOBOLUS.

1. **Ophiobolus acuminatus** (Sow.) Duby. — Oud. Rév. II, 369; N. K. A. 2, VI, 184. — Sacc. Syll. II, 340. — Wint. Kr. Fl. II, 527. — Sphaeria Carduorum Wallr. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 64. — Rhaphidospora acuminata (Sow.) de Not. — Oud. Fgi Neerl. exs. n° 277. — Tiges d'un *Carduus*.

2. **Ophiobolus arenarius** Bomm. Rouss. Sacc. — Oud. N. K. A. 3, I, 236 et 483. — Sacc. Syll. IX, 935. — Chaumes du *Psamma littoralis*.

3. **Ophiobolus Cirsii** (Karst.) Sacc. Syll. II, 341. — Oud. Rév. II, 370; N. K. A. 2, VI, 37 et 184. — Tiges d'un *Cirsium*.

4. **Ophiobolus clavisporus** Pass. — Oud. N. K. A. 3, II, 709. — Sacc. Syll. IX, 925. — Tiges d'une espèce de *Carduus*.

5. **Ophiobolus Eryngii** (Oud.) Sacc. Syll. II, 345. — Oud. Rév. II, 371. — Sphaeria (Rhaphidophora) Er. N. K. A. 2, III, 257; Sph. Er. a. petiolicola West. in Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 67. — F. de l'*Eryngium maritimum*.

6. **Ophiobolus erythrosporus** (Riess) Wint. — Oud. Rév. II, 368. — Wint. Kr. Fl. II, 525. — Rhaphidospora erythrospora Oud. N. K. A. 2, I, 265; Sphaeria erythrospora Riess Arch. Néerl.

VIII, 407. — Ophiobolus Urticae Sacc. Syll. II, 338. — Tiges d'un *Urtica*.

7. **Ophiobolus cusporus** Sacc. Syll. II, 344. — Oud. N. K. A. 3, II, 709. — Tiges de l'*Origanum vulgare*.

8. **Ophiobolus Galii veri** Fautrey. — N. K. A. 3, II, 710. — Sacc. Syll. XI, 351. — Tiges d'une espèce de *Galium*.

9. **Ophiobolus graminis** (Sacc.) Sacc. Syll. II, 349. — Wint. Kr. Fl. II, 523. — Oud. Rév. II, 371; N. K. A. 2, VI, 185. — Chaumes du *Psamma littoralis*.

10. **Ophiobolus herpotrichus** (Fr.) Sacc. Syll. II, 352; Wint. Kr. Fl. II, 524. — Oud. N. K. A. 3, II, 710. — Gaînes du *Triticum vulgare*.

11. **Ophiobolus Jacobaeae** Oud. N. L. A. 2, VI, 36 et 184. — id. Rév. II, 370. — Sacc. Syll. IX, 924. — Tiges du *Senecio Jacobaeae*.

12. **Ophiobolus littoralis** (Crouan) Sacc. Syll. II, 349. — Oud. Rév. II, 372; N. K. A. 2, VI, 185. — Chaumes du *Psamma littoralis*.

13. **Ophiobolus porphyrogonus** (Tode) Sacc. Syll. II, 338. — Wint. Kr. Fl. II, 525. — Oud. Rév. II, 367; N. K. A. 2, VI, 184. — Sphaeria rubella P. — T. N. G. XI, 394; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 61. — Tiges des *Urtica dioica*, *Symphytum off.*, *Senecio Jacobaea*, *Solanum tuberosum*.

14. **Ophiobolus tenellus** (Auersw.) Sacc. Syll. II, 346. — Wint. Kr. Fl. II, 540. — Oud. Rév. II, 371; N. K. A. 3, I, 236 et 483. — Tiges desséchées de l'*Anchusa officinalis*.

***Ophiobolus Urticae** Sacc. — N. K. A. 2, VI, 184. — Voir: *O. erythrosporus*.

15. **Ophiobolus vulgaris** (Sacc.) Sacc. Syll. II, 338. — Oud. N. K. A. 3, I, 483. — Tiges du *Galeopsis Tetrahit*.

†[17] Xylariaceae.

1. Phaeosporae.

HYPOXYLON.

***Hypoxylon argillaceum** (P.) Fr., mentionné dans le T. N. G. XI, 393 et le Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 43, doit être transporté vers l'*H. fuscum*..

1. **Hypoxylon coccineum** (Bull.) de Not. — Oud. Rév. II, 179; N. K. A. 2, VI, 180. — Sacc. Syll. I, 353. — Wint. Kr. Fl. II,

865. — Sphaeria fragiformis P. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 42. — Rameaux et branches du *Fagus silvatica*.

***Hypoxylon cohaerens** (P.) Fr. — T. N. G. XI, 393. — Oud. Rév. II, 182. — Voir: *H. multiforme*.

2. **Hypoxylon fuscum** (P.) Fr. — Oud. Rév. II, 181; N. K. A. 2, VI, 180. — Sacc. Syll. I, 361. — Wint. Kr. Fl. II, 861. — Sphaeria fusca P. — T. N. G. XI, 393; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 43. — Sph. argillacea Fr. — T. N. G. XI, 393; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 43.

Rameaux et branches des *Alnus glutinosa*, *Fagus silvatica* et *Corylus Avellana*.

3. **Hypoxylon multiforme** Fr. — Oud. Rév. II, 183; N. K. A. 1, V, 342; 2, VI, 180. — Sacc. Syll. I, 363. — Wint. Kr. Fl. II, 857. — Sphaeria multiformis Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 43. — Sphaeria granulosa P. Prodr. Fl. Bat. II, 4, 43. — Hypoxylon cohaerens Oud. Rév. II, 182. — Sphaeria cohaerens T. N. G. XI, 393; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 43. — Rameaux des *Fagus silv.*, *Quercus Robur*, *Alnus glutinosa*, *Betula alba*.

4. **Hypoxylon serpens** (P.) Fr. — Oud. Rév. II, 183; N. K. A. 2, VI, 180. — Sacc. Syll. I, 379. — Wint. Kr. Fl. II, 855. — L'H. serpens du Prod. II, 4, p. 43 semble appartenir à l'*Eutypa lata*. — Bois de chêne vermoulu.

5. **Hypoxylon udum** (P.) Fr. — Oud. Rév. II, 185; N. K. A. 2, VI, 180. — Sacc. Syll. I, 386. — Wint. Kr. Fl. II, 852. — Sphaeria confluens Tode. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 14.

Bois vermoulu des Saules.

6. **Hypoxylon unitum** (Fr.) Nke. — Oud. Rév. II, 184; N. K. A. 2, II, 185. — Sacc. Syll. I, 384. — Wint. Kr. Fl. II, 856. — Rameaux décortiqués du Chêne, ayant servi à la fabrication de corbeilles pour Orchidées, au jardin botanique d'Amsterdam.

***Hypoxylon ustulatum** Bull. — N. K. A. I, V, 342. — Voir: *Ustulina vulgaris*.

***Hypoxylon vulgare** N. K. A. 2, V, 594. — Voir: *Xylaria Hypoxylon*.

DALDINIA.

1. **Daldinia concentrica** (Bolt.) Ces. et de Not. — Oud. Rév. II, 186; N. K. A. 2, VI, 180. — Sacc. Syll. I, 393. — Hypoxylon concentricum Grev. — Wint. Kr. Fl. II, 866. — Sphaeria concentrica P. — N. K. A. 1, I, 52; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 42. — Débris de troncs abattus (*Acer Pseudo-Platanus*, *Fagus silvatica*, et autres).

NUMMULARIA.

1. **Nummularia Bulliardi** Tul. — Oud. Rév. II, 187; N. K. A. 2, VI, 181. — Sacc. Syll. I, 395. — Wint. Kr. Fl. II, 847. — Sphaeria nummularia D. C. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 41. — Rameaux de Chêne (*Quercus*) et de Hêtre (*Fagus*).

2. **Nummularia repandoides** Fuck. — Oud. Rév. II, 188; N. K. A. 2, II, 186. — Sacc. Syll. I, 397. — Wint. Kr. Fl. II, 850. — Sphaeria operculata T. N. G. XI, 394; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 59. — Tronc d'un Chêne.

USTULINA.

1. **Ustulina vulgaris** Tul. — Oud. Rév. II, 177; N. K. A. 2, VI, 180. — Sacc. Syll. I, 351. — Wint. Kr. Fl. II, 869. — Hypoxylon ustulatum Bull. — N. K. A. 1, V, 342. — Sphaeria deusta Hoffm. — N. K. A. 1, I, 52; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 44. Troncs et racines de plusieurs arbres.

PORONIA.

1. **Poronia punctata** (L.) Fr. — Oud. Rév. II, 176; N. K. A. 2, VI, 181. Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 10. — Sacc. Syll. I, 348. — Wint. Kr. Fl. II, 870. — Peziza coriacea Bull. — T. N. G. XI, 391. Crottin de cheval suranné.

XYLARIA.

1. **Xylaria carpophila** (P.) Fr. — Oud. Rév. II, 174; N. K. A. 2, VI, 181; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 41. — Sacc. Syll. I, 336. — Wint. Kr. Fl. II, 873. — Sphaeria carpophila P. — N. K. A. 1, I, 51. — Involucres pourrissants des fruits du *Fagus silvatica*. — Le n° 273 de Oud. Fgi Néerl. exs. en présente des exemplaires.

***Xylaria cornuta** Schrank. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 40. — Voir: *Xyl. Hypoxylon*.

2. **Xylaria coronata** West. — Oud. Rév. II, 171. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 42. Tronc pourri.

***Xylaria cupressiformis** Kx. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 41. — Voir: *Xyl. Hypoxylon* β. et γ.

3. **Xylaria digitata** (L.) Grev. — Oud. Rév. II, 174. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 41; N. K. A. 1, V, 342. — Sacc. Syll. I, 339. — Wint. Kr. Fl. II, 876. — Souches en train de décomposition et bois ramolli.

4. **Xylaria filiformis** (A. S.) Fr. — Oud. Rév. II, 175; N. K. A. 2, I, 92 et 183; ibid. 2, VI, 181; Oud. Herb. N. Pl. n° 163; Arch. Néerl. VIII, 403. — Sacc. Syll. I, 342. — Wint. Kr. Fl. II, 875. — Résidus pourrissants de plusieurs plantes herbacées, et ramilles en train de décomposition.

5. **Xylaria Hypoxylon** (P.) Grev. — Oud. Rév. II, 172; N. K. A. 2, VI, 181. — Sacc. Syll. I, 333. — Wint. Kr. Fl. II, 872. — Sphaeria Hyp. Ehrh. — T. N. G. XI, 393; Fl. Bat. tab. 510. — Hypoxylon vulgare Lk. — N. K. A. 2, V, 594. — Xylaria cornuta Schrank. — Prodr. Fl. Bat. III, 4, p. 40. — Troncs et poteaux pourris.

β. *cupressiformis* (P.) Oud. Rév. II, 173. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 41. — Sacc. Syll. I. 333. — Sphaeria Hyp. var. cupr. T. N. G. XI, 393. Même support.

γ. *pedata* (Fr.) Sacc. Syll. I. 333. — Oud. Rév. II, 173; Prodr. Fl. Bat. II, 1, p. 41. — Sphaeria Hyp. var. pedata T. N. G. XI, 393. — Même support.

6. **Xylaria longipes** Nke. — Oud. Rév. II, 171; N. K. A. 2, I, 92 et 183; Arch. Néerl. VIII, 403; Oud. Herb. N. Pl. n° 573. — Sacc. Syll. I, 328. — Wint. Kr. Fl. II. 877. — Bois pourri de caisses à arbustes de serre du Jard. bot. à Amsterdam.

7. **Xylaria polymorpha** (P.) Grev. — Oud. Rév. II, 170; N. K. A. 2, I, 92; ibid. 2, VI, 181; Prodr. Fl. Bat. II, 1, p. 41; Oud. Herb. N. Pl. n° 572. — Sacc. Syll. I, 309. — Wint. Kr. Fl. II, 878. — Souches enterrées et bois travaillé à demi pourri.

†[18] Valsaceae.

1. Allantosporae.

CALOSPHAERIA.

1. **Calosphaeria corylina** Nke. — Oud. N. K. A. 3, II, 688. — Sacc. Syll. I, 97. — Wint. Kr. Fl. II, 816. — Rameaux du *Corylus Avellana*.

2. **Calosphaeria princeps** Tul. — Oud. Rév. II, 117. — Sacc. Syll. I, 95. — Wint. Kr. Fl. II, 814. — Sphaeria pulchella P. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 50. — Rameaux d'une espèce de *Prunus*.

3. **Calosphaeria pusilla** (Wahlb.) Karst. — N. K. A. 3, II, 212. — Sacc. Syll. I, 96. — Wint. Kr. Fl. II, 814. — Rameaux du *Betula alba*.

CORONOPHORA.

1. **Coronophora angustata** (Nke.) Fuck. — Ond. Rév. II, 119; N. K. A. 2, IV, 180. — Sacc. Syll. I, 103. — Calosphaeria angust. Nke. — Wint. Kr. Fl. II, 821. — Rameaux du *Juglans regia*.

2. **Coronophora gregaria** (Lib.) Fuck. — Ond. Rév. II, 119. — N. K. A. 2, V, 177; N. K. A. 2, VI, 180. — Sacc. Syll. I, 103. — Calosphaeria greg. Nke. — Wint. Kr. Fl. II, 820. — Rameaux du *Corylus Avellana*.

QUATERNARIA.

1. **Quaternaria dissepta** (Fr.) Tul. — Ond. Rév. II, 120; N. K. A. 2, VI, 176. — Sacc. I, Syll. I, 107. — Wint. Kr. Fl. II, 825. — Valsa dissepta Fr. — N. K. A. 2, I, 183 et 2, III, 159; Arch. Néerl. VIII, 101; Ond. Fgi Neerl. n° 171. — Diatrype stipata B. Br. — N. K. A. 2, VI, 179. — Rameaux de l'*Ulmus campestris* et du *Robinia Pseudo-Acacia*.

2. **Quaternaria Persoonii** Tul. — Ond. Rév. II, 120; N. K. A. 2, VI, 175. — Sacc. Syll. I, 106. — Wint. Kr. Fl. II, 824. — Sphaeria quaterrata P. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 50. — Rameaux du *Betula alba* et du *Fagus silvatica*.

VALSA.

1. **Valsa Abietis** Fr. — Ond. N. K. A. 3, II, 212. — Sacc. Syll. I, 111. — Wint. Kr. Fl. II, 710. — Ecorce du *Picea excelsa*.

2. **Valsa aceilinis** Fr. — Ond. N. K. A. 3, II, 714. — Sacc. Syll. I, 130. — Wint. Kr. Fl. II, 725. — Rameaux du *Pirus Malus*.

***Valsa Aesculi** Fuck. — N. K. A. 2, I, 183. — Arch. Néerl. VIII, 403. — Voir: *Diaporthe Ch. Oudemansii*.

3. **Valsa ambiens** (P.) Fr. — Ond. Rév. II, 124; N. K. A. 2, VI, 175. — Sacc. Syll. I, 131. — Wint. Kr. Fl. II, 729. — Valsa deplanata N. K. A. 1, V, 345; Arch. Néerl. VIII, 404. — Rameaux des *Pirus Malus*, *Crataegus monogyna* et *Quercus Robur*.

4. **Valsa Auerswaldi** NKe. — Ond. Rév. II, 127; N. K. A. 2, V, 167 et 2, VI, 175. — Sacc. Syll. I, 138. — Wint. Kr. Fl. II, 735. — Rameaux du *Fagus silcatica*.

5. **Valsa coenobitica** Ces. et de Not. — N. K. A. 3, II, 715. — Sacc. Syll. I, 109. — Wint. Kr. Fl. II, 706. — Rameaux du *Quercus Robur*.

6. **Valsa ceratophora** (Tode) Tul. — Oud. Rév. II. 122 et Fgi Neerl. exs. n° 278. — Sacc. Syll. I, 108. — Wint. Kr. Fl. II, 707. — Sphaeria ceratosperma Tode. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 16. — Rameaux du *Quercus Robur*.

7. **Valsa cincta** (Fr.) Nke. — Oud. Rév. II, 464; id. N. K. A. 3, I, 473. — Sacc. Syll. I, 142. — Wint. Kr. Fl. II. 737. — Rameaux du *Prunus lusitanica*.

***Valsa coenobitica.** — Voir sous le n° 5.

***Valsa convergens** (Tode) Fr. — N. K. A. 1, V, 345. — Arch. Néerl. VIII, 104. — Voir: *Pseudovalsa*.

8. **Valsa coronata** (Hoffm.) Fr. — Sphaeria coronata Hoffm. Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 49. — Ram. du *Fagus silvatica*.

9. **Valsa Cypri** Tul. — Oud. Rév. II, 126; N. K. A. 2, V, 477. — Sacc. Syll. I, 133. — Wint. Kr. Fl. II, 724. — Rameaux du *Ligustrum vulgare*.

10. **Valsa decorticans** (Fr.) Fr. — Oud. Rév. II, 123. — Sacc. Syll. I. 123. — Wint. Kr. Fl. II, 715. — Sphaeria decort. Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 49. — Rameaux du *Fagus silvatica*.

***Valsa deplanata** (Nees) Fr. — N. K. A. I, V, 345. — Arch. Néerl. VIII, 404. — Voir: *V. ambiens*.

***Valsa dissepta** Fr. — N. K. A. 2, I, 183; et 2, III, 159. — Arch. Néerl. VIII, 404. — Voir: *Quaternaria*.

***Valsa Frit** Fr. — N. K. A. 2, I, 183; Arch. Néerl. VIII, 404. — Voir: *Fenestella*.

11. **Valsa Hoffmanni** Nke. — N. K. A. 3, II, 716. — Sacc. Syll. I, 118. — Wint. Kr. Fl. II, 716. — Rameaux du *Crataegus Oxyacantha*.

***Valsa hypodermia** Fr. N. K. A. 2, VI, 175. — Voir: *Cryptosporella*.

***Valsa Hystrix** Tode. — N. K. A. 2, I, 264; Arch. Néerl. VIII, 103. — Voir: *Diaporthe Chorostate Hystrix*.

***Valsa Innesii** Curr. — N. K. A. 2, I, 183; Arch. Néerl. VIII, 404. — Voir: Calospora platanoidis.

***Valsa Kickxii** Kickx. — N. K. A. 2, III, 157. — Voir *Pseudovalsa*.

12. **Valsa leucostoma** (P.) Fr. — Oud. Rév. II, 128; N. K. A. 2, VI, 175 et 3, I, 236. — Sacc. Syll. I. 139. — V. Persoonii Nke. — Wint. Kr. Fl. II, 733. Sphaeria leucostoma (P.) Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 48 (dubia). — Rameaux du *Crataegus Oxyacantha*.

***Valsa Limminghii** West. — Voir: Cryptosporella.

13. **Valsa nivea** (P.) Fr. — Oud. Rév. II, 127; N. K. A. 2,

VI, 175. — Sacc. Syll. I, 137. — Wint. Kr. Fl. II, 234. — Sphaeria nivea P. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 48. — Rameaux d'espèces de *Populus*.

***Valsa oncostoma** Fuck. — N. K. A. 2, II, 186. — Voir: *Diap. Chorostate*.

***Valsa platanoidis** Berk. — N. K. A. 2, III, 157. — Voir: *Calospora platanoides*.

***Valsa profusa** Fr. — N. K. A. 2, IV, 266. — Voir: *Aglaospora*.

14. **Valsa pustulata** Auersw. — Oud. Rév. II, 126; N. K. A. 2, VI, 175. — Sacc. Syll. I, 135. — Wint. Kr. Fl. II, 727. — Rameaux du *Fagus silvatica*.

15. **Valsa rhodophila** B. Br. — N. K. A. 3, II, 716. — Sacc. Syll. I, 136. — Wint. Kr. Fl. II, 726. — Rameaux du *Rosa canina*.

16. **Valsa Rubi** Fuck. — Oud. Rév. II, 122. — Sacc. Syll. I, 109. — Wint. Kr. Fl. II, 707. — Diatrype ceratosperma Sprée in N. K. A. 1, V, 313. — Tiges et rameaux d'une espèce de *Rubus*.

17. **Valsa salicina** (P.) Fr. — Oud. Rév. II, 125; N. K. A. 2, VI, 175. — Sacc. Syll. I, 131. — Wint. Kr. Fl. II, 734. — Sphaeria salicina P. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 49. — Rameaux tombés de plusieurs espèces de *Salix*.

18. **Valsa sepincola** a. **rosaccola** Fuck. — N. K. A. 2, VI, 286. — Sacc. Syll. I, 131. — Wint. Kr. Fl. II, 729. — Rameaux du *Rosa rubiginosa*.

19. **Valsa sorbicola** Nke. — Oud. Rév. II, 124. — Sacc. Syll. I, 124. — γ. decorticans dans Oud. Revisio Pyrenom. p. 23 p.p. — Sphaeria decorticans Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 49. — Rameaux du *Pirus* (Sorbus) *aucuparia*.

20. **Valsa sordida** Nke. — Oud. Rév. II, 123; N. K. A. 2, VI, 175. — Sacc. Syll. I, 120. — Wint. Kr. Fl. II, 722. — Rameaux d'une espèce de *Populus*.

21. **Valsa stenopora** Tul. — Oud. Rév. II, 124; N. K. A. 2, V, 477 et 2, VI, 175. — Sacc. Syll. I, 129. — Rameaux de l'*Alnus glutinosa*.

22. **Valsa translucens** de Not. — Oud. Rév. II, p. (11); N. K. A. 3, I, 236 et 472. — Sacc. Syll. I, 142. — Wint. Kr. Fl. II, 737. — Rameaux du *Salix repens*.

EUTYPELLA.

1. **Eutypella Prunastri** (P.) Sacc. Syll. I, 147. — Oud. Rév. II, 129. — Valsa Prunastri Fr. — Wint. Kr. Fl. II, 700. —

Sphaeria Pr. P. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 47. — Rameaux d'un *Prunus*.

2. **Eutypella stellulata** (Fr.) Sacc. Syll. I, 149. — Wint. Kr. Fl. II, 697. — Oud. Rév. II, 129; N. K. A. 2, VI, 176. — Sphaeria stellulata P. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 47. — Rameaux de l'*Ulmus compestris*.

VALSELLA.

1. **Valsella fertilis** (Nke) Sacc. Syll. I, 161. — Wint. Kr. Fl. II, 744. — Oud. Rév. II, 130; N. K. A. 2, VI, 32. — Rameaux d'un *Salix*.

EUTYPA.

1. **Eutypa Acharii** (Ach.) Tul. — Oud. Rév. II, 131; N. K. A. 2, VI, 178; Oud Fgi Neerl. exs. n° 169. — Sacc. Syll. I, 162. — Valsa Eutypa Nke. — Wint. Kr. Fl. II, 674. — Sphaeria Eutypa Fr. — T. N. G. XI, 394; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 59. — Branches de l'*Acer Pseudo-Platanus*.

2. **Eutypa aspera** (Nke) Fuck. — Oud. Rév. II, 132; N. K. A. 2, VI, 32. — Sacc. Syll. I, 163. — Wint. Kr. Fl. II, 675. — Rameaux décortiqués d'une espèce de *Lonicera*.

3. **Eutypa flavo-virescens** (Hoffm.) Sacc. Syll. I, 172. — Oud. Rév. II, 135. — Diatrype flavo-virens Fr. — N. K. A. 1, V, 343. — Valsa flavo-vir. Wint. Kr. Fl. II, 680. — Sphaeria flavovirens P. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 45. — Rameaux tombés.

4. **Eutypa Fraxini** (Nke). Oud. N. K. A. 2, III, 156; Rév. II, 136. — Sacc. Syll. I, 171. — Valsa Fraxini Nke in Wint. Kr. Fl. II, 684. — Rameaux du *Fraxinus excelsior*.

***Eutypa heteracantha** Sacc. Syll. I, 177. — N. K. A. 2, V, 177 et 2, VI, 178. — Voir: *Eutypa spinosa*.

5. **Eutypa lata** (P.) Tul. — Oud. Rév. II, 133; N. K. A. 2, VI, 178. — Sacc. Syll. I, 170. — Valsa lata Nke. — Wint. Kr. Fl. II, 681. — Sphaeria lata P. — T. N. G. XI, 394; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 46. — Sph. undulata Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 144. — Bois et rameaux de plusieurs arbres (*Crataegus*, *Fraxinus*, *Corylus*).

6. **Eutypa lejoplaca** (Fr.) Cooke. — Oud. Rév. II, 134. — Sacc. Syll. I, 170. — Valsa lejoplaca Nke. — Wint. Kr. Fl. II, 687. — Branches décortiqués de l'*Acer campestre*.

7. **Eutypa polycocca** (Fr.) Karst. — N. K. A. 3, II, 312. — Sacc. Syll. I, 165. — Valsa polyc. Nke. — Wint. Kr. Fl. II, 674. — Rameaux du *Prunus spinosa*.

8. **Eutypa scabrosa** (Bull.) Auersw. — Oud. Rév. II, 134. — Sacc. Syll. I, 171. — Valsa scabrosa Nke. — Wint. Kr. Fl. II, 679. — Sphaeria scabr. Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 45. — Rameaux et bois du *Quercus Robur*.

9. **Eutypa spinosa** (P.) Tul. — Oud. Rév. II, 132. — Sacc. Syll. I, 169. — Valsa spinosa Nke. — Wint. Kr. Fl. II, 672. — Eutypa heteracantha N. K. A. 2, V, 277 et 2, VI, 178. — Rameaux de l'*Alnus glutinosa*.

10. **Eutypa subtecta** (Fr.) Fuck. — N. K. A. 2, VI, 178. — Sacc. Syll. I, 164. — Valsa subt. Nke. — Wint. Kr. Fl. II, 676. — Rameaux de l'*Acer Pseudo-Platanus*.

11. **Eutypa tetragona** Sacc. Syll. I, 166. — N. K. A. 2, VI, 178. — Rameaux du *Sarothamnus scoparius*.

12. **Eutypa velutina** (Wallr.) Sacc. Syll. I, 176. — Oud. Rév. II, 136. Valsa vel. Wint. Kr. Fl. II, 748. — Sphaeria vel. Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 16. — Rameaux tombés et bois vermoulu.

CRYPTOSPHAERIA.

1. **Cryptosphaeria populina** (P.) Sacc. I, 183. —. Oud. Rév. II, 137; N. K. A. 2, VI, 178. — Valsa pop. Wint. Kr. Fl. II, 694. — Sphaeria corticis Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 59. — Ecorce agée d'une espèce de *Populus*.

***Diatrype stipata** B. Br. — N. K. A. 2, VI, 179. — Voir: *Quaternaria*.

CRYPTOVALSA.

1. **Cryptovalsa Nitschkii** Fuck. — Oud. N. K. A. 3, II, 690. — Sacc. Syll. I, 138. — Valsa Mori Nke. — Wint. Kr. Fl. II, 691. — Rameaux du *Sarothamnus scoparius*.

DIATRYPE.

1. **Diatrype bullata** (Hoffm.) Fr. — Oud. Rév. II, 140; N. K. A. 1, V, 342 et 2, VI, 179; Oud. Fgi Neerl. exs. n° 280. — Sacc. Syll. I, 192. — Wint. Kr. Fl. II, 840. — Sphaeria bull. P. Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 14. — Rameaux d'un *Salix*.

***Diatrype ceratosperma** (Tode) Fr. — N. K. A. 1, V, 343. — Voir: *Valsa Rubi* Fuck.

2. **Diatrype disciformis** (Hoffm.) Fr. — Oud. Rév. II, 139; N. K. A. 2, V, 594 et VI, 179. — Sacc. Syll. I, 191. — Wint. Kr. Fl. II, 839. — Sphaeria discif. N. K. A. 1, I, 51; Prodr.

Fl. Bat. II, 4, p. 45. — Rameaux des *Aesc. Hippoc.*, *Fraxinus excels.* et *Quercus Robur.*

***Diatrypa flavovirens** Fr. — N. K. A. 1, V, 343. — Voir: *Eutypa flavo-virescens.*

***Dyatrypa favacea** Ces. et de Not. — N. K. A. 2, VI, 179. — Voir: *Diatrypella.*

3. **Diatrypa rimosa** Fuck. — Oud. N. K. A. 3, II, 701. — Sacc. Syll. I, 193. — Wint. Kr. Fl. II, 840. — Rameaux du *Crataegus Oxyacantha.*

4. **Diatrypa Stigma** (Hoffm.) Fr. — Oud. Rév. II, 138; N. K. A. 2, VI, 179. — Sacc. Syll. I, 193. — Wint. Kr. Fl. II, 838. — Sphaeria Stigma Hoffm. — T. N. G. XI, 393; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 45. — Sph. decorticata D. C. — Prod. Fl. Bat. ibid. — Sph. undulata P. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 44. — Rameaux des *Betula alba*, *Fagus silv.*, *Prunus Padus* et *Quercus Robur.*

DIATRYPELLA.

1. **Diatrypella aspera** (Fr. Nke. — Oud. Rév. II, 143; N. K. A. 2, VI, 180. — Sacc. Syll. I, 204. — Wint. Kr. Fl. II, 830. — Rameaux du *Fagus silv.*

2. **Diatrypella favacea** (Fr.) Ces. et de Not. — Oud. Rév. II, 142; N. K. A. 2, V, 168. — Sacc. Syll. I, 201. — Wint. Kr. Fl. II, 832. — Diatrype favacea Fr. N. K. A. 2, VI, 179. — Rameaux du *Betula alba.*

3. **Diatrypella melaena** NKe. — Oud. Rév. II, 144; N. K. A. 2, VI, 180. — Sacc. Syll. I, 209. — Wint. Kr. Fl. II, 833. — Rameaux des *Betula alba* et *Tilia cordata.*

4. **Diatrypella quercina** (P.) Nke. — Oud. Rév. II, 144; N. K. A. 2, VI, 179. — Oud. Herb. Nederl. Pl. n° 759. — Sacc. Syll. I, 206. — Wint. Kr. Fl. II, 828. — Sphaeria quercina P. — T. N. G. XI, 393; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 45. — Rameaux du *Quercus Robur.*

5. **Diatrypella Torreiacana** de Not. — Oud. Rév. II, 143. — Sacc. Syll. I, 202. — Wint. Kr. Fl. II, 836. — Rameaux de l' *Alnus glutinosa.*

6. **Diatrypella verrucaeformis** (Ehrh.) Nke. — Oud. Rév. II, 141; N. K. A. 2, VI, 179. — Sacc. Syll. I, 200. — Wint. Kr. Fl. II, 832. — Diatrype verr. N. K. A. 1, V, 342. — Sphaeria verr. Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 45. — Rameaux des *Alnus glutinosa*, *Quercus Robur* et *Ulmus campestris.*

2. Hyalosporae.

CRYPTOSPORELLA.

1. **Cryptosporella chondrospora** Sacc. Syll. I, 167. — N. K. A. 3, II, 213. — Cryptospora ch. Rehm — Wint. Kr. Fl. II, 774. — Rameaux du *Tilia cordifolia*.

2. **Cryptosporella compta** (Tul.) Sacc. Syll. I. 168. — Oud. Rév. II, 464; N. K. A. 3, I, 474. — Cryptospora compta Wint. Kr. Fl. II, 771. — Rameaux du *Fagus silvatica*.

3. **Cryptosporella hypodermia** (Fr.) Sacc. Syll. I, 466. — Oud. Rév. II, 201. — Valsa hyp. Fr. — N. K. A. 2, VI, 175. — Cryptospora hyp. Fuck. — Wint, Kr. Fl. II, 768. — Rameaux de l'*Ulmus campestris*.

4. **Cryptosporella Limminghii** (West.) Sacc. Syll. I, 466. — Oud. Rév. II, 201. — Sphaeria Limm. West. in Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 47. — Oud. Fgi Neerl. exs. n° 172. — Rameaux de l'*Ulmus camp.*

5. **Cryptosporella populina** (Fuck.) Sacc. Syll. I, 467. — Oud. Rév. II, 202; N. K. A. 2, V, 479; 2, VI, 175. — Cryptospora populina Fuck. — Wint. Kr. Fl. II, 769. — Rameaux du *Populus nigra* b. *pyramidalis*.

3. Phaeosporae.

ANTHOSTOMA.

1. **Anthostoma gastrinum** (Fr.) Sacc. Syll. I, 303; Wint. Kr. Fl. II, 758. — Sphaeria gastrina Fr. — Prodr. Pl. Bat. II, 4, p. 47.

2. **Anthostoma melanotes** (B. Br.) Sacc. Syll. I, 294. — Wint. Kr. Fl. II, 750. — Oud. Rév. II, p. (12); N. K. A. 3, I, 235; ibid. 472. — Rameaux de l'*Ulmus suberosa*.

3. **Anthostoma turgidum** (P.) Sacc. Syll. I, 303. — Wint. Kr. Fl. II, 757. — Oud. Rév. II, 168; N. K. A. 2, VI, 178. — Sphaeria turgida P. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 49. — Rameaux du *Fagus silvatica*.

4. **Anthostoma Xylostei** (P.) Sacc. Syll. I, 300. — Wint. Kr. Fl. II, 755. — Oud. Rév. II, 168. — Sphaeria Xyl. P. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 60. — Ram. du *Lonicera Xylosteum*.

4. Hyalodidymae.

MELANCONIS.

1. **Melanconis Alni** Tul. — Oud. Rév. II, 237; N. K. A. 2,

I, 183; 2, VI, 178; Arch. Néerl. VIII, 403. — Sacc. Syll. I, 604. — Wint. Kr. Fl. II, 779. — Rameaux de l'*Alnus glutinosa*.

***Melanconis Berkeleyi** Tul. — N. K. A. 2, III, 156. — Voir: *Pseudovalsa convergens*.

2. **Melanconis Fagi** Oud. N K. A. 3, I, 177. — Sacc. Syll. XIV. 543. — Rameaux du *Fagus silvatica*.

3. **Melanconis Quercus** Oud. N. K. A. 3, II, 707. — Rameaux du *Quercus Robur*.

4. **Melanconis stilbostoma** (Fr.) Tul. — Oud. Rév. II, 236; N. K. A. 2, VI, 178; id. Fgi Neerl. exs. n° 79 et n° 80. — Sacc. Syll. I, 602. — Wint. Kr. Fl. II, 777. — Rameaux du *Betula alba*.

HERCOSPORA.

1. **Hercospora Tiliae** (P.) Fr. — Oud. Rév. II, 239; N. K. A. 2, VI, 178. — Sacc. Syll. I, 605; Wint. Kr. Fl. II, 775. — Sphaeria Tiliae Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 59. — Rameaux du *Tilia cordifolia*.

DIAPORTHE.

(Ch. = Chorostate; Eup. = Euporthe; Tetr. = Tetrastaga).

1. **Diaporthe Ch. affinis** Sacc. Syll. I, 625. — Oud. Rév. II, 253; N. K. A. 2, VI, 237. — Rameaux du *Corylus Avellana*.

2. **Diaporthe Ch. Betuli** (P.) Wint. Kr. Fl. II, 656. — Oud. Rév. II, 241. — D. Carpini Fuck. — Sacc. Syll. I, 608. — Sphaeria Carpini Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 48. — Rameaux du *Carpinus Betulus*.

3. **Diaporthe Ch. castanea** (Tul.) Sacc. Syll. I, 624. — Oud. Rév. II, 252; N. K. A. 3, I, 238. — Rameaux du *Castanea vesca*.

4. **Diaporthe Ch. conjuncta** Nees. — Sphaeria conjuncta Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 50

5. **Diaporthe Ch. Crataegi** (Curr.) Nke. — Oud. Rév. II, 250; N. K. A. 2, VI, 177. — Sacc. Syll. I, 620. — Wint. Kr. Fl. II, 651. — Rameaux du *Crataegus monogyna*.

6. **Diaporthe Ch. decipiens** Sacc. Syll. I, 608. — Wint. Kr. Fl. II, 659. — Oud. N. K. A. 2, VI, 177; 3, II, 691. — Rameaux du *Carpinus Betulus*.

7. **Diaporthe Ch. decorticans** (Lib.) Sacc. et Roum. — Oud. Rév. II, 249; N. K. A. 2, V, 480; 2, VI, 177. — Sacc. Syll. I, 619. — Wint. Kr. Fl. II, 650. — Rameaux du *Prunus Padus*.

8. **Diaporthe Ch. detrusa** (Fr.) Fuck. — Oud. Rév. II, 248; N. K. A. 2, VI, 177. — Sacc. Syll. I, 619. — Wint. Kr. Fl. II, 653. — Sphaeria detrusa Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 18. — Rameaux du *Berberis vulgaris*.

9. **Diaporthe Ch. dryophila** (Niessl) Sacc. Syll. I, 615. — Wint. Kr. Fl. II, 651. — Oud. N. K. A. 3, II, 691. — Rameaux du *Quercus Robur*.

10. **Diaporthe Ch. fibrosa** (P.) Nke — Oud. Rév. II, 247; N. K. A. 2, V, 168; 2, VI, 177. — Sacc. Syll. I, 618. — Wint. Kr. Fl. II, 653. — Rameaux du *Frangula Alnus* (= Rhamnus Frangula).

11. **Diaporthe Ch. Hippocastani** (Cooke) Berl. et Vogl. — Oud. Rév. II, 243; N. K. A. 2, VI, 32 et 177. — Sacc. Syll. Additam. ad. vol. I—IV, 105; Syll. IX, 709. — Rameaux de l'*Aesculus Hippocastanum*.

12. **Diaporthe Ch. Hippophaës** Bomm. Rouss. Sacc. in Sacc. Syll. IX. 707. — Oud. Rév. II, 248; N. K. A. 2, VI, 177. — Rameaux du *Hippophaë rhamnoides*.

13. **Diaporthe Ch. Hystrix** (Tode) Sacc. Syll. I, 623. — Wint. Kr. Fl. II, 664. — Oud. Rév. II, 252. — Valsa Hystrix Oud. N. K. A. 2, I, 264; Arch. Néerl. VIII, 403. — Ecorce et rameaux de l'*Acer Pseudo-Platanus*.

14. **Diaporthe Ch. Kunzeana** Sacc. Syll. I, 607. — Oud. N. K. A. 3, II, 692. — Rameaux du *Carpinus Betulus*.

15. **Diaporthe Ch. leiphaemia** (Fr.) Sacc. Syll. I, 615. — Wint. Kr. Fl. II, 652. — Oud. Rév. II, 245; N. K. A. 2, VI, 177. — Rameaux du *Quercus Robur*.

16. **Diaporthe Ch. longirostris** (Tul.) Sacc. Syll. I, 609; Wint. Kr. Fl. II, 658. — Oud. Rév. II, 241. — Rameaux de l'*Acer Pseudo-Platanus*.

17. **Diaporthe Ch. Niesslii** Sacc. Syll. I, 610. — Wint. Kr. Fl. II, 636. — Oud. Rév. II, 242; N. K. A. 2, V, 480; 2, VI, 177. — Rameaux de l'*Acer Pseudo-Platanus*.

18. **Diaporthe Ch. oncostoma** (Duby) Fuck. — Oud. Rév. II, 243; N. K. A. 2, VI, 177; 3, I, 238. — Sacc. Syll. I, 612. — Wint. Kr. Fl. II, 655. — Valsa oncost. Fuck. — N. K. A. 2, II, 186. — Sphaeria rostrata Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 59 (Lisez pour le support: Robinia Pseudo-Acacia). — Rameaux du *Robinia Pseudo-Acacia*.

19. **Diaporthe Ch. Oudemansii** (Oud.) Sacc. Syll. I, 611. — Oud. Rév. II, 243. — Valsa Aesculi Oud. N. K. A. 2, I, 183; Arch. Néerl. VIII, 103. — Rameaux de l'*Aesculus Hippocastanum*.

20. **Diaporthe Ch. pulchella** Sacc. et Briard in Sacc. Syll. Addit. ad vol. I—IV, 106 et Syll. IX, 704. — Oud. Rév. II. 246; N. K. A. 2, VI, 287. — Rameaux d'une espèce de *Populus*.

21. **Diaporthe Ch. pustulata** (Desm.) Sacc. Syll. I, 610. — Wint. Kr. Fl. II, 657. — Oud. Rév. II, 242; N. K. A. 2, VI, 177. — Rameaux de l'*Acer Pseudo-Platanus*.

22. **Diaporthe Ch. salicella** (Fr.) Sacc. Syll. I, 622. — Wint. Kr. Fl. II, 649. — Oud. Rév. II, 250; N. K. A. 2, VI, 177. — Sphaeria salicella Fr. — N. K. A. 2, I. 184; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 46; Arch. Néerl. VIII, 406. — Rameaux d'une espèce de *Salix*.

23. **Diaporthe Ch. sphingiophora** Oud. Rév. II. 251. — Sacc. Syll. I, 622. — Sphaeria sph. Oud. N. K. A. 2, I, 184; Arch. Néerl. VIII, 403. — Rameaux du *Cornus alba*.

24. **Diaporthe Ch. Strumella** (Fr.) Fuck. — Oud. Rév. II. 244; N. K. A. 2, VI, 177. — Sacc. Syll. I, 613. — Wint. Kr. Fl. II, 654. — Sphaeria Str. Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 46. — Rameaux du *Ribes rubrum*.

25. **Diaporthe Ch. Taleola** (Fr.) Sacc. Syll. I, 626. — Wint. Kr. Fl. II, 665. — Oud. Rév. II, 254; N. K. A. 2, VI, 177. — Rameaux du *Quercus Robur*.

26. **Diaporthe Ch. Taxi** Oud et Destr. — Oud. Rév. II, 251. — Sacc. Syll. XIV, 546. — Rameaux du *Taxus baccata*.

27. **Diaporthe Ch. transversalis** Karst. — Oud. N. K. A. 3, II, 692. — Sacc. Syll. I, 612. — Rameaux du *Betula alba*.

28. **Diaporthe Eup. Berkeleyi** (Desm.) Nke. — Oud. Rév. II, 259. — Sacc. Syll. I, 617. — Wint. Kr. Fl. II, 602. — Sphaeria Berk. Desm. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 65. — Tiges du *Heracleum Sphondylium*.

29. **Diaporthe Eup. brachyceras** Sacc. Syll. I, 643. — Oud. Rév. II, 258; N. K. A. 2, VI, 287. — Rameaux du *Ligustrum vulgare*.

30. **Diaporthe Eup. ceuthosporioides** (Berk.) Sacc. Syll. I, 646. — Oud. Rév. II, 259. — F. du *Prunus Laurocerasus*.

31. **Diaporte Eup. Chailletii** NKe. Sacc. Syll. I, 658. — Wint. Kr. Fl. II, 601. — N. K. A. 2, VI, 176.

32. **Diaporthe Eup. cryptica** NKe. — Oud. Rév. II, 257; N. K. A. 2, V, 168 et 2, VI, 176. — Sacc. Syll. I, 641. — Wint. Kr. Fl. II, 610. — Rameaux du *Lonicera Periclymenum*.

33. **Diaporthe Eup. fasciculata** Nke. — N. K. A. 3, I, 237 et 477; 3, II, 693. — Sacc. Syll. I, 639. — Wint. Kr. Fl. II, 619. — Rameaux du *Robinia Pseudo-Acacia.*

34. **Diaporthe Eup. forabilis** Nke. — N. K. A. 3, I, 237 et 477. — Sacc. Syll. I, 640. — Wint. Kr. Fl. II, 613. — Rameaux tombés d'une espèce de *Populus.*

35. **Diaporthe Eup. geographica** Fuck. — Oud. Rév. II, 257. — Sacc. Syll. I, 639. — Wint. Kr. Fl. II, 624. — Rameaux du *Syringa vulgaris.*

36. **Diaporthe Eup. intermedia** Sacc. Syll. I, 660. — N. K. A. 3, I, 477. — Tiges du *Saponaria officinalis.*

37. **Diaporthe Eup. nigricolor** Nke. — Oud N. K. A. 3, II, 693. — Sacc. Syll. I, 638. — Wint. Kr. Fl. II, 613. — Rameaux du *Frangula Alnus.*

38. **Diaporthe Eup. obsoleta** Sacc. Syll. I, 636. — N. K. A. 3, II, 346 et 695. — Tiges du *Hypericum perfoliatum.*

39. **Diaporthe Eup. orientalis** Sacc. et Speg. — Sacc. Syll. I, 633. — Oud. Rév. II, 255; N. K. A. 3, I, 237. — Rameaux du *Morus alba.*

40. **Diaporthe Eup. pulla** Nke. — Oud. Rév. II, 256; N. K. A. 2, VI, 176. — Sacc. Syll. I, 636. — Wint. Kr. Fl. II, 619. — Rameaux du *Hedera Helix.*

41. **Diaporthe Eup. Ryckholti** (West.) Nke. — Oud. N. K. A. 3, II, 694. — Sacc. Syll. I, 679. — Wint. Kr. Fl. II, 625. — Rameaux du *Symphoricarpos racemosa.*

42. **Diaporthe Eup. scobina** (Nke.) — Oud. N. K. A. 3, II, 695. — Diap. Tetr. scob. Nke. — Sacc. Syll. 636. — Wint. Kr. Fl. II, 641. — Rameaux du *Fraxinus excelsior.*

43. **Diaporthe Eup. semiimmersa** Nke. — Oud. Rév. II, 258; N. K. A. 3, I, 237. — Sacc. Syll. I, 645. — Wint. Kr. Fl. II, 617. — Rameaux. du *Crataegus monogyna.*

44. **Diaporthe Eup. silvestris** Sacc. et Berl. — Sacc. Syll. IX, 711. — Oud. Rév. II, 256; N. K. A. 3, I, 237. — Rameaux du *Vitis vinifera.*

45. **Diaporthe Eup. Sorbariae** Nke. — Oud. N. K. A. 3, II, 696. — Sacc. Syll. I, 641. — Wint. Kr. Fl. II, 612. — Rameaux du *Spiraea sorbifolia.*

46. **Diaporthe Eup. sordida** Nke. — Oud. N. K. A. 3, II, 697. — Sacc. Syll. I, 632. — Wint. Kr. Fl. II, 617. — Rameaux du *Carpinus Betulus.*

47. **Diaporthe Eup. spiculosa** (P.) Nke. — Oud. Rév. II, 255; N. K. A. 2, VI, 177. — Sacc. Syll. I, 633. — Wint. Kr. Fl.

II, 615. — Sphaeria Eup. spic. P. — Prodr. Fl. Bat. II. 4, p. 16. — Rameaux du *Viburnum Opulus.*

48. **Diaporthe Eup. Tulasnei** Nke. — Oud. Rév. II, 260. — Sacc. Syll. I, 657. — Wint. Kr. Fl. II, 602. — Tiges de l'*Urtica dioica.*

49. **Diaporthe Tetr. Beckhausii** Nke. — Oud. Rév. II, 265; N. K. A. 2, VI, 177 et 3, I, 238. — Sacc. Syll. I, 678. — Wint. Kr. Fl. II, 639. — Rameaux du *Viburnum Opulus.*

50. **Diaporthe Tetr. circumscripta** Otth N. K. A. 3, I, 237 et 178; 3, II, 697. — Sacc. Syll. I, 679. — Wint. Kr. Fl. II, 629. — Rameaux du *Sambucus nigra.*

51. **Diaporthe Tetr. controversa** (Desm.) Nke. — Oud. Rév. II, 265; N. K. A. 2, VI, 177. — Sacc. Syll. I, 676. — Wint. Kr. Fl. II, 623. — Sphaeria controv. Desm. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 18. — Rameaux du *Fraxinus excelsior.*

52. **Diaporthe Tetr. Corni** Fuck. — Oud. Rév. II, 267. — Sacc. Syll. I, 681. — Wint. Kr. Fl. II, 635. — Rameaux du *Cornus alba.*

53. **Diaporthe Tetr. crustosa** Sacc. et Roum. — Sacc. Syll. I, 682. — Wint. Kr. Fl. II, 648. — Oud. Rév. II, 267; N. K. A. 2, VI, 176. — Rameaux de l'*Ilex Aquifolium.*

54. **Diaporthe Tetr. cupulata** Berl. et Destr. N. K. A. 3, I, 238; ibid. p. 178. — Rameaux du *Populus monilifera.*

55. **Diaporthe Tetr. exasperans** Nke. — N. K. A. 3, I, 237; ibid. p. 178. — Sacc. Syll. I, 686. Wint. Kr. Fl. II, 644. — Rameaux du *Betula alba.*

56. **Diaporthe Tetr. inaequalis** (Curr.) Nke. — N. K. A. 3, I, 237; ibid. p. 177. — Sacc. Syll. I, 663. — Wint. Kr. Fl. II, 615. — Rameaux décortiqués du *Sarothamnus scoparius.*

57. **Diaporthe Tetr. incarcerata** (B. Br.) Nke. — Oud. N. K. A. 3, II, 698. — Sacc. Syll. I, 669. — Wint. Kr. Fl. II, 638. — Rameaux d'une espèce de *Rosa.*

58. **Diaporthe Tetr. insignis** Fuck. — Oud. N. K. A. 3, II, 698. — Sacc. Syll. I, 668. — Wint. Kr. Fl. II, 624. — Tiges d'un *Rubus.*

59. **Diaporthe Tetr. insularis** Nke. — Oud. N. K. A. 3, II, 699. — Sacc. Syll. I, 672. — Wint. Kr. Fl. II, 639. — Rameaux du *Quercus Robur.*

60. **Diaporthe Tetr. Landeghemiae** (West.) Nke. — Oud. Rév.

II, 268; N. K. A. 2, V, 480 et 2, VI, 176. — Sacc. Syll. I, 683. — Wint. Kr. Fl. II, 626. — Rameaux du *Philadelphus coronarius.*

61. **Diaporthe Tetr. Laschii** Nke. — Oud. Rév. II, 268. — N. K. A. 2, VI, 32; ibid. p. 176. — Sacc. Syll. I, 684. — Wint. Kr. Fl. II, 642. — Rameaux de l'*Evonymus europaea.*

62. **Diaporthe Tetr. Lirella** (Moug. Nestl.) Fuck. — Oud. Rév. II, 269. — Sacc. Syll. I, 668. — Wint. Kr. Fl. II, 622. — Sphaeria Lir. Berk. — T. N. G. XII, 271; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 53. — Tiges du *Filipendula* (*Spiraea*) *Ulmaria.*

63. **Diaporthe Tetr. oligocarpa** Nke. — Oud. N. K. A. 3, II, 700. — Sacc. Syll. I, 670. — Wint. Kr. Fl. II, 632. — Rameaux du *Prunus spinosa.*

64. **Diaporthe Tetr. resecans** Nke. — Oud. Rév. II, 264; N. K. A. 2, VI, 176. — Sacc. Syll. I, 674. — Wint. Kr. Fl. II, 628. — Rameaux du *Syringa vulgaris.*

65. **Diaporthe Tetr. retecta** Fuck. et Nke. — N. K. A. 3, I, 237 et 478. — Sacc. Syll. I, 680. — Wint. Kr. Fl. II, 633. — Rameaux du *Buxus sempervirens.*

66. **Diaporthe Tetr. rostellata** (Fr.) Nke. — Oud. Rév. II, 262; N. K. A. 2, VI, 177. — Sacc. Syll. I, 667. — Wint. Kr. Fl. II, 637. — Sphaeria rost. Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 59; N. K. A. I, V, 344. — Sph. conjuncta Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 50. — Rameaux d'une espèce de *Rubus.*

67. **Diaporthe Tetr. rudis** (Fr.) Nke. — Oud. Rév. II, 261; N. K. A. 2, VI, 176. — Sacc. Syll. I, 662. — Wint. Kr. Fl. II, 647. — Rameaux du *Cytisus Laburnum.*

68. **Diaporthe Tetr. Sarothamni** (Auersw.) Nke. — Oud. Rév. II, 261; N. K. A. 2, VI, 176. — Sacc. Syll. I, 663. — Wint. Kr. Fl. II, 634. — Rameaux du *Sarothamnus scoparius.*

69. **Diaporthe Tetr. Spina** Fuck. — Oud. N. K. A. 3, II, 700. — Sacc. Syll. I, 685. — Wint. Kr. Fl. II, 640. — Rameaux d'une espèce de *Salix.*

***Diaporthe Tetr. striaeformis** (Fr.) Fuck. — Oud. Rév. II, 270. — Indigène fort douteuse.

70. **Diaporthe Tetr. tenuirostris** Nke. — Oud. Rév. II, 263; N. K. A. 2, VI, 176. — Sacc. Syll. I, 673. — Wint. Kr. Fl. II, 641. — Rameaux du *Juglans regia.*

71. **Diaporthe Tetr. velata** (P.) N. K. A. — Oud. Rév. II, 266; N. K. A. 2, V, 480 et 2, VI, 176. — Sacc. Syll. I, 681. — Wint. Kr. Fl. II, 645. — Rameaux du *Tilia cordata.*

72. **Diaporthe Tetr. Vepris** (de Lacr.) Fuck. — Oud. Rév. II

263; N. K. A. 2, VI, 176. — Sacc. Syll. I, 667. — Wint. Kr. Fl. II, 637. — Tiges du *Rubus idaeus*.

5. Hyalophragmiae.

CALOSPORA.

1. **Calospora Pickelii** Oud. et Rick N. K. A. 3, II, 689. — Rameaux du *Carpinus Betulus*.

2. **Calospora platanoidis** (P.) Niessl. — Oud. Rév. II, 338; N. K. A. 2, VI, 178; 3, I, 236 et 481. — Valsa platan. Berk. N. K. A. 2, III, 157. — Sphaeria stilbostoma var. umbilicata Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 49. — Valsa Innesii Curr. — N. K. A. 2, I, 183; Arch. Néerl. VIII, 404. — Calospora platan. Sacc. Syll. II, 231. — Pseudovalsa platan. Wint. Kr. Fl. II, 790. — Calospora Innesii Sacc. — N. K. A. 2, VI, 179. — Rameaux de l'*Acer Pseudo-Platanus*.

forma *Sorbi* Roll. et Destr. N. K. A. 3, I, 236 et 481.

6. Phaeophragmiae.

PSEUDOVALSA.

***Pseudovalsa Berkeleyi** Sacc. — Voir: *Ps. convergens*.

1. **Pseudovalsa convergens** (Tode) Sacc. Syll. II, 136. — Wint. Kr. Fl. II, 791. — Oud. Rév. II, 317. — Valsa converg. Fr. N. K. A. 1, V, 345; Arch. Néerl. VIII, 404. — Melanconis Berkeleyi Tul. — N. K. A. 2, III, 156; Oud. Fgi Neerl. exs. n° 170. — Rameaux du *Fagus silvatica* et de l'*Ulmus campestris*.

2. **Pseudovalsa Kickxii** (West.) Sacc. Syll. II, 139. — Oud. Rév. II, 318; Valsa Kickxii Kickx, N. K. A. 2, III, 157 et Fgi Neerl. exs. n° 173. — Rameaux du *Platanus orientalis*.

3. **Pseudovalsa lanciformis** (Fr.) Ces. et de Not. — Oud. Rév. II, 315; N. K. A. 2, VI, 179. — Sacc. Syll. II, 135. — Wint. Kr. Fl. II, 767 et 784. — Sphaeria lancif. Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 46. — Rameaux du *Betula alba*.

4. **Pseudovalsa macrosperma** (Tul.) Sacc. Syll. II, 139. — Wint. Kr. Fl. II, 789. — Oud. Rév. 318; N. K. A. 2, V, 168 et 2, VI, 179. — Rameaux du *Carpinus Betulus*.

5. **Pseudovalsa umbonata** (Tul.) Sacc. Syll. II, 135. — Wint. Kr. Fl. II, 785. — Oud. Rév. II, 316; N. K. A. 2, VI, 179. — Rameaux tombés.

AGLAOSPORA.

1. **Aglaospora profusa** (Fr.) de Not. — Oud. Rév. II, 314; N. K. A. 2, VI, 178. — Sacc. Syll. II, 133. — Pseudovalsa prof. Wint. Kr. Fl. II, 785. — Valsa profusa Fr. — N. K. A. 2, IV, 266 et Fgi Neerl. exs. n° 279. — Sphaeria anomia Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 48. — Rameaux du *Robinia Pseudo-Acacia*.

MELOGRAMMA.

1. **Melogramma Betulae** Oud. et Destr. N. K. A. 3, I, 180. — Oud. Rév. II, 320. — Rameaux du *Betula alba*.

2. **Melogramma vagans** de Not. — Oud. Rév. II, 319; N. K. A. 2, VI, 180. — Sacc. Syll. II, 144. — Melogramma Bulliardi Tul. — Wint. Kr. Fl. II, 799 et 807. — Ecorce du *Betula alba*.

6. Phaeodictyae.

FENESTELLA.

1. **Fenestella Frit** (Fr.) Sacc. Syll. II, 332. — Wint. Kr. Fl. II, 796 — Oud. Rév. II, 362. — Valsa Frit. Fr. — N. K. A. 2, I, 183; Arch. Néerl. VIII, 401. — Rameaux du *Negundo fraxinifolia*.

2. **Fenestella livida** (P.) Wint. Kr. Fl. II, 796. — Oud. N. K. A. 3, II, 701. — Thyridium lividum Sacc. Syll. II, 324. — Rameaux du *Robinia Pseudo-Acacia*.

3. **Fenestella princeps** Tul. — Oud. Rév. II, 362; N. K. A. 2, VI, 179 et 3, I, 235. — Sacc. Syll. II, 325. — Wint. Kr. Fl. II, 792. — Rameaux du *Crataegus monogyna*.

4. **Fenestella vestita** (Fr.) Sacc. Syll. II, 329. — Wint. Kr. Fl. II, 793. — Oud. N. K. A. 3, II, 702. — Rameaux du *Fagus silvatica*.

7. Scolecosporae.

CRYPTOSPORA.

1. **Cryptospora Betulae** Tul. — Oud. Rév. II, 377; N. K. A. 3, I, 484. — Sacc. Syll. II, 364. — Wint. Kr. Fl. II, 364. — Rameaux du *Betula alba*.

2. **Cryptospora corylina** (Tul.) Fuck. — N. K. A. 3, I, 236 et 484. — Sacc. Syll. II, 362. — Wint. Kr. Fl. II, 773. — Rameaux du *Corylus Avellana*.

3. **Cryptospora suffusa** (Fr.) Tul. — Oud. Rév. II, 377; N. K. A. 2, VI, 179. — Sacc. Syll. II, 361. — Wint. Kr. Fl. II, 772. — Rameaux de l'*Alnus glutinosa*.

VIALAEA.

1. **Vialaea insculpta** (Fr. et Oud.) Sacc. Syll. XIV, 620. — Oud. N. K. A. 3, I, 484. — Zignoëlla insc. (Fr. et Oud.) Sacc. Syll. II, 225. — Oud. N. K. A. 2, I, 184; ibid. 2, VI, 187; ibid. 3, I, 184; Arch. Néerl. VIII, 405; Rév. II, 338. — Rameaux de l'*Ilex Aquifolium*.

SILLIA.

1. **Sillia ferruginea** (P.) Karst. — Oud. Rév. II, 375; N. K. A. 2, VI, 180. — Sacc. Syll. II, 361. — Melogramma ferr. — Wint. Kr. Fl. II, 809. — Sphaeria ferr. P. — Prodr. Fl. Bat. II, 1, p. 46. — Rameaux du *Corylus Avellana*.

†[19] Dothideaceae.

1. Hyalosporae.

MAZZANTIA.

1. **Mazzantia Galii** (Fr.) Mont. — N. K. A. 3, II, 221. — Sacc. Syll. II, 591. — Wint. Kr. Fl. II, 913. — Tiges du *Galium verum*.

PHYLLACHORA.

1. **Phyllachora Caricis** (Fr.) Nke. — Oud. Rév. II, 414. — Sacc. Syll. II, 625. — Ph. Graminis forma Caricis Wint. Kr. Fl. II, 899. — Dothidea Caricis Fr. — N. K. A. 2, I, 316; Arch. Néerl. VIII, 103. — F. d'une espèce de *Carex*.

2. **Phyllachora depazeoides** (Desm.) Nke. — Oud. Rév. II, 113. — Sacc. Syll. II, 596. — Dothidea depaz. Desm. — Prodr. Fl. Bat. II, 1, p. 72. — F. du *Buxus sempervirens*.

3. **Phyllachora graminis** (P.) Fuck. — Oud. Rév. II, 414; N. K. A. 2, VI, 181. — Sacc. Syll. II, 602. — Wint. Kr. Fl. II, 898. — Dothidea gram. Fr. — Sphaeria gram. P. — T. N. G. XI, 394; Prodr. Fl. Bat. II, 1, p. 72. — F. de plusieurs Graminées.

4. **Phyllachora Heraclei** (Fr.) Fuck. — Oud. N. K. A. 3, II, 711. — Sacc. Syll. II, 600; Wint. Kr. Fl. II, 901. — Excipula

Heraclei Rab. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 81. — F. du *Heracleum Sphondylium*.

5. **Phyllachora Junci** (Fr.) Fuck. — Oud Rév. II, 115. — Sacc. Syll. II, 605. — Wint. Kr. Fl. II, 900. — Sphaeria Junci Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 53. — Leptostroma juncinum T. N. G. XII, 271. — Chaumes des *Juncus effusus* et *glaucus*.

6. **Phyllachora Podagrariae** (Roth) Karst. — Oud. Rév. II, 113; N. K. A. 2, VI, 181. — Sacc. Syll. II, 615. — Wint. Kr. Fl. II, 901. — Dothidea Pod. Fr. — T. N. G. XI, 396. — Phoma Podagr. West. Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 95. — F. de l'*Aegopodium Podagraria*.

7. **Phyllachora Trifolii** (P.) Fuck. — Oud. Rév. II, 112; N. K. A. 2, VI, 181. — Sacc. Syll. II, 613. — Wint. Kr. Fl. II, 902. — Sphaeria Trif. P. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 54. — Folioles des *Trif. pratense* et *repens*.

***Phyllachora Ulmi** Fuck. — N. K. A. 2, V, 595 et VI, 181. — Voir: *Dothidella*.

2. Hyalodidymae.

PLOWRIGHTIA.

1. **Plowrightia Ribesia** (P.) Sacc. Syll. II, 635. — Oud. Rév. II, 120. — Dothidea Rib. Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 1, 70; N. K. A. 1, V, 343; 2, VI, 183. — Wint. Kr. Fl. II, 910. — Rameaux du *Ribes rubrum*.

DOTHIDELLA.

1. **Dothidella thoracella** (Rutström) Sacc. Syll. II, 630. — Wint. Kr. Fl. II, 905. — Oud. Rév. II, 417. — Ectostroma Sedi Fr. — T. N. G. XI, 396; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 120. — Tiges et feuilles des *Sedum maximum* et *purpureum*.

2. **Dothidella Ulmi** (Duval) Wint. Kr. Fl. II, 904. — Oud. Rév. II, 417. — Phyllachora Ulmi Fuck. — N. K. A. 2, VI, 181. — Sacc. Syll. II, 594. — Dothidea Ulmi Fr. — T. N. G. XI, 396; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 73; Oud. Fgi Neerl. exs. n° 78. — F. de l'*Ulmus campestris* et de sa variété b. *suberosa*.

SCIRRHIA.

1. **Scirrhia rimosa** (A. S.) Fuck. — Oud. Rév. II, 418; N. K. A. 2, I, 264 et 2, VI, 182; Oud. Fgi Neerl. exs. n° 281. —

Sacc. Syll. II, 634. — Wint. Kr. Fl. II, 906. — Sphaeria rimosa Fr. — T. N. G. XI, 394; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 53. — Gaînes du *Phragmites communis*.

1. **Scirrhia depauperata** (Desm.) Fuck. — N. K. A. 2, III, 256 et 2, VI, 182. — Sacc. Syll. II, 634. — Sc. rimosa Fuck. var. depauperata in Ond. Rév. II, 419. — Wint. Kr. Fl. II, 507. — Rubans des f. du *Phragmites communis*.

3. Phaeodidymae.

DOTHIDEA.

***Dothidea alnea** Fr. — T. N. G. XII, 271; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 71. — Voir: *Discosia*.

***Dothidea Asteroma** Fr. — T. N. G. XI, 396. — Voir: *Mycosphaerella*.

***Dothidea Brassicae** Desm. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 71. — Voir: *Mycosphaerella brassicaecola*.

***Dothidea Caricis** Fr. — N. K. A. 2, I, 316. Arch. Néerl. VIII 103. — Voir: *Phyllachora Caricis*.

***Dothidea Chaetomium** Kze. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 71. — Voir: *Venturia Kunzei*.

***Dothidea decoloraus** Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 71. — Quid?

***Dothidea fimbriata** Kickx — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 71. — Voir: *Gnomoniella*.

***Dothidea Fraxini** Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 72. — Voir: *Stigmatea*.

***Dothidea Fraxini** Fr. — T. N. G. XI, 396. — Voir: *Cercospora*.

***Dothidea fulva** Fr. — T. N. G. XI, 396. — Voir: *Polystigma*.

***Dothidea geographica** Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 72. — Voir: *Asteroma*.

***Dothidea graminis** Chev. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 72. — Voir: *Phyllachora*.

***Dothidea Himantia** Fr. — T. N. G. XI, 396. — Voir: *Asterella*.

***Dothidea Podagrariae** Fr. — T. N. G. XI, 396. — Voir: *Phyllachora*.

Dothidea Potentillae Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 71. — Voir: *Venturia*.

***Dothidea Pteridis** Fuck. (= Phyllachora Pt.) — N. K. A. 2, II, 186; doit être rayé!

1. **Dothidea puccinioides** (D. C.) Fr. — Ond. Rév. II, 422;

Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 70. — Sacc. Syll. II, 641. — Wint. Kr. Fl. II, 909. — Rameaux du *Buxus sempervirens.*

***Dothidea Ranunculi** Fr. — T. N. G. XI, 396. — Voir: *Fabraea.*

***Dothidea Ribesia** Fr. — N. K. A. 1, V, 343. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 70. — Voir: *Plowrightia.*

***Dothidea Robertiani** Fr. — T. N. G. XI, 396; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 73. — Voir: *Stigmatea.*

***Dothidea rubra** Fr. — T. N. G. XI, 396. — Voir: *Polystigma.*

2. **Dothidea Sambuci** (P.). Fr. — Oud. Rév. II, 421. — Sacc. Syll. II, 639. — Wint. Kr. Fl. II, 908. — Sphaeria Samb. P. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 70. — Rameaux du *Sambucus nigra.*

***Dothidea sphaeroides** Fr.? — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 70.

3. **Dothidea tetraspora** B. Br. — N. K. A. 2, VI, 182; Oud. Rév. II, 422. — Sacc. Syll. II, 640. — Rameaux du *Sarothamnus scoparius.*

***Dothidea Ulmi** Fr. — T. N. G. 396; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 73. — Voir: *Dothidella.*

4. **Dothidea umbilicata** Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 70. — Quid?

4. Phaeophragmiae.

HOMOSTEGIA.

1. **Homostegia gangraena** (Fr.) Wint. Kr. Fl. II, 917. — Phyllachora gangr. (Fr.) Sacc. Syll. II, 604. — Sphaeria gangraena Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 68. — Sur les f. d'une Graminée.

RHOPOGRAPHUS.

1. **Rhopographus caulincola** Ond. N. K. A. 3, II, 712. — Tige d'une Ombellifère inconnue.

2. **Rhopographus filicinus** (Fr.) Nke. — Ond. Rév. II, 123; N. K. A. 2, VI, 181. — Sacc. Syll. II, 648. — Sphaeria filicina Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 53. — Rhop. Pteridis Wint. Kr. Fl. II, 915. — Pétioles du *Pteris aquilina.*

Appendix.

SPHAERIA.

***Sphaeria acervalis** Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 51. — Voir: *Gibberella.*

***Sphaeria acuta** (Moug. Nestl.) Karst. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 62; N. K. A. 1, I, 51. — Voir: *Leptosphaeria.*

***Sphaeria Aegopodii** P. — T. N. G. XI, 395. — Voir: *Stigmatea.*

***Sphaeria aesculicola** Fr. — T. N. G. XI, 395. — Voir: *Septoria Aesculi.*

***Sphaeria aggregata** Lasch — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 52. — Voir: *Scleroderris.*

***Sphaeria agnita** Desm. — N. K. A. 2, II, 104. — Voir: *Leptosphaeria.*

***Sphaeria allicina** Fr. — T. N. G. XI, 392; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 54. — Voir: *Mycosphaerella.*

***Sphaeria Anomia** Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 48. — Voir: *Aglaospora profusa.*

***Sphaeria applanata** Fr. — N. K. A. 2, II; 186. — Voir: *Trematosphaeria.*

***Sphaeria Aquila** Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 55; N. K. A. 1, V, 343. — Voir: *Rosellinia.*

***Sphaeria aquilina** Fr. — N. K. A. 1, I, 52. — Voir: *Mycosphaerella* s. *Sphaerella Polypodii.*

***Sphaeria aquilina** Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 66. — A. supprimer.

***Sphaeria argillacea** Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 43. — Voir: *Hypoxylon.*

***Sphaeria Armeriae** Cda. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 64. — Voir: *Pleospora herbarum.*

Sphaeria arundinacea Sow. — T. N. G. XI, 394; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 53. — Voir: *Leptosphaeria.*

***Sphaeria Aspegrenii** Fr. — N. K. A. 2, II, 186. — Voir: *Melanomma.*

***Sphaeria Atomus** Desm. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 68. — Voir: *Mycosphaerella.*

***Sphaeria Aucupariae** Lasch. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 67. — Voir: *Mycosphaerella.*

***Sphaeria aurantia** P. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 55. — Voir: *Hypomyces.*

***Sphaeria Bardanae** Wallr. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 64. — Voir: *Leptosphaeria.*

***Sphaeria Berberidis** P. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 51. — Voir: *Cucurbitaria.*

***Sphaeria Berkeleyi** Desm. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 65. — Voir: *Diaporthe* (*Euporthe*) *Berkeleyi.*

23. **Sphaeria biformis** P. — N. K. A. 1, V, 343. — Voir: *Lasiosphaeria.*

***Sphaeria bifrons** Schm. et Kze. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 54. — Voir: *Hypospila.*

***Sphaeria Bombarda** Batsch. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 57. — Voir: *Bombardia fasciculata.*

***Sphaeria Brassicae** Kl. — N. K. A. 2, I, 264; Arch. Néerl. VIII, 405. — Voir: *Sordaria.*

***Sphaeria brunneola** Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 67. — Voir: *Mycosphaerella.*

***Sphaeria bullata** Ehrh. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 44. — Voir: *Diatrype.*

***Sphaeria Buxi** Desm. — N. K. A. I, V, 344. Voir: *Hyponectria.*

***Sphaeria byssiseda** Tode. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 55. — Voir: *Rosellinia Aquila β byssiseda.*

***Sphaeria Cardnorum** Wallr. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 64. — Voir: *Ophiobolus acuminatus.*

***Sphaeria carpinea** Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 67; N. K. A. 1, I, 52. — Voir: *Carlia.*

***Sphaeria Carpini** P. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 48. — Voir: *Diaporthe (Chorostate) Betuli.*

***Sphaeria carpophila** Fr. — N. K. A. 1, I, 52. — Voir: *Xylaria.*

***Sphaeria caulium** Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 63. — Voir: *Lophiostoma.*

***Sphaeria ceratosperma** Tode. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 46. — Voir: *Valsa ceratophora.*

***Sphaeria ceuthocarpa** Fr. — Prodr. Fl. Bar. II, 4, p. 56. — Voir: *Linospora populina.*

***Sphaeria cinnabarina** Tode. — T. N. G. XI, 394; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 50. — Voir: *Nectria.*

***Sphaeria cirrhosa** P. — N. K. A. 1, V, 344; Arch. Néerl. VIII, 406. — Voir: *Ceratostomella.*

***Sphaeria clivensis** B. Br. — N. K. A. 2, III, 160. — Voir: *Leptosphaeria.*

***Sphaeria clypeata** Nees. — N. K. A. 1, V, 344; Arch. Néerl. VIII, 407. — Voir: *Clypeosphaeria Notarisii.*

***Sphaeria coccinea** P. — T. N. G. XI, 394; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 50. — Voir: *Nectria.*

***Sphaeria cohaerens** P. — T. N. G. XI, 393; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 43. — Voir: *Hypoxylon multiforme.*

***Sphaeria complanata** Tode. — T. N. G. XI, 395. — Voir: *Metasphaeria.*

***Sphaeria concentrica** Bolt. — Prodr. Fl. Bat. II. 4, p. 42; N. K. A. 1, I, 32. — Voir: *Daldinia.*

***Sphaeria confluens** Tode. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 44. — Voir: *Hypoxylon udum.*

***Sphaeria coniformis** Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 62. — Voir: *Leptosphaeria acuta.*

***Sphaeria conjuncta** Nees. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 50. — Voir: *Diaporthe (Chorostate) conjuncta.*

***Sphaeria controversa** Desm. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 48. — Voir: *Diaporthe (Tetrastaga) controversa.*

***Sphaeria cornicola** D. C. — N. K. A. 1, I, 52. — Voir: *Phyllachora.*

***Sphaeria coronata** Hoffm. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 19. — Voir: *Valsa.*

***Sphaeria corticis** Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 59. — Voir: *Cryptosphaeria populina.*

***Sphaeria Craterium** D. C. — N. K. A. 1, I, 52. — Voir: *Trochila* (Discomycetes).

***Sphaeria crinita** P. — N. K. A. 1. V, 343: Arch. Néerl. VIII, 405. — Voir: *Lasiosphaeria.*

***Sphaeria Cruciferarum** Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 68. — Voir: *Mycosphaerella.*

***Sphaeria cruenta** Kze. — T. N. G. XI, 395. — Voir: *Phyllosticta.*

***Sphaeria culmifraga** Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 63. — Voir: *Leptosphaeria.*

***Sphaeria cupularis** P. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 52. — Voir: *Coelosphaeria.*

***Sphaeria curvirostra** Sow. — N. K. A. 2, III, 257. — Voir: *Gnomonia.*

***Sphaeria cyanogena** Desm. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 51. — Voir: *Gibberella.*

***Sphaeria decorticans** Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 59. — Voir: *Valsa.*

***Sphaeria decorticata** D. C. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 15. — Voir: *Diatrype Stigma.*

***Sphaeria Dematium** P. — T. N. G. XI, 394. — Voir: *Vermicularia.*

***Sphaeria detrusa** Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 48. — Voir: *Diaporthe (Chorostate) detrusa.*

Sphaeria deusta Hoffm. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 44. — Voir: *Ustulina vulgaris.*

***Sphaeria Dianthi** A. S. — T. N. G. XI, 395. — Voir: *Ascochyta* (Sphéropsidées).

***Sphaeria diminuens** P. — N. K. A. 1, I, 52. — Voir: *Lophidium.*

***Sphaeria disciformis** Hoffm. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 45; N. K. A. 1, I, 52. — Voir: *Diatrype.*

***Sphaeria ditopa** Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 59. — Voir: *Ditopella fusispora.*

***Sphaeria Doliolum** P. — T. N. G. XI, 395; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 62. — Voir: *Leptosphaeria.*

***Sphaeria Dothidea** Moug. — Prodr. Fl. Bat. II, 4. p. 52; N. K. A. 1, V, 344. — Voir: *Botryosphaeria.*

***Sphaeria dryina** P. — N. K. A. 1, V, 344; Arch. Néerl. VIII, 106. — Voir: *Ceratostoma piliferum.*

***Sphaeria elongata** Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 52; N. K. A. 1, V, 344. — Voir: *Cucurbitaria.*

***Sphaeria enteroleuca** Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 47. — Voir: *Diaporthe* (*Chorostate*) *leiphaema.*

***Sphaeria epicymatia** Wallr. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 60. — Voir: *Epicymatia vulgaris.*

***Sphaeria epidermidis** Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 61. — Voir: *Didymosphaeria.*

***Sphaeria episphaeria** Tode. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 56. — Voir: *Nectria.*

***Sphaeria Epochnii** B. Br. — N. K. A. 2, II, 186. — Voir: *Melanomma.*

***Sphaeria erubescens** Rob. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 57. — Voir: *Calonectria.*

***Sphaeria Eryngii** Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 67. — Voir: *Mycosphaerella.*

***Sphaeria Eryngii** Fr. α petiolicola West. Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 68; N. K. A. 2, III, 257. — Voir: *Ophiobolus.*

***Sphaeria erythrospora** Riess, Hedw. 1854; explic. de la fig. 5, table V. — Voir: *Ophiobolus.*

***Sphaeria Euphorbiae** Fuck. — N. K. A. 2, II, 103. — Voir: *Gnomoniella.*

***Sphaeria eutypa** Fr. — T. N. G. XI, 394; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 54. — Voir: *Eutypa Acharii.*

***Sphaeria excipuliformis** Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 58. — Voir: *Lophiostoma.*

***Sphaeria ferruginea** P. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 16. — Voir: *Sillia.*

***Sphaeria filicina** Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 53. — Voir: *Rhopographus.*

***Sphaeria flavovirens** P. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 45. — Voir: *Eutypa flavo-virescens.*

***Sphaeria fragiformis** P. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 42. — Voir: *Hypoxylon coccineum.*

***Sphaeria fraxinicola** Curr. — N. K. A. 2, II, 186. — Voir: *Melomastia Friesii.*

***Sphaeria frondicola** Fr. — T. N. G. XI, 395. — Voir: *Gloeosporium Tremulae* (Sphéropsidées).

***Sphaeria fusca** P. — T. N. G. XI, 393; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 43. — Voir: *Hypoxylon.*

***Sphaeria gangraena** Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, 68. — Voir: *Homostegia.*

***Sphaeria gastrina** Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 47. — Voir: *Anthostoma.*

***Sphaeria Gnomon** Tode. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 66. — Voir: *Gnomoniella vulgaris.*

***Sphaeria Godini** Desm. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 53. — Voir: *Leptosphaeria arundinacea* (Sow.) Sacc. var. Godini (West.) Sacc. Syll. II, 63.

***Sphaeria Graminis** P. — T. N. G. XI, 394; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 154. — Voir: *Phyllachora* (Sphéropsidées).

***Sphaeria granulosa** P. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 43. — Voir: *Hypoxylon multiforme.*

Sphaeria haematites Rob. Desm. Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 61. — Voir: *Leptosphaeria.*

***Sphaeria Hederae** Sow. — T. N. G. XI, 395. — Voir: *Metasphaeria.*

***Sphaeria hederaecola** Fr. — T. N. G. XI, 395. — Voir: *Leptosphaeria.*

***Sphaeria herbarum** Fr. — T. N. G. XI, 295; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 63; N. K. A. 2, III. — Voir: *Pleospora.*

***Sphaeria hirsuta** P. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 56. — Voir: *Lasiosphaeria.*

Sphaeria Hypoxylon Ehrh. — T. N. G. XI, 393. — Voir: *Xylaria.*

***Sphaeria idaea** Rob. et Desm. A. S. N. 3, VI (1846) p. 80 et exs. 1e Ed. n° 1796; Arch. Néerl. II, 46. — Espèce douteuse.

***Sphaeria Ilicis** Fr. — T. N. G. XI, 394; Fl. Bat. II, 4, p. 61. — Voir: *Diplodia* (Sphéropsidées).

Sphaeria inquilina Fr. — N. K. A. 2, II, 186. — A. rayer!

***Sphaeria insculpta** Fr. — N. K. A. 2, 1, 184; Arch. Néerl. VIII, 405. — Voir: *Zignoëlla* Rév. II, 338 et *Vialaea* N. K. A. 3, 1, 484.

***Sphaeria Juncі** Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 53; N. K. A. 2, 1, 264; Arch. Néerl. VIII, 40. — Voir: *Metasphaeria.*

***Sphaeria Laburni** P. — T. N. G. XII, 271; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 51. — Voir: *Cucurbitaria.*

***Sphaeria lanciformis** Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 46. — Voir: *Pseudovalsa.*

***Sphaeria lata** P. — T. N. G. XI, 394; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 16. — Voir: *Eutypa.*

***Sphaeria leucostoma** Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 48. — Voir: *Valsa.*

***Sphaeria lichenicola** Sommf. — T. N. G. XII, 271. — Voir: *Epicymatia.*

***Sphaeria Limminghii** West. — Prodr. Fl. Bat. II, 47. — Voir: *Cryptosporella.*

***Sphaeria Lirella** Moug. et Nestl. — T. N. G. XII, 271; Prodr. Fl. Bat. II, 1, p. 53. — Voir: *Diaporthe* (*Tetrastaga*).

***Sphaeria Loniceraе** Sow. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 60. — Voir: *Melomastia.*

***Sphaeria lugubris** Rob. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 65. — Voir: *Anthostomella.*

***Sphaeria macrostoma** Tode. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 58. — Voir: *Lophiostoma.*

***Sphaeria maculaeformis** P. — T. N. G. XI, 395; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 67. — Voir: *Mycosphaerella.*

***Sphaeria macularis** Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 61. — Voir: *Mycosphaerella.*

***Sphaeria mammaeformis** P. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 56. — Voir: *Rosellinia.*

***Sphaeria mastoidea** Fr. — T. N. G. XI, 394; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 58. — Voir: *Melanomma Friesii.*

***Sphaeria melanoplaca** Desm. — Prodr. Fl. Bat. Bat. II, 4, p. 68. — Voir: *Mycosphaerella.*

***Sphaeria modesta** Desm. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 62. — Voir: *Leptosphaeria.*

***Sphaeria moriformis** Tode. — T. N. G. XII, 271; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 57. — Voir: *Bertia.*

***Sphaeria mucosa** P. — T. N. G. XI, 394; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 52. — Voir: *Pleospora.*

***Sphaeria multiformis** Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 431. — Voir: *Hypoxylon multiforme.*

***Sphaeria myriadea** D. C. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 67. — Voir: *Sphaerulina.*

***Sphaeria nebularis** Fr. N. K. A. 1, 1, 52. — Voir: *Sphaerella.*

***Sphaeria nebulosa** P. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 54; N. K. A. 1, V. 344. — Voir: *Mycosphaerella.*

***Sphaeria nigrans** Rob. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 65. — Voir: *Leptosphaeria.*

***Sphaeria nigrella** Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 65; N. K. A. 1, 1, 52. — Voir: *Didymella.*

***Sphaeria nivea** Hoffm. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 48. — Voir: *Valsa.*

***Sphaeria nummularia** D. C. — Prodr. Fr. Bat. II, 4, p. 44. — Voir: *Nummularia Bulliardi.*

***Sphaeria obducens a. minor** Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 57. — Voir: *Teichospora.*

Sphaeria obliteseens B. Br. — N. K. A. 2, II, 186. — Voir: *Didymella rerata.*

***Sphaeria operculata** A. S. — T. N. G. XI, 394; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 59. — Voir: *Trematosphaeria applanata.*

***Sphaeria Ostruthii** Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 68. — Voir: *Stigmatea.*

***Sphaeria ovina** P. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 56. — Voir: *Lasiosphaeria.*

Sphaeria Patella Fr. — N. K. A. 1, 1, 52. — Voir: *Heterosphaeria* (Discomycètes).

***Sphaeria pellita** Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 61. — Voir: *Pyrenophora.*

Sphaeria perforans Rob. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 64; N. K. A. 2, III, 161. — Voir: *Selenospora perforans* (Sphéropsidées).

Sphaeria pertusa P. — T. N. G. XI, 394; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 58. — Voir: *Trematosphaeria.*

Sphaeria Peziza Tode. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 56. — Voir: *Nectria.*

Sphaeria Pisi Sow. — Prodr. Fl. Bat. II, p. 63. — Voir: *Pleospora.*

Sphaeria polygramma Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 54. Voir: *Mycosphaerella.*

***Sphaeria Polypodii** Rab. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 66. — Voir: *Mycosphaerella.*

***Sphaeria pomiformis** P. — N. K. A. 1, V, 343; Arch. Néerl. VIII, 405. — Voir: *Melanopsamma.*

1. **Sphaeria pruinosa** Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 4. p. 59. — Rév. 1. II, 378.

***Sphaeria Prunastri** P. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 47. — Voir: *Eutypella.*

***Sphaeria pulchella** P. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 50. — Voir: *Calosphaeria princeps.*

***Sphaeria pulicaris** Fr. — T. N. G. XI, 794; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 52. — Voir: *Gibberella.*

***Sphaeria pulveracea** Ehrh. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p.58. — Voir: *Rosellinia.*

***Sphaeria pulvis pyrius** P. — T. N. G. XI, 394. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 57. — Voir: *Melanomma.*

***Sphaeria punctiformis** P. — T. N. G. XI, 395; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 67. — Voir: *Mycosphaerella.*

***Sphaeria quaternata** P. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 50. — Voir: *Quaternaria Persoonii.*

Sphaeria quercina P. — T. N. G. XI, 393; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 15. Voir: *Diatrypella.*

***Spaeria Ribis** Tode. — T. N. G. XI, 394; Prodr. Fl. Bat. II 4, p. 51. — Voir: *Nectria.*

***Sphaeria rimosa** A. S. — T. N. G. XI, 394; Prodr. Fl. II, 4, p. 53. — Voir: *Scirrhia.*

***Sphaeria rostellata** Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 59; N. K. A. 1, V, 344. — Voir: *Diaporthe* (*Tetrastaga*).

***Sphaeria rostrata** Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 59. — Voir: *Ceratostomella.*

***Sphaeria rubella** P. — T. N. G. XI, 394; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 61. — Voir: *Ophiobolus porphyrogonus.*

***Sphaeria Rusci** Wallr. — Arch. Néerl. II, 46. — Voir: *Leptosphaeria.*

***Sphaeria sabuletorum** B. Br. — N. K. A. 2, III; 257. — Voir: *Metasphaeria.*

***Sphaeria salicella** Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 46; N. K. A. 2, I, 184; Arch. Néerl. VIII, 406. — Voir: *Diaporthe* (*Chorostate*).

***Sphaeria salicina** P. — Prodr. Fl. Bat. II, 4. p. 49. — Voir: *Valsa.*

***Sphaeria saligna** Ehrh. — Prod. Fl. Bat. II, 4, p. 66. — Voir: *Linospora Capreae.*

***Sphaeria sanguinea** Sibth. — Prod. Fl. Bat. II, 4, p. 56. — Voir: *Nectria.*

Sphaeria sapinea Fr.? Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 60.

Sphaeria scabrosa D. C. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 45. — Voir: *Eutypa.*

Sphaeria scirpicola D. C. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 63. — Voir: *Pleospora.*

Sphaeria serpens P. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 43. — Voir: *Hypoxylon.*

Sphaeria setacea P. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 66; N. K. A. 1, V, 314. — Voir: *Gnomonia.*

Sphaeria Spartii Nees. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 52. — Voir: *Pleospora.*

Sphaeria spermoides Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 57. Voir: *Lasiosphaeria.*

Sphaeria sphingiophora Oud. — N. K. A. 2. I. 184. — Voir: *Diaporthe* (*Chorostate*).

Sphaeria spiculosa P. — Prodr. Fl. Bat. II, 1, p. 16. — Voir: *Diaporthe* (*Euporthe*)

Sphaeria stellulata Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 1, p. 17. — Voir: *Eutypella.*

Sphaeria stercoraria Sow. — T. N. G. XI, 394; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 56. — Voir: *Hypocopra.*

Sphaeria Stigma Hoffm. — T. N. G. XI, 393; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 45. — Voir: *Diatrype.*

Sphaeria stilbostoma Fr. *z.* **umbilicata** Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 19. — Voir: *Calospora Platanoidis.*

Sphaeria strobilina Holl. u. Schm. — T. N. G. XI, 394; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 60. — Voir: *Dichaena.*

Sphaeria Strumella Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 1, p. 46. — Voir: *Diaporthe* (*Chorostate*).

Sphaeria Syringae Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 60; N. K. A. 1, I, 52. — Voir: *Otthia.*

Sphaeria Taxi Sow. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 61. — Voir: *Diplodia* (Sphéropsidées).

Sphaeria Tiliae Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 59. — Voir: *Hercospora.*

Sphaeria tosta B. Br. — N. K. A. 2. II. 104. — Voir: *Didymella.*

Sphaeria Trifolii P. — Prodr. Fl. Bat. II, 1, p. 54. — Voir: *Phyllachora.*

Sphaeria tristis Tode. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 55. — Voir *Nitschkia.*

Sphaeria tritorulosa B. Br. — N. K. A. 2, II. 187. — Voir: *Metasphaeria.*

*Sphaeria tubaeformis Tode. — T. N. G. XI, 395; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 66. — Voir: *Gnomoniella*.

*Sphaeria turgida P. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 49. — Voir: *Anthostoma*.

*Sphaeria undulata P. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 44. — Voir: *Diatrype Stigma*.

*Sphaeria vagans α. atriplicicola Fr. — T. N. G. XI, 395. — Voir: *Septoria Atriplicis* (Sphéropsidées).

Sphaeria vagans β. rumicicola Fr. — T. N. G. XI, 395. — Voir: *Venturia Rumicis*.

*Sphaeria vagans γ. fragariaecola Fr. — T. N. G. XI, 395. — Voir: *Phyllosticta fragaricola* (Sphéropsidées).

*Sphaeria vagans δ. malvaecola D. C. — T. N. G. XII, 271. — Voir: *Depazea* (Sphéropsidées).

*Sphaeria vagans ε. scabiosaecola D. C. — T. N. G. XII, 271. — Voir: *Depazea* (Sphéropsidées).

2. Sphaeria varia P. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 51. — Rév. II, 378.

*Sphaeria velutina Wallr. Prodr. Fl. Bat. II, 4, 46. — Voir: *Eutypa*.

*Sphaeria verruciformis Ehrh. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, 45. — Voir: *Diatrypella verruciformis*.

*Sphaeria Xylostei P. — Prod. Fl. Bat. II, 4, p. 60. — Voir: *Anthostoma*.

†20 Hypocreaceae.

1. Hyalosporae.

HYPONECTRIA.

1. Hyponectria Buxi (Desm.) Sacc. Syll. II, 455. — Oud. Rév. II, 381; N. K. A. 2, VI, 174. — Sphaeria B. Desm. — N. K. A. 1, V, 344. — Feuilles du *Buxus sempervirens*.

NECTRIELLA.

1. Nectriella Chamaecropis Oud. N. K. A. 2, IV, 524. — Id. Rév. II, 380. — Branches de l'inflor. d'un *Chamaerops*.

2. Nectriella chrysites (West.) Sacc. Syll. II, 450. — Wint. Kr. Fl. II, 110. — Nectria chrysitis (Wallr.) Kickx. — Oud. Herb. N. Pl. n° 474. — N. K. A. 2, I, 92 et 182. — Sur un trone vermoulu.

3. **Nectriella Rousseliana** (Mont.) Sacc. Syll. II, 452. — Wint. Kr. Fl. II, 109. — Oud. Rév. II, 380; N. K. A. 2, VI, 174. — Feuilles du *Buxus sempervirens*.

POLYSTIGMA.

***Polystigma fulvum** Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 69. — Voir: Pol. *ochraceum*.

***Polystigma fulvum** *α.* **aurantiacum** West. Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 69 et N. K. A. 2, V, 594 = l'état spermogonifère du *Gymnosporium Sabinae*, propre aux feuilles du *Pirus communis* = *Aecidiolum*.

1. **Polystigma ochraceum** (Wahlb.) Sacc. Syll. II, 458. — Wint. Kr. Fl. II, 115. — Oud. Rév. II, 383. — Dothidea fulva Fr. — T. N. G. XI, 396; Polystigma fulvum P. — Prodr. Fl. Bat. II, 1, p. 69. — Feuilles du *Prunus Padus*.

2. **Polystigma rubrum** (P.) D. C. — Oud. Rév. II, 382. — Prodr. Fl. Bat. II, 1, p. 69. — Sacc. Syll. II, 458; Wint. Kr. Fl. II, 144. — Dothidea rubra Fr. - T. N. G. XI, 396. — Feuilles du *Prunus spinosa*.

2. Phaeosporae.

SPHAERODERMA.

1. **Sphaeroderma Hulschoschii** Oud. N. K. A. 2, IV, 523; id. Rév. II, 384. — Sacc. Syll. Addit. ad vol. I—IV, 123 et IX, 919. — Crottin de lapin.

3. Hyalodidymae.

NECTRIA.

***Nectria chrysitis** (Wallr.) Kr. — N. K. A. 2, I, 92; Arch. Néerl. VIII, 102. — Voir: *Nectriella*.

1. **Nectria cinnabarina** (Tode) Fr. — Oud. Rév. II, 388; N. K. A. 2, I, 92; 2, V, 591. 2, VI, 173; Oud. Fgi Neerl. exs. n° 167; Herb. v. Ned. Pl. X, n° 171; Sacc. Syll. II, 479. — Wint. Kr. Fl. II, 110. — Sphaeria cinnabarina Tode. — T. N. G. XI, 394; Prodr. Fl. Bat. II, 1, p. 50. — Rameaux de l'*Aesculus Hippocastanum* et de plusieurs autres arbres.

2. **Nectria citrina** Fr. — Oud. Rév. II, 394, N. K. A. 2, VI, 173. — Sacc. Syll. II, 494. — Wint. Kr. Fl. II, 126. — N.

Citrum Oud. Arch. Néerl. VIII, 402; N. K. A. 2, II, 42. — Bois ramolli de l'*Alnus glutinosa*.

***Nectria Citrum** Wallr. — N. K. A. 2, II, 42; Arch. Néerl. VIII, 402. — Voir: *N. citrina*.

3. **Nectria coccinea** (P.) Fr. — Oud. Rév. II, 390; N. K. A. 2, I, 92; 2, VI, 173. — Oud. Herb. v. Ned. Pl. X, n°. 472. — Sphaeria cocc. P. — T. N. G. XI, 394; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 50. — Sacc. Syll. II, 481. — Wint. Kr. Fl. II, 112. — Rameaux de l'*Alnus glutinosa* et d'une espèce de *Prunus*.

4. **Nectria consanguinea** Rehm. — Oud. Rév. II, 393. — N. K. A. 2, V, 169. — Sacc. Syll. IX, 960. — Poutres de *Fagus silvatica*.

5. **Nectria Cucurbitula** (Tode) Fr. — Oud. Rév. II, 392; N. K. A. 1, V, 343; Arch. Néerl. VIII, 103. — Sacc. Syll. II, 484. — Wint. Kr. Pl. II, 114. — Rameaux d'une espèce de *Pinus*.

6. **Nectria Desmazierii** de Not. — Oud. Rév. II, 391; N. K. A. 2, VI, 173. — Sacc. Syll. II, 482. — Wint. Kr. Fl. II, 113. — Rameaux desséchés du *Buxus sempervirens*.

7. **Nectria ditissima** Tul. — Oud. Rév. II, 390; N. K. A. 2, VI, 173. — Sacc. Syll. II, 482. — Wint. Kr. Fl. II, 113. — Écorce du *Fagus silvatica*.

8. **Nectria episphaeria** (Tode) Fr. — Oud. Rév. II, 395; N. K. A. 1, V, 343; 2, VI, 173. — Sacc. Syll. II, 197. — Wint. Kr. Fl. II, 121. — Sphaeria episph. Tode. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 56. — Strome des *Diatrypella quercina*, *Diatrype Stigma* et *Eutypa Acharii*.

9. **Nectria ochracea** (Grev. et. Fr.) Fr. — Oud. Rév. II, 394. — Sacc. Syll. II, 487. — Wint. Kr. Fl. II. 115. — N. chrysitis Oud. N. K. A. 2, I, 92 et 182; Arch. Néerl. VIII, 402. — Ecorce du *Tilia cordata*.

***Nectria Oudemansii** West. — N. K. A. 2, I, 92, — Arch. Néerl. II, 46. — Voir: *Calonectria*.

10. **Nectria Peziza** (Tode) Fr. — Oud. Rév. II, 396; N. K. A. 2, VI, 173. — Sacc. Syll. II 501. — Wint. Kr. Fl. II, 124. — Sphaeria Peziza Tode. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 56. — Sur le bois mort.

11. **Nectria punicea** (Kze u. Schm.) Fr. — N. K. A. 3, II, 221. — Sacc. Syll. II, 480. — Wint. Kr. Fl. II, 112. — Rameaux du *Frangula Alnus*.

12. **Nectria Ribis** (Tode) Rab. — Oud. Rév. II, 389; id. Fgi Neerl. exs. n° 168; N. K. A. 2, VI, 173. — Sacc. Syll. II, 480. — Wint. Kr. Fl. II, 111. — Sphaeria Ribis Tode. — T. N. G. XI,

391; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 51. — Rameaux desséchés du *Ribes rubrum*.

13. **Nectria sanguinea** (Sibth.) Fr. — Oud. Rév. II, 393; N. K. A. 2, VI, 173. — Sacc. Syll. II, 493. — Wint. Kr. Fl. II, 117. — Sphaeria sang. Sibth. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 56. — Bois ramolli.

14. **Nectria sinopica** Fr. — Oud. Rév. II, 389; N. K. A. 2, V, 485; 2, VI, 173. — Sacc. Syll. II, 480. — Wint. Kr. Fl. II, 112. — Rameaux desséchés du *Hedera Helix*.

15. **Nectria Stilbosporae** Tul. — Oud. Rév. II, 393; N. K. A. 2, VI, 173. — Sacc. Syll. II, 489. — Rameau du *Carpinus Betulus*, attaqués par une Mélanconiacée.

16. **Nectria suffulta** Berk. et Curr. — Oud. Rév. II, 396; N. K. A. 2, V, 169. — Sacc. Syll. II, 502. — Pétioles pourrissants d'un *Musa Ensete*.

HYPOCREA.

1. **Hypocrea citrina** (P.) Fr. — Oud. Rév. II, 398; N. K. A. 2, VI, 173. — Sacc. Syll. II, 528. — Wint. Kr. Fl. II, 141. — Bois pourri.

2. **Hypocrea rufa** (P.) Fr. — Oud. Rév. II, 397; N. K. A. 2, V, 169 et 2, VI, 173. — Sacc. Syll. II, 520. — Wint. Kr. Fl. II, 138. — Ecorce du *Quercus Robur*.

HYPOMYCES.

1. **Hypomyces aurantius** (P.) Tul. — Oud. Rév. II, 387. — Sacc. Syll. II, 170. — Wint. Kr. Fl. II, 134. — Sphaeria aur. P. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 55. — Sur une espèce subéreuse de *Polyporus*.

4. Hyalophragmiae.

CALONECTRIA.

1. **Calonectria erubescens** (Rob.) Sacc. Syll. II, 545. — Oud. Rév. II, 399. — Sphaeria erub. Rob. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 57. — Feuilles de l'*Ilex Aquifolium*.

2. **Calonectria Oudemansii** (West.) Sacc. Syll. II, 546. — Rév. II, 400. — Nectria Oudemansii West. — Arch. Néerl. I, II, 46; N. K. A. 2, I, 92 et Herb. N. Pl. n° 473. — Rameaux d'un *Crostigma Neumanni*.

3. **Calonectria Pseudo-Peziza** (Desm.) Sacc. — Syll. II, 541. — Oud. Rév. II, 400; N. K. A. 2, VI, 174. — Rameaux du *Robinia Pseudo-Acacia*.

GIBBERELLA.

1. **Gibberella acervalis** (Moug.) Sacc. Syll. II, 555. — Wint. Kr. Fl. II, 103. — Oud. Rév. II, 403. — Sphaeria acerv. Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 51. — Rameaux du Frêne et du Saule.

2. **Gibberella baccata** (Wallr.) Sacc. Syll. II, 543. — Oud. N. K. A. 3, III, 1092. — Rameau du Robinia Pseudo-Acacia.

3. **Gibberella cyanogena** (Desm.) Sacc. Syll. II, 555. — Wint. Kr. Fl. II, 102. — Oud. Rév. II, 402; N. K. A. 2, VI, 171. — Sphaeria cyan. Desm. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 51. — Tiges pourrissantes du *Chou-fleur* et de l'*Aster Tripolium*.

4. **Gibberella pulicaris** (Fr.) Sacc. Syll. II, 552. — Wint. Kr. Fl. II, 100. — Oud. Rév. II, 401; N. K. A. 2, VI, 173. — Sphaeria pul. Fr. — T. N. G. XI, 394; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 52. — Rameaux du *Sambucus nigra*.

5. **Gibberella Saubinetii** (Mont.) Sacc. Syll. II, 554. — Wint. Kr. Fl. II, 102. — Oud. Rév. II, 402; N. K. A. 2, V, 169; 2, VI, 173. — Rameaux du *Sambucus nigra*.

5. Scolecosporae.

EPICHLOË.

2. **Epichloë typhina** (P.) Tul. — Oud. Rév. II, 409; N. K. A. 2, I, 92; 2, VI, 172; Oud. Fgi Neerl. exs. n° 77. — Sacc. Syll. II, 578. — Wint. Kr. Fl. II, 115. — Dothidea typh. Fr. — T. N. G. XI, 395. — Polystigma typhinum D. C. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 69. — Typhodium graminis Lk. — Oud. Herb. N. Pl. n° 160. — Chaumes de plusieurs Graminées.

CLAVICEPS.

1. **Claviceps microcephala** (Wallr.) Tul. — Oud. Rév. II, 406. — Sacc. Syll. II, 565. — Wint. Kr. Fl. II, 117. — Sur l'ergot qui se forme dans les fleurs du *Phragmites communis*.

2. **Claviceps purpurea** (Fr.) Tul. — Oud. Rév. II, 404; N. K. A. 2, VI, 172. — Fl. Bat. VIII, tab. 626; XII. tab. 905. — Sacc. Syll. II, 564. — Wint. Kr. Fl. II, 116. — Cordyceps purp. Fr. — Arch. Néerl. II, 15. — Sur l'ergot qui se forme dans les fleurs du *Secale cereale*.

TORRUBIA.

(Voir: *Cordyceps*.)

CORDYCEPS.

1. **Cordyceps capitata** (Holmsk.) Lk. — Oud. Rév. II, 408; N. K. A. 2, V, 169. — Sacc. Syll. II, 571. — Wint. Kr. Fl. II, 161. — Sur une espèce d'*Elaphomyces*.

2. **Cordyceps cinerea** (Tul.) Sacc. Syll. II, 570. — Wint. Kr. Fl. II, 149. — N. K. A. 3, II, 346. — Sur une larve desséchée d'une espèce de *Carabus*.

3. **Cordyceps militaris** (L.) Lk. — Oud. Rév. II, 406; Prodr. Fl. Bat. II, p. 40; N. K. A. 1, V, 341; 2, VI, 172, Fl. Bat. tab. 1395. — Sacc. Syll. II, 572. — Wint. Kr. Fl. II, 150. — Sur les larves pourrissantes de plusieurs insectes.

4. **Cordyceps ophioglossoides** (Ehrh.) Lk. — Oud. Rév. II, 407; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 40; N. K. A. 1, V, 342; 2, V, 532; 2, VI, 172. — Sacc. Syll. II, 574. — Wint. Kr. Fl. II, 151. — Torrubia ophiogl. Tul. — Oud. Fgi Néerl. exs. n°. 166. — Sur les *Elaphomyces granulata* et *muricata*.

***Cordyceps purpurea** Fr. — Arch. Néerl. II, 45. — Voir: *Claviceps*.

†[21] Microthyriaceae.

1. Hyalosporae.

MYIOCOPRON.

1. **Myiocopron Lycopodii** Rostr. — Oud. N. K. A. 3, II, 872. — Sacc. XI, 379. — Tiges et feuilles du *Lycopodium complanatum*.

2. Hyalodidymae.

ASTERINA.

1. **Asterina Hederae** Desm. — Oud. N. K. A. 2, 218. — Feuilles du *Hedera Helix*.

2. **Asterina Veronicae** Cooke. — Oud. Rév. II, 107; N. K. A. VI, 72. — Wint. Kr. Fl. II, 78. — Feuilles du *Veronica Chamaedrys*.

MICROTHYRIUM.

1. **Microthyrium microscopicum** Desm. — Oud. Rév. II, 426; N. K. A. 2, VI, 192; 3, II, 871; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 116. —

Sacc. Syll. II, 662. — Wint. Kr. Fl. II, 80. — Feuilles de l'*Ilex Aquifolium*, du *Vinca minor* et d'autres plantes.

2. **Microthyrium Quercus** Fuck. — Oud. Rév. II, 426; N. K. A. 2, II, 187. — Sacc. Syll. II, 663. — Wint. Kr. Fl. II, 80. — Feuilles du *Quercus Robur*.

4[22] Lophiostomaceae.

1. Hyalophragmiae.

LOPHIOTREMA.

1. **Lophiotrema duplex** (Karst.) Sacc. Syll. II, 679. — Wint. Kr. Fl. II, 292. — Oud. Rév. II, 428. — Sur un morceau de bois.

2. Phaeophragmieae.

LOPHIOSTOMA.

1. **Lophiostoma Arundinis** (Fr.) Ces. et de Not. — Oud. Rév. II, 429; N. K. A. 2, I, 264; 2 VI, 187; Arch. Néerl. VIII, 104. — Sacc. Syll. II, 699. — Wint. Kr. Fl. II, 301. — Chaumes du *Phragmites communis*.

2. **Lophiostoma caulium** (Fr.). Ces et de Not. — Oud. Rev. II, 429; N. K. A. 2, VI, 186. — Sacc. Syll. II, 697. — Wint. Kr. Fl. II, 300. — Sphaeria caulium Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 1, p. 63. — Tige de plantes herbacées.

3. **Lophiostoma Desmazierii** Sacc. et Speg. — Oud. Rév. II, 428; N. K. A. 2, V, 185; 2, VI, 187. — Sacc. Syll. II, 693. — Wint. Kr. Fl. II, 299. — Rameaux du *Philadelphus coronarius*.

4. **Lophiostoma excipuliforme** (Fr.) Ces. et de Not. — Sacc. Syll. II, 700. — Sphaerie excip. Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 1, p. 58. — Ecorce de chêne.

5. **Lophiostoma insidiosum** (Desm.) Ces. et de Not. Oud. Rév. II, 431; N. K. A. 2, VI, 37 et 137. — Sacc. Syll. II, 703. — Wint. Kr. Fl. II, 304. — Tiges desséchées de l'*Echium vulgare*.

6. **Lophiostoma macrostomum** (Tode) Ces. et de Not. — Oud. Rév. II, 430. — Sacc. Syll. II. 700. — Wint. Kr. Fl. II, 302. — Sphaeria macrostoma Tode. — Prodr. Fl. Bat. II, 1. p. 58. — Morceau d'écorce tombé.

3. Phaeodictyae.

LOPHIDIUM.

***Lophidium compressum** Sacc. — N. K. A. 2, V, 486 et 2, VI, 187. — Voir: *Platystomum.*

1. **Lophidium diminuens** (P.) Ces. et de Not. — Sacc. Syll. II, 714. — Sphaeria diminuens P. — N. K. A. 1, 52. — Ram. du *Cornus sanguinea.*

PLATYSTOMUM.

1. **Platystomum compressum** (P.)Sacc. Syll. XIV, 27 (en ce qui concerne le genre). — Lophidium compr. (P.) Sacc. Syll. II, 711. — Oud. Rév. II, 132; N. K. A. 2, V, 486; 2, VI, 187. — Lophiostoma compressum Ces. et de Not. — Wint. Kr. Fl. II, 305. — Sur un rameau tombé d'une espèce de *Populus.*

2. **Platystomum diminuens** (P.). Sacc. Syll. XIV, 27 (en ce qui concerne le genre). — Lophidium dimin. (P.) Sacc. Syll. II, 714. — Oud. Rév. II, 432. — Sphaeria dimin P. — N. K. A. 1. 1, 51. — Sur un rameau du *Cornus sanguinea.*

†[23] Hysteriaceae.

× HYSTERIEAE.

1. Hyalosporae.

SCHIZOTHYRIUM.

1. **Schizothyrium Ptarmicae** Desm. — Oud. Rév. II, 434; N. K. A. 2, VI, 192; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 115. — Sacc. Syll. II, 725. — Wint. Kr. Fl. III, 75. — Labrella Pt. Desm. — T. N. G. XI, 396. — Feuilles et tiges de l'*Achillea Ptarmica.*

2. Hyalodidymae.

AULOGRAPHUM.

1. **Aulographum Hederae** Lib. — Oud. Rév. II, 436. — Aul. vagum Desm. — N. K. A. 2, VI, 192. — Sacc. Syll. II, 727. — Wint. Kr. Fl. III, 8. — Aul. vagans Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 80. — Feuilles des *Hedera Helix* et *Ilex Aquifolium.*

*__Autographum vagum__ Desm. — N. K. A. 2, VI, 192; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 80. — Voir: *A. Hederae*.

GLONIUM.

1. __Glonium lineare__ (Fr.) de Not. — Oud. Rév. II, 137; N. K. A. 2, VI, 192. — Sacc. Syll. II, 732. — Wint. Kr. Fl. III, 10. — Hysterium lineare Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 77. — Sur le bois vermoulu et les rameaux du *Quercus Robur*.

3. Phaeodidymae.

LEMBOSIA.

1. __Lembosia autographoides__ Bomm. Rouss. Sacc. dans Sacc. Syll. IX, 1107. — Oud. Rév. II, 438; N. K. A. 2, VI, 192. — Rameaux du *Rhododendrum ponticum* cultivé.

4. Hyalophragmiae.

DICHAENA.

1. __Dichaena faginea__ (P.) Fr. — Oud. Rév. II, 143; N. K. A. 2, VI, 193. — Sacc. Syll. II, 771. — Wint. Kr. Fl. III, 50. — Rameaux du *Fagus silvatica*.

2. __Dichaena quercina__ (P.) Fr. — Oud. Rév. II, 142; N. K. A. 2, V, 186; 2, VI, 193. — Sacc. Syll. II, 771. — Wint. Kr. Fl. III, 50. — Ecorce du *Quercus Robur*.

3. __Dichaena strobilina__ Fr. — Oud. Rév. II, 443; N. K. A. 2, III, 161; 2, VI, 193. — Sacc. Syll. II, 771. — Wint. Kr. Fl. III, 51. — Sphaeria strobilina Holle et Schm. — T. N. G., XI, 394. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 60, 51. — Face inférieure des écailles des *Abies*.

5. Phaeophragmiae.

HYSTERIUM.

*__Hysterium aggregatum__ D. C. — N. K. A. 1, 1, 51. — Voir *Mytilidion*.

1. __Hysterium angustatum__ A. S. — Oud. Rév. II, 441; N. K. A. 2, VI, 193. — Sacc. Syll. II, 744. — Wint. Kr. Fl. III, 11. — Rameaux d'une espèce de *Populus*.

*__Hysterium arundinaceum__ Schrad. — T. N. G. XI, 393. — Voir: *Lophodermium*.

*__Hysterium commune__ Fr. — N. K. A. 2, I, 182; Arch. Néerl. VIII, 402. — Voir: *Hypoderma*.

*__Hysterium conigenum__ Moug. et Nestl. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 78. — Voir: *Hypoderma*.

*__Hysterium culmigenum__ Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 80. Voir: *Lophodermium arundinaceum*.

*__Hysterium foliicolum__ Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, p. 80. — Voir: *Lophodermium hysterioides*.

*__Hysterium Fraxini__ P. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 77. — Voir: *Hysterographium*.

__Hysterium grammodes__ de Not. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 77. — Voir: *Hysterographium*.

__Hysterium Lauri__ Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 79. — Voir: *Hypoderma*.

*__Hysterium lineare__ Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 77. — Voir: *Glonium*.

*__Hysterium petiolare__ A. S. — N. K. A. I. V, 341; Arch. Néerl. VIII, 402. — Voir: *Lophodermium petiolicolum*.

*__Hysterium Pinastri__ Schrad. — T. N. G. XI, 393; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 78. — Voir: *Lophodermium*.

*__Hysterium Pinastri__ β. __juniperinum__ Fr. — T. N. G. XI, 393; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 79. — Voir: *Lophodermium juniperinum*.

2. __Hysterium pulicare__ P. — Oud. Rév. II, 440; N. K. A. 1, I, 50; 2, VI, 192; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 77. — Sacc. Syll. II, 743. — Wint. Kr. Fl. III, 13. — Bois et écorce du *Quercus Robur*, et d'espèces de *Populus* et de *Salix*.

__Hysterium punctiforme__ Fr. S. M. II, 593. — N. K. A. 1, I, 51. — Voir: *Lophodermium*.

*__Hysterium rocheanum__ Duby. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 77. — Voir: *Gloniopsis*.

*__Hysterium Rubi__ P. — N. K. A. 1, V, 345; Prod. Fl. Bat. II, 4, p. 79. — Voir: *Hypoderma virgultorum*.

__Hysterium rugosum__ Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 78. — α et β. Voir: *Psilospora faginea* et *Ps. Quercus*.

3. __Hysterium Wallrothii__ Duby. — Oud. Rév. II, 441; N. K. A. 2, V, 169 et 2, VI, 192. — Sacc. Syll. II, 745. — Hysteropatella Rostii (Duby) Rehm in Wint. Kr. Fl. III, 367. — Branches tombées.

MYTILIDION.

1. **Mytilidion aggregatum** (D. C.) Duby. — Sacc. Syll. II, 760. Hysterium aggreg. D. C. — Tronc de Saule âgé.

6. Hyalodictyae.

GLONIOPSIS.

1. **Gloniopsis australis** (Duby) Sacc. Syll. II, 774. — Oud. Rév. II, p. (13): N. K. A. 3, 1, 484. — Branches décortiqués d'une espèce de *Populus*.

2. **Gloniopsis biformis** (Fr.) Sacc. Syll. II, 773. — N. K. A. 3, 1, 235. — Branches d'une espèce de *Populus*.

3. **Gloniopsis curvata** (Fr.) Sacc. Syll. II, 775. — Oud. Rév. II. 445. — Hysterographium curvatum Wint. Kr. Fl. III, 17; N. K. A. 2, VI, 193. — Rameaux du *Rhododendron ponticum*.

4. **Gloniopsis Rocheana** (Duby) Sacc. Syll. II, 773. — Oud. Rév. II, 445. — Hysterium Rocheanum de Not. Prodr. Fl. Bat. II, 1, p. 77. — Ecorce d'un arbre inconnu.

7. Phaeodictyae.

HYSTEROGRAPHIUM.

***Hysterographium curvatum** Rehm. N. K. A. 2, VI, 193. — Voir: *Gloniopsis*.

1. **Hysterographium flexuosum** (Schwein.) Sacc. Syll. II, 781. — Oud. Rév. II, 447; N. K. A. 2, V, 169 et 2, VI, 193. — Rameaux d'une espèce d'*Acer*.

2. **Hysterographium Fraxini** (P.) de Not. — Oud. Rév. II, 446; N. K. A. 2, VI, 193. — Sacc. Syll. II, 776. — Wint. Kr. Fl. III, 19. — Hysterium Fraxini P. — T. N. G. XI, 393; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 77; Oud. Fgi. Neerl. exs. n° 282. — Rameaux du *Fraxinus excelsior*.

3. **Hysterographium grammodes** (de Not.) Sacc. (Syll. II, 782). — Hysterium grammodes de Not. — Prodr. Fl. Bat. II, p. 77. Bois ramolli du *Quercus Robur*.

8. Scolecosporae.

HYPODERMA.

1. **Hypoderma aquilinum** (Schum.) Rehm. — Sacc. Syll. II, 789. — Sphaeria aquilina Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 66.

2. **Hypoderma commune** (Fr.) Duby. — Oud. Rév. II, 151; N. K. A. 2, VI, 193. — Sacc. Syll. II, 788. — Wint. Kr. Fl. III, 32. — Hysterium commune Fr. — N. K. A. 2, I, 182; Arch. Néerl. VIII, 402. — Tige d'un *Rumex*.

3. **Hypoderma conigenum** (Fr.) Sacc. Syll. II, 786. — Wint. Kr. Fl. III, 35. — Oud. Rév. II. 450. — Hysterium conigenum Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 78. — Ecailles des cônes du *Pinus silvestris*.

4. **Hypoderma Hederae** (Mart.) de Not. — Oud. Rév. II, 449; N. K. A. 2, VI, 193. — Sacc. Syll. II, 784. — Wint. Kr. Fl. III. 33. — Hysterium Hed. Mart. — Prodr. Fl. Bat. II. 4. p. 80. — F. du *Hedera Helix*.

5. **Hypoderma Lauri** (Fr.) Duby. — Oud. Rév. II, 449. — Sacc. Syll. II, 784. — Lophodermium Lauri Wint. Kr. Fl. III, 37. — Hysterium Lauri Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 4. p. 79. — F. du *Laurus nobilis*.

6. **Hypoderma scirpinum** D. C. — Oud. Rév. II. 152. — Sacc. Syll. II, 788. — Wint. Kr. Fl. III, 34. — Hysterium scirp. Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, p. 79. — Tiges du *Scirpus lacustris*.

7. **Hypoderma virgultorum** D. C. — Oud. Rév. II, 451. — Sacc. Syll. II, 786. — Wint. Kr. Fl. III, 32. — Hysterium Rubi P. — N. K. A. 1, V, 341; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 78; Hyst. petiolare N. K. A. 1, V. 341. — Sarments d'une espèce de *Rubus* et pétioles de l'*Acer Pseudo-Platanus*.

LOPHODERMIUM.

1. **Lophodermium arundinaceum** (Schrad.) — Chev. Oud. Rév. II, 157. — N. K. A. 2, VI, 193. — Sacc. Syll. II, 795. — Wint. Kr. Fl. III, 45. — Hysterium arund. Schrad. — T. N. G. XI, 392; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 79. — Hyst. culmigenum *z.* graminenm Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 80. — Chaumes du *Phragmites communis*.

Var. *abbreviatum* N. K. A. 2, VI, 193; Oud. Rév. II, 158. — Hyst. culmig. var. abbrev. Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 80. — Chaumes du *Psamma littoralis*.

2. **Lophodermium hysteroides** (P.) Sacc. Syll. II, 701. — Wint. Kr. Fl. III, 38. — Oud. Rév. II, 453; N. K. A. 2, VI, 193. — Hysterium foliicolum Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 80. — F. du *Crataegus monogyna*.

3. **Lophodermium juniperinum** (Fr.) de Not. — Oud. Rév. II, 157. — Sacc. Syll. II, 794. — Wint. Kr. Fl. III, 44. — Hysterium

Pinastri β juniperinum Fr. — T. N. G. XI, 393; Prodr. Fl. Bat. II, p. 79. — Aiguilles des *Juniperus communis* et *Sabina officinalis* (cultivé).

4. **Lophodermium maculare** (Fr.) de Not. — Oud. Rév. II, 155; N. K. A. 2, IV, 525. — Sacc. Syll. II, 791. — Wint. Kr. Fl. III, 39. — F. du *Quercus rubra*.

5. **Lophodermium melaleucum** (Fr.) de Not. — Oud. Rév. II, 454; N. K. A. 2, IV, 525. — Sacc. Syll. II, 791. — Wint. Kr. Fl. III, 38. — F. du *Vaccinium Vitis idaea*.

6. **Lophodermium petiolicolum** Fuck. — Oud. Rév. II, 455. — Sacc. Syll. II, 793. — Wint. Kr. Fl. III, 41. — Hysterium punctiforme Fr. — N. K. A. 1, I, 51; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 80. — Hyst. petiolare A. S. — N. K. A. 1, V, 341; Arch. Néerl. VIII. 402. — Pètioles du *Quercus Robur* et de l'*Acer Pseudo-Platanus*.

7. **Lophodermium Pinastri** (Schrad.) Chev. — Oud. Rév. II, 456; N. K. A. 2, I, 93; 2, III, 156; 2, VI, 193; 3, II, 867; Oud. Herb. N. Pl. n° 518. — Sacc. Syll. II, 794. — Wint. Kr. Fl. III, 43. — Hysterium Pinastri Schrad. — T. N. G. XI, 393. — Hyst. Pin. a. et b. Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 78 et 79. — Aiguilles des *Pinus silvestris*, *Pinaster* et *Cembra*, et du *Picea excelsa*.

8. **Lophodermium punctiforme** (Fr.) Fuck. — Sacc. Syll. II, 793. — F. du *Quercus Robur*.

SPOROMEGA.

1. **Sporomega cladophila** Duby. — Oud. N. K. A. 3, III, 1093. Rameaux du *Vaccinium Vitis idaea*.

COLPOMA.

1. **Colpoma quercinum** (P.) Wallr. — Oud. Rév. II, 460; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 81; N. K. A. 2, VI, 194. — Sacc. Syll. II, 803. — Clithris quercina Rehm in Wint. Kr. Fl. III, 102. — Cenangium quercinum Fr. — T. N. G. XII, 270. — Rameaux du *Quercus Robur*.

LOPHIUM.

1. **Lophium mytilinum** (P.) Fr. — Oud. Rév. II, 159; N. K. A. 1, V, 341; Arch. Néerl. VIII, 402. — Sacc. Syll. II, 799; Wint. Kr. Fl. III, 26. — Bois ramolli.

×× ACROSPERMEAE.

1. Scolecosporae.

ACROSPERMUM.

1. **Acrospermum compressum** Tode. — Oud. Rév. II, 461; Prodr. Fl. Bat. II. 1, p. 25. — Sacc. Syll. II, 807. — Wint. Kr. Fl. III, 53. — Tiges desséchées de l'*Urtica dioica* et d'une espèce de *Carduus*.

2. **Acrospermum graminum** Lib. — Oud. Rév. II, 462; Prodr. Fl. Bat. II. 1, p. 25; N. K. A. 2, VI, 184. — Sacc. Syll. II, 807. — Acrosp. compressum var. graminum Lib. — Wint. Kr. Fl. III, 55. — F. d'un *Poa* et de l'*Elymus arenarius*.

†[24] Elaphomycetaceae.

1. Phaeosporae.

1. **Elaphomyces granulatus** Fr. — Oud. Rév. II, 112; Hartsen, Liste des Fonges supérieurs, 16; N. K. A. 1, V, 298. — Sacc. Syll. VIII, 868. — Caché dans le sable des sapinières.

Elaphomyces muricatus Fr. — N. K. A. 1, V, 347. Arch. Néerl. VIII, 101. — Voir: *El. variegatus*.

2. **Elaphomyces variegatus** Vittad. — Oud. Rév. II, 112. — Sacc. Syll. VIII, 867. — El muricatus Fr. — N. K. A. 1, V, 347. — Caché dans le sol des bois feuillés.

†[25] Cenococcaceae.

1. Phaeosporae.

1. **Cenococcum geophilum** Fr. — Oud. Rév. II, 113; T. N. G. XI, 389. Prodr. Fl. Bat. II, 1, p. 16; Arch. Néerl. XV. — Sacc. Syll. VIII, 871.

†[26] Tuberaceae.

× TUBEREAE.

1. Phaeosporae.

PACHYPHLAEUS.

1. **Pachyphlaeus luteus** Hesse. Fischer dans Wint. Kr. Fl. V, 34. — Oud. N. K. A. 3, II, 345. — Caché sous terre.

TUBER.

1. **Tuber excavatum** Vittad. — Oud. N. K. A. 3, II, 212. — Sacc. Syll. VIII, 886. — Wint. Kr. Fl. V, 55. — Caché sous terre.
2. **Tuber puberulum** B. Br. — Oud. N. K. A. 3, II, 212. — Sacc. Syll. VIII, 893. — Wint. K. Fl. V, 45. — Caché sous terre.

†[27] Helvellaceae.

× MORCHELLEAE.

1. Hyalosporae.

MORCHELLA.

1. **Morchella esculenta** (L.) Pers. — T. N. G. XI, 390; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 394; N. K. A. 2, I, 93 et 149; 2, V, 532 et 593; 2, VI, 356. — Oud. Herb. N. Pl. n°. 542. — Fl. Bat. tab. 670. — Sacc. Syll. VIII, 8. — Wint. Kr. Fl. III, 1206.
2. **Morchella conica** P. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 394; N. K. A. 2, V, 593; Fl. Bat. tab. 1435. — Sacc. Syll. VIII, 9. — Wint. Kr. Fl. III, 1203.
3. **Morchella Gigas** (Batsch) P. — Oud. N. K. A. 3, II, 867. — Sacc. Syll. VIII, 12. — Wint. Kr. Fl. III, 1203.
4. **Morchella hybrida** (Sow.) P. — Sacc. Syll. VIII, 13. — Wint. Kr. Fl. III, 1201. — M. semilibera Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 394; 2, I, 149; N. K. A. 2, V, 593.
5. **Morchella patula** Fr. — Oud. N. K. A 2, I, 316 et 149; Arch. Néerl. III, 394. — Sacc. Syll. VIII, 14.
6. **Morchella rimosipes** D. C. — Oud. N. K. A. 3, II, 686. — Sacc. Syll. VIII, 12. — Wint. Kr. Fl. III, 1202.

***Morchella semilibera** D. C. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 394; N. K. A. 2, I, 149. — Voir: *M. hybrida*.

GYROMITRA.

1. **Gyromitra esculenta** (P.). Fr. — Oud. N. K. A. 2, IV, 255. — Sacc. Syll. VIII, 16. — Wint. Kr. Fl. III, 1190.
2. **Gyromitra suspecta** Krombh. — Sprée in N. K. A. I, V, 336; Arch. Néerl. VIII, 395. — Sacc. Syll. VIII, 21, sub *Helvella infula*, quod minus justum videtur. — Wint. Kr. Fl. III, 1194.

HELVELLA.

1. **Helvella atra** König. — N. K. A. 1, V, 337; Arch. Néerl. VIII, 395; Oud. Fgi. Néerl. exs. n°. 287. — Sacc. Syll. VIII, 27. — Wint. Kr. Fl. III, 1182.

2. **Helvella crispa** (Scopoli) Fr. — T. N. G. XI, 390; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 394; N. K. A. 2, I, 449; 2, VI 356; Fl. Bat. tab. 1155. — Sacc. Syll. VIII, 18. — Wint. Kr. Fl. III, 1188.

3. **Helvella elastica** Bull. — T. N. G. XI, 390; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 394. — Sacc. Syll. VIII, 24. — Wint. Kr. Fl. III, 1183.

4. **Helvella Ephippium** Lév. — N. K. A. 3, II, 202. — Sacc. Syll. VIII, 28. — Wint. Kr. Fl. III, 1180.

5. **Helvella infula** Schäff. — T. N. G. XII, 270. — Sacc. Syll. VIII, 21. — Gyromitra infula Quél. in Wint. Kr. Fl. III, 1191.

6. **Helvella lacunosa** Afzel. T. N. G. XI, 390; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 394; N. K. A. 2, I, 409; 2, VI, 356 et 3, I, 466; Fl. Bat. tab. 1200. — Sacc. Syll. VIII, 19. — Wint. Kr. Fl. III, 1186.

7. **Helvella macropus** (P.) Karst. — Sacc. Syll. VIII, 28. — Peziza macropus P.. — T. N. G. XI, 390; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 397; N. K. A. 2, I, 450; 2, V, 165; Oud. Fgi. Néerl. n°. 292. — Lachnea macropus (P.) Phill. — N. K. A. 2, VI, 363. — Macropodia macropus Fuck. — Wint. Kr. Fl. III, 985. — Peziza fibrosa Wallr. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 397.

8. **Helvella Monachella** (Scop.) Fr. — Oud. N. K. A. 2, IV, 256. — Sacc. Syll. VIII, 22. — Wint. Kr. Fl. III, 1185.

9. **Helvella pezizoides** Afzel. — N. K. A., 3, II, 202. — Sacc. Syll. VIII, 27. — Wint. Kr. Fl. III, 1179.

10. **Helvella pulla** Holmskj. — N. K. A. 3, II, 679. — Sacc. Syll. VIII, 26. — Wint. Kr. Fl. III, 1182.

11. **Helvella sulcata** Afzel. — N. K. A. 2, VI, 27. — Sacc. Syll. VIII, 20. — Wint. Kr. Fl. III, 1186, sub H. lacunosa.

VERPA.

1. **Verpa digitaliformis** P. — Oud. N. K. A. 3, I, 165. — Sacc. Syll. VIII, 29. — Wint. Kr. Fl. III, 1196, sub V. conica.

×× GEOGLOSSEAE.

MITRULA.

1. **Mitrula cucullata** (Batsch) Fr. — N. K. A. 1, V, 337; Arch. Néerl. VIII 395 et 2, VI, 356. — Sacc. Syll. VIII, 33. — Wint.

Kr. Fl. III, 1148. — Aiguilles pourrissantes du *Pinus silvestris* et de l'*Abies alba*.

***Mitrula paludosa** Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 395; N. K. A. 1, 1, 50. — Voir *M. phalloides*.

2. **Mitrula phalloides** (Bull.) Chev. — Sacc. Syll. VIII, 33. — Wint. Kr. Fl. III, 1147. — M. paludosa Fr. — N. K. A. 1, 1, 50; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 395; N. K. A. 1, 1, 49; 2, V, 532; Fl. Bat. tab. 1425. — Débris végétaux pourrissants dans les endroits marécageux des sapinières.

3. **Mitrula sclerotipes** Boudier. — N. K. A. 3, II, 202. — Sacc. Syll. VIII, 35. — Sur le Hypnum Schreberi dans les endroits humides des bois.

MICROGLOSSUM.

1. **Microglossum viride** (P.) Gill in Wint. Kr. Fl. III, 1151. Geoglossum viride P. — N. K. A. 1, V, 337; 2, VI, 356; Arch. Néerl. VIII, 395. — Mitrula viridis (P.) Karst in Sacc. Syll. VIII, 38. — Au milieu des mousses, dans l'ombre des Hêtres (*Fagus silvatica*).

CUDONIELLA.

1. **Cudoniella acicularis** (Bull.) Schröt. — N. K. A. 3, II, 203. — Wint. Kr. Fl. III, 1167. — Helotium aciculare (Bull.) P. in Sacc. Syll. VIII, 217. — Bois ramolli.

2. Phragmosporae.

GEOGLOSSUM.

***Geoglossum glabrum** P. — T. N. G. XII, 269; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 395; N. K. A. 2, I, 449; 2, VI, 356. — Voir: *Geoglossum ophioglossoides*.

1. **Geoglossum glutinosum** P. — N. K. A. 1, V, 337. — Arch. Néerl. VIII, 395. — Sacc. Syll. VIII, 42. — Wint. Kr. Fl. III, 1154. — Gazons dans les endroits sablonneux.

2. **Geoglossum hirsutum** P. — T. N. G. XI, 389; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 395; N. K. A. 1, V, 337. — Sacc. Syll. VIII, 46. — Wint. Kr. Fl. III, 1157. — Gazons et prés.

3. **Geoglossum ophioglossoides** (L.) Sacc. Syll. VIII, 43. — Wint. Kr. Fl. III, 1155. — G. glabrum P. — T. N. G. XII, 269; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 395; N. K. A. 2, VI, 356. — Gazons et prés.

*__Geoglossum viride__ P. — N. K. A. 1, V. 337; 2, VI, 356. — Arch. Néerl. VIII, 395. — Voir: *Microglossum*.

4. __Geoglossum viscosum__ P. — N. K. A. 3, II, 203. — Sacc. Syll. VIII, 43. — Wint. Kr. Fl. III, 1151. — Endroits herbacés.

5. __Geoglossum Walteri__ Berk. — N. K. A. 2, IV, 256. — Sacc. Syll. VIII, 45.

3. Scolecosporae.

SPATHULARIA.

1. __Spathularia clavata__ (Schaeff.) Sacc. Syll. VIII. 18. — Wint. Kr. Fl. III, 1158. — Spathulea flavida Fr. — N. K. A. 1, V, 337; Arch. Néerl. VIII, 395. — A terre dans les sapinières.

***SPATHULEA.**

*__Spathulea flavida__ Fr. — N. K. A. 1, V. 337; Arch. Néerl. VIII, 395. — Voir: *Sp. clavata*.

†[28] Pezizaceae.

1. Hyalosporae.

ACETABULA.

1. __Acetbula helvelloides__ (Lasch) Sacc. Syll. VIII 62. — Wint. Kr. Fl. III, 981. — Peziza helv. Lasch — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 396; N. K. A. 2, 1, 450. — Parmi l'herbe dans un terrain sablonneux.

2. __Acetabula leucomelas__ P. — N. K. A. 3, II, 203. — Sacc. Syll. VIII, 61. — Wint. Kr. Fl. III, 981. — Endroits ombragés à sol argileux.

3. __Acetabula sulcata__ (P.) Fuck. — N. K. A. 3, II, 204. — Sacc. Syll. VIII, 62. — Wint. Kr. Fl. III, 982. — Terrains boisés.

4. __Acetabula vulgaris__ Fuck. — Sacc. Syll. VIII, 59. — Wint. Kr. Fl. III, 983. — Peziza Acetabulum L. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 396; N. K. A. 2, 1, 450; 2, VI, 360; Fl. Bat. tab. 1105[3]. — Vergers et endroits herbeux ombragés.

GEOPYXIS.

1. __Geopyxis ammophila__ (Dur. Mont.) Sacc. Syll. VIII, 70. — Peziza ammophila Dur. Mont. — N. K. A. 2, V, 471; et VI,

360; Fl. Bat. tab. 1700. — Dans le sable des dunes maritimes.

2. **Geopyxis brevipes** (van den Bosch) Sacc. Syll. VIII, 68. — Peziza brevipes van den Bosch Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 398. — Au pied d'aunes âgés (*Alnus glutinosa.*)

3. **Geopyxis Craterium** Rehm in Wint Kr. Fl. III, 971. — N. K. A. 3, II, 204. — Plectania adusta (Schultz) et Pl. lugubris (Kalchbr.) Sacc. Syll. VIII, 164. — Lieux boisés.

4. **Geopyxis cupularis** (L) Sacc. Syll. VIII, 72. — Wint. Kr. Fl. III, 972. — Peziza cupularis L. — Arch. Néerl. II, 44 (Foi d'exemplaires récoltés par feu le Dr. F. A. Hartsen en Sept. 1863 à Overveen, dans les endroits boisés de la campagne Elswoud); N. K. A. 2, I, 450; 2, VI, 360.

5. **Geopyxis muralis** (Sow.) Sacc. Syll. VIII, 72. — N. K. A. 3, II, 205.

6. **Geopyxis Rapulum** (Bull.) Sacc. Syll. VIII, 61. — Peziza Rapulum Bull. — T. N. G. XII, 270; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 397.

PLICARIA.

***Plicaria sepiatra** Rehm. — N. K. A. 3, II, 344. Voir. *Peziza.*

PEZIZA.

1. **Peziza abietina** P. — Arch. Néerl. I, II, 44. — Sacc. Syll. VIII, 80. — Discina abietina (P.) Wint. Kr. Fl. III, 977. — Aiguilles pourrissantes dans une sapinière.

***Peziza Acetabulum** L. — T. N. G. XII, 270; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 396; N. K. A. 2, I, 450; 2, VI, 360. — Voir: *Acetabula vulgaris.*

***Peziza aeruginosa** Vahl — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 404; N. K. A. 2, I, 451. — Voir: *Chlorosplenium.*

***Peziza albida** Rob. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 6. — Voir: *Phialea.*

***Peziza albo-testacea** Desm. — N. K. A. 1, V, 339; Arch. Néerl. VIII, 397. — Voir: *Trichopeziza.*

***Peziza albo-violascens** A. S. — T. N. G. XI, 390. — Voir: *Cyphella* (Théléphoracées).

***Peziza alpina** Oud. N. K. A. 2, IV, 257. — Voir: *Lachnea.*

2. **Peziza alutacea** P. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 398. — Fl. Bat. tab. 1105; N. K. A. 2, I, 450. — Sacc. Syll. VIII, 78. — Plicaria alut. (P.) Fuck. — Wint. Kr. Fl. III. 1014. — Terrains boisés, aux endroits humides.

***Peziza amentacea** Balb. — Arch. Néerl. II, 15. — Voir: *Ciboria*.

***Peziza ammophila** Dur. et Mont. — N. K. A. 2, V, 171; 2, VI, 360. — Voir: *Geopyxis*.

***Peziza ancilis** P. — N. K. A. 1, I, 50; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 398. — Voir: *Discina*.

***Peziza anomala** P. — T. N. G. XI, 390. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 402. — Voir: *Soleuia* (Polyporacées).

3. **Peziza applanata** (Hedwig) Fr. — T. N. G. XI, 390; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 398; N. K. A. 2, I, 450. — Sacc. Syll. VIII, 92. — Humaria applanata (Hedw.) Wint. Kr. Fl. III, 919. — Terrain argileux humide.

***Peziza arduennensis** Mont. — Prodr. Fl. Bat. II, 1, p. 7. — Voir: *Pezicula rhabarbarina*.

***Peziza arenivaga** Desm. — Prodr. Fl. Bat. II, 1, p. 7. — Voir: *Mollisia*.

***Peziza atrata** P. — N. K. A. 2, I, 263 et 451; Arch. Néerl. VIII, 399. — Voir: *Pyrenopeziza*.

4. **Peziza aurantia** P. — T. N. G. XI, 390; Prodr. Fl. Bat. II, 399; N. K. A. 2, I, 450; 2, VI, 360; Fl. Bat. tab. 1135[2], 1185 et 1610 (var. gigantea Vuijck). — Sacc. Syll. VIII, 74. — Aleuria aurantia (P.) Fuck. — Wint. Kr. Fl. III, 970. — Terrains sablonneux humides.

***Peziza Aurelia** P. — N. K. A. 1, V, 339; Arch. Néerl. VIII, 398. — Voir: *Belonidium*.

3. **Peziza badia** P. — N. K. A. 2, VI, 360. — Terrains sablonneux humides.

***Peziza barbata** Kze. — N. K. A. 1, V, 339; Arch. Néerl. VIII, 397. — Voir: *Lachnella*.

***Peziza bicolor** Bull. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 401; T. N. G. XI, 390. — Voir: *Dasyscypha*.

***Peziza brevipes** van den Bosch. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 398. — Voir: *Geopyxis*.

6. **Peziza brunneo-atra** Desm. — Prodr. Fl. Bat. II, 1, p. 5. — Sacc. Syll. VIII, 92. — Plicaria br.-atra (Desm.) Wint. Kr. Fl. III, 1010. — Terrains humides.

***Peziza brunneola** Desm. — N. K. A. 1, V, 338; Arch. Néerl. VIII, 397. — Voir: *Dasyscypha*.

***Puccinia Buccina** P. — N. A. K. 2, I, 451. — Voir: *Helotium*.

***Puccinia bulborum** (Wakker) N. K. A. 2, IV, 260. — Voir: *Sclerotinia*.

***Puccinia caesia** P. — N. K. A. 2, I, 263 et 451; Arch. Néerl. VIII, 398. — Voir: *Mollisia*.

*__Puccinia calycina__ Schum. — N. K. A. 2, II, 103. — Voir: *Dasyscypha calyciformis.*

*__Puccinia caulicola__ Fr. — N. K. A. 1, V, 338. — Voir: *Dasyscypha.*

*__Puccinia Cerastiorum__ Wallr. — N. K. A. 2, II, 185. — Voir: *Pseudopeziza.*

7. __Puccinia cerea__ (Sow.) Fr. — T. N. G. XII, 270; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 399; N. K. A. 2, I, 150; 2, IV, 257. — Sacc. Syll. VIII, 59. — Pustularia vesiculosa var. cerea Wint. Kr. Fl. III, 1018. — Sur la terre grasse.

*__Peziza cerina__ P. — N. K. A. 1, V, 338; Arch. Néerl. VIII, 396. — Voir: *Dasyscypha.*

8. __Peziza cervina__ (Fuck) Sacc. Syll. VIII, 84. — Plicaria cervina Fuck. — Wint. Kr. Fl. III, 1012. — N. K. A. 3, II, 313. — Terre argileuse.

*__Peziza chrysocoma__ Bull. — T. N. G. XI, 391; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 404; N. K. A. 2, I, 451. — Voir: *Orbilia.*

*__Peziza ciliaris__ Schrad. — Prodr. Fl. Bat. II, 1, p. 5. — Voir: *Dasyscypha.*

*__Peziza cinerea__ Batsch T. N. G. XI, 391. — Voir: *Mollisia.*

*__Peziza cinerella__ Karsr. — N. K. A. 2, IV, 260. — Voir: *Ascophanus.*

*__Peziza citrina__ Batsch. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 401; N. K. A. 2, I, 451. — Voir: *Helotium.*

9. __Peziza cochleata__ P. — T. N. G. XI, 390. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 398; N. K. A. 2, I, 150. — Sacc. Syll. VIII, 87. — Otidea Fuck. — Wint. Kr. Fl. III, 1024. — Lieux ombragés des bois.

*__Peziza compressa__ P. — N. K. A. 1, V, 340; Arch. Néerl. VIII, 399. — Voir: *Durella.*

*__Peziza Constellatio__ B. Br. — N. K. A. 2, VI, 360. — Voir: *Barlaeina.*

*__Peziza coriacea__ Bull. — T. N. G. XI, 391. — Voir: *Poronia punctata.*

*__Peziza coronata__ Bull. — T. N. G. XII, 279; Prodr. Fl. Bat. II, 3, 403. — Voir: *Cyathicula.*

*__Peziza corticalis__ P. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 408. — Voir: *Lachnella.*

*__Peziza culmicola__ Desm. — N. K. A. 2, I, 451; Arch. Néerl. II, 45. — Voir: *Phialea.*

*__Peziza cupularis__ L. — N. K. A. 2, I, 450; 2, VI, 360; Arch. Néerl. II, 44. — Voir: *Geopyxis.*

*__Peziza cyathoidea__ Bull. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 403; N. K. A. 2, 1, 93. — Voir: *Phialea*.

*__Peziza dilutella__ Fr. — N. K. A. 2, 1, 263 et 451; Arch. Néerl. VIII, 308. — Voir: *Pezizella*.

*__Peziza diversicolor__ Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 5. — Voir: *Lasiobolus*.

*__Peziza fascicularis__ A. S. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 5; N. K. A. 2, 1, 450. — Voir: *Cenangium populneum*.

*__Peziza fibrosa__ Wallr. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 397. — Voir: *Helvella macropoda*.

*__Peziza firma__ P. — T. N. G. XI, 391; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 402. — Voir: *Tapesia*.

__Peziza flammea__ A. S. — N. K. A. 1, V, 338; Arch. Néerl. VIII, 397. — Voir: *Lachnella*.

*__Peziza fructigena__ Bull. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 403. — Voir: *Phialea*.

*__Peziza fusca__ P. — T. N. G. XI, 390; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 402. — Voir: *Tapesia*.

*__Peziza fuscescens__ P. — N. K. A. 2, IV, 517. — Voir: *Lachnum*.

10. __Peziza geochroa__ P. — T. N. G. XI, 390; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 399. — Sacc. Syll. VIII, 78. — Au pied d'un Chêne dans un lieu boisé.

*__Peziza graminis__ Desm. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 7. — Voir: *Belonium*.

*__Peziza grandis__ P. — Voir: *Otidea*.

__Peziza granulata__ Bull. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 400; N. K. A. 2, 1, 450; 2, VI, 360. — Voir: *Humaria*.

*__Peziza Grevillei__ Berk. — N. K. A. 2, III, 256. — Voir: *Trichopeziza*.

*__Peziza Hederae__ Lib. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 7. — Voir: *Trochila Craterium*.

*__Peziza helvelloides__ Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 396; N. K. A. 2, 1, 450. — Voir: *Acetabula*.

*__Peziza hemisphaerica__ Wigg. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 400; N. K. A. 1, 150; 2, VI, 360. — Voir: *Lachnea*.

__Peziza hemisphaerica__ Wigg. β. __lanuginosa__ Bull. — N. K. A. 1, 1, 51. — Voir: *Sepultaria lanuginosa*.

__Peziza herbarum__ P. — T. N. G. XI, 391; Prodr. II, 3, p. 404. — Voir: *Helotium*.

11. *__Peziza Howsei__ Boudier. — N. K. A. 3, II, 205 et 686. — Sacc. Syll. VIII, 81. — Plicaria Howsei (Boud.) Wint. Kr. Fl. III, 1015. — Terre argileuse ombragée.

***Peziza humosa** Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 400; N. K. A. 2, I, 450. — Voir: *Humaria.*

Peziza hyalina P. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 402; N. K. A. 1, I, 51. — Voir: *Pseudohelotium.*

***Peziza imberbis** Bull. — T. N. G. XI, 391; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 404. — Voir: *Helotium.*

Peziza infixa Wallr. N. K. A. 2, I, 182 et 451; Arch. Néerl. VIII, 398. — Voir: *Pezizella.*

***Peziza inflexa** Bolt. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 5. — Voir: *Cyathicula.*

***Peziza lactea** Bull. — N. K. A. 2, IV, 259. — Voir: *Lachnea.*

***Peziza lacustris** Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 6. — Voir: *Niptera.*

***Peziza leocarpa** Curr. — N. K. A. 2, V, 172. — Voir: *Delonia.*

***Peziza lenticularis** Bull. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 404; N. K. A. 2, I, 451. — Voir: *Helotium.*

***Peziza leporina** Batsch. — N. K. A. 1, V, 337; 2, I, 450; 2, VI, 360; Arch. Néerl. II, 44. — Voir: *Otidea.*

***Peziza leucoloma** (Hedw.) Rebent. — N. K. A. 1, V, 338; Arch. Néerl. II, 45. — Voir: *Humaria.*

***Peziza luteola** Fr. — N. K. A. 2, I, 182; Arch. Néerl. VIII, 398. — Voir: *Tapesia.*

***Peziza macropus** P. — N. K. A. 2, I, 150. — Voir: *Helvella.*

Peziza melaleuca Fr. — N. K. A. 2, I, 182; 451. — Arch. Néerl. VIII, 399. — Voir: *Mollisia.*

Peziza melaloma A. S. — N. K. A. 2, I, 182; Arch. Néerl. VIII, 396. — Voir: *Lachnea.*

Peziza membranacea Schum. — N. K. A. 1, I, 50; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 399. — Voir: *Humaria.*

Peziza micropus P. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, 399. — Voir: *Otidea.*

***Peziza miliaris** Wallr. — N. K. A. 1, V, 338; Arch. Néerl. VIII, 396. — Voir: *Pseudohelotium.*

***Peziza neglecta** Lib. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 6. — Voir: *Calloria fusarioides.*

***Peziza nigrella** P. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 400; N. K. A. 2, I, 150. — Voir: *Pseudoplectania.*

***Peziza nivea** Fr. — T. N. G. XI, 390. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 401. — Voir: *Dasyscypha.*

***Peziza omphalodes** Bull. — N. K. A. 1, V, 338; 2, I, 182; Arch. Néerl. VIII, 396. — Voir: *Pyronema.*

***Peziza onotica** P. — N. K. A. 2, I, 150; 2, VI, 360; Arch. Néerl. II, 44. — Voir: *Otidea.*

***Peziza pallida** Schum. — T. N. G. XI, 391. — Voir: *Pseudohelotium gemmiferum.*

***Peziza papillaris** Bull. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 402. — Voir: *Lachnella.*

***Peziza papillata** P. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 401; N. K. A. 1, 1, 51. — Voir: *Lasiobolus.*

***Peziza patula** P. — N. K. A. 1, V, 338; Arch. Néerl. VIII, 396. — Voir: *Dasyscypha.*

***Peziza pineti** Batsch. — N. K. A. 1, V, 339; Arch. Néerl. VIII, 397. — Voir: *Pseudohelotium.*

***Peziza poriaeformis** D. C. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 402; N. K. A. 2, 1, 151. — Voir: *Solenia anomala.*

***Peziza Pteridis** A. S. — N. K. A. 1, V, 339; Arch. Néerl. VIII, 398. — Voir: *Trichopeziza.*

***Peziza pulverulenta** Lib. — N. K. A. 1, V, 338; Arch. Néerl. VIII, 397. — Voir: *Dasyscypha.*

***Peziza punctiformis** Fr. — N. K. A. 1, V, 339; Arch. Néerl. VIII, 397. — Voir: *Trichopeziza.*

***Peziza purpurascens** P. — Arch. Néerl. II, 41. — Voir: *Humaria.*

12. **Peziza pustulata** (Hedw.) P. — N. K. A. 2, 1, 182; 2, V, 173; Arch. Néerl. VIII, 395. — Sacc. Syll. VIII, 85. — Plicaria pust. (Hedw.) Fuck. — Arch. Néerl. VIII, 395. — Wint. Kr. Fl. III, 1013. — A terre, dans une sapinière.

***Peziza radiata** P. — N. K. A. 1, 1, 51. — Voir: *Stictis.*

***Peziza Ranunculi** Fuck. — N. K. A. 2, 1, 182. — Voir: *Fabraea litigiosa.*

***Peziza Rapulum** Bull. — T. N. G. XII, 270; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 397. — Voir: *Geopyxis.*

***Peziza repanda** Wahlb. — N. K. A. 2, 1; 450. — Voir: *Discina.*

***Peziza reticulata** Grev. — Prodr. Fl. Bat. II, 308; N. K. A. 2, 1, 150. — Voir: *Discina.*

***Peziza retincola** Rab. — N. K. A. 1, V, 339; Arch. Néerl. VIII, 398. — Voir: *Belonium.*

***Peziza Rosae** P. — N. K. A. 2, 1, 182; Arch. Néerl. VIII, 398. — Voir: *Tapesia.*

***Peziza Rubi** Lib. — N. K. A. 1, V, 339; Sprée in Rab. F. E. n° 717; Prodr. Fl. Bat. II, 1, p. 6; Arch. Néerl. VIII, 397. — Voir: *Pezicula rhabarbarina.*

***Peziza rufo-olivacea** A. S. — N. K. A. 1, V, 339; Arch. Néerl. VIII, 397. — Voir: *Lachnella.*

***Peziza rutilans** Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 400; N. K. A. 2, 1, 150. — Voir: *Humaria.*

***Peziza salicaria** P. — Prodr. Fl. Bat. II, p. 8. — Voir: *Mollisia cinerea.*

***Peziza sanguinea** P. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 5. — Voir: *Tapesia.*

***Peziza scutellata** L. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 400; N. K. A. 2, I, 150; 2, IV, 258. — Voir: *Lachnea.*

13. **Peziza sepiatra** Cooke? Sacc. Syll. VIII, 91. — Plicaria sepiatra Wint. Kr. Fl. III, 1002; N. K. A. 3, II, 344. — Valkenberg.

***Peziza setosa** N. ab E. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 401. — Voir: *Lachnea.*

14. **Peziza sepulcralis** Rebent. Fl. Neomarchiae 384 et tab. 4 f. 18. — Sacc. Syll. VIII, 87. — Fl. Bat. tab. 1594, fig. inf. — Dans les dunes.

***Peziza sphaeroides** var. **Lychnidis** Desm. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 7. — Voir: *Pyrenopeziza sphaeroides* (P.) Fuck. f^a^ *Lychnidis* Phill.

***Peziza spirotricha** Oud. — N. K. A. 2, I, 182 et 150; Arch. Néerl. VIII, 396. — Voir: *Trichopeziza.*

***Peziza stercorea** P. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 400. — Voir: *Lachnea.*

***Peziza Stevensoniana** (Ellis). — Sacc. Syll. VIII, 800. — Oud. N. K. A. 3, II, 864. — Pustularia Stev. Rehm. in Wint. Kr. Fl. III, 1019. — Bois ramolli. — Voir: *Discina.*

***Peziza striata** Nees. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 6. — Voir: *Phialea Urticae.*

Peziza strobilina Fr. N. K. A. 1, V, 339; Arch. Néerl. VIII, 398. — Voir: *Phialea.*

***Peziza subhirsuta** Schum. — N. K. A. 1, V, 338; Arch. Néerl. VIII, 396. — Voir: *Pyronema.*

***Peziza sulphurea** P. — T. N. G. XI, 390; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 402. — Voir: *Trichopeziza.*

***Peziza Syringae** Wallr. — N. K. A. 2, I, 45; Arch. Néerl. VIII, 396. — Voir: *Trichopeziza.*

***Peziza syringea** Wallr. — N. K. A. 2, I, 182 (par erreur les deux derniers caractères ont changé de place.) — Voir: *Trichopeziza.*

15. ***Peziza tectoria** Cooke Mycogr. tab. 68, fig. 263 et Grev. III, 119. — Fl. Bat. tab. 1595. — Sacc. Syll. VIII, 89. — Sur une muraille plâtrée.

***Peziza tuberosa** Bull. — T. N. G. VI, 390; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 397. — Voir: *Sclerotinia.*

***Peziza uliginosa** Fr. — N. K. A. 2, IV, 517. — Voir: *Helotium.*

***Peziza umbonata** P. — N. K. A. 2, I, 184 et 451. — Arch. Néerl. VIII, 398. — Voir: *Mollisia*.

***Peziza umbrorum** Fr. — N. K. A. 2, III, 256. — Voir: *Lachnea*.

***Peziza umbrosa** Schrad. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 5. — Voir: *Humaria*.

***Peziza vaccinea** Schum. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 403. — Voir: *Helotium*.

***Peziza versicolor** Desm. — N. K. A. 2, II, 185. — Voir: *Pseudohelotium*.

16. **Peziza vesiculosa** Bull. — T. N. G. XI. 390; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 399; N. K. A. 2, I, 450; 2, IV. 256; 2, VI, 360; Fl. Bat. tab. 1575. — Sacc. Syll. VIII, 83. — Pustularia vesic. (Bull.) Wint. Kr. Fl. III. 1017. — Terre grasse des jardins; tannée des serres; terrains engraissés.

Peziza villosa P. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 402; N. K. A. 2, I, 451. — Voir: *Cyphella* (Théléphoracées).

Peziza virginea Batsch. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 401; N. K. A. 2, I, 450. — Voir: *Dacryscypha*.

Peziza viridi-fusca Fuck. — N. K. A. 2, V, 166. — Voir: *Phialea*.

OTIDEA.

1. **Otidea grandis** (P.) Rehm in Wint. Kr. Fl. III, 1023. — N. K. A. 3, II, 205. — Peziza gr. P. — Sacc. Syll. VIII, 79. — Dans les sapinières.

2. **Otidea leporina** (Batsch) Fuck. — Sacc. Syll. VIII, 94. — Wint. Kr. Fl. III, 1025. — Peziza leporina Batsch. — N. K. A. 1, V, 337; 2, VI, 360; 2, I, 450; 2, V, 532; Arch. Néerl. II, 44. — Dans les sapinières.

3. **Otidea micropus** (P.) Sacc. Syll. VIII, 98. — Peziza micropus P. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 399. — Geopyxis micropus (P.) Wint. Kr. Fl. III, 975. — Au pied d'aunes et de hêtres agés.

4. **Otidea onotica** (P.) Fuck. — Sacc. Syll. VIII, 94. — Wint. Kr. Fl. III, 1025. — N. K. A. 2, I. 93; Oud. Herb. N. Pl. n° 567. — Peziza onotica P. — Arch. Néerl. II, 44; N. K. A. 2, I, 450; 2, VI, 360. — Fl. Bat. tab. 1090. — Dans les sapinières.

DISCINA.

1. **Discina ancilis** (P.) Rehm. in Wint. Kr. Fl. III, 979. — Sacc. Syll. VIII, 103. — Peziza ancilis. — N. K. A. 1, I, 50; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 398. — Dans les bois.

2. **Discina repanda** (Wahlb.) Sacc. Syll. VIII, 100. — Ond. N. K. A. 3, III, 1094. — Plicaria rep. Rehm in Wint. Kr. Fl. III, 1007. — Peziza rep. Wahlb. — N. K. A. 2, I, 450. — Fl. Bat. tab. 1725. — Sur les troncs ramollis.

3. **Discina reticulata** (Grev.) Sacc. Syll. VIII, 100. — Discina venosa var. reticulata Rehm in Wint. Kr. Fl. III, 978. — Peziza reticulata Grev. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 398; N. K. A. 2, I, 450. — Sur la terre humeuse des bois.

4. **Discina Stevensoniana** (Ellis) Sacc. Syll. VIII, 100. — Ond. N. K. A. 3, II, 864. — Pustularia Stev. Rehm. in Wint. Kr. Fl. III, 1019. — Ond. N. K. A. 3, II, 205. — Sur le bois ramolli.

5. **Discina venosa** (P.) Sacc. Syll. VIII, 104. — Wint. Kr. Fl. III, 977. — N. K. A. 3, II, 206. — Sur la terre argileuse.

PUSTULARIA.

***Pustularia Stevensoniana** Rehm. — N. K. A. 3, II, 205. — Voir: *Discina*.

DETONIA.

Detonia leiocarpa (Curr.) Sacc. Syll. VIII, 105. — Plicariella leiocarpa (Curr.) Rehm in Wint. Kr. Fl. III, 994. — Peziza leiocarpa Curr. — Ond. N. K. A. 2, V, 472. — Dans les sapinières.

PYRONEMA.

1. **Pyronema domesticum** (Sow.) Sacc. Syll. VIII, 109. — Wint. Kr. Fl. III, 962. — N. K. A. 3, II, 206. — Sur les murs humides d'un édifice.

2. **Pyronema omphalodes** (Bull.) Fuck. — Sacc. Syll. VIII, 107. — Wint. Kr. Fl. III, 964. — N. K. A. 2, I, 93; Oud Herb. Ned. Pl. n° 336. — Peziza omphalodes Bull. — N. K. A. 1, V, 338; 2, I, 182; Arch. Néerl. VIII, 396. — Dans un pré saumâtre, et sur la terre humide nue.

3. **Pyronema subhirsutum** (Schum.) Fuck. — Sacc. Syll. VIII, 108. — Humaria subhirsuta (Schum.) Karst. dans Wint. Kr. Fl. III, 943. — Peziza subhirsuta Schum. — N. K. A. 1, V, 338; Arch. Néerl. VIII, 396. — Bouse de vache.

BARLAEINA.

1. **Barlaeina cinnabarina** (Fuck.) Sacc. Syll. XIV, 748 (pour ce qui concerne le genre). — Barlaea cinn. (Fuck.) Sacc. Syll. VIII,

112. — Oud. N. K. A. 3, II, 206 et 3, III, 1093. — Sur la terre.

2. **Barlaeina Constellatio** (B. Br.) Sacc. Syll. XIV, 749. — N. K. A. 3, II, 678. — Barlaea Const. (B. Br.) Rehm dans Wint. Kr. Fl. III, 928. — Peziza Const. B. Br. in N. K. A. 2, VI, 360. — Terre argileuse ombragée.

3. **Barlaeina Rickii** (Rehm) Sacc. Syll. XIV, 749. — Barlaea Rickii Rehm in Oesterr. bot. Zeitsch. 1898, n° 1—2. — Oud. N. K. A. 3, II, 206. — Sur la terre.

*BARLAEA.

***Barlaea cinnabarina** (Fuck.) Sacc. — Oud. N. K. A. 3, II, 207. — Voir: *Barlaeina.*

***Barlaea Rickii** Rehm — Oud. N. K. A. 3, II, 206. — Voir: *Barlaeina.*

HUMARIA.

***Humaria alpina** Oud. N. K. A. 2, IV, 257. — Voir: *Lachnea.*

1. **Humaria anceps** Rehm dans Wint. Kr. Fl. III, 1269, sous le n° 5589, et, pour ce qui concerne la description, sous l'H. thelebolоides (A. S.), dans le même ouvrage, p. 944. — Oud. N. K. A. 3, II, 681. — Excréments desséchés de l'homme.

2. **Humaria Chateri** (Sm.) Sacc. Syll. VIII, 120. — Oud. N. K. A. 3, II, 1095. — Lachnea Chat. (Sm.) Rehm in Wint. Kr. Fl. III, 1059. — Peziza Chat. (Sm.) Cooke Mycogr. 35 et tab. 16 f. 62. — Terre argilo-sablonneuse, remplissant les espaces entre les briques dures d'un pavé à Arnhem.

3. **Humaria Gerardi** (Cooke) Sacc. Syll. VIII, 150. — Oud. N. K. A. 3, II, 864. — Terre argileuse.

4. **Humaria granulata** (Bull.) Sacc. Syll. VIII, 129. — Wint. Kr. Fl. III, 942. — Peziza gran. Bull. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 400; N. K. A. 2, I, 450; 2, VI, 360. — Bouse de vache.

5. **Humaria humosa** (Fr.) Sacc. Syll. VIII, 120. — Wint. Kr. Fl. III, 937. — Peziza humosa Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 100; N. K. A. 2, I, 450. — Sur la terre.

6. **Humaria leucoloma** (Hedw.) Sacc. Syll. VIII, 118. — Wint. Kr. Fl. III, 935. — Peziza leucol. Hedw. — N. K. A. 1, V, 338; Arch. Néerl. II, 15. — Sur la terre.

forma **geoscypha** (Rehm) Oud. N. K. A. 3, II, 1096. — Geoscypha subcupularis Rehm Hedw. XXXVI (1887) p. 82. — Wint. Kr. Fl. III, 936.

7. **Humaria mellea** (Phill.) Bresad. — Oud. N. K. A. 3, II,

865. — Peziza mellea Sacc. Syll. VIII, 89. — Eclats de bois ramolli.

8. **Humaria membranacea** (Schum.) Sacc. Syll. VIII, 128. — Peziza membr. Schum. — N. K. A. 1, 1, 50; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 399. — Bouse de vache âgée.

9. **Humaria ollaris** (Fr.) Cooke. — Sacc. Syll. VIII, 131. — Wint. Kr. Fl. III, 959. — N. K. A. 3, II, 207. — Sur la terre.

10. **Humaria Phillipsii** (Cooke) Sacc. Syll. VIII, 140. — N. K. A. 3, II, 865. — Sur la terre argileuse.

11. **Humaria phycophila** Oud. Beibl. z. bot. Centr. bl. 1902. — Oud. N. K. A. 3, II, 681. — Sur une espèce de *Rhizoctonium*, occupant le fond d'une fossette, dans un terrain de bruyère marécageux.

12. **Humaria purpurascens** (P.) Sacc. Syll. VIII, 124. — Wint. Kr. Fl. III, 949. — Peziza purp. P. Arch. Néerl. II, 14. — Terre ombragée.

13. **Humaria rutilans** (Fr.) Sacc. Syll. VIII, 133. — Wint. Kr. Fl. III, 960. — Peziza rut. Fr. — T. N. G. XI, 390; Prodr Fl. Bat. II, 3, 400; N. K. A. 2, I, 450. — Leucoloma rut. (Fr.) Fuck. — N. K. A. 2, 1, 93. — Oud. Fgi Neerl. exs. n° 288. — Terre ombragée, parmi la mousse.

14. **Humaria umbrosa** (Schrad.) Sacc. Syll. VIII, 128. — Peziza umbrosa Schrad. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 5. — Terre ombragée, parmi la mousse.

15. **Humaria violacea** (P.) Sacc. Syll. VIII, 149. — Oud. N. K. A. 3, II, 682. — Plicaria violacea Wint. Kr. Fl. III, 1002. — Au bord des chemins.

16. **Humaria viridans** (Hedw.) Sacc. Syll. VIII, 184. — Wint. Kr. Fl. III, 950. — Oud. N. K. A. 3, II, 682. — Terre argileuse.

LEUCOLOMA.

(Voir: *Humaria*).

MACROPODIA.

1. **Macropodia bulbosa** (Hedw.) Sacc. Syll. VIII, 158. — Wint. Kr. Fl. III, 987. — Oud. N. K. A. 3, II, 683. — Terre argileuse ombragée.

2. **Macropodia fibrosa** (Wallr.) Sacc. Syll. VIII, 160. — Wint. Kr. Fl. III, 987. — Peziza fibrosa Wallr. Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 397. — Dans les bois, aux endroits exposés.

PSEUDOPLECTANIA.

1. **Pseudoplectania nigrella** (P.) Fuck. — Sacc. Syll. VIII, 165. — Wint. Kr. Fl. III, 1039. — Peziza nigrella P. — T. N. G. XI, 390; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 400; N. K. A. 2, I, 450; Oud. Fgi Neerl. exs. n° 289; Fl. Batava tab. 1190. — Lieux ombragés, sur le bois ramolli.

LACHNUM.

1. **Lachnum fuscescens** Karst. — N. K. A. 3, II, 866. — F. de Chêne tombées. — Voir aussi: *Dasyscypha brunneola* et *Lachnum brunneolum* Karst. — Oud. Fgi Neerl. exs. n° 291.

LACHNEA.

1. **Lachnea alpina** (Fuck.) Sacc. Syll. VIII, 180. — Peziza (Humaria) alpina N. K. A. 2, IV, 257. — Crottin de lapin.

*__Lachnea bulborum__ (Wakker) N. K. A. 2, IV, 260. — Voir: *Sclerotinia.*

2. **Lachnea arenicola** (Lév.) Quélet. — Oud. N. K. A. 3, I, 468. — Sacc. Syll. VIII, 172. — Sepultaria arenicola Rehm in Wint. Kr. Fl. III, 1076. — Terre de bruyère, presque totalement enseveli dans le sable.

3. **Lachnea carneo-sanguinea** (Fuck.) Phill. — Oud. N. K. A. 3, II, 207. — Sacc. Syll. VIII, 176. — Wint. Kr. Fl. II, 1053. — Terre argileuse humide.

4. **Lachnea coprinaria** (Cooke) Sacc. Syll. VIII, 178. — Wint. Kr. Fl. III, 1055. — N. K. A. 3, II, 326. — Excréments de l'homme.

5. **Lachnea fusco-atra** (Rebent.) Fr. — Oud. N. K. A. 3, II, 682. — Sacc. Syll. VIII, 184. — Wint. Kr. Fl. III, 1049. — Terrains boiseux.

6. **Lachnea gilva** (Bond.) Sacc. Syll. VIII, 184. — Wint. Kr. Fl. III, 1049. — N. K. A. 3, II, 207. — Terrains argileux ombragés.

7. **Lachnea hemisphaerica** (Wigg.) Gill. — Sacc. Syll. VIII, 166. — Wint. Kr. Fl. III, 1058. — N. K. A. 2, VI, 363. — Peziza hemisph. Wigg. — T. N. G. XI, 390; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 400; N K. A. 1, I, 51 et 540 et 2, VI, 360. — Oud. Fgi Neerl. exs. n° 290. — Sur la terre, surtout dans les sapinières.

8. **Lachnea hirta** (Schum.) Fr. — Fl. Bat. tab. 1580. — Vallées dans les dunes, parmi la mousse.

9. **Lachnea melaloma** (A. S.) Sacc. Syll. VIII, 181. — Wint. Kr. Fl. III, 1046. — Peziza melaloma A. S. — Arch. Néerl. VIII, 396; N. K. A. 2, I, 182. — Pyronema melalomum (A. S.) Fuck. — N. K. A. 2, I, 93 et Oud. Herb. N. Pl. n° 568. — Terre argileuse ombragée.

10. **Lachnea lactea** (Bull.) Oud. N. K. A. 2, IV, 259.

***Lachnea macropus** (P.) Phill. — N. K. A. 2, VI, 363. — Voir: *Helvella*.

11. **Lachnea pseudogregaria** Rick Oesterr. bot. Zeits. 1900, n° 1. — N. K. A. 3, II, 207. — Sacc. Syll. XVI, 717. — Sur la terre.

12. **Lachnea scutellata** (L.) Gill. — Sacc. Syll. VIII, 173. — Wint. Kr. Fl. III, 1063. — N. K. A. 2, I, 450; 2, VI, 363. — Peziza scut. L. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 400; N. K. A. 2, IV, 258. — Crottin de lapin.

13. **Lachnea sepulta** (Fr.) Gill. — N. K. A. 2, V, 476 et 2, VI, 363. — Sacc. Syll. VIII, 170. — Sepultaria sepulta (Fr.) Rehm in Wint. Kr. Fl. III, 1075. — Dans le sable des dunes.

14. **Lachnea setosa** (Nees) Gill. — N. K. A. 3, II, 865. — Peziza setosa Nees. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 401. — Aux troncs d'aune (*Alnus glutinosa*) surannés.

15. **Lachnea stercorea** (P.) Gill. — Sacc. Syll. VIII, 183. — Wint Kr. Fl. III, 1056. — Peziza sterc. P. — Prodr. Fl. II, 3, 400. — Sur la bouse de vache desséchée.

16. **Lachnea thelebolоides** (A. S.) Sacc. Syll. VIII, 179. — Wint. Kr. Fl. III, 179. — Oud. N. K. A. 3, II, 683. — Terre engraissée.

17. **Lachnea umbrorum** (Fr.) Gill. — Wint. Kr. Fl. III, 1060. — L. umbrarum Sacc. Syll. VIII, 174. — N. K. A. VI, 363; Peziza umbrorum Fr. — Oud. N. K. A. 2, III, 256. — Sur la terre.

18. **Lachnea Woolhopeia** (Cooke et Phill.) Sacc. Syll. VIII, 185. — N. K. A. 3, II, 207. — Sur la terre.

SEPULTARIA.

1. **Sepultaria lanuginosa** (Bull.) Cooke. — Wint. Kr. Fl. III, 1077. — Peziza hemisphaerica Hoffm. β. lanuginosa Bull. — N. K. A. 1, I, 51. — Sur la terre.

NEOTTIELLA.

1. **Neottiella leucotricha** (A. S.) Sacc. Syll. VIII, 194. — N. K. A. 3, II, 342. — Lachnea leucotricha Quél. — Wint. Kr. Fl. III, 1067. — Sur la terre.

2. **Neotiiella luteo-pallens** (Nyl.) Sacc. Syll. VIII. 191. — N. K. A. 3, II, 342. — Lachnea Lojkaeana Rehm in Wint. Kr. Fl. III, 1045. — Terre argileuse près d'un fumier.

SCLEROTINIA.

1. **Sclerotinia Bresadolae** J. Rick, Oest. bot. Zeits. 1890, n° 4. — N. K. A. 3, II. 207. — Sur les galles en train de décomposition, venues sur les bourgeons de chêne, et provoquées par la piqûre du *Dryoteras terminalis*.

2. **Sclerotinia bulborum** (Wakker) Sacc. Syll. VIII, 197. — Wint. Kr. Fl. III. 819. — Peziza bulborum Wakker Bot. Centralbl. VIII, p. 309; id. Onderzoek der ziekten van Hyacinthen, 1883, p. 20. — Oud. N. K. A. 2, IV, 260. — Bulbes de l'*Hyacinthus orientalis* cultivé.

3. **Sclerotinia filipes** (Phill.) Sacc. Syll. VIII, 198. — N. K. A. 3, II, 208. — Débris végétaux.

4. **Sclerotinia Kerneri** Wettstein. — Sacc. Syll. VIII, 179. — Wint. Kr. Fl. III, 813. — N. K. A. 3, II, 207 (où le nom spécifique est mutilé). — Aiguilles de l'*Abies alba*.

5. **Sclerotinia nervisequia** Schröt. — N. K. A. 3, II, 207. — Wint. Kr. Fl. III, 1237. — Pyrenopeziza nerv. (P.) Sacc. Syll. VIII. 364. — F. de l'*Alnus glutinosa*.

6. **Sclerotinia Nicotianae** Oud et Koning, Zittingsv. d. Kon. Akad. v. Wet. 30 Mei 1903; N. K. A. 3, II, 1096. — F. et tiges du *Nicotiana Tabacum* cultivé.

7. **Sclerotinia pseudotuberosa** Rehm. — N. K. A. 3, II, 208. Sacc. Syll. VIII, 201. — Wint. Kr. Fl. III, 809. — Sur les cotylédons du *Quercus Robur*, en train de putréfaction, noircis et enfouis dans la terre.

8. **Sclerotinia Trifoliorum** Eriksson. — Oud. N. K. A. 3, I, 167. — Sacc. Syll. VIII, 196. — Wint. Kr. Fl. III, 817. — Racines et tiges du *Trifolium pratense*.

9. **Sclerotinia tuberosa** (Herw.) Fuck. — Sacc. Syll. VIII, 195. — Wint. Kr. Fl. III, 814. — Peziza tuberosa Bull. — T. N. G. XI, 390; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 391. — Rhizomes de l'*Anemone nemorosa*.

10. **Sclerotinia Urnula** (Weinm.) Rehm in Wint. Kr. Fl. III, 804. — N. K. A. 3, II, 208. — Ciboria Urnula Weinm. — Sacc. Syll. VIII, 202. — Fruits pourrissants du *Vaccinium Vitis idaea*.

CIBORIA.

1? **Ciboria amentacea** (Balbis) Fuck. — Sacc. Syll. VIII, 201. — Wint. Kr. Fl. III, 755. — Peziza ament. Balb. — Arch. Néerl. II, 45. — Débris végétaux.

2. **Ciboria calopus** (Fr.) Fuck. — Oud. N. K. A. 3, II, 862. — Sacc. Syll. VII, 205. — Helotium calopus Fr. — Wint. Kr. Fl. III, 768. — Pétioles d'une feuille de *Fagus silvatica*.

3. **Ciboria firma** (P.) Fuck. — Sacc. Syll. VII, 203. — Rutstroemia firma Karst. — Wint. Kr. Fl. III, 764. — Peziza firma P. — T. N. G. XI, 391; Prodr. Fl. Bat. II. 3, p. 403; Hymenoscypha firma (P.) Phill. — N. K. A. 2, VI, 361. — Ramilles tombées.

4. **Ciboria Sydowiana** Rehm in Wint. Kr. Fl. III, 758. — Sacc. Syll. VIII, 207. — N. K. A. 3, II, 208. — Pétioles d'une feuille de chêne (*Quercus Robur* L.)

HELOTIUM.

***Helotium aluiellum** Karst. — N. K. A. 2, V, 166 et 2, VI, 361. — Voir *Phialea*.

1. **Helotium Buccina** (P.) Fr. — Sacc. Syll. VIII, 224. — Peziza B. P.

***Helotium calycinum** Karst. — N. K. A. 2, IV, 261. — Voir: *Dasyscypha calyciformis*.

2. **Helotium citrinum** (Hedw.) Fr. — Sacc. Syll. VIII, 224. — Wint. Kr. Fl. III, 772. — N. K. A. 2, I, 451; 2, VI, 361. — Peziza citrina Batsch. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 404. — Bois ramolli des *Salix* et *Populus*.

3. **Helotium claro-flavum** (Grev.) Berk. — Oud. N. K. A. 2, I, 182; Arch. Néerl. VIII, 100. — Sacc. Syll. VIII, 225. — Ecorce d'un tronc d'arbre.

4. **Helotium conigenum** (P.) Fr. — N. K. A. 2, VI, 361. — Sacc. Syll. VIII, 221. — N. K. A. 2, VI, 361. — Phialea conorum Rehm in Wint. Kr. Fl. III, 663. — Cônes de *Pinus silvestris*.

5. **Helotium epiphyllum** (P.) Fr. — N. K. A. 2, VI, 361. — Sacc. Syll. VIII, 227. — Wint. Kr. Fl. III, 795. — F. mortes du *Quercus Robur*.

6. **Helotium herbarum** (P.) Fr. — Sacc. Syll. VIII, 217. — Wint. Kr. Fl. III, 778. — Peziza herb. P. — T. N. G. XI, 391; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 404; N. K. A. 2, VI, 360. — Tiges de plantes herbacées mourantes.

7. **Helotium herbicolum** Karst. — N. K. A. 2, V, 166. — Sacc. Syll. VIII, 218. — Tiges fanées d'un *Urtica*.

8. **Helotium Humuli** (Lasch) de Not. — N. K. A. 2, V, 474 et 2, VI, 360. — Sacc. Syll. VIII, 243. — Wint. Kr. Fl. III, 788. — Tiges desséchées du *Humulus Lupulus*.

9. **Helotium imberbe** (Bull.) Fr. — Sacc. Syll. VIII, 216. — Wint. Kr. Fl. III, 775. — Peziza imberbis Bull. — T. N. G. XI, 391; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 404. — Bois vermoulu.

10. **Helotium lenticulare** (Bull.) Fr. — Sacc. Syll. VIII, 225. — H. citrinum var. lenticulare Rehm in Wint Kr. Fl. III, 773. — Peziza lentic. Bull. — Prodr. Fl. Bat. II, 3. p. 404; N. K. A. 2, I, 251. — Rameaux et bois ramolli de plusieurs arbres.

11. **Helotium lutescens** (Hedw.) Fr. — Oud. in herb. — Sacc. Syll. VIII, 223. — Phialea lutescens Gill. — Wint. Kr. Fl. III, 713. — Branche de Conifère.

12. **Helotium pallescens** (P.) Fr. — Oud. Arch. Néerl. II, 45; N. K. A. 2, VI, 361. — Sacc. Syll. VIII, 216. — Wint. Kr. Fl. III, 790. — Rameaux tombés.

***Helotium punctiforme** (Grev.) Phill. — N. K. A. 2, VI, 361. — Voir: *Pseudohelotium*.

13. **Helotium salicellum** Fr. — Oud. N. K. A. 2, III, 156. — Sacc. Syll. VIII, 230. — Wint. Kr. Fl. III, 786. — Rameaux d'un *Salix*.

14. **Helotium trabinellum** Karst. — Oud. N. K. A. 2, VI, 27. — Sacc. Syll. VIII, 245. — Wint. Kr. Fl. III, 771. — Morceau de bois pourri.

15. **Helotium uliginosum** Fr. — Sacc. Syll. VIII, 232. — Ciboria uliginosa (Fr.) Rehm in Wint. Kr. Fl. III, 761. — Peziza uliginosa Fr. — Oud. N. K. A. 2, IV, 517. — Branches pourries du *Fraxinus excelsior*.

16. **Helotium vaccinum** (Schum.) Fr. — Sacc. Syll. VIII, 213.— Peziza vaccinea Schum. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 103. — Bouse de vache.

PHIALEA.

1. **Phialea albida** (Rob. et Desm.) Sacc. Syll. VIII, 251. — Helotium albidum Pat. — Wint. Kr. Fl. III, 797. — Peziza albida Rob. et Desm. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 6. — Pétioles tombés du *Fraxinus excelsior*.

2. **Phialea alnella** (Nyl.) Sacc. Syll. VIII, 257. — Wint. Kr. Fl. III, 721. — Helotium alnellum Karst. — N. K. A. 2, V, 166 et 2, VI, 361. — Chatons féminins de l'*Alnus glutinosa*.

3. **Phialea Amenti** (Batsch) Quél. — N. K. A. 3, II, 208. —

Sacc. Syll. VIII, 257. — Wint. Kr. Fl. III, 720. — Chatons féminins des *Salix*.

4. **Phialea appendiculata** Oud. Versl. Med. K. Ak. v. Wet. 3, VII, 313 (avec figure); id. N. K. A. 2, VI, 28. — Belonioscypha ciliatospora (Fuck.) Rehm in Wint. Kr. Fl. III, 744. — Parties émergentes de la tige pourrissante du *Mentha aquatica*.

***Phialea caulicola** (Fr.) Rehm. — Voir: *Dasyscypha*.

5. **Phialea cotyledonum** Oud. N. K. A. 3, II, 687.

6. **Phialea culmicola** (Desm.) Gill. — N. K. A. 2, I, 451; Peziza culm. Desm. Arch. Néerl. II, 15. — Tiges de Graminées.

7. **Phialea cyathoidea** (Bull.) Gill. — N. K. A. 2, VI, 27 et 361. — Sacc. Syll. VIII, 251. — Wint. Kr. Fl. III, 723. — Peziza cyathoidea Bull. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 103; N. K. A. 2, I, 93 et Oud. Herb. N. Pl. n° 190. — Tiges pourrissantes de plantes herbacées.

8. **Phialea fructigena** (Bull.) Gill. — Sacc. Syll. VIII, 265. — Helotium virgultorum var. fructigenum Rehm in Wint. Kr. Fl. III, 783. — Peziza fructigena Bull. — T. N. G. XI, 391; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 103. — Hymenoscypha fr. Phill. — N. K. A. 2, VI, 361. — Chatons féminins de l'*Alnus glutinosa*.

9. **Phialea phyllophila** (Desm.) Gill. — N. K. A. 3, II, 208. — Sacc. Syll. VIII, 254. — Helotium phyllophilum (Desm.) Karst. — Wint. Kr. Fl. III, 796. — F. du *Fagus silvatica*.

10. **Phialea rubicola** (Fr.) Sacc. Syll. VIII, 253. — N. K. A. 2, VI, 29. — Helotium rubicolum Fr. — Wint. Kr. Fl. III, 788. — Tiges d'une espèce de *Rubus*.

11. **Phialea Scutula** (P.) Gill. — Oud. N. K. A. 3, I, 468. — Sacc. Syll. VIII, 266. — Helotium Sc. Karst. — Wint. Kr. Fl. III, 792. — Tiges de l'*Euphorbia Cyparissias*.

12. **Phialea strobilina** (Fr.) Sacc. Syll. VIII, 256. — Wint. Kr. Fl. III, 722. — Peziza strobilina Fr. — N. K. A. 1, V, 339; Arch. Néerl. VIII, 398. — Cônes du *Picea excelsa*.

13. **Phialea subpallida** Rehm in Wint. Kr. Fl. III, 710. — Sacc. Syll. XI, 404. — Oud. N. K. A. 3, II, 687. — Bois ramolli du *Corylus Avellana*.

14. **Phialea Urticae** (P.) Sacc. Syll. VIII, 253. — Wint. Kr. Fl. III, 728. — Peziza striata Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 6. — Sur les tiges desséchées des *Urtica*.

15. **Phialea virgultorum** (Vahl) Sacc. Syll. VIII, 266. — N. K. A. 3, II, 209. — Hymenoscypha virg. Phill. — N. K. A. 2, VI, 361. — Helotium virgultorum (Vahl) Karst. — Wint. Kr. Fl. III, 782. — Brindilles et rameaux tombés.

16. **Phialea viridi-fusca** (Fuck.) Sacc. Syll. VIII, 275. — Wint. Kr. Fl. III, 721. — Peziza vir.-fusca Fuck. — N. K. A. 2, V, 166 et VI, 360. — Chatons de l'*Alnus glutinosa*.

HYMENOSCYPHA.

***Hymenoscypha coronata** Phill. — N. K. A. 2, VI, 361. — Voir: *Cyathicula*.

***Hymenoscypha cyathoidea** Phill. — N. K. A. 2. VI, 361. — Voir: *Phialea*.

***Hymenoscypha firma** Phill. — N. K. A. 2, VI, 361. — Voir: *Ciboria*.

***Hymenoscypha fructigena** Phill. — N. K. A. 2. VI, 361. — Voir: *Phialea*.

***Hymenoscypha virgultorum** Phill. — N. K. A. 2, VI, 361. — Voir: *Phialea*.

PEZIZELLA.

1? **Pezizella albella** (With.) Sacc. Syll. VIII, 280. — N. K. A. 2, VI, 29. — Phialea vulgaris (Fr.) Rehm in Wint. Kr. Fl. III, 709. — Ecorce pourrie du *Betula alba*.

2. **Pezizella dilutella** (Fr.) Fuck. — Sacc. Syll. VIII, 277. — Niptera dil. (Fr.) Rehm in Wint. Kr. Fl. III, 356. — Peziza dil. Fr. — Oud. N. K. A. 2, I, 263; Arch. Néerl. VIII, 398, N. K. A. 2. I, 151. — Tige à demi pourrie de l'*Angelica silvestris*.

3. **Pezizella infixa** (Wallr.) Sacc. Syll. VIII, 287. — Wint. Kr. Fl. III, 661. — Peziza infixa Wallr. — Oud. N. K. A. 2, I, 182; Arch. Néerl. VIII, 398; N. K. A. 2, I, 151. — Souches d'arbres abattus.

4. **Pezizella pannorum** Brondeau. — Oud. N. K. A. 3, II, 686. — Morceau de tissu laineux teint en noir et demi-pourri.

PSEUDOHELOTIUM.

1. **Pseudohelotium gemmiferum** (Wallr.) Sacc. Syll. VIII, 298. Peziza pallida Schum. T. N. G. XI, 391. — Tronc inconnu.

2. **Pseudohelotium hyalinum** (P.) Fuck. — Sacc. Syll. VIII, 291. — Pezizella hyalina (P.) Rehm dans Wint. Kr. Fl. III, 653. — Peziza hyalina P. — N. K. A. 1, I, 51; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 102. — Bois pourri.

3. **Pseudohelotium miliare** (Wallr.) Sacc. Syll. VIII, 296. — Paziza miliaris Wallr. — N. K. A. 1, V, 338; Arch. Néerl. VIII, 396. — Thalle du *Peltigera*.

4. **Pseudohelotium Pineti** (Batsch) Fuck. — Sacc. Syll. VIII, 296. — Belonium Pineti (Batsch) Rehm in Wint. Kr. Fl. III, 688. — Peziza Pineti Batsch. — N. K. A. 1, V, 339; Arch. Néerl. VIII, 397. — Aiguilles pourries du *Picea excelsa*.

5. **Pseudohelotium punctiforme** (Grev.) Sacc. Syll. VIII, 295. — Pezizella punctiformis (Grev.) Rehm in Wint. Kr. Fl. III, 664. — Helotium punctiforme Grev. — N. K. A. 2, VI, 361. — F. du *Quercus Robur*.

6. **Pseudohelotium versicolor** (Desm.) Sacc. VIII, 296. — Pezizella versicolor (Desm.) Wint. Kr. Fl. III, 683. — Peziza versicolor Desm. — N. K. A. 2, II, 183. — Mollisia versicolor Phill. — N. K. A. 2, VI, 362. — Pétioles pourris d'une Fougère.

CYATHICULA.

1. **Cyathicula coronata** (Bull.) de Not. — Sacc. Syll. VIII, 304. — Wint. Kr. Fl. III, 740. — Peziza cor. Bull. — T. N. G. XII, 270; Prodr. Fl. Bat. II, p. 403; Pez. radiata Sw. 2, II, 185; N. K. A. 1. I, 51. — Hymenoscypha cor. (Bull.) Phill. N. K. A. 2, VI, 361. — Tiges, brindilles et rameaux tombés.

2. **Cyathicula inflexa** (Bolt.) Sacc. Syll. VIII, 305. — C. coronata forma inflexa Rehm in Wint. Kr. Fl. III, 741. — Peziza inflexa Bolt. — Podr. Fl. Bat. II, 4, p. 5. — Tiges de plantes herbacées fânées.

PEZICULA.

1. **Pezicula carpinea** (P.) Tul. — Sacc. Syll. VIII, 310; Wint. Kr. Fl. III, 250. — Dermatea carpinea Fr. — N. K. A. 3, VI, 358. — Ram du *Carpinus Betulus*.

2. **Pezicula rhabarbarina** (Berk.) Tul. — Sacc. Syll. VIII, 311. — Dermatea Rubi (Lib.) Rehm. in Wint. Kr. Fl. III, 258. — Peziza Rubi Lib. — N. K. A. 1, V, 339. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 6; Sprée in Rab. F. E. n° 717. — Arch. Néerl. VIII, 397. — Peziza arduennensis Mont. — Prodr. Fl. Bat II, 4, p. 7. — Tiges mortes d'une espèce de *Rubus*.

CHLOROSPLENIUM.

1. **Chlorosplenium aeruginosum** (Oeder) de Not. — Sacc. Syll. VIII, 315. — Wint. Kr. Fl. III, 753. — Peziza aerug. Oeder. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 404; N. K. A. 2, I, 451. — Bois ramolli des *Quercus Robur* et *Fagus silvatica*.

MOLLISIA.

1. **Mollisia arenivaga** (Desm.) Phill. — Sacc. Syll. VIII, 344. — N. K. A. 3. VI, 361. — Peziza aren. Desm. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 7; N. K. A. 2, I, 451. — F. pourrissantes du *Psamma littoralis*.

***Mollisia atrata** (P.) Karst. — N. K. A. 2, V, 474 et 2, VI, 361. — Voir: *Pyrenopeziza*.

2. **Mollisia caesia** (Fuck.) — Sacc. Syll. VIII, 340. — Rehm in Wint. Kr. Fl. III, 516. — Oud. N. K. A. 3, II, 685. — Bois pourri.

***Mollisia Cerastiorum** (Wallr.) Phill. — N. K. A. 2, VI, 362. — Voir: *Pseudopeziza*.

3. **Mollisia cinerea** (Batsch) Karst. — Sacc. Syll. VIII, 336. — Wint. Kr. Fl. III, 514. — N. K. A. 2, VI, 362. — Peziza cin. Batsch. — T. N. G. XI, 391; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 404. — Pez. salicaria P. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 8. — Bois vermoulu dans un tronc de Saule (*Salix*) creux.

***Mollisia Cynoglossi** Oud. — N. K. A. 2, V, 475 et 2, VI, 362. — Voir: *Pyrenopeziza*.

4. **Mollisia discolor** (Mont.) Phill. — Sacc. Syll. VIII, 334. — Niptera disc. Rehm in Wint. Kr. Fl. III, 552. — Patellaria discolor Mont. et Fr. — N. K. A. 1, V, 340; Arch. Néerl. VIII, 400. — Rameaux du *Quercus Robur*.

***Mollisia Grevillei** B. Br. — N. K. A. 2, VI, 362. — Voir: *Trichopeziza*.

***Mollisia ligni** (Desm.) Karst. — N. K. A. 2, V, 475 et 2, VI, 362. — Voir: *Pyrenopeziza*.

5. **Mollisia melaleuca** (Fr.) — Sacc. Syll. VIII, 337. — Wint. Kr. Fl. III, 519. — Peziza melaleuca Fr. — N. K. A. 2, I, 182 et 151; Arch. Néerl. VIII, 399. — Rameaux tombés décortiqués.

***Mollisia uliginosa** Fr. — N. K. A. 2, IV, 517. — Voir: *Helotium*.

6. **Mollisia umbonata** var. **amenticola** Sacc. Syll. VIII, 335. — M. amenticola (Sacc.) Rehm. in Wint. Kr. Fl. III, 510. — Peziza umb. Sacc. — N. K. A. 2, I, 182; Arch. Néerl. VIII, 398; N. K. A. 2, I, 451. — Chatons féminins pourrissants de l'*Alnus glutinosa*.

Mollisia versicolor (Desm.) Phill. — N. K. A. 2, VI, 362. — Voir: *Pseudohelotium*.

7. **Mollisia Viburni** Karst. Hedw. 1892, p. 130. — Sacc. Syll. XI, 109. — N. K. A. 3, II, 209. — Face inférieure des f. du *Viburnum Tinus*.

PYRENOPEZIZA.

1. **Pyrenopeziza atrata** (P.) Fuck. — Sacc. Syll. VIII, 354. — Mollisia atrata (P.) Karst. — N. K. A. 2, V, 474 et 2, VI, 361. — Wint. Kr. Fl. III, 529. — Peziza atrata P. — Oud. N. K. A. 2, I, 263 et 451; Arch. Néerl. VIII, 399. — Tiges fanées de l'*Anthriscus silvestris*.

2. **Pyrenopeziza Cynoglossi** (Oud.) — Mollisia Cyn. Oud. N. K. A. 2, V, 475 et 2, VI, 362. — Sacc. Syll. X, 13. — Tiges fanées du *Cynoglossum officinale*.

3. **Pyrenopeziza ligni** (Desm.) — Sacc. Syll. VIII, 366. — Cenangium ligni Desm. — Wint. Kr. Fl. III, 224. — Mollisia ligni Karst. — N. K. A. 2, V, 475 et 2, VI, 362. — Bois décortiqué d'un Peuplier (*Populus*.)

4. **Pyrenopeziza lignicola** (Phill.) — Sacc. Syll. VIII, 366. — N. K. A. 3, II, 209. — Mollisia lignicola Phill. — Wint. Kr. Fl. III, 522. — Bois de Frêne (*Fraxinus excelsior*).

5. **Pyrenopeziza Rubi** (Fr.) Rehm. Wint. Kr. Fl. III, 411. — Oud. N. K. A. 3, I, 470. — Sacc. Syll. VIII, 361. — Peziza Rubi (Lib.) Oud. Arch. Néerl. VIII, 397; Excipula Rubi Fr. — Podr. Fl. Bat. II, 4, p. 81. — Tiges fanées du *Rubus idaeus*.

6. **Pyrenopeziza sphaeroides** (P.) Fuck. forma **Lychnidis** Desm. Phill. — Sacc. Syll. VIII, 365. — Peziza sphaeroides v. Lychnidis Desm. — Podr. Fl. Bat. II, 4, p. 7. — Tiges fanées des *Melandrium album* et *rubrum*.

TAPESIA.

1. **Tapesia caesia** (P.) Fuck. — Sacc. Syll. VIII, 381. — Eriopezia caesia (P.) Wint. Kr. Fl. III, 696. — Peziza caesia P. — Oud. N. K. A. 2, I, 263; N. K. A. 2, I, 451; Arch. Néerl. VIII, 398. — Ecorce ramollie d'un arbre inconnu.

2. **Tapesia fusca** (P.) Fuck. — Sacc. Syll. VIII, 374. — Wint. Kr. Fl. III, 579. — Peziza fusca P. — T. N. G. XI, 390; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 402. — Rameaux tombés de plusieurs arbres (*Alnus glutinosa*, *Populus*, *Betula*).

3. **Tapesia lutcola** (Fr.) — Sacc. Syll. VIII, 378; Wint. Kr. Fl. III, 589. — Peziza lut. Fr. — N. K. A. 2, I, 182 et 451. — Arch. Néerl. VIII, 398. — Souches d'*Alnus glutinosa* abattues.

4. **Tapesia Rosae** (P.) Fuck. — Sacc. Syll. VIII, 374. — Wint. Kr. Fl. III, 581. — Peziza R. — P. — N. K. A. 2, I, 182; 2, I, 451; 2, IV, 518. — Arch. Néerl. VIII, 398. — Rameaux d'un Rosier.

5. **Tapesia sanguinea** (P.) Fuck. — Sacc. Syll. VIII, 371. — Patellea sang. (P.) Rehm in Wint. Kr. Fl. III. 284. — Peziza sang. P. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 5. — Bois ramolli.

DESMAZIERELLA.

1. **Desmazierella acicola** Lib. — N. K. A. 1, V, 340; Arch. Néerl. VIII, 399. — Sacc. Syll. VIII, 386. — Wint. Kr. Fl. III, 1041. — Aiguilles, et parfois rameaux du *Pinus silvestris*.

LACHNELLA.

***Lachnella acnum** (A. S.) Phill. — N. K. A. 2, VI, 362. — Voir: *Dasyscypha*.

1. **Lachnella barbata** (Kunze) Fr. — Sacc. Syll. VIII, 392. — Wint. Kr. Fl. III, 854. — Peziza barbata Kze. — N. K. A. 1, V, 339; Arch. Néerl. VIII, 397. — Rameaux du *Lonicera Periclymenum*.

***Lachnella bicolor** (Bull.) Phill. — N. K. A. 2, VI, 362. — Voir: *Dasyscypha*.

***Lachnella calycina** (Schum.) Gill. — N. K. A. 2, VI, 362. — Voir: *Dasyscypha*.

2. **Lachnella corticalis** (P.) Fr. — Sacc. Syll. VIII, 393. — Wint. Kr. Fl. III, 857. — Peziza corticalis P. — T. N. G. XI, 390; Prodr. Bat. II, 3, p. 402; Ond. Fgi Néerl. exs. n° 177. — Lachnella corticalis (P.) Phill. — N. K. A. 2, VI, 362. — Ecorce de plusieurs arbres (*Aesculus Hipp.*, etc.)

***Lachnella dumorum** (Desm.) Phill. — N. K. A. 2, VI, 362. — Voir: *Trichopeziza*.

3. **Lachnella flammea** (A. S.) Fr. — N. K. A. 2, V, 476 et 2, VI, 362. — Sacc. Syll. VIII, 392. — Wint. Kr. Fl. III, 858. — Peziza fl. A. S. — N. K. A. 1, V, 338; Arch. Néerl. VIII, 397. — Rameaux décortiqués du *Ligustrum vulgare*.

***Lachnella nivea** (Hedw.) Phill. — N. K. A. 2, VI, 362. — Voir: *Dasyscypha*.

4. **Lachnella papillaris** (Bull.) Phill. — Sacc. Syll. VIII, 394. — Wint. Kr. Fl. III, 857. — Peziza pap. Bull. — T. N. G. XI, 390; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 402. — Bois ramolli.

5. **Lachnella rufo-olivacea** (A. S.) Phill. — Sacc. Syll. VIII, 398. — Peziza rufo-olivacea A. S. — N. K. A. 1, V, 339; Arch. Néerl. VIII, 397. — Rameaux desséchés d'une espèce de *Rubus*.

Lachnella varicolor (Fr.) Phill. — N. K. A. 2, VI, 362. — Voir: *Trichopeziza alba-lutea*.

*__Lachnella virginea__ (Batsch) Phill. — N. K. A. 2, VI, 362. — Voir: *Dasyscypha*.

TRICHOPEZIZA.

1. __Trichopeziza albo-lutea__ (P.) Sacc. Syll. VIII, 412. — Dasyscypha albo-lutea (P.) Rehm in Wint. Kr. Fl. III, 842. — Lachnella variecolor (P.) Phill. — N. K. A. 2, VI, 362. — Bois pourrissant.

2. __Trichopeziza albo-testacea__ (Desm.) Sacc. Syll. VIII, 419. — Lachnum albotestaceum (Desm.) Karst. — Wint. Kr. Fl. III, 903. — Peziza albot. Desm. — N. K. A. 1, V, 339; Arch. Néerl. VIII, 397. — Chaumes fanées du Molinia caerulea.

2. __Trichopeziza dumorum__ (Desm.) Sacc. Syll. VIII, 418. — Phialea dum. (Desm) Rehm in Wint. Kr. Fl. III, 715. — Lachnella dum. Quél. — N. K. A. 2, VI, 253. — F. du *Rubus caesius*.

*__Trichopeziza echinulata__ Rehm. — Voir: *Dacyscypha*.

3. __Trichopeziza Grevillei__ (Berk.) Sacc. Syll. VIII, 407. — Peziza Grev. Berk. — N. K. A. 2, III, 256. — Mollisia Grevillei Berk. — N. K. A. 2, VI, 362. — Tiges desséchées de l'*Anthriscus silvestris*.

4. __Trichopeziza lactea__ (Bull.) champ. de France tab. 476, f. III) Oud. N. K. A. 3, I, 468. — Peziza (Lachnea) lactea Oud. N. K. A. 2, IV, 259. — Bois de Chêne (*Quercus Robur*) ramolli.

5. __Trichopeziza leucophaea__ (Nyl.) Rehm. — N. K. A. 3, II, 327. — Sacc. Syll. VIII, 402. — Lachnum leucophaeum (P.) Wint. Kr. Fl. III, 890. — Tige fanée d'un *Urtica*.

6. __Trichopeziza Nidulus__ (Schm. et Kze) Fuck. — Oud. N. K. A. 3, I, 469. — Sacc. Syll. VIII, 408. — Lachnum nidulus (S. et K.) Karst. — Wint. Kr. Fl. III, 892. — Tiges pourrissantes du *Polygonatum multiflorum*.

7. __Trichopeziza Pteridis__ (A. S.) Rehm. — Sacc. Syll. VIII, 423. — Dasyscypha Pt. (A. S.) Wint. Kr. Fl. III, 846. — Peziza Pt. A. S. — N. K. A. 1, V, 339 et Rab. Fl. n° 424 (Sprée); Arch. Néerl. VIII, 398. — Pétioles du *Pteris aquilina*.

8. __Trichopeziza punctiformis__ (Fr.) Fuck. — N. K. A. 3, II, 687. — Sacc. Syll. VIII, 416. — Lachnum echinulatum Rehm in Wint. Kr. Fl. III, 876. — Peziza punctif. Fr. — N. K. A. 1, V, 339. — Arch. Néerl. VIII, 397. — F. pourrissantes de l'Aune (*Alnus glutinosa*) et du Chêne (*Quercus Robur*.)

9. __Trichopeziza spirotricha__ (Oud.) Sacc. Syll. VIII, 405. — Dasyscypha spir. (Oud.) Wint. Kr. Fl. III, 830. — Peziza spirotricha N. K. A. 2, I, 182 et 480; Arch. Néerl. VIII, 396. — Brindilles pourries.

10. **Trichopeziza sulphurea** (P.) Fuck. — Sacc. Syll. VIII, 401. — Erinella Nylanderi Rehm in Wint. Kr. Fl. III, 910. — Peziza sulph. P. — T. N. G. XI, 390; Prodr. Fl. Bat. II, 3, 402. — Tiges fanées de plusieurs plantes herbacées (*Urtica*, Ombellifères).

11. **Trichopeziza syringea** (Wallr.) Fuck. — Sacc. Syll. VIII, 427. — Peziza syringea Wallr. — N. K. A. 2, I, 182 et 451; Arch. Néerl. VIII, 396. — Rameaux desséchés du *Syringa vulgaris*.

12. **Trichopeziza villosa** (P.) — Peziza villosa P. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 402.

DASYSCYPHA.

1. **Dasyscypha acuum** (A. S.) — Sacc. Syll. VIII, 362. — Phialea ac. (A. S.) Rehm in Wint. Kr. Fl. III, 717. — Lachnella acuum (A. S.) Phill. — N. K. A. 2, VI, 362. — Aiguilles du *Pinus silvestris*.

2. **Dasyscypha bicolor** (Bull.) Fuck. — Sacc. Syll. VIII, 439. Lachnum bicolor (Bull.) Karst. — Wint. Kr. Fl. III, 870. — Peziza bic. Bull. — T. N. G. XI, 390; Prodr. Fl. Bat. II, 3, 401; Lachnella bicolor (Bull.) Phill. — N. K. A. 2, VI, 362. — Rameaux tombés du Chêne (*Quercus Robur*.)

3. **Dasyscypha brunneola** (Desm.) — Sacc. Syll. VIII, 460. — Lachnum fuscescens (P.) Karst. — Wint. Kr. Fl. III, 900. — N. K. A. 3, II, 866 (avec figure.) — Peziza brunneola Desm. — N. K. A. 1, V, 338 et Rab. F. E. n° 426 (Sprée.) — Arch. Néerl. VIII, 397. — Peziza fuscescens P. — Oud. N. K. A. 2, IV, 517. — F. sèches du *Quercus Robur* et du *Fagus silvatica*.

4. **Dasyscypha calyciformis** (Willd.) — Rehm. in Wint. Kr. Fl. III, 884. — D. calycina (Schum.) Fuck. — Sacc. Syll. VIII, 437. — N. K. A. 2, II, 103; 2, VI, 29. — Helotium calycinum Karst. — N. K. A. 2, IV, 261. — Rameaux du *Larix decidua*.

5. **Dasyscypha carneola** Sacc. Syll. VIII, 447. — N. A. K. 3, II, 311. — Lachnum carneolum (Sacc.) Rehm in Wint. Kr. Fl. III, 881. — F. d'une Graminée inconnue.

6. **Dasyscypha caulicola** (Fr.) — Sacc. Syll. VIII, 463. — Phialea caulicola (Fr.) Rehm in Wint. Kr. Fl. III, 727. — Peziza caul. Fr. — N. K. A. 1, V, 338. — Arch. Néerl. VIII, 397. — Tiges de plantes herbacées.

7. **Dasyscypha cerina** (P.) Fuck. — N. K. A. 3, II, 327. — Sacc. Syll. VIII, 453. — Wint. Kr. Fl. III, 847. — Peziza cerina P. — N. K. A. 1, V, 338. — Arch. Néerl. VIII, 396. — Bois ramolli.

8. **Dasyscypha cillaris** (Schrad.) — Sacc. Syll. VIII, 443. — Lachnum ciliare (Schrad.) Rehm in Wint. Kr. Fl. III. 877. — Peziza ciliaris Schrad. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 5. — F. de Chêne (*Quercus Robur*) tombées.

9. **Dasyscypha distinguenda** (Karst.) — Sacc. Syll. VIII, 434. — Wint. Kr. Fl. III, 836. — N. K. A. 3, II, 328. — Bois ramolli de Chêne (*Quercus Robur*).

***Dasyscypha echinulata** (Rehm). — Sacc. Syll. VIII, 444. — Trichopeziza echin. Rehm in Wint., Ascom. n° 259; Lachnum echin. Rehm in Wint. Kr. Fl. III, 876. — Voir: *Trichopeziza punctiformis.*

10. **Dasyscypha nivea** (Hedw.) — Sacc. Syll. VIII, 437. — Lachnum niveum (Hedw.) Karst. — Wint. Kr. Fl. III, 879. — Peziza nivea Fr. — T. N. G. XI, 390; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 401. — Lachnella nivea (Hedw.) Phill. — N. K. A. 2, VI, 362. — Rameaux tombés et bois ramolli.

11. **Dasyscypha patens** (Fr.) — Sacc. Syll. VIII, 466. — N. K. A. 3, II, 209. — Lachnum patens Karst. — Wint. Kr. Fl. III, 905. — Chaumes des Graminées.

12. **Dasyscypha patula** (P.) — Sacc. Syll. VIII, 443. — Lachnum patulum (P.) Rehm in Wint. Kr. Fl. III, 875. — Peziza patula P. — N. K. A. 1, V, 338 et Rab. F. E. n° 425 (Sprée). — Arch. Néerl. VIII, 396. — F. de Chêne (*Quercus Robur*) tombées.

***Dasyscypha fuscescens** Rehm. — Voir: D. brunneola.

13. **Dasyscypha pulverulenta** (Lib.) — Sacc. Syll. VIII, 462. — Wint. Kr. Fl. III, 850. — Peziza pulverulenta Lib. — Sprée in N. K. A. 1, V, 338 et Rab. Fgi Eur. n° 514. — Arch. Néerl. VIII, 397. — Aiguilles tombées des sapins.

14. **Dasyscypha Rhytismatis** (Phill.) — Sacc. Syll. VIII, 453. — Oud. N. K. A. 2, VI, 29. — Lachnum echinulatum Rehm in Wint. Kr. Fl. 876. — Croûte du *Rhytisma acerinum,* habitant les f. de l'*Acer Pseudo-Platanus.*

15. **Dasyscypha subtilissima** (Cooke.) — Sacc. Syll. VIII, 438. — Wint. Kr. Fl. III, 833. — Oud. N. K. A. 3, III, 1094. — Morceau de bois ramolli.

16. **Dasyscypha virginea** (Batsch) Fuck. — Sacc. Syll. VIII, 432. — Lachnum virgineum Karst. — Wint. Kr. Fl. III, 872. — Peziza virginea Batsch. — T. N. G. XI, 390. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 401; N. K. A. 2, I, 450. — Lachnella virg. (Batsch) Phill. — N. K. A. 2, VI, 362. — Rameaux tombés, péricarpes pourrissants, etc.

17. **Dasyscypha Willkommii** (Hartig) Rehm in Wint. Kr. Fl. III, 832. — Oud. N. K. A. 3, II, 862. — Dasysc. calycina Fuck. — Sacc. Syll. VIII, 437. — N. K. A. 2, VI. 29 et 362. — Rameaux pourrissants du *Larix decidua*.

2. Phaeosporae.

PHAEOPEZIA.

1. **Phaeopezia atrospora** (Fuck.) Sacc. Syll. VIII, 473. — N. K. A. 3. II, 209. — Plicariella ferruginea Rehm in Wint. Kr. Fl. III. 996. — Sur la terre.

3. Hyalodidymae.

DERMATELLA.

1. **Dermatella cucrita** (Karst.) Sacc. Syll. VIII, 491. — N. K. A. 2. VI, 30. — Dermatea cucrita (Karst.) Rehm in Wint. Kr. Fl. II, 255. — Ecorce du *Pinus silvestris*.

2. **Dermatella Frangulae** (Fr.) Karst. — Sacc. Syll. VIII, 489. — Wint. Kr. Fl. III, 260. — Dermatea Fr. Tul. — N. K. A. 2, VI, 358. — Ram. du *Frangula Alnus*.

3. **Dermatella quercina** (Fuck.) Sacc. Syll. VIII, 490, var. **Alni** Fuck. — Sacc. ibid. — Oud in herb. — Dermatea Alni (Fuck.) Rehm in Wint. Kr. Fl. III, 1257. — Rameaux de l'*Alnus glutinosa*.

BELONIDIUM.

1. **Belonidium Alicularíae** (Oud.) Sacc. Syll. VIII, 502. — Peziza Alicul. Oud. Versl. Meded. K. Ak. v. Wet. 2, XVIII, 379. — Stictis Alic. Oud. N. K. A. 2, IV, 264. — Sur l'*Alicularia scalaris*.

2. **Belonidium Aurelia** (P.) de Not. — Sacc. Syll. VIII, 499. — Arachnopeziza Aurelia Fuck. — Wint. Kr. Fl. III, 699. — Peziza aurelia P. — N. K. A. 1, V. 339; Arch. Néerl. VIII, 398. — F. à demi pourries.

***Belonidium caulicola** Oud. N. K. A. 2, V, 473 et 2, VI, 361. — Voir: *Belonium*.

NIPTERA.

1. **Niptera lacustris** (Fr.) Sacc. Syll. VIII, 484. — Mollisia epitypha (Karst.) Wint. Kr. Fl. III, 532. — Peziza lacustris Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 6. — Chaumes du *Scirpus lacustris*.

BELONIUM.

1. **Belonium caulicola** Oud. — Belonidium caulicola Oud. N. K. A. 2, V, 173 et 2, VI, 361. — Tiges desséchées du *Senecio Jacobaea*.

2. **Belonium filisporum** (Cooke) Sacc. Syll. VIII, 494. — N. K. A. 3, II, 209. — F. de l'*Agrostis stolonifera*.

3. **Belonium graminis** (Desm.) Sacc. Syll. VIII, 493. — Belonicella gram. (Desm.) Rehm in Wint. Kr. Fl. III, 643. — Peziza graminis Desm. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 7. — Tiges et f. de quelques Graminées.

4. **Belonium retincolum** (Rab.) Sacc. Syll. VIII, 495. — Trichobelonium retinc. (Rab.) Rehm in Wint. Kr. Fl. III, 592. — Peziza retinc. (Rab.) — N. K. A. 1, V, 339; Arch. Néerl. VIII, 398. — A la base des chaumes du *Phragmites communis*.

SOLENOPEZIA.

1. **Solenopezia consimilis** (Oud. et Rehm) Sacc. Syll. VIII, 478. — Lachnum consimile Oud. et Rehm in N. K. A. 2, V, 166. — Bois pourrissant.

SCUTULA.

1. **Scutula miliaris** (Wallr.) Karst. — Sacc. Syll. VIII, 486. — Peziza mil. Wallr. — N. K. A. 1, V, 338; Arch. Néerl. VIII, 396. — Thalle d'une espèce de *Peltigera*.

4. Scolecosporae.

GORGONICEPS.

1. **Gorgoniceps Fiscella** (Karst.) Sacc. Syll. VIII, 505. — Wint. Kr. Fl. III, 1232. — Oud. N. K. A. 3, II, 679. — Rameaux d'une espèce de *Salix*.

†[29] Ascobolaceae.

1. Hyalosporae.

ASCOPHANUS.

1. **Ascophanus carneus** (P.) Boudier. — Oud. Versl. Med. K. A. v. W. 2, XVIII, 382; N. K. A. 2, IV, 264 et VI, 359. — Sacc. Syll. VIII, 534. — Wint. Kr. Fl. III, 1094. — Bouse de vache.

2. **Ascophanus cinerellus** (Karst.) Sacc. Syll. VIII, 532. — Wint. Kr. Fl. III, 1085. — Peziza cinerella Karst. — Oud. N. K. A. 2, IV, 260. — Crottin de lapin.

3. **Ascophanus cinereus** (Cronan) Boud. — N. K. A. 3, II, 210. — Sacc. Syll. VIII, 531. — Bouse de vache.

4. **Ascophanus microsporus** (B. Br.) Phill. — N. K. A. 3, II, 210. — Sacc. Syll. VIII, 528. — Wint. Kr. Fl. III, 1088. — Bouse de vache.

5. **Ascophanus minutissimus** Boud. — Oud. V. M. K. A. v. W. 2, XVIII, 382; N. K. A. 2, IV, 263. — Sacc. Syll. VIII, 533. — Crottin de chèvre.

6. **Ascophanus ochraceus** (Cronan) Boud. — Oud. N. K. A. 2, IV, 261. — Sacc. Syll. VIII, 531. — Wint. Kr. Fl. III, 1091. — Crottin de lapin.

***Ascophanus papillatus** Boud. — N. K. A. 2, IV, 264. — Voir: *Lasiobolus equinus.*

***Ascophanus pilosus** Boud. — N. K. A. 2, VI, 359. — Voir: *Lasiobolus.*

***Ascophanus sedecimsporus** Boud. — N. K. A. 2, IV, 264. — Voir: *Ryparobius.*

7. **Ascophanus subfuscus** Boud. — Oud. V. M. K. A. v. W. 2, XVIII, 382; N. K. A. 2, IV, 263 et VI, 359. — Sacc. Syll. VIII, 532. — Wint. Kr. Fl. III, 1089. — Crottin de lapin.

8. **Ascophanus testaceus** (Moug.) Phill. — N. K. A. 3, II, 677. — Sacc. Syll. VIII, 535. — Wint. Kr. Fl. III, 1093. — Fumiers, composées de débris ramassés dans la rue.

9. **Ascophanus vicinus** Boud. — Oud. N. K. A. 2, V, 263. — Sacc. Syll. VIII, 530. — Crottin de lapin.

LASIOBOLUS.

1. **Lasiobolus equinus** (Müll.) Karst. — Sacc. Syll. VIII, 536. — Wint. Kr. Fl. III, 1096. — Ascophanus papillatus Boud. — Oud. V. M. K. A. v. W. 2, XVIII, 382; N. K. A. 2, IV, 264. — Peziza papillata P. — N. K. A. 1, 1, 51; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 401. — Peziza diversicolor Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 4. — Crottin de chèvre.

forma **pilosus** (Fr.) Sacc. Syll. VIII, 537. — Wint. Kr. Fl. III, 1096, sub. n° 5801. — Ascophanus pilosus Boud. — Oud. V. M. K. A. v. W. 2, XVIII, 382; N. K. A. 2, III, 156; 2, IV, 264 et 2, VI, 359. — Crottin de plusieurs herbivores.

RYPAROBIUS.

1. **Ryparobius brunneus** Boud. — V. M. K. A. v. W., 2, XVIII, 383; N. K. A. 2, IV, 263. — Sacc. Syll. VIII, 540. — Crottin de plusieurs herbivores.

2. **Ryparobius Pelletieri** (Crouan) — Sacc. Syll. VIII, 542. — Wint. Kr. Fl. III, 1100. — N. K. A. 3, II, 210. — Bouse de vache.

3. **Ryparobius sedecimsporus** (Crouan) — Sacc. Syll. VIII, 541. — Wint. Kr. Fl. III, 1100. — Ascophanus sedecimsporus Boud. — N. K. A. 2, IV, 264. — Crottin de chèvre.

2. Phaeosporae.

ASCOBOLUS.

1. **Ascobolus aeruginosus** Fr. — V. M. K. A. v. W. 2, XVIII, 380; N. K. A. 2, IV, 262 et VI, 359. — Sacc. Syll. VIII, 514. — Asc. aeruginosus Rehm in Wint. Kr. Fl. III, 1125. — Bouse de vache.

2. **Ascobolus amoenus** Oud. Hedw. 1882, p. 165; V. M. K. A. v. W. 2, XVIII, 381; N. K. A. 2, IV, 262. — Sacc. Syll. VIII, 518. — Crottin de chameau.

3. **Ascobolus atrofuscus** Phill. et Plowr. — N. K. A. 3, II, 210. — Sacc. Syll. VIII, 520. — Wint. Kr. Fl. III, 1131. — Sur la terre.

4. **Ascobolus furfuraceus** P. — T. N. G. XI, 391; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 396. — Sacc. Syll. VIII, 516. — N. K. A. 2, I, 450. — Asc. stercorarius (Bull.) Wint. Kr. Fl. III, 1126. — Bouse de vache.

5. **Ascobolus glaber** P. — N. K. A. 1, I, 51; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 396; N. K. A. 2, IV, 262. — Sacc. Syll. VIII, 517. — Wint. Kr. Fl. III, 1121. — Crottin de lapin.

6. **Ascobolus immersus** P. — Oud. V. M. K. A. v. W. 2, XVIII, 380; N. K. A. 2, IV, 262 et VI, 359. — Sacc. Syll. VIII, 523. — Wint. Kr. Fl. III, 1127. — Bouse de vache et crottin de cheval.

var. **brevisporus** Oud. N. K. A. 2, IV, 262. — Wint. Kr. Fl. III, 1128. — Crottin de lapin.

***Ascobolus Trifolii** Beruh. — T. N. G. XI, 391; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 396. — Voir: *Pseudopeziza*.

7. **Ascobolus vinosus** Berk. — Oud. V. M. K. A. v. W. 2, XVIII, 380; N. K. A. 2, IV, 261 et VI, 359. — Sacc. Syll. VIII, 518. — Wint. Kr. Fl., III, 1123. — Crottin de lapin.

8. **Ascobolus viridis** Currey. — N. K. A. 3, II, 210. — Sacc. Syll. VIII, 519. — Wint. Kr. Fl. III, 1130. — Sur la terre.

SACCOBOLUS.

1. **Saccobolus Boudierii** Oud. Hedw. 1882, p. 166; N. K. A. 2, VI, 263; V. M. K. A. v. W. 2, XVIII, 382. — Sacc. Syll. VIII, 527. — Crottin de lapin.

2. **Saccobolus Kerverni** (Crouan) Boudier. — V. M. K. A. v. W. 2, XVIII, 382; N. K. A. 2, IV, 263 et VI, 359. — Sacc. Syll. VIII, 524. — Wint. Kr. Fl. III, 1116. — Crottin de chèvre.

3. **Saccobolus neglectus** Boudier. — V. M. K. A. v. W. 2, XVIII, 382; N. K. A. 2, IV, 263 et VI, 359. — Sacc. Syll. VIII, 526. — Wint. Kr. Fl. III, 1118. — Crottin de cheval,

4. **Saccobolus violascens** Boudier. — Arch. Néerl. VIII, 400; N. K. A. 2, I, 316. — Sacc. Syll. VIII, 525. — Wint. Kr. Fl. III, 1118. — Crottin de lapin.

†[30] Dermateaceae.

1. Hyalosporae.

DERMATEA.

*__Dermatea carpinea__ Fr. — N. K. A. 2, VI, 358. — Voir: *Peziculu carpinea.*

1. **Dermatea Cerasi** (P.) Fr. — Sacc. Syll. VIII, 550. — Wint. Kr. Fl. III, 247. — Cenangium Padi Fr. — N. K. A. 2, II, 185. — Rameaux du *Prunus Avium.*

*__Dermatea Frangulae__ Tul. — N. K. A. 2, VI, 358. — Voir: *Dermatella Frangulae.*

2. **Dermatea Padi** Fr. — N. K. A. 2, VI, 285 et 358. — Sacc. Syll. VIII, 551. — Wint. Kr. Fl. III, 248. — Rameaux du *Prunus Padus.*

3. **Dermatea Rubi** (Lib.) Rehm in Wint. Kr. Fl. III, 258. — Peziza rhabarbarina (Berk.) Tul. — Sacc. Syll. VIII, 311. — Peziza arduennensis Mont. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 7. — Helotium Rubi Sprée in Rab. Fgi Eur. n° 717. — Tiges mortes d'une espèce de *Rubus.*

CENANGIUM.

1. **Cenangium Abietis** (P.) Duby. — Sacc. Syll. VIII, 560. — Wint. Kr. Fl. III, 1255. — Cenangium ferruginosum Fr. — T.

N. G. XI, 391; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 405; N. K. A. 2, VI, 358. — Ecorce du *Pinus silvestris*.

***Cenangium Cerasi** Fr. — N. K. A, 2, II, 185. — Voir: *Dermatea*.

2. **Cenangium Coryli** Cda. — Sacc. Syll. VIII, 559. — Tympanis corylina Rehm in Wint. Kr. Fl. III, 1258. — Catinula turgida (Fr.) Desm. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 9. — Écorce du *Corylus Avellana*.

3. **Cenangium Crataegi** Schwein. — Sacc. Syll. X, 573. — Oud. N. K. A. 3, III, 1098. — Ram. du *Crataegus Oxyacantha*.

***Cenangium ferruginosum** Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 405; N. K. A. 2, VI, 358. — Voir: *Cen. Abietis*.

4. **Cenangium populneum** (P.) — Rehm in Wint. Kr. Fl. III, 220 et 1255. — Sacc. Syll. VIII, 565. — Oud. N. K. A. 3, III, 1098. — Peziza fascicularis A. S. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 5; N. K. A. 2, I, 450. — Rameaux pourrissants des Peupliers (*Populus*) et de l'Aune (*Alnus glutinosa*).

***Cenangium quercinum** Fr. — T. N. G. XII, 270. — Voir: *Colpoma*.

CATINULA.

***Catinula turgida** Desm. — Podr. Fl. Bat. II, 4, p. 9. — Voir: *Cenangium Coryli*.

TYMPANIS.

1. **Tympanis conspersa** Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 9; N. K. A. 2, VI, 358. — Sacc. Syll. VIII, 578. — Wint. Kr. Fl. III, 264. — Rameaux des *Sorbus Aucuparia* et *Pirus Malus*.

2. **Tympanis Ligustri** Tul. — N. K. A. 2, V, 477 et VI, 358. — Sacc. Syll. VIII, 580. — Wint. Kr. Fl. III, 271 et 1258. — Rameaux du *Ligustrum vulgare*.

3. **Tympanis saligna** Tode. — Sacc. Syll. VIII, 582. — Wint. Kr. Fl. III, 269. — Oud. in herb. — Rameaux d'une espèce de *Salix*.

2. Phragmosporae.

SCLERODERRIS.

1. **Scleroderris aggregata** (Lasch) Rehm in Wint. Kr. Fl. III, 212. — Sacc. Syll. VIII, 597. — Sphaeria aggregata Lasch. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 52. — F. et tiges de l'*Euphrasia officinalis* et de l'*Odontites verna*.

2. **Scleroderris ribesia** (P.) Karst. — N. K. A. 3, II, 328. — Sacc. Syll. VIII, 594. — Wint. Kr. Fl. III, 209. — Rameaux du *Ribes rubrum*.

†[31] Bulgariaceae.

1. Hyalosporae.

LEOTIA.

1. **Leotia gelatinosa** Hill. — Wint. Kr. Fl. III, 609. — L. lubrica P. — T. N. G. XI, 390; Prodr. Fl. Bat. II, p. 395; N. K. A. 2, I, 449; 2, VI, 358; Oud. Fgi Neerl. exs. n° 286; Fl. Bat. tab. 1045. — Sur la terre humeuse ombragée.

*__Leotia lubrica__ P. — T. N. G. XI, 609; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 395; N. K. A. 2, I, 449; 2, VI, 358. — Voir: *L. gelatinosa*.

OMBROPHILA.

1. **Ombrophila Clavus** (A. S.) Cooke. — Oud. N. K. A. 3, I, 471. — Sacc. Syll. VIII, 614. — Wint. Kr. Fl. III, 178 et 1262. — Tubercule pourri d'un *Begonia*.

2. **Ombrophila violacea** (Hedw.) Fr. — Oud. N. K. A. 3, II, 686. — Sacc. Syll. VIII, 613. — Wint Kr. Fl. III, 177. — Bois ramolli d'un Saule (*Salix*).

ORBILIA.

1. **Orbilia chrysocoma** (Bull.) — Sacc. Syll. VIII, 624. — Wint. Kr. Fl. III, 157 et 1261. — Peziza ombrophila Bull. — T. N. G. XI, 391; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 404; N. K. A. 2, I, 451. — Bois ramolli.

AGYRIUM.

1. **Agyrium nigricans** Fr. Epicr. Ed. 1ª p. 593; N. K. A. I, V, 340; Arch. Néerl. VIII, 401. — Rameaux tombés d'un *Tilia*. — Supprimé par les auteurs modernes, voire même par Fries dans la seconde Edition de son Epicrisis.

2. Phaeosporae.

BULGARIA.

*__Bulgaria atra__ Fr. — T. N. G. XII, 270 (Introuvable!)

*__Bulgaria inquinans__ Fr. — Voir: *B. polymorpha*.

1. **Bulgaria polymorpha** (Oeder) Wett. — Wint. Kr. Fl. III, 495. — B. inquinans Fr. — T. N. G. XI, 391; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 395; N. K. A. 2, I, 93 et 449; 2 V, 593 et 2, VI, 358; Oud. Herb. N. Pl. n° 462 et Fgi Neerl. exs., n° 178; Fl. Bat. tab. 814, f. 4. — Troncs abattus de *Quercus* et de *Fagus* en train de pourriture.

2. **Bulgaria sarcoides** Fr. — Voir: *Coryne.*

3. Didymosporae.

CALLORIA.

1. **Calloria fusarioides** (Berk.) Fr. — N. K. A. 2, VI, 359. — Sacc. Syll. VIII, 639. — Wint. Kr. Fl. III, 463. — Peziza neglecta Lib. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 6. — Tiges fanées des *Urtica.*

4. Phragmosporae.

CORYNE.

1. **Coryne atro-virens** (P.) — Sacc. Syll VIII, 641; Wint. Kr. Fl. III, 485. — Coryne virescens Tul. — N. K. A. 2, VI, 359. — Bois décortiqué.

2. **Coryne Cylichnium** (Tode.) — Sacc. Syll. VIII, 643. — N. K. A. 3, II, 210. — C. sarcoides var. Cylichnium Rehm in Wint. Kr. Fl. III, 491. — Bois ramolli.

3. **Coryne sarcoides** (Jacq.) Tul. — N. K. A. 2, I, 449; 2, V, 166 et VI, 359. — Sacc. Syll. VIII, 642. — Wint. Kr. Fl. III, 489 et 1262. — Bulgaria sarcoides, Fr. — T. N. G. XI, 391; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 396. — N. K. A. 2, I, 450. — Troncons d'arbre.

4. **Coryne urnalis** (Nyl.) — Sacc. Syll. VIII, 642. — C. sarcoides (Jacq.) Tul. var. urnalis Nyl. in Rehm, Wint. Kr. Fl. 490. — Oud. N. K. A. 3, II, 1099. — Tronc ramolli de *Fagus silv.*

***Coryne virescens** Tul. — N. K. A. 2, VI, 359. — Voir: *C. atrovirens.*

†[32] Stictidaceae.

1. Hyalosporae.

PROPOLIS.

***Propolis alba** Fr. — N. K. A. 2, IV, 319. — Voir: *Pr. fagínea.*

1. **Propolis fagínea** (Schrad.) Karst. — Sacc. Syll. VIII, 648. —

Wint. Kr. Fl. III, 149. — Propolis versicolor Fr. — N. K. A. 1, V, 341; Arch. Néerl. VIII. 401. — Propolis alba Fr. — Oud. N. K. A. 2, IV, 519. — Bois de chêne (*Quercus*) ramolli.

***Propolis versicolor** Fr. — N. K. A. I, V, 341; 2, VI, 357; Arch. Néerl. VIII, 401. — Voir: *Pr. faginea.*

NAEVIA.

1. **Naevia pusilla** (Lib.) Rehm in Wint. Kr. Fl. III, 143. — Sacc. Syll. VIII, 662. — N. K. A. 2, VI, 30. — Chaume du *Juncus effusus.*

2. **Naevia valvata** Mont. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 8; N. K. A. 2, I, 451; 2, VI, 357. — Sacc. Syll. VIII, 663. — F. sèches du *Psamma arenaria.*

2. Scolecosporae.

STICTIS.

***Stictis Alicularlae** Oud. N. K. A. 2, IV, 264. — Voir: *Belonidium.*

1. **Stictis radiata** (L.) P. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 8. — Sacc. Syll. VIII, 682. — Wint. Kr. Fl. III, 176. — Peziza Phialea radiata P. — N. K. A. 1, 1, 51; Peziza radiata Sw.; N. K. A. 2, II, 185. — Ecorce d'un *Tilia* et tiges desséchées.

†[33] Phacidiaceae.

CRYPTOMYCES.

I. Hyalosporae.

1. **Cryptomyces Rubiae** (Mont.) Sacc. Syll. VIII, 709. — Rhytisma Rubiae Mont. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 75. — F. du *Rubia tinctorum.*

PHACIDIUM.

***Phacidium Abietis** Rab. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 76. — Voir: *Blitrydium abietinum.*

***Phacidium coronatum** Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 75. — Voir: *Coccomyces.*

***Phacidium dentatum** Schm. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 75. — Voir: *Coccomyces.*

***Phacidium Ilicis** Lib. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 751; N. K. A. 2, VI, 357. — Voir: *Ph multivalve.*

1. **Phacidium lacerum** Fr. — N. K. A. 1, V, 341; Arch. Néerl.

VIII, 401. — Sacc. Syll. VIII, 713. — Wint. Kr. Fl. III, 66. — Aiguilles tombées du *Pinus silvestris*.

***Phacidium Laurocerasi** Desm. — T. N. G. XII, 270; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 76. — Voir: *Trochila*.

***Phacidium litigiosum** Desm. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 76. — Voir: *Fabraea*.

***Phacidium Medicaginis** Lib. — N. K. A. 2, I, 263. — Arch. Néerl. VIII, 401. — Voir: *Pseudopeziza*.

2. **Phacidium multivalve** (D. C.) Kze. et Schm. — T. N. G. XI, 393. — Sacc. Syll. VIII, 710. — Wint. Kr. Fl. III, 68. — Ph. Ilicis Lib. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 75; N. K. A. 2, VI, 357. — F. de l'*Ilex Aquifolium*.

***Phacidium Patella** P. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 75. — Voir: *Heterosphaeria*.

***Phacidium Pini** Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 75. — Voir: *Coccomyces*.

3. **Phacidium pusillum** Lib. — Oud. N. K. A. 2, VI, 30; Hedw. 1891, p. 248. — Sacc. Syll. VIII, 716. — Cryptodiscus pusillus (Lib.) Rehm in Wint. Kr. Fl. III, 1217. — Tiges d'une espèce de *Rubus*.

***Phacidium Ranunculi** Lib. — T. N. G. XII, 270; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 76. — Voir: *Fabraea litigiosa*.

***Phacidium Rubi** Fr. — N. K. A. 2, I, 264. — Arch. Néerl. VIII, 401. — Voir: *Coccomyces*.

4. **Phacidium Vaccinii** Fr. — Oud. N. K. A. 3, III, 1100. — Sacc. Syll. VIII, 709. — Wint. Kr. Fl. VIII, 69. — F. du *Vacc. Vitis idaea*.

PSEUDOPEZIZA.

1. **Pseudopeziza Cerastiorum** (Wallr.) Fuck. Sacc. Syll. VIII, 725. — Peziza Cerast. Wallr. — N. K. A. 2, II, 185; Mollisia Cerast. (Wallr.) Phill. — N. K. A. 2, VI, 362; Wint. Kr. Fl. III, 600. — F. du *Cerastium glomeratum*.

2. **Pseudopeziza Medicaginis** (Lib.) Sacc. — Sacc. Syll. VIII 724. — Pseudopez. Trifolii Fuck. f^{a} Medicaginis (Lib.) Rehm in Wint. Kr. Fl. III, 598. — Phacidium Medicaginis Lib. — N. K. A. 2, I, 263; Arch. Néerl. VIII, 401. — F. du *Medicago Lupulina*.

***Pseudopeziza Ranunculi** Fuck. — N. K. A. 2, II, 41. — Voir: *Fabraea litigiosa*.

3. **Pseudopeziza Trifolii** (Biv. Bernh.) Fuck. — Sacc. Syll. VIII, 723. — Wint. Kr. Fl. III, 597. — Ascobolus Trifolii Biv. Bernh. T. N. G. XI, 391; Prodr. Fl. Bat. II, 3, 396. — Trochila Trifolii de Not. — Oud. Fgi Neerl. exs. n° 293. — Folioles du *Trif. repens*.

TROCHILA.

1. **Trochila Buxi** Capron. — Oud. N. K. A. 3, II, 688. — Sacc. Syll. VIII, 729. — Wint. Kr. Fl. III, 131. — F. du *Buxus sempervirens*.

2. **Trochila Craterium** (D. C.) Fr. — Oud. N. K. A. 2, II, 185; 2, IV, 264; 2, VI, 357. — Sacc. Syll. VIII, 728. — Wint. Kr. Fl. III, 128. — Sphaeria Craterium D. C. — N. K. A. 1, I, 52. Peziza Hederae Lib. Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 7. — F. du *Hedera Helix*.

3. **Trochila Laurocerasi** (Desm.) Fr. — Oud. N. K. A. 3, III, 1101. — Sacc. Syll. VIII, 729. — Wint. Kr. Fl. III, 129. — Phacidium Laur. T. N. G. XII, 270; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 76. F. du *Prunus Laurocerasus*.

***Trochila Trifolii** de Not. — Voir: *Pseudopeziza*.

*EUSTEGIA.

***Eustegia Ilicis** Chev. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 73. — Voir: *Stegia*.

STEGIA.

1. **Stegia Ilicis** Fr. — N. K. A. 2, VI, 357; Oud. Fgi Neerl. exs. n° 181. — Sacc. Syll. VIII, 733. — Eustegia Ilicis Chev. — T. N. G. XI, 393; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 73. — Trochila Ilicis Cronan. — Wint. Kr. Fl. III, 129. — F. de l'*Ilex Aquifolium*.

FABRAEA.

1. **Fabraea Ranunculi** (Fr.) Karst. — Oud. N. K. A. 3, III, 1100. — Wint. Kr. Fl. III, 601. — Fabraea litigiosa (Rob. et Desm.) Sacc. Syll. VIII, 735. — Phacidium Ranunculi Lév. — T. N. G. XII, 270; Phac. litigiosum Desm. et Phac. Ranunculi Lib.; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 76; Peziza Ran. Oud. N. K. A. 2, I, 183; Pseudopeziza Ran. Fuck. — Arch. Néerl. VIII, 399; N. K. A. 2, II, 41. — Dothidea Ranunculi Fr. — T. N. G. XI, 396. — F. des *Ran. acer* et *repens*.

2. Didymosporae.

ABROTHALLUS.

1. **Abrothallus Parmeliarum** (Sommerf.) Nyl. — N. K. A. 3, II, 210. — Sacc. Syll. VIII, 739. — Wint. Kr. Fl. III, 359. Abr. Smithii Tul. in Prodr. Fl. Bat. (Nieuwe Lijst der Nederl. Korstmossen, p. 70). — Thalle de quelques Lichens.

2. Scolecosporae.

COCCOMYCES.

1. **Coccomyces coronatus** (Schum.) de Not. — Sacc. Syll. VIII, 744. — Wint. Kr. Fl. III, 76. — Phacidium coronatum Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 75. — F. du Chêne (*Quercus Robur*).

2. **Coccomyces dentatus** (Kze u. Schm.) Sacc. Syll. VIII, 745. — Wint. Kr. Fl. III, 78. — Phacidium dentatum Kze u. Schm. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 75. — F. du Chêne (*Quercus Robur*).

3. **Coccomyces Pini** (A. S.) Karst. — N. K. A. 2, VI, 357. — Sacc. Syll. VIII, 748. — Coccophacidium Pini (A. S.) Rehm in Wint. Kr. Fl. III, 96 et 1249. — Phacidium Pini Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 75. — Rameaux des *Pinus silvestris* et *Picea excelsa*.

4. **Coccomyces Rubi** (Fr.) Karst. — Sacc. Syll. VIII, 751. — Wint. Kr. Fl. III, 81. — Phacidium Rubi Fr. — N. K. A. 2, I, 264; Arch. Néerl. VIII, 400. — F. du *Rubus caesius*.

RHYTISMA.

1. **Rhytisma acerinum** (P.) Fr. — T. N. G. XI, 393; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 74; N. K. A. 2, I, 93; 2, V, 593; 2, VI, 357. — Oud. Herb. N. Pl. n° 210. — Sacc. Syll. VIII, 753. — Wint. Kr. Fl. III, 82 et 1249. — F. de l'*Acer Pseudo-Platanus*.

2. **Rhytisma Andromedae** (P.) Fr. — Oud. N K. A. 2, I, 264; Arch. Néerl. VIII, 402. — Sacc. Syll. VIII, 774. — Wint. Kr. Fl. III, 85. — F. de l'*Andromeda polifolia*.

3. **Rhytisma Bistortae** (D. C.) Lib. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, 74. — Sacc. Syll. VIII, 755. — Wint. Kr. Fl. III, 596. — F. du *Polygonum Bistorta*.

4. **Rhytisma punctatum** (P.) Fr. — T. N. G. XI, 393; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 74. — Sacc. Syll. VIII, 753. — Wint. Kr. Fl. III, 83. — F. de l'*Acer Pseudo-Platanus*.

***Rhytisma Rubiae** Mont. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 75. — Voir: *Cryptomyces*.

5. **Rhytisma salicinum** (P.) Fr. — T. N. G. XI, 392. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 74; N. K. A. 2 VI, 357; Oud. Fgi Neerl. exs. n° 84. — Sacc. Syll. VIII, 753. — Wint. Kr. Fl. III, 84. — F. du *Salix Caprea*.

f^a^ umbonatum (Hoppe) Rab. — T. N. G. XI, 393 et Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 74. — (Rh. umbonatum.) — F. du *Salix Caprea*.

*Rhytisma umbonatum Desm. — Prodr. Fl. Bat. II, 4 p. 74. — Voir: *Rh. salicinum* f^a *umbonatum*.

6. **Rhytisma Urticae** (Wallr.) Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 74. — Sacc. Syll. VIII, 755. — Wint. Kr. Fl. III, 86. — Tiges de l'*Urtica dioica*.

4. Dictyosporae.

DOTHIORA.

1. **Dothiora sphaeroides** (P.) Fr. — Sacc. Syll. VIII, 764. — Wint. Kr. Fl. III, 109. — Dothidea sphaeroides Fr. ? Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 70. — Rameaux d'un *Acer*.

†[34] Patellariaceae.

1. Hyalosporae.

PATINELLA.

1. **Patinella artemisioides** (Roum. et Pat.) Sacc. — N. K. A. 3, I, 235 et 471. — Sacc. Syll. VIII, 772. — Patellaria artem. Roum. Pat. — N. K. A. 2, VI, 358. — Tige de l'*Artemisia vulgaris*.

HETEROSPHAERIA.

1. **Heterosphaeria Patella** (Tode) Sacc. Syll. VIII, 775. — Wint. Kr. Fl. III, 201 et 1254. — N. K. A. 2, VI, 357; 3, II, 680; Oud. Fgi Neerl. exs. n° 180, 3, II, 680; Sphaeria Patella Fr. — N. K. A. 1, I, 52. — Phacidium Patella P. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 75. — Tiges desséchées du *Daucus Carota*.

2. Didymosporae.

KARSCHIA.

1. **Karschia lignyota** (Fr.) Sacc. Syll. VIII, 779. — Wint. Kr. Fl. III, 346. — Patellaria lignyota Fr. N. K. A. 2, II, 185. — Bois ramolli.

3. Phragmosporae.

PATELLARIA.

*Patellaria artemisioides Roum. Pat. — N. K. A. 2, VI, 358. — Voir: *Patinella*.

*__Patellaria atrata__ Fr. — T. N. G. XII, 270; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 405; N. K. A. 2, VI, 358. — Voir: *Lecanidion*.

1. __Patellaria clavispora__ (Peck) Sacc. Syll. VIII, 787. — N. K. A. 2, VI, 358. — Ram. du *Ligustrum vulgare*.

*__Patellaria connivens__ Karst. — N. K. A. 2, VI, 358. — Voir: *Durella*.

*__Patellaria corlacea__ (Bull.) Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 405. — Mentionné nulle part.

*__Patellaria discolor__ (Fr. et Mont.). — N. K. A. 1, V, 340; Arch. Néerl. VIII, 400. — Voir: *Mollisia*.

*__Patellaria ligniota__ Fr. — N. K. A. 2, II, 185. — Voir: *Karschia*.

*__Patellaria parvula__ Cooke. — N. K. A. 2, IV, 261. — Voir: *Durella*.

DURELLA.

1. __Durella compressa__ (P.) Tul. — Sacc. Syll. VIII, 790. — Wint. Kr. Fl. III, 287. — Peziza compressa P. — N. K. A. 1, V, 340; Arch. Néerl. VIII, 399. — Bois dur et sec.

2. __Durella connivens__ (Fr.) Rehm. in Wint. Kr. Fl. III, 288; Sacc. Syll. VIII, 790. — Patellaria connivens Karst. — N. K. A. 2, VI, 358.

2. __Durella parvula__ (Cooke) Sacc. Syll. VIII, 793. — Patellaria proxima B. Br. — Wint. Kr. Fl. III, 331. — Patellaria parvula Cooke. — Oud. N. K. A. 2, IV, 261. — Rameaux décortiqués de Chêne (*Quercus Robur*).

LECANIDION.

1. __Lecanidion atratum__ (Hedw.) — Sacc. Syll. VIII, 795. — Patellaria atrata (Hedw.) Fr. — Wint. Kr. Fl. III, 334. — T. N. G. XII, 270; Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 405; N. K. A. 2, VI, 358. — Bois suranné.

2. __Lecanidion proximum__ (B. Br.) Sacc. Syll. VIII, 796. — Patellaria proxima B. Br. — Wint. Kr. Fl. III, 331. — N. K. A. 2, IV, 261. — Rameaux de Chêne (*Quercus Robur*) décortiqués.

4. Dictyosporae.

BLITRYDIUM.

1. __Blitrydium abietinum__ (Wallr.) Sacc. Syll. VIII, 804. — Phacidium Abietis Rab. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 76. — Ram. du *Picea excelsa*.

†[35] Caliciaceae.

Hyalosporae.

ROESLERIA.

1. **Roesleria pallida** (P.) Sacc. Syll. VIII, 826. — R. hypogaea Pass. et de Thüm. — Oud. N. K. A. 2, V, 167. — Coniocybe nivea (Hoffm.) Rehm. in Wint. Kr, Fl. III. 396. — Racines du *Vitis riparia*.

CONIOCYBE.

1. **Coniocybe furfuracea** (L.) Körb. — Prodr. Fl. Bat.: Nieuwe Lijst, etc. 52; N. K. A. 3, II, 211.

α. vulgaris Körb. — R. Racines déterrées d'arbres.

β. sulphurella Körb. — Tronc d'un *Salix* creux.

2. Didymosporae.

ACOLIUM.

1. **Acolium tympanellum** (Arch.) Körb. — Prodr. Fl. Bat.: Nieuwe Lijst der Nederl. Korstm., a° 1898, p. 50; N. K. A. 3, II, 211. — Sacc. Syll. VIII, 211. — Calicium adspersum γ. trabinellum Schr. in Wint. Kr. Fl. II, 410. — Sur le bois de Chêne (*Quercus Robur*) suranné.

CALICIUM.

1. **Calicium adspersum** (P.) Körb. — Prodr. Fl. Bat.: Nieuwe Lijst. etc., p. 50; N. K. A. 3, II, 211. — Sacc. Syll. VIII, 839. — Sur l'écorce de Chêne (*Quercus Robur*).

2. **Calicium curtum** Turn. et Borr. — Prodr. Fl. Bat.: Nieuwe Lijst etc. p. 50; N. K. A. 3, II, 211. — Sacc. Syll. VIII, 838. — Wint. Kr. Fl. III, 409. — Bois suranné de Chêne (*Quercus Robur*) et de Pin (*Pinus silvestris*).

3. **Calicium hyperellum** (Ach.) Körb. — Prodr. Fl. Bat.: Nieuwe Lijst. etc. p. 51; N. K. A. 3, II, 211. — Sacc. Syll. VIII, 8. — Ecorce de Chêne (*Quercus Robur*) agé.

4. **Calicium nigrum** (Schaer.) β. minutum Körb. — Prodr. Fl. Bat.: Nieuwe Lijst. etc. p. 50; N. K. A. 3, II, 211. — C. minutum Körb. — Wint. Kr. Fl. III, 408. — Bois de Chêne (*Quercus Robur*) suranné et dans les troncs de Chêne creux.

5. **Calicium pusillum** (Flörke) Körb. — Prodr. Fl. Bat.: Nieuwe

Lijst, enz., p. 50; N. K. A. 3, II, 211. — Sacc. Syll. VIII, 835. — Wint. Kr. Fl. III, 106. — Bois de vieilles clôtures.

6. **Calicium quercinum** (P.) Massal. — Prodr. Fl. Bat.: Nieuwe Lijst, enz., p. 50 (sub. n° 195) N. K. A. 3, II, 211. — Sacc. Syll. VIII, 837. — Écorce de Chêne (*Quercus Robur*).

7. **Calicium Stictarum** (de Not.) Tul. — Sacc. Syll. VIII, 743. — Wint. Kr. Fl. III, 426. — Prodr. Fl. Bat.: Nieuwe Lijst, enz., p. 61; N. K. A. 3, II, 211. — Apothèces du *Sticta pulmonacea*.

8. **Calicium trachelinum** (Ach.) Körb. — Prodr. Fl. Bat.: Nieuwe Lijst, enz., p. 51. — N. K. A. 3, II, 211. — Sacc. Syll. VIII, 838. — C. salicinum P. — Wint. Kr. Fl. III, 410. — Sur le bois des troncs creux de *Salix* et *Populus*. — Bois et écorce des troncs de Chêne (*Quercus Robur*) âgés.

3. Phaeosporae.

CYPHELIUM.

1. **Cyphelium chrysocephalum** (Turn.) Körb. — Prodr. Fl. Bat.: Nieuwe Lijst, enz., p. 51; N. K. A. 3, II, 211. — Sacc. Syll. VIII, 831. — Bois de vieux troncs.

2. **Cyphelium phaeocephalum** (Turn.) Körb. — Prodr. Fl. Bat.: Nieuwe Lijst, enz., p. 51; N. K. A. 3, II, 211. — Sacc. Syll. VIII, 831. — Écorce d'un *Salix* âgé.

3. **Cyphelium trichiale** (Ach.) Körb. — Prodr. Fl. Bat.: Nieuwe Lijst, enz., p. 51; N. K. A. 3, II, 212. — Sacc. Syll. III, 830. — Wint. Kr. Fl. III, 395. — Bois vermoulu des *Salix* et *Fagus*.

SPHINCTRINA.

1. **Sphinctrina turbinata** (P.) Fr. — Prodr. Fl. Bat.: Nieuwe Lijst, enz., p. 61; N. K. A. 3, II, 211. — Sacc. Syll. VIII, 829. — Wint. Kr. Fl. III, 390. — Croûtes du *Pertusaria communis*.

†[36] Arthoniaceae.

1. Didymosporae.

CELIDIUM.

1. **Celidium Stictarum** (de Not.) Tul. — Prodr. Fl. Bat.: Nieuwe Lijst, enz., p. 61. — Sacc. Syll. VIII, 743. — Wint. Kr. Fl. III, 426 et 1261. — Calicium Stictarum N. K. A. 3, II, 211. — Apothèces du *Sticta palmonaria*.

†[37] Gymnoascaceae.

1. Hyalosporae.

MYXOTRICHUM.

1. **Myxotrichum chartarum** (Nees) Kunze. — T. N. G. XI, 402; Prodr. Fl. Bat. II, 4 p. 128. — Sacc. Syll. IV, 317. — Papier pourri.

BOLACOTRICHA.

1. **Bolacotricha grisea** B. Br. — N. K. A. 2, IV, 245. — Sacc. Syll. IV, 317. — Crottin de lapin.

†[38] Exoascaceae.

1. Hyalosporae.

EXOASCUS.

*__Exoascus Alni__ de By. — N. K. A. 2, I, 263; Arch. Néerl. VIII, 401. — Voir: *E. Tosquinetii*.

1. **Exoascus amentorum** Sadebeck [1]) — Exoascus Alni de Bary (p. p.) — N. K. A. 2, V, 532. — Exoascus alnitorquus Sacc. Syll. VIII, 817 (p. p.) — Châtons féminins de l'Aune.

*__Exoascus Betulae__ Fuck. — N. K. A. 2, VI, 169. — Voir: *Taphrina Betulae*.

*__Exoascus bullatus__ (B. Br.) Fuck. — N. K. A. 2, VI, 169. — Voir: *Taphrina Betulae*.

2. **Exoascus deformans** (Berk.) Fuck. — Oud. N. K. A. 2, II, 678. — Sacc. Syll. VIII, 816. — F. du *Persica vulgaris*.

3. **Exoascus Pruni** Fuck. — Oud. N. K. A. 2, IV, 264. — Sacc. Syll. VIII, 817. — Sur les fruits du *Prunus domestica*, dans les premiers stades de leur développement. — Jeunes fruits, étamines, et calyce du *Prunus Padus* (Wakker, Pringsheim's Jahrb. XXIV).

4. **Exoascus Tosquineti** (Westend.) Sadebeck. — Exoascus Alni de Bary (p. p.) — Oud. N. K. A. 2, I, 263. — Exoascus alnitorquus (Tul.) Sadeb. (p. p.) — Sacc. Syll. VIII, 817. — Wint. Kr. Fl. II, 7. — N. K. A. 2, VI, 169. — F. de l'*Alnus glutinosa*.

TAPHRINA.

1. **Taphrina aurea** (P.) Fr. — Sacc. Syll. VIII, 812. — Oud. Fgi Neerl. exs. n° 179. — Erineum aureum P. — T. N. G. XI,

[1]) R. Sadebeck. — Die parasitischen Exoasceen, im Jahrb. der Hamburgischen wissenschaftlichen Anstalten X, 2. — Hamburg 1893. — Eine Monographie.

413; Exoascus Populi Thüm. — N. K. A. 2, VI, 169. — Exoascus aureus (P.) Sadeb. Wint. Kr. Fl. II, 9. — Taphrina populina Fr. — N. K. A. 2, V, 593. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 139. — F. du *Populus nigra* b. *pyramidalis* Garcke.

2. **Taphrina Betulae** (Fuck.) Joh. — Sadeb. Monogr. 80. — Exoascus Betulae Fuck. — Sacc. Syll. VIII, 818. — Wint. Kr. Fl. II, 9. — N. K. A. 2, VI, 169. — F. du *Betula alba*.

3. **Taphrina bullata** (B. Br.) Tul. — Sadeb. Monogr. 68. — Exoascus bull. (B. Br.) Fuck. — Sacc. Syll. VIII, 817. — Wint. Kr. Fl. II, 5. — N. K. A. 2, VI, 169. — F. du *Pirus communis*.

***Taphrina populina** Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 139. — Voir: *T. aurea*.

4. **Taphrina Ulmi** (Fuck.) Joh. — Sadeb. Monog. 84. — Exoascus U. Fuck. — Sacc. Syll. VIII, 819. — Wint. Kr. Fl. II, 11. — N. K. A. 2, VI, 169. — F. de l'*Ulmus campestris*.

†[39] Saccharomycetaceae.

1. Hyalosporae.

SACCHAROMYCES.

a. Espèces rencontrées dans l'écoulement blanc de nos arbres. [1])

1. **Saccharomyces apiculatus** Reess. — Oud. N. K. A. 2, IV, 559. — Sacc. Syll. VIII, 919. — Wint. Kr. Fl. I, 70.

2. **Saccharomyces globosus** Beijer. n. sp.

3. **Saccharomyces Ludwigii** Hansen. — Sacc. Syll. XI, 457.

4. **Saccharomyces minor** Engel. — Sacc. Syll. VIII, 919.

5. **Saccharomyces minutissimus** Beijer. n. sp.

6. **Saccharomyces Mycoderma** Reess. — Oud. N. K. A. 2, IV, 559. — Sacc. Syll. VIII, 917.

7. **Saccharomyces sphaeromyces** Beijer. (= Torula alionum).

b. Espèces rencontrées sur des fruits (raisins, groseilles, poires, pommes) gâtés, cultivés et mûris dans notre pays (outre celles, nommées sous a).

8. **Saccharomyces sphaericus** Nägeli.

9. **Saccharomyces uvarum** Beijer.

c. Espèces originaires de fruits importés.

10. **Saccharomyces passularum** Beijer. Centralbl. für Bakteriologie XVI (1894) p. 51. — Raisins de Corinthe desséchés.

[1]) Je dois les indications suivantes à l'obligeance de Mr. le Prof. Beyerinck à Delft.

11. **Schizosaccharomyces octosporus** Beyer. Centralbl. f. Bakteriologie XVI (1894) p. 49. — Oud. N. K. A. 3, I, 471. — Obtenu de raisins de Corinthe desséchés.

d. Espèces pathogènes.

12. **Saccharomyces albicans** (Robin) Reess. — Oud. N. K. A. 2. IV. 559. — Sacc. Syll. VIII. 918. — Wint. Kr. Fl. I, 72.

13. **Saccharomyces capillitii** Oud. et Pekelharing Ned. Tijds. v. Geneesk. 1885. — Sacc. Syll. VIII. 921.

e. Espèces rencontrées dans des liquides gâtées ou en train de fermentation.

14. **Saccharomyces acetaethylicus** Beyer. — N. K. A. 2, IV, 561. — Liquides sucrés, obtenus par l'infusion des graines de seigle et de maïs germinantes.

15. **Saccharomyces Cerevisiae** Meijen. — Oud. N. K. A. 2, IV, 559. — Sacc. Syll. VIII, 916. — Wint. Kr. Fl. I, 69. — Dans la bière.

16. **Saccharomyces conglomeratus** Reess. — Oud. N. K. A. 2, IV, 559. — Sacc. Syll. VIII, 917. — Wint. Kr. Fl. I, 70. — Dans le vin, à l'état de fermentation commençante.

17. **Saccharomyces ellipsoideus** Reess. — Oud. N. K. A. 2, IV, 559. — Sacc. Syll. VIII, 917. — Wint. Kr. Fl. I, 69. — Dans le moût de vin.

18. **Saccharomyces Pasteurianus** Reess. — N. K. A. 2, IV, 559. — Vin, en état de fermentation.

f. Espèces rouges.

Celles-ci, représentées par *S. glutinis*, *roseus*, *rubellus* et autres, ont besoin d'une étude plus approfondie avant de pouvoir être admises dans notre Aperçu.

†[40] Endomycetaceae.

1. Hyalosporae.

ENDOMYCES.

1. **Endomyces Magnusii** Ludw. — Oud. N. K. A. 3, I, 465. — Sacc. Syll. X. 70. — Rencontré dans l'écoulement blanc des arbres.

†[41] Protomycetaceae.

1. Hyalosporae.

PROTOMYCES.

***Protomyces Bizzozerianus** Sacc. — N. K. A. 2, IV, 238. — Voir: *Doassansia Sagittariae*.

*__Protomyces Calendulae__ Oud. Arch. Néerl. VIII, 384. — Voir: *Entyloma*.

1. __Protomyces fallax__ Sacc. Mich. I, 118; Syll. VII, 320. — Oud. N. K. A. 3, III, 1102. — Aiguilles putrescentes du *Pinus silvestris*.

2. __Protomyces macrosporus__ Ung. — Oud. Rév. II, 61; N. K. A. 2, V, 164 et 632. — Sacc. Syll. VII, 319. — Au dedans des tiges et des pétioles de l'*Aegopodium Podagraria*.

†[42] Monascaceae.

1. Hyalosporae.

THELEBOLUS.

1. __Thelebolus stercorarius__ Tode. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 12. — Arch. Néerl. XV, 365. — Oud. Rév. I, 459. — Bouse de vache desséchée.

III. PHYCOMYCETAE.

A. Zygomycetae.

†[43] Mucoraceae.

a. __Mucoreae.__

HYDROPHORA.

*__Hydrophora stercorea__ Tode. — N. K. A. 2, I, 181. — Voir: *Mucor Mucedo*.

*__Hydrophora fimetaria__ Fr. — Arch. Néerl. II, 48. — Voir: *Mucor*.

MUCOR.

1. __Mucor adventitius__ Oud. N. K. A. 3, II, 719. — Sur gélatine préparée, exposé à l'air du Spanderswoud, près de Bussum.

*__Mucor caninus__ P. — Prodr. Fl. Bat. II, 1, p. 122. — Voir: *Mucor Mucedo*.

2. __Mucor clavatus__ Lk. Spec. I, 92. — Sacc. Syll. VII, 193. — Wint. Kr. Fl. IV, 232. — Oud. Rév. II, 30; Arch. Néerl. II, 48. — Sur une poire pourrie.

3. __Mucor fimetarius__ Lk. Spec. I, 60. — Sacc. Syll. VII, 199. —

Wint. Kr. Fl. IV, 256. — Oud. Rév. II, 31 et Arch. Néerl. II, 18 (*Hydrophora*). — Sur une terre engraissée.

***Mucor fusiger** Lk. — Arch. Néerl. II, 47. — Voir: *Spinellus*.

4. **Mucor geophilus** Oud. Arch. Néerl. 2, VII, 278 et N. K. A. 3, II, 877. — Sur gélatine préparée, trempée d'une bouillie diluée de terre humeuse.

5. **Mucor hygrophilus** Oud. N. K. A. 3, II, 719. — Immergé dans l'eau du réservoir de l'aqueduc à Enschedé.

6. **Mucor macrocarpus** Cda. — T. N. G. XII, 273; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 122. — Voir: *Spinellus*.

7. **Mucor Mucedo** L. Spec. Pl. II, 1655 p. p. Sacc. Syll. VII, 191. — Wint. Kr. Fl. IV, 186. — Oud. Rév. II, 29; T. N. G. XII, 273; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 122 (y compris les *M. caninus* et *stercoreus*); Arch. Néerl. VIII, 394; N. K. A. 2, I, 181 et 2, VI, 363.

8. **Mucor nucum** (Cda) Berl. et de Toni in Sacc. Syll. VII, 199. — Wint. Kr. Fl. IV, 232. — Oud. Rév. II, 30. — Ascophora nucum Cda Ic. Fg. V, 54; Oud. Arch. Néerl. II, 47. — Noix écalées.

9. **Mucor oosporus** Lk. Spec. I, 84. — Sacc. Syll. VII, 203. — Wint. Kr. Fl. IV, 189. — Oud. Rév. II, 31; N. K. A. 2, IV, 253. — Crottin de cheval.

***Mucor phycomyces** Berk. — Arch. Néerl. II, 47. — Voir: *Phycomyces nitens*.

10. **Mucor racemosus** Fres. Beitr. 12. — Sacc. Syll. VII, 192. — Wint Kr. Fl. IV, 192. — Oud. Rév. II, 31; N. K. A. 2, IV, 253 et 2, VI, 363; Arch. Néerl. 2, VII, 280. — Chocolat à lait gâté.

***Mucor Saccardoi** Oud. Arch. Néerl. 2, VII, 278; N. K. A. 3, II, 877. — Voir: *Proabsidia*.

11. **Mucor speciosus** Oud. N. K. A. 3, II, 720. — Tranches de carotte souillés de terre, et déposées dans un aréostat, sous une temp. de 35 à 37° C.

***Mucor stolonifer** Fr. — Arch. Néerl. II, 47. — Voir: *Rhizopus nigricans*.

12. **Mucor subtilissimus** Oud. N. K. A. 3, I, 163. — Crottin de cheval.

13. **Mucor tenuis** Lk Spec. I, 86. — Sacc. Syll. VII, 197. — Wint. Kr. Fl. IV, 191. — Oud. N. K. A. 3, I, 163. — Riz cuit gâté.

HYDROPHORA.

***Hydrophora stercorea** Tode. — Arch. Néerl. VIII, 391. — Voir: *Mucor Mucedo*.

ABSIDIA.

1. **Absidia caerulea** Bainier Bull. Soc. bot. de Fr. XXXVI, p. 184—186. — (1889). — Proabsidia Saccardoi (Oud.) Vuillemin Bull. Soc. Myc. Fr. XIX (1903), p. 12 (Tir. à p.) — Mucor Saccardoi Oud. Arch. Néerl. 2, VII (1902), 278; N. K. A. 3, II, 877. — Gélatine préparée, trempée d'une bouillie diluée de terre humeuse.

CIRCINELLA.

1. **Circinella umbellata** v. Tiegh. et Le Monnier, A. S. N. 5, XVII, 300. — Sacc. Syll. VII, 217. — Wint. Kr. Fl. IV, 216. — Oud. Rév. II, 32; N. K. A. 2, IV, 253. — Crottin de cheval.

SPINELLUS.

1. **Spinellus fusiger** (Lk.) v. Tiegh. A. S. N. 6, I, 67. — Sacc. Syll. VII, 206. — Wint. Kr. Fl. IV, 222. — Oud. Rév. II, 35. — Mucor fusiger Lk. Spec. I, 93. — Oud. Arch. Néerl. II, 47. — Ascophora chalybaea Dozy et Molk. T. N. G. XII, 273 et 282; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 122. — Feuillets des *Inocybe rimosa* et *Mycena pura*.

2. **Spinellus macrocarpus** (Cda) Karst. Myc. Fenn. IV, 73. — Sacc. Syll. VII, 206. — Wint. Kr. Fl. IV, 223. — Oud. Rév. II, 35. — Mucor macrocarpus Cda Ic. Fg. II, 21; T. N. G. XII, 273; Prodr. Fl. II, 4, p. 122. — Feuillets du *Mycena galopus*.

ASCOPHORA.

***Ascophora chalybaea** Dozij et Molk. T. N. G. XII, 273; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 122. — Voir: *Spinellus fusiger*.

***Ascophora fructicola** Cda. — T. N. G. XII, 273; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 122. — Voir: *Rhizopus*.

***Ascophora Mucedo** Cda. — N. K. A. 1, I, 54. — Voir: *Rhizopus nigricans*.

***Ascophora mucum** Cda. — Arch. Néerl. II, 47. — Voir: *Mucor*.

RHIZOPUS.

1. **Rhizopus nigricans** Ehrb. N. A. Ac. L. C. X, I, 198. — Sacc. Syll. VII, 212. — Wint. Kr. Fl. IV, 230. — Oud. Rév. II, 38. — Mucor stolonifer Ehrb. Syly. myc. Berol. 1818, p. 25. — Oud. Arch. Néerl. II, 47. — Ascophora Mucedo Tode. — N. K. A. 1, I, 54. — Colle d'amidon; poires pourries.

2. **Rhizopus fructicola** (Cda.) Berl. et de Toni in Sacc. Syll. VII, 214. — Ascophora fructicola Cda. Ic. Fg. II, 20. — Wint. Kr. Fl. IV, 189; T. N. G. XII, 273. — Fruits des *Ribes rubrum* et *Prunus domestica*.

PHYCOMYCES.

1. **Phycomyces nitens** (Agardh) Kze in Kze u. Schm. Myc. Hfte II, 113. — Sacc. Syll. VII, 205. Wint. Kr. Fl. IV, 218. — Oud. Rév. II, 33. — Mucor Phycomyces Berk. Outl. 28; Oud. Arch. Néerl. II, 47. — Restes d'une pâte de roucou à l'huile, longtemps conservé.

SPORODINIA.

1. **Sporodinia Aspergillus** (Scop.) Schröt. Pilze Schles. I, 209. — Sacc. Syll. VII, 207; Oud. Rév. II, 36. — Sporod. grandis Lk. Spec. I, 94; Wint. Kr. Fl. IV, 224. — Sporod. dichotoma Cda Ic. Fg. I, 22; Arch. Néerl. II, 49. — Nematogonium simplex Bon. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 131. — Plusieurs champignons charnus en train de décomposition.

***Sporodinia dichotoma** Cda. — Arch. Néerl. II, 49. — Voir: *Sporodinia Aspergillus*.

THAMNIDIUM.

1. **Thamnidium elegans** Lk. Spec. I, 95. — Sacc. Syll. VII, 211. — Wint. Kr. Fl. IV, 241. — Oud. Rév. II, 12 et N. K. A. 2, IV, 253. — Crottin de cheval et blanc d'oeuf, en train de décomposition.

CHAETOSTYLUM.

1. **Chaetostylum Fresenii** (Fres.) v. Tiegh et Le Monn. A. S. N. 5, XVII, 328. — Sacc. Syll. VII, 208. — Wint. Kr. Fl. IV, 247. — Oud. Rév. II, 13 et N. K. A. 2, IV, 253. — Crottin de cheval.

PILAIRA.

1. **Pilaira anomala** (Cesati) Schröt. Pilze Schles. I, 211. — Sacc. Syll. VII, 188. — Wint. Kr. Fl. IV, 255. — Oud. Rév. II, 44. — Pilaira Cesatii v. Tiegh. — A. S. N. 6, I, 51; N. K. A. 2, IV, 254 et 2, VI, 363; Arch. Néerl. 2, VII, 280. — Crottin de cheval.

***Pilaira Cesatii** v. Tiegh. — N. K. A. 2-4, IV, 254. — Voir: *P. anomala*.

PILOBOLUS.

1. **Pilobolus crystallinus** (Wigg.) Tode Schr. natf. Fr. Berl. V, 16. — Sacc. Syll. VII, 185. — Wint. Kr. Fl. IV, 260.

Oud. Rév. II, 46; N. K. A. 2, VI, 363; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 121. — Crottin de cheval et bouse de vache.

2. **Pilobolus Kleinii** v. Tiegh. A. S. N. 6, IV, 262. — Sacc. Syll. VII, 185. — Wint. Kr. Fl. IV, 262. — Oud. Rév. II, 47; N. K. A. 2, IV, 254 et 2, VI, 363. — Crottin de cheval.

b. Mortierelleae.

MORTIERELLA.

1. **Mortierella humicola** Oud. Arch. Néerl. 2, VII, 276 et N. K. A. 3, II, 875. — Gélatine préparée, trempée d'une bouillie de terre humeuse.

2. **Mortierella isabellina** Oud. Arch. Néerl. 2, VII, 276 et N. K. A. 3, II, 875. — Gélatine préparée, trempée d'une bouillie de terre humeuse.

3. **Mortierella pusilla** Oud. Arch. Néerl. 2, VII, 277 et N. K. A. 3, II, 876. — Gélatine préparée trempée d'une bouillie dilnée de terre humeuse.

4. **Mortierella subtilissima** Oud. Arch. Néerl. 2, VII, 277 et N. K. A. 3, II, 876. — Sur gélatine préparée, trempée d'une bouillie dilnée de terre humeuse.

c. Chaetocladieae.

CHAETOCLADIUM.

1. **Chaetocladium Jonesii** Fres. Beitr. 97. — Sacc. Syll. VII, 220. — Wint. Kr. Fl. I, IV, 285. — Oud. Rév. II, 48 et N. K. A. 2, IV, 253. — Crottin de cheval.

d. Piptocephalideae.

PIPTOCEPHALIS.

1. **Piptocephalis Freseniana** de Bary Abh. Senckb. nat. Ges. V, 356. — Sacc. Syll. VII, 226. — Wint. Kr. Fl. IV, 289. — Oud. Rév. II, 51 et N. K. A. 2, IV, 253. — Crottin de cheval.

2. **Piptocephalis fusispora** v. Tiegh. A. S. N. 6, I, 146. — Sacc. Syll. VII, 226. — Wint. Kr. Fl. IV, 293. — Oud. Rév. II, 52 et N. K. A. 2, IV, 253. — Crottin de cheval.

3. **Piptocephalis sphaerospora** v. Tiegh. A. S. N. 6, I, 150. — Sacc. Syll. VII, 227. — Wint. Kr. Fl. IV, 291. — Oud. Rév. II, 51 et N. K. A. 2, IV, 253. — Crottin de cheval.

SYNCEPHALIS.

1. **Syncephalis depressa** v. Tiegh. et Le Monn. A. S. N. 5,

XVII, 375. — Sacc. Syll. VII, 230. — Wint. Kr. Fl. IV, 302. — Oud. Rév. II, 55 et N. K. A. 2, IV, 254. — Vit en parasite sur les Mucorinées qui habitent le crottin de cheval.

2. **Syncephalis nodosa** v. Tiegh. A. S. N. 6, 1, 131. — Sacc. Syll. VII, 231. — Wint. Kr. Fl. IV, 303. — Oud. Rév. II, 55 et N. K. A. 2, IV, 254. — Vit en parasite sur les Mucorinées qui habitent le crottin de cheval.

†[41] Entomophthoraceae.

EMPUSA.

1. **Empusa Muscae** Cohn Hedw. I (1855) p. 61 et N. A. Ac. L. C. N. C. XXV, pars 1, p. 317. — Sacc. Syll. VII, 281. — Oud. Rév. II, 24 et N. K. A. 2, IV, 254. — Entomophthora Muscae Wint. Kr. Fl. I, 76. — Parasitant sur la *Musca domestica*.

B. Oomycetae.

†[45] Chytridiaceae.

a. Synchytreae.

SYNCHYTRIUM.

1. **Synchytrium Anemones** (D. C.) Woronin Bot. Zeit. 1868, p. 100. — Sacc. Syll. VII, 288. — Wint. Kr. Fl. IV, 60. — Oud. Rév. II, 59 et N. K. A. 2, II, 183. — Sphaeronema Anemones Lib. Cr. Ard. n° 167; Prodr. Fl. Bat. II, 4 p. 89. — Dans les feuilles de l'*Anemone nemorosa*.

2. **Synchytrium aureum** Schröt. in Cohn, Beitr. z. Biol. I (1875) p. 36 et 40. — Sacc. Syll. VII, 290. — Wint. Kr. Fl. IV, 56. — Oud. N. K. A. 2, II, 167 et 3, II, 879. — Dans les feuilles de l'*Hypericum perforatum*.

3. **Synchytrium Succisae** de Bary et Woronin Ber. natf. Ges. Freib. 1863 (III), 25. — Sacc. Syll. VII, 291. — Wint. Kr. Fl. IV, 53. — N. K. A. 3, I, 238 et 161. — Dans les feuilles du *Succisa pratensis*.

4. **Synchytrium Taraxaci** de Bary et Woronin Ber. naturf. Ges. Freib. 1863 (III), 25. — Sacc. Syll. VII, 291. — Wint. Kr. Fl. IV, 19. — Oud. Rév. II, 59; N. K. A. 2, II, 102 et 2, VI, 365; Arch. Néerl. 2, VI, 365; Oud. Fgi Néerl. exs. n° 71. — Dans les feuilles du *Taraxacum officinale*.

RHIZOPHIDIUM.

1. **Rhizophidium ampullaceum** (Al. Br.) Alf. Fischer in Wint. Kr. Fl. IV, 101. — Oud. Rév. II, 57. — Sphaerostylidium ampullaceum Sacc. Syll. VII, 309. — Chytridium ampullaceum Al. Br. Berl. Akad. 1855, p. 66; N. K. A. I, V, 279. — Filaments d'un *Oedogonium*.

2. **Rhizophidium minus** (Suringar) Oud. Rév. II, 57. — Chytridium minus Suring. N. K. A. I, V, 275. — Filaments du *Conferva rhyppophila* et d'autres Algues.

c. Cladochytricae.

CLADOCHYTRIUM.

1. **Cladochytrium Alismatis** Büsgen, in Cohn's Biol. Beitr. IV, 280. — Physoderma maculare Wallr. Fl. Cr. 192. — Sacc. Syll. VII, 317. — Oud. Rév. II, 60 et N. K. A. 2, IV, 239. — Dans les feuilles des *Alisma ranunculoides* et *Plantago*.

2. **Cladochytrium graminis** Büsgen in Cohn's Biol. Beitr. IV, 179. — Fisch. in Wint. Kr. Fl. IV, 139. — Oud. N. K. A. 3, I, 164. — Dans les feuilles languissantes du *Secale cereale*.

***Physoderma maculare** Wallr. — N. K. A. 2, IV, 239. — Voir: *Cladochytrium Alismatis*.

†[46] Saprolegniaceae.

a. Saprolegnieae.

ACHLYA.

1. **Achlya prolifera** Nees N. A. Ac. L. C. N. C. XI (1823). — Sacc. Syll. VII, 274. — Wint. Kr. Fl. IV, 353. — Oud. Rév. II, 163. — Débris pourrissants d'un *Batrachium*.

b. Pythieae.

PYTHIUM.

1. **Pythium de Baryanum** Hesse, Broch. à part. 31. — Sacc. Syll. VII, 271. — Wint. Kr. Fl. IV, 103. — Oud Rév. II, 4. — Dans les cotylédons du *Lepidium sativum*.

†[47] Cystopodaceae.

CYSTOPUS.

1. **Cystopus candidus** (P.) Lév. A. S. N. 3, VIII, 371. — Sacc. Syll. VII, 234. — Wint. Kr. Fl. IV, 418. — Oud. Rév. II, 9; Arch. Néerl. VIII, 382; N. K. A. 2, I, 91 et 177; 2, II, 101; 2, V, 595; 2, VI, 365; Herb. N. Pl. n° 509; Fgi Néerl. exs. n° 65, 66 et 67. — Caeoma candidum Nees Syst. I, 15; T. N. G. XI, 109 (p. p.). — Uredo candida P. Syn. 223; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 173 a. Cruciferarum Rab. — Parties vertes des *Alyssum calycinum*, *Brassica oleracea*, *Cakile maritima*, *Capsella Bursa pastoris* (Oud. Fgi Néerl. exs. n° 65), *Cardamine hirsuta* et *pratensis*, *Cochlearia anglica* (Oud. Fgi Néerl. exs. n° 67 et Rab. F. E. n° 1465), *Diplotaxis tenuifolia*, *Senebiera Coronopus* (Oud. Fgi Néerl. exs. n° 66), *Sisymbrium officinale* et *Sophia*, *Teesdalia nudicaulis*, *Thlaspi calaminare*.

***Cystopus cubicus** de Bary. — N. K. A. 2, V, 595; Arch. Néerl. II, 39. — Voir: *C. Tragopogonis*.

2. **Cystopus Lepigoni** de Bary in Rab. F. E. n° 183 et A. S. N. 4, XX, 132. — Sacc. Syll. VII, 236. — Wint. Kr. Fl. IV, 420. — Oud. Rév. II, 10 et Arch. Néerl. II, 39. — Caeoma candidum Nees in T. N. G. XI, 109 p. p. — Feuilles des *Spergularia marginata* et *salina* (Lep. marg. et medium).

3. **Cystopus Portulacae** (Dekin et Passy) Lév. A. S. N. 3, VIII, 371. — Sacc. Syll. VII, 235. — Wint. Kr. Fl. IV, 420. — Oud. Rév. II, 10; N. K. A. 2, V, 595. — Caeoma candidum β grossum T. N. G. XI, 109. — Uredo Portulacae Dek. et Passy Florule de Brux. a° 1814; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 173. — Feuilles des *Portulaca oleracea* et *sativa* (Oud. Fgi Néerl. exs. n° 68).

***Cystopus spinulosus** de Bary. — Arch. Néerl. II, 39. — Voir: *C. Tragopogonis*.

4. **Cystopus Tragopogonis** (P.) Schröt. Pilze Schles. I, 234. — Sacc. Syll. VII, 234. — Wint. Kr. Fl. IV, 421. — Oud. Rév. II, 10; N. K. A. 2, VI, 365. — Caeoma candidum Nees in T. N. G. XI, 109 (p. p.). — Uredo candida P. b. Compositarum Rab. Kr. Fl. 13; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 173. — Cystopus cubicus Lév. A. S. N. 3, VIII, 371; Arch. Néerl. II, 39; N. K. A. 2, V, 595. — Cystopus spinulosus de Bary in Rab. F. E. n° 179; Oud. Arch. Néerl. II, 39; id. N. K. A. 2, I, 91. — Feuilles des Carduus crispus, Cirsium arvense (Oud. Fgi Néerl. exs. n° 69 et Herb. N. Pl. n° 118; Scorzonera hispanica (Oud. Fgi Néerl. exs. n° 70, Sonchus arvensis, Tragopogon porrifolius, Trag. pratensis.

†[48] Peronosporaceae.

PHYTOPHTHORA.

1. **Phytophthora infestans** (Mont.) de Bary Journ. of Bot. 1876, p. 105—126 et 149—154. — Sacc. Syll. VII, 237. — Wint. Kr. Fl. IV, 413. — Oud. Rév. II, 5; N. K. A. 2, VI. 365. — Peronospora infestans Casp. in Rab. H. M. Ed. I, n° 1879; Oud. Arch. Néerl. II, (1867), 41; N. Kr. A. 2, I, 91. — Feuilles du *Solanum tuberosum* (Oud. Fgi Neerl. exs. n° 152 et Herb. N. Pl. n° 440).

PLASMOPARA.

1. **Plasmopara densa** (Rab.) Schröt. Pilze Schles. I, 239. — Sacc. Syll. VII, 243. — Wint. Kr. Fl. IV, 431. — Oud. Rév. II, 13; N. K. A. 2, VI, 365. — Peronospora densa Rab. H. M. I, n° 157; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 133; Oud. Arch. Néerl. VIII, 389; id. N. K. A. 2, I, 179; id. Fgi Neerl. exs. n°. 64. — Botrytis parasitica Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 130 p. p. — Feuilles des *Euphrasia officinalis* (Oud. Fgi Neerl. exs. n° 64; *Odontites vulgaris* (Oud. ibid. n° 270); *Alectorolephus major*.

2. **Plasmopara nivea** (Unger) Schröt. Pilze Schles. I, 237. — Sacc. Syll. VII, 240. — Wint. Kr. Fl. IV, 429. — Oud. Rév. II, 11; N. K. A. 2, VI, 365. — Peronospora nivea Ung. Bot. Zeit. 1847, p. 314 p. p. — Arch. Néerl. VIII, 389; N. K. A. 2, I, 91 et 180; 2, II, 102 et 184; — Peron. macrospora Ung. Bot. Zeit. 1847 p. 315; Oud. Arch. Néerl. II, 41. — Feuilles des *Aegopodium Podagraria*, *Angelica silvestris*, *Anthriscus silvestris* et *vulgaris*, *Conium maculatum* (Oud. Fgi Neerl. exs. n° 271), *Foeniculum capillare*, *Heracleum Sphondylium* (Oud. Fgi Neerl. exs. n° 151), *Pastinaca sativa* (Oud. ibid. n° 150) et Herb. N. Pl. n° 395), *Petroselinum sativum*, *Thysselinum palustre*.

3. **Plasmopara pygmaea** (Ung.) Schröt. Pilze Schles. I, 239. — Wint. Kr. Fl. IV, 480. — Oud. Rév. II, 12; N. K. A. 2, V, 471 et 2, VI, 365. — Feuilles de *Anemone nemorosa*.

4. **Plasmopara viticola** (Berk. et Curt). Berl. et de Toni in Sacc. Syll. VII, 239. — Wint. Kr. Fl. IV, 435. — Oud. N. K. A. 3, I, 404 et Rév. II (11). — Feuilles du *Vitis vinifera*.

BREMIA.

1. **Bremia Lactucae** Regel Bot. Zeit. 1843, p. 666. — Sacc. Syll. VII, 244. — Wint. Kr. Fl. IV, 440. — Oud. Rév. II, 14.

Peronospora ganglioniformis (Berk.) Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 133. - Peronosp. gangliformis de Bary A. S. N. 4, XX, 108; Arch. Néerl. VIII, 390; N. K. A. 2, I, 180 et 2, VI, 364. — Botrytis farinosa T. N. G. XI, 103. — F. des *Centaurea nigricans*, *Lactuca muralis* et *sativa*, *Lappa minor*, *Lapsana communis*, *Senecio vulgaris*, *Sonchus asper* et *oleraceus*, *Taraxacum officinale*, *Rhodanthe Manglesii*.

PERONOSPORA.

1. **Peronospora Alsinearum** Casp. Monats. Berl. Akad. 1855, p. 330. — Sacc. Syll. VII, 246. — Wint. Kr. Fl. 2, IV, 452. — Oud. Rév. II, 16; N. K. A. 2, II, 102 et 2, VI, 365; Oud. Fgi Neerl. exs. n° 62. — Feuilles des *Cerastium semidecandrum*, *triviale* et *viscosum*, *Stellaria media*.

2. **Peronospora alta** Fuck Fgi Rhen. n° 39 et Symb. 71. — Sacc. Syll. VII, 262. — Wint. Kr. Fl. IV, 483. — N. K. A. 2, VI. 364 et 3, II, 202. — Feuilles du *Plantago major*.

3. **Peronospora arborescens** (Berk.) de Bary A. S. N. 4, XX, 119. — Sacc. Syll. VII, 251. — Wint. Kr. Fl. IV, 463. — Oud. Rév. II, 18; N. K. A. 2, III, 155 et 2, VI, 364. — Feuilles des *Papaver dubium* (Oud Fgi Neerl. exs. n° 149) et *somniferum*.

4. **Peronospora calotheca** de Bary in Rab. H. M. II, n° 673 et A. S. N. 4, XX, III. — Sacc. Syll. VII, 215. — Wint. Kr. Fl. IV, 150. — Oud. Rév. II, 16. — N. K. A. 2, VI. 365. — Botrytis farinosa Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 130. — Feuilles des *Asperula odorata*, *Galium Aparine* et *Rubia tinctorum*.

5. **Peronospora conglomerata** Fuck. in Fgi Rhen. n° 25 et Symb. 68. — Sacc. Syll. VII, 252. — Wint. Kr. Fl. IV, 475. — Oud. Rév. II. 20; N. K. A. 2, IV, 252 et 2, VI, 364. — Feuilles du *Geranium molle*.

6. **Peronospora Corydalis** de Bary A. S. N. 4, XX, 111. — Sacc. Syll. VII, 250. — Wint. Kr. Fl. IV, 478. — Oud. Rév. II, 21; Arch. Néerl., VIII, 390; N. K. A. 2, VI. 364. — Feuilles du *Corydalis solida*.

***Peronospora densa** de Bary. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 133; N. K. A. 2, I. 179. — Voir: *Plasmopara*.

7. **Peronospora effusa** (Grev.) Rab. H. M. I, n° 1880. — Sacc. Syll. VII, 256. — Wint. Kr. Fl. IV, 467. — Oud. Rév. II, 18. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 133; N. K. A. 2, VI, 361. — Botrytis parasitica T. N. G. XI, 103 et Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 130 p. p. — Botrytis effusa T. N. G. XI, 403 p. p. — Feuilles des *Alhersia Blitum*, *Atriplex hastata* et *latifolia*, *Blitum glaucum*, *Blitum rubrum*, *Chenopodium album*, *Schoberia maritima*, *Spinacia oleracea*.

8. **Peronospora Ficariae** Tul. (Ctes Rend. 26 Janv. 1854) Sacc. Syll. VII, 251. — Wint. Kr. Fl. IV, 172. — N. K. A. 3, II, 201 et 2, VI, 364. — Feuilles du *Ficaria verna* et des *Ranunculus acer*, *bulbosus* et *repens*.

***Peronospora gangliformis** de Bary. Arch. Néerl. VIII, 390; N. K. A. 2, I, 180. — Voir: *Bremia Lactucae*.

***Peronospora ganglioniformis** Berk. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 138. — Voir: *Bremia Lactucae*.

9. **Peronospora grisea** (Ung.) Bot. Zeit. 1847, p. 315. — Sacc. Syll. VII, 255. — Wint. Kr. Fl. IV, 470. — Oud. Rév. II, 19 et Arch. Néerl. VIII, 390; N. K. A. 2, I, 180 et 2, VI, 364. — Feuilles du *Veronica Beccabunga*.

***Peronospora infestans** Mont. N. K. A. 2, I, 91; Arch. Néerl. II, 41. — Voir: *Phytophthora*.

10. **Peronospora Lamii** Al. Br. in Rab. H. M. II, n° 325. — Sacc. Syll. VII, 256. — Wint. Kr. Fl. IV, 462. — Oud. Rév. II, 17; N. K. A. 2, II, 103 et 2, VI, 365; id. Fgi Néerl. exs. n° 63. — Feuilles du *Lamium purpureum*.

***Peronospora macrospora** Casp. — Arch. Néerl. II, 11. — Voir: *Plasmopara nivea*.

***Peronospora nivea** Ung. — Arch. Néerl. VIII, 389; N. K. A. 2, I, 91; 2, II, 102 et 184. — Voir: *Plasmopara*.

11. **Peronospora parasitica** (P.) Ctes Rend. 1854, p. 1103. — Sacc. Syll. VII, 249. — Wint. Kr. Fl. IV, 476. — Oud. Rév. II, 20; Arch Néerl. VIII, 390; N. K. A. 2, I, 180; 2, IV, 516; 2, V, 165; N. K. A. 2, VI, 363. — Botrytis parasitica T. N. G. XI, 403; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 130. — Feuilles des *Alliaria officinalis*, *Brassica oleracea*, *Capsella Bursa pastoris*, *Cardamine pratensis*, *Cheiranthus Cheiri*, *Erysimum cheiranthoides*, *Matthiola annua* et *incana*, *Sisymbrium Sophia*, *Suaeda maritima*.

12. **Peronospora leptosperma** de Bary A. S. N. 4, XX, 124. — Sacc. Syll. VII, 254. — Wint. Kr. Fl. IV, 455. — N. K. A. 2, VI, 364. — Tiges et feuilles du *Tanacetum vulgare*.

13. **Peronospora Myosotidis** de Bary in Rab. F. E. n° 572 et A. S. N. 4, XX, 112. — Sacc. Syll. VII, 245. — Wint. Kr. Fl. IV, 453. — N. K. A. 2, VI, 364. — Feuilles du *Symphytum officinale*.

14. **Peronospora Polygoni** Thüm. Fgi austr. n° 742. — Wint. Kr. Fl. IV, 481. — Per. effusa γ. Polygoni Sacc. Syll. VII, 257. — Oud. N. K. A. 3, III, 1103.

15. **Peronospora Potentillae** de Bary A. S. N. 4, XX, 124. — Sacc. Syll. VII, 253. — Wint. Kr. Fl. IV, 473. — Oud. N. K. A. 3, III, 1103. — Feuilles d'une espèce de *Rubus*.

16. **Peronospora Radii** de Bary. — Rab. F. E. n° 573 et A. S. N. 4, XX, 121. — Sacc. Syll. VII, 254. — Wint. Kr. Fl. IV, 458. — Oud. Rév. II, 17. Botrytis effusa T. N. G. XI, 403 (p. p.) — Botrytis violacea Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 131. — Fleurs ligulées de l'*Anthemis Cotula*.

17. **Peronospora Schleideni** Unger Bot. Zeit. 1847, p. 315. — Sacc. Syll. VII, 257. — Wint. Kr. Fl. IV, 474. — Oud. Rév. II, 19 et N. K. A. 2, VI, 27. — Feuilles des *Allium Cepa* et *fistulosum*.

18. **Peronospora sordida** Berk. A. N. H. 3, VII, 449. — Sacc. Syll. VII, 262. — Wint. Kr. Fl. IV, 481. — Oud, Rév. II, 19 et Arch. Néerl. VIII, 390. — Feuilles du *Scrophularia Ehrharti*.

19. **Peronospora Trifoliorum** de Bary A. S. N. 4, XX, 117. — Sacc. Syll. VII, 252. — Wint. Kr. Fl. IV, 457. — Oud. Rév. II, 17; N. K. A. 2, III, 155 et N. K. A. 2, VI, 364. — Feuilles du *Lotus uliginosus*.

20. **Peronospora Urticae** (Lib.) de Bary A. S. N. 4, XX, 116. — Sacc. Syll. VII, 257. — Wint. Kr. Fl. IV, 473. — N. K. A. 2, VI, 364. — Feuilles de l'*Urtica dioica*.

21. **Peronospora Viciae** (Berk.) de Bary A. S. N. 4, XX, 112. — Sacc. Syll. VII, 245. — Wint. Kr. Fl. IV, 454. — Oud. Rév. II, 16; Arch. Néerl. II, 44; N. K. A. 2, VI, 361. — Feuilles des *Pisum sativum* et *Vicia Faba*.

IV. MYXOMYCETAE.

†[49] Myxomycetaceae.

A. Amaurosporae.

a. Physareae.

BADHAMIA.

***Badhamia carnea** N. K. A. 2, I, 166; Arch. Néerl. VIII, 355. — A supprimer.

***Badhamia inaurata** Currey. — N. K. A. 2, III, 149; Arch. Néerl. XV, 376. — Voir: *Badh. nitens*.

1. **Badhamia nitens** Berk. — Lister Mycet. 32. — N. K. A. 2, III, 149. — Badh. inaurata Curr. — N. K. A. 2, III, 149; Arch. Néerl. XV, 376.

2. **Badhamia utricularis** (Bull.) Berk. — Lister Mycet. 31. — Leocarpus utric. (Bull.) Bon. N. K. A. 1, V, 348; Arch. Néerl. XV, 375. — Sacc. Syll. VII, 33.

*CARCERINA.

***Carcerina valvata** Fr. — N. K. A. 1, V, 348; Arch. Néerl. VIII, 354. — Voir: *Physarum bivalve.*

*DIDERMA.

***Diderma difforme** Sommerfield. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 18. — Sacc. Syll. VII, 371. — Voir: *Didymium.*

***Diderma globosum** Fr. — N. K. A. 1, V, 347; 2, II, 166; Arch. Néerl. XV, 382. — Voir: *Chondrioderma.*

***Diderma leiocoides** Fr. — N. K. A. 1, V, 347; Arch. Néerl. VIII, 353. — Sacc. Syll. VII, 365. — Voir: *Didymium difforme.*

***Diderma spumarioides** (Fr.) Rostaf. — T. N. G. XI, 399; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 18. — Voir: *Chondrioderma.*

***Diderma testaceum** P. — N. K. A. 1, V, 347. — Voir: *Chondrioderma testaceum.*

***Diderma testaceum** Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 18. — Voir: *Chondrioderma globosum.*

***Diderma vernicosum** P. — T. N. G. XI, 399. — Voir: *Leocarpus vernicosus.*

PHYSARUM.

***Physarum albipes** Lk. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 19. — Voir: *Ph. nutans.*

***Physarum aureum** P. — N. K. A. 1, V, 348; Arch. Néerl. VIII, 355. — Voir: *Ph. viride.*

1. **Physarum bivalve** P. — Lister Mycet. 57. — Phys. sinuosum Weinm. — Sacc. Syll. VII, 347. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 19; N. K. A. 3, I, 136; Arch. Néerl. XV, 577.

***Physarum bryophilum** Fr. — T. N. G. XI, 399. — Prod. Fl. Bat. II, 4, p. 19. — Voir: *Lamproderma physaroides.*

2. **Physarum cinereum** (Batsch) P. — Lister Mycet. 55. — Sacc. Syll. VII, 344. — N. K. A. 2, IV, 561; 3, I, 136; Arch. Néerl. XV, 376. — Didymium cin. (Batsch) Fr. — T. N. G. XI, 399; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 18.

3. **Physarum conglomeratum** Rostaf. — Lister Mycet. 58. — Sacc. Syll. VII, 342. — Oud. in N. K. A. 3, II, 1104.

*__Physarum gyrosum__ Rostaf. — Arch. Néerl. XV, 376. — Voir: *Fuligo septica* (L.) Gmelin.

*__Physarum leucophaeum__ Fr. — N. K. A. 2, VI, 65; Sacc. Syll. VII, 345. — Voir: *Phys. nutans.*

*__Physarum muscorum__ (A. S.) Berlese. — Sacc. Syll. VII, 346. — Voir: *Fuligo septica.*

4. __Physarum nutans__ P. — Lister Mycet. 50. — T. N. G. XI, 399; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 19; N. K. A. 1, V, 348; Arch. Néerl. VIII, 351. — Tilmadoche nutans Rostaf. — Sacc. Syll. VII, 359. — Arch. Néerl. XV, 380. — Phys. albipes Lk. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 19.

5. __Physarum nutans__ P. γ __leucophaeum__ Lister Mycet. 51. — N. K. A. 2, VI, 65. — Ph. leucoph. Fr. — N. K. A. 2, VI, 65.

*__Physarum sinuosum__ (Weinm.) Fr. — Sacc. Syll. VII, 347. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 19; Arch. Néerl. XV, 377. — Voir: *Phys. bivalve* P.

6. __Physarum virescens__ Ditmar. — Lister Mycet. 59. — Didymium lobatum Nees. — N. K. A. 2, I, 314. — Didymium sinapinum Cooke. — Arch. Néerl. XV, 388.

7. __Physarum viride__ P. — Lister Mycet. 46. — Phys. aureum P. — N. K. A. 1, V, 348. — Tilmadoche mutabilis Rostaf. — Arch. Néerl. XV, 380. — Tilm. viridis (Gmel.) Sacc. Syll. VII, 361.

AETHALIUM.

*__Aethalium septicum__ Fr. — T. N. G. XI, 398. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 24. — Voir: *Fuligo sept.*

RETICULARIA.

*__Reticularia muscorum__ Fr. — T. N. G. XI, 398. — Voir: *Physarum.*

FULIGO.

1. __Fuligo septica__ (L.) Gmelin. — Lister Mycet. 66. — N. K. A. 3, I, 136. — Aethalium septicum Fr. — T. N. G. XI, 398; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 24. — Reticularia muscorum Fr. — T. N. G. XI, 398; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 24. — Phys. gyrosum Rostaf. — Arch. Néerl. XV, 376. — Fuligo varians (L.) Gmelin. — Arch. Néerl. XV, 377. — Phys. muscorum (A. S.) Berl. in Sacc. Syll. VII, 346.

CRATERIUM.

*__Craterium Friesii__ Rostaf. — Arch. Néerl. XV, 378. — Voir: *Crat. pedunculatum.*

1. __Craterium leucocephalum__ (Hoffmann) Ditmar. — Lister Mycet. 72. — Sacc. Syll. VII, 356. — N. K. A. I, V, 348. — Arch. Néerl. VIII, 355 et XV, 378. — Crat. leucostictum Fr. — T. N. G. XII, 272; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 20.

*__Craterium leucostictum__ Fr. — T. N. G. XII, 272; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 20. — Voir: *Crat. leucocephalum.*

*__Craterium minutum__ (Leers) Fr. — Sacc. Syll. VII, 356. — T. N. G. XI, 399; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 19; Arch. Néerl. XV, 378, N. K. A. 3, I, 136.

*__Craterium minutum β aureum__ Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 20. — Voir: *Crat. pedunculatum.*

*__Craterium nutans__ Fr. — Voir: *Physarum.*

2. __Craterium pedunculatum__ Trentepohl. — Lister Mycet. 70. — T. N. G. XI, 399; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 19. — Crat. minutum (Leers) T. N. G. XI, 399. — Crat. Friesii Rostaf. — Crat. vulgare Ditm. — Crat. minutum (Leers) Fr. — Arch. Néerl. XV, 378. — Crat. minutum β aureum Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 20.

*__Craterium vagans__ Sommerf. — Voir: *Fuligo septica.*

*__Craterium vulgare__ Ditm. — Arch. Néerl. XV, 378. — Voir: *Crat. pedunculatum.*

TILMADOCHE.

*__Tilmadoche nutans__ (P.) Rostaf. Mon. 127. — Sacc. Syll. VII, 359. — Arch. Néerl. XV, 380. — Voir: *Physarum.*

LEOCARPUS.

*__Leocarpus fragilis__ Rostaf. — Sacc. Syll. VII, 358. — Arch. Néerl. XV, 379; N. K. A. 3, I, 136. — Voir: *Leoc. vernicosus.*

*__Leocarpus stipitatus__ (Bull.) Bon. — N. K. A. I, V, 17; Arch. Néerl. XV, 379. — Voir: *L. vernicosus.*

*__Leocarpus utricularis__ (Bull.) Bon. — N. K. A. I, V, 348; Arch. Néerl. VIII, 354. — Voir: *Badhamia.*

1. __Leocarpus vernicosus__ (P.) Lister Mycet. 75. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 17; Fl. Bat. tab. 210. — Leoc. fragilis (Dicks). Rostaf. — Arch. Néerl. XV, 379; N. K. A. 3, I, 136; Sacc. Syll. VII, 358. — Leoc. stipitatus (Bull.) Bon. — N. K. A. I, V, 347;

Arch. Néerl. VIII, 354. — Diderma vernicosum P. — T. N. G. XI, 399; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 17; N. K. A. 2, V, 532.

CHONDRIODERMA.

1. **Chondrioderma calcareum** (Lk.) Rostaf. — Lister Mycet. 87. — Arch. Néerl. XV, 381. — Sacc. Syll. VII, 370.

***Chondrioderma difforme** Rostaf. — Sacc. Syll. VII, 371. — Arch. Néerl. XV, 381. — Voir: *Didymium.*

2. **Chondrioderma globosum** (P.) Rostaf. — Lister Mycet. 78. — Syll. VII, 370. — Arch. Néerl. XV, 382. — Diderma glob. N. K. A. I, V, 347; 2, I, 166. — Did. testaceum Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 18 (non Rostaf.).

3. **Chondrioderma spumarioides** (Fr.) Rostaf. — Lister Mycet. 76. — Oud. N. K. A. 3, III, 1104. — Sacc. Syll. VII, 367. — Arch. Néerl. XV, 380. — Diderma spum. Fr. — T. N. G. XI, 399; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 18.

4. **Chondrioderma testaceum** (Schrad.) Rostaf. — Lister Mycet. 78. — Sacc. Syll. VII, 369. — Arch. Néerl. XV, 381. — Diderma test. P. (non Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 18, quod. Chondr. globosum (P.) Rostaf. — N. K. A. 1, V, 347.)

DIACHAEA.

1. **Diachaea elegans** Fr. — Lister Mycet. 91. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 20; N. K. A. 1, V, 349. — D. leucopoda (Bull.) Rostaf. — Arch. Néerl. XV, 384.

***Diachaea leucopoda** (Bull.) Rostaf. — Sacc. Syll. VII, 387. — Arch. Néerl. XV, 384. — Voir: *D. elegans.*

b. Didymeae.

DIDYMIUM.

***Didymium cinereum** Fr. — T. N. G. XI, 399; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 18. — Voir: *Physarum.*

1. **Didymium difforme** Duby. — Lister Mycet. 94. — Chondrioderma liceoides Rost. et difforme Rost. — Sacc. Syll. VII, 365 et 371. — Diderma difforme Sommerf. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 18. — Diderma liceoides Fr. — N. K. A. 1, V, 347. — Chondrioderma diff. Rostaf. et Ch. calcareum Rostaf. — Arch. Néerl. XV, 381.

2. **Didymium effusum** (Lk.) Fr. — Lister Mycet. 99. — Sacc. Syll. VII, 378. — N. K. A. 2, I, 314; 3, I, 137; Arch. Néerl.

XV, 384. — Didym. herbarum Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 18. — Didym. praecox de Bary. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 19. — Didym. squamulosum (A. S.) Fr. — N. K. A. 2, I, 166; 2, IV, 561. — Didym. squam. (A. S.) Fr. et Didym. praecox de Bary. — Arch. Néerl. XV, 383.

3. **Didymium farinaceum** Schrad. — Lister Mycet. 97. — Sacc. Syll. VII, 381. — T. N. G. XI, 399. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 18; Arch. Néerl. XV, 382; N. K. A. 3, I, 137. — Didym. hemisphaericum (Bull.) Fr. — N. K. A. 1, V, 348.

***Didymium hemisphaericum** (Bull.) Fr. — N. K. A. 1, V, 348; Arch. Néerl. VIII, 354. — Voir: *Didym. farinaceum.*

***Didymium herbarum** Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 18. — Voir: Didym. effusum (Lk.) Fr.

***Didymium Iridis** (Ditmar) Fr. — N. K. A. 1, V, 348; Arch. Néerl. VIII, 354. — Voir: *Didym nigripes.*

***Didymium lobatum** Nees. — N. K. A. 2, I, 314; Arch. Néerl. VIII, 354. — Voir: *Physarum virescens.*

***Didymium microcarpon** (Fr.) Rostaf. — Sacc. Syll. VII, 382. — Arch. Néerl. XV, 382. — Voir: *Didym. nigripes.*

4. **Didymium nigripes** Fr. — Lister Mycet. 98. — T. N. G. XI, 399; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 18. — Didym. microcarpon (Fr.) Rostaf. — Sacc. Syll. VII, 382; Arch. Néerl. XV, 382; N. K. A. 1, V, 348. — Didym. Iridis (Ditmar) Fr. — N. K. A. 1, V, 348. — Didym. xanthopus Fr. — N. K. A. 2, II, 149.

***Didymium praecox** de Bary. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 19; Arch. Néerl. XV, 383. — Voir: *Didym. effusum* (Lk.) Fr.

***Didymium sinapinum** Cooke. — Arch. Néerl. XV, 383. — Voir: *Physarum virescens.*

***Didymium squamulosum** (A. S.) Fr. — N. K. A. 2, I, 166; 2, IV, 561; Arch. Néerl. VIII, 353; XV, 383; N. K. A. 3; I, 136. — Voir: *Didym. effusum.*

***Didymium xanthopus** Fr. — N. K. A. 2, III, 149. — Voir: *Didym. nigripes.*

SPUMARIA.

1. **Spumaria alba** (Bull.) D. C. — Lister Mycet. 104. — T. N. G. XI, 398; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 25; Arch. Néerl. XV, 384; N. K. A. 3, I, 137.

LEPIDODERMA.

1. **Lepidoderma tigrinum** (Schrad.) Rostaf. — Lister Mycet. 105. — Sacc. Syll. VII, 386. — Arch. Néerl. XV, 384.

c. **Stemoniteae.**

STEMONITIS.

1. **Stemonitis ferruginea** Ehrenb. — Lister Mycet. 110. — Sacc. Syll. VII, 398. — N. K. A. 1, V, 349; Arch. Néerl. VIII, 355; XV, 387. — Stem. heterospora Oud. N. K. A. 2, I, 253.

2. **Stemonitis fusca** Roth — Lister Mycet. 110. — Sacc. Syll. VII, 397. — T. N. G. XI, 399; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 20; Arch. Néerl. XV, 386; N. K. A. 2, V, 532; 3, I. 137.

***Stemonitis fusca** Roth β tubulina Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 20. — Voir: *Stem. Tubulina.*

***Stemonitis heterospora** Oud. N. K. A. 2, I, 253; Arch. Néerl. VIII, 353. — Voir: *Stem. ferruginea.*

Stemonitis oblonga Fr. — N. K. A. 2, I, 313; Arch. Néerl. VIII, 356. — Voir: *Comatriche Persoonii.*

***Stemonitis obtusata** Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 21. — Voir: *Comatricha obtusata.*

Stemonitis ovata P. — N. K. A. 1. I, 53; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 21. — Voir: *Comatricha obtusata.*

Stemonitis Tubulina A. S. — Lister Mycet. 115. — Sacc. Syll. VII, 399. — Stem. fusca Roth. β tubulina Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 20.

Stemonitis typhoides D. C. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 21. — Voir: *Comatricha.*

COMATRICHA.

Comatricha Friesiana (de Bary) Rostaf. — Arch. Néerl. XV, 386; N. K. A. 3, I, 137. — Sacc. Syll. VII, 395. — Voir, *Com. obtusata.*

1. **Comatricha obtusata** Preuss Linn. XXIV (1851) p. 111. — Lister Mycet. 117. — Com. Friesiana (de Bary) Rostaf. — Sacc. Syll. VII, 395. — Arch. Néerl. XV, 386. — Stemonitis obtusata Fr. — Prodr. Fl. Bat. II. 4, p. 21. — Stem. ovata P. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 21; N. K. A. 1, I, 53.

2. **Comatricha Persoonii** Rostaf. — Lister Mycet 122. — Com. pulchella (Bab.) Rostaf. — Sacc. Syll. VII, 395. — Arch. Néerl. XV, 386. — Stem. oblongata Fr. — N. K. A. 2, I. 313.

Comatricha pulchella (Bab.) Rost. — Sacc. Syll. VII, 395. — Voir: *Com. Persoonii* Rost.

Comatricha typhina (Roth) Rost. — Sacc. Syll. VII, 394. — Arch. Néerl. XV, 385. — Voir: *Com. typhoides.*

3. **Comatricha typhoides** D. C. — Lister Mycet. 120. — Com. typhina (Roth) Rostaf. — Sacc. Syll. VII, 394. — Arch. Néerl. XV, 385. — Stem. typhoides D. C. — T. N. G. XII, 272. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 21.

ENERTHENEMA.

1. **Enerthenema elegans** (B. Br.) Bowman. — Lister Mycet. 124. — Enerth. papillatum (P.) Rostaf. — Sacc. Syll. VII, 402. — Enerth. Berkeleyanum (B. Br.) Rostaf. — N. K. A. 2, VI, 65.

LAMPRODERMA.

Lamproderma arcyrioides (Sommerf.) Rostaf. — Sacc. Syll. VII, 303. — N. K. A. 2, V, 175; 3, I, 137. — Voir: *Lampr. violaceum.*

Lamproderma columbinum Rostaf. — Sacc. Syll. VII, 391. — Arch. Néerl. XV, 385. — Voir: *Lampr. physaroides.*

1. **Lamproderma physaroides** (A. S.) Rostaf. — Lister Mycet. 125. — Sacc. Syll. VII, 390. — Physarum bryophilum Fr. — T. N. G. XI, 399; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 19. — Lamprod. columbinum Rostaf. — Arch. Néerl. XV, 385.

2. **Lamproderma violaceum** Rostaf. — Lister Mycet. 129. — Sacc. Syll. VII, 392. — Lamp. arcyrioides (Sommerf.) Rostaf. — N. K. A. 2, V, 175.

B. Lamprosporae.

a. Heterodermeae.

CRIBRARIA.

1. **Cribraria argillacea** (Gmelin) P. — Lister Mycet. 139. — Sacc. Syll. VII, 416. — N. K. A. 1, V, 349; Arch. Néerl. VIII, 356; XV, 389.

2. **Cribraria aurantiaca** Schrad. — Lister Mycet. 112. — Sacc. Syll. VII, 413. — Cribr. vulg. Schrad. — N. K. A. 1, V, 349; Arch. Néerl. XV, 388.

3. **Cribraria microcarpa** P. — Lister Mycet. 146. — Sacc. Syll. VII, 414. — Arch. Néerl. XV, 389. — Dictydium microc. Schrad. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 21.

4. **Cribraria splendens** P. — Lister Mycet. 143. — Sacc. Syll. VII, 415. — Arch. Néerl. XV, 389. — Dictydium splendens Schrad. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 21.

*__Cribraria vulgaris__ Schrad. — Sacc. Syll. VII, 414. — N. K. A. 1, V, 349; Arch. Néerl. VIII, 356; XV, 388. — Voir: *Cribr. aurantiaca* Schrad.

DICTYDIUM.

*__Dictydium ambiguum__ Schrad. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 21. — Voir: *D. umbilicatum.*

*__Dictydium cernuum__ (P.) Nees. — Sacc. Syll. VII, 411. — Arch. Néerl. XI, 388. — Voir: *D. umbilicatum.*

*__Dictydium microcarpum__ Schrad. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 21. — Voir: *Cribraria.*

*__Dictydium splendens__ Schrad. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 21. — Voir: *Cribraria.*

1. __Dictydium umbilicatum__ Schrad. — Lister Mycet. 148. — T. N. G. XII, 272; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 21. — Dict. ambiguum Schrad. — Prodr. Fl. Bat. II, p. 21. — Dict. cernuum (P.) Nees. Arch. Néerl. XI, 388.

b. **Liceae.**

***LICEA.**

*__Licea fragiformis__ Nees. — N. K. A. 1, I, 52. — Voir: *Tubulina.*

c. **Tubulineae.**

TUBULINA.

*__Tubulina cylindrica__ (Bull.) D. C. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 21; Arch. Néerl. XV, 387; N. K. A. 2, V, 532; 3, I, 137. — Sacc. Syll. VII, 406. — Voir: *Tub. fragiformis* P.

1. __Tubulina fragiformis__ P. — Lister Mycet. 153. — Sacc. Syll. VII, 406. — Tub. cylindrica (Bull.) D. C. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 21 et 22; Arch. Néerl. XV, 387. — Tub. pulvinata Lév. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 22. — Licea fragiformis Nees. — N. K. A. 1, 52.

*__Tubulina pulvinata__ Lév. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 22. — Voir: *Tub. fragiformis.*

d. **Reticulariae.**

RETICULARIA.

1. __Reticularia Lycoperdon__ Bull. — Lister Mycet. 160. — Sacc. Syll. VII, 118. — Arch. Néerl. XV, 389. — Ret. umbrina Fr. — N. K. A. 1, I, 52; Prodr. Fl. Bat. 4, II, p. 24.

***Reticularia muscorum** Fr. — T. N. G. XI, 398; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 24. — Voir: *Fuligo septica.*

***Reticularia umbrina** Fr. — N. K. A. 1, I, p. 52; Prodr. Fl. Bat. II, 4, 24. — Voir: Ret. *Lycoperdon.*

c. Trichieae.

TRICHIA.

1. **Trichia Botrytis** P. — Lister Mycet. 171. — Tr. fragilis (Sow.) Rostaf. — Sacc. Syll. VII, 490. — Tr. pyriformis Fr. — N. K. A. 1. V, 349.

***Trichia chrysosperma** (Bull.) D. C. — T. N. G. XII, 272; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 22; Arch. Néerl. V, 491. — Voir: *Tr. favoginea.*

***Trichia clavata** T. β. **cerina** Wallr. — N. K. A. 1, V, 349; Arch. Néerl. VIII, 356. — Voir: *Tr. fallax.*

2. **Trichia fallax** P. — Lister Mycet. 170. — Tr. clavata P. β. cerina Wallr. — Arch. Néerl. XV, 393; N. K. A. 1, V, 34; 3, I, 138.

3. **Trichia favoginea** P. — Lister Mycet. 163. — T. N. G. XII, 272. — Tr. chrysosperma (Bull.) D. C. — T. N. G. XII, 272; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 22; Arch. Néerl. V, 394. — Tr. turbinata Withering. — Prodr. Fl. Bat. II, 1, p. 22.

***Trichia Neesiana** Cda. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 23. — Voir: *Hemitrichia rubiformis.*

***Trichia pyriformis** Fr. — N. K. A. 1, V, 349; Arch. Néerl. VIII, 356. — Voir: *Tr. Botrytis.*

***Trichia rubiformis** P. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 23. — Voir: *Hemitrichia.*

4. **Trichia scabra** Rostaf. — Lister Mycet. 167. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 22. — Voir: *Tr. favoginea* P.

5. **Trichia varia** (P) P. — Lister Mycet. 168. — T. N. G. XI, 399; Prodr. Fl. Bat. II, 1, p. 22; Arch. Néerl. XV, 393; N. K. A. 3, I, 138.

HEMITRICHIA.

1. **Hemitrichia rubiformis** Lister Mycet. 175. — Tr. rubif. P. et Tr. Neesiana Cda. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 23. — Hemiarcyria rubiformis Rostaf. — Arch. Néerl. XV. 395.

f. **Arcyrieae.**

ARCYRIA.

Arcyria adnata Rost. — Voir: *Arc. incarnata.*

1. **Arcyria albida** P. — Lister Mycet. 186. — Arc. cinerea P. — T. N. G. XI, 399; Arch. Néerl. XV, 391.

***Arcyria cinerea** P. — T. N. G. XI, 399; Arch. Néerl. XV, 391. — Voir. *Arc. albida.*

2. **Arcyria flava** P. — Lister Mycet. 190. — Arc. nutans (Bull.) Grev. — T. N. G. XII, 272; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 20; Arch. Néerl. XV, 392.

3. **Arcyria incarnata** P. — Lister Mycet. 189. — T. N. G. XII, 272; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 23; Arch. Néerl. XV, 391. — Arc. adnata Rostaf. — N. K. A. 3, 1. 138.

4. **Arcyria nutans** (Bull.) Grev. — T. N. G. XII, 272. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 23; Arch. Néerl. XV, 392.

5. **Arcyria punicea** P. — Lister Mycet. 188. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 23; N. K. A. 1, V, 349; 3, 1, 137; Arch. Néerl. XV, 390.

PERICHAENA.

Perichaena corticalis (Batsch) Rostaf. Arch. Néerl. XV, 390. — Voir: *Per. populina* Fr.

1. **Perichaena depressa** Libert. — Lister Mycet. 197. — N. K. A. 2. IV. 227.

2. **Perichaena populina** Fr. — Lister Mycet. 198. — T. N. G. XI, 100; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 22. — Per. corticalis (Batsch) Rostaf. — Arch. Néerl. XV, 390.

Perichaena strobilina Fr. — Voir: *Aecidium strobilinum.*

g. **Lycogaleae.**

DERMODIUM.

Dermodium conicum (Fr.) Rostaf. — Arch. Néerl. XV, 392. — Voir: *Lycogala.*

LYCOGALA.

1. **Lycogala conicum** P. — Lister Mycet. 210. — N. K. A. 1, V, 347; Arch. Néerl. VIII, 353. — Dermodium conicum (Fr.) Rostaf. — Arch. Néerl XV, 392.

Lycogala epidendron (L.). — T. N. G. XI, 398 (L.) Fr.;

Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 24; N. K. A. 3, I, 138; Arch. Néerl. XV, 392. — Voir: *Lyc. miniatum.*

2. **Lycogala flavo-fuscum** (Ehrb.) Rostaf. — Lister Mycet. 208. — N. K. A. 3, II, 779.

3. **Lycogala miniatum** P. — Lister Mycet. 209. — Lyc. epidendron (L.) Fr. — T. N. G. XI, 398; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 21; N. K. A. 3, I, 138; Arch. Néerl. XV, 392.

***Lycogala parietinum** Fr. — T. N. G. XI, 398. — Voir: *Mycogala.*

4. **Lycogala terrestre** (Micheli) Fr. — N. K. A. 2, V, 175.

†[50] Ceratiomyxaceae.

CERATIOMYXA.

1. **Ceratiomyxa mucida** Schröt. — Lister Mycet. 25. — Ceratiom. hydnoides A. S. — N. K. A. 1, V, 350. — Sacc. Syll. IV, 596. — Bois pourri des *Alnus glutinosa* et *Salix* sp.

***Ceratium hydnoides** A. S. — N. K. A. 1, V, 350. — Voir: *Ceratiomyxa mucida.*

†[51] Acrasiaceae.

DICTYOSTELIUM.

1. **Dictyostelium sphaerocephalum** (Oud.) Sacc. et March. Champ. coproph. Belg. p. 42. — Sacc. Syll. VII, 152. — Hyalostilbum sphaerocephalum Oud. N. K. A. 2, IV, 241.

†[52] Phytomyxaceae.

PLASMODIOPHORA.

1. **Plasmodiophora Brassicae** Woronin in Pringsh. Jahrbücher XI, 548. — Sacc. Syll. VII, 461. — Ritzema Bos et Staes Tijds. over Plantenziekten IX, 7.

V. DEUTEROMYCETAE.

Sphaerioidaceae.

1. Hyalosporae.

A. Simplices.

*Calvae.

PHYLLOSTICTA.

1. **Phyllosticta Acori** Oud. N. K. A. 2, II, 181. — Sacc. Syll. III, 59. — Wint. Kr. Fl. VI, 157 et 348. — F. de l'*Acorus Calamus*.

2. **Phyllosticta acoricola** (Cooke) Oud. — Phoma Acori Cooke. — Oud. N. K. A. 3, I, 487; 3, III, 1113. — Sacc. Syll. X, 183. — F. de l'*Acorus Calamus*.

3. **Phyllosticta aesculana** Oud. Zitt. Versl. K. A. v. W. 1900, p. 290; id. N. K. A. 3, II, 221. — Sacc. Syll. XVI, 829. — Wint. Kr. Fl. VII, 752. — F. de l'*Aesculus Hippocastanum*.

4. **Phyllosticta aesculicola** Sacc. Syll. III, 4. — Wint. Kr. Fl. VI, 18 et 344. — N. K. A. 3, II, 221. — F. de l'*Aesc. Hippocastanum*.

5. **Phyllosticta aesculina** Sacc. Syll. III, 3. — Wint. Kr. Fl. VI, 18. — N. K. A. 3, II, 222. — F. de l'*Aesc. Hippoc.*

6. **Phyllosticta Alaterni** Pass. et Brun. — N. K. A. 3, II, 222. — Sacc. Syll. X, 111. — Wint. Kr. Fl. VI, 79. — F. du *Rhamnus Alaternus*.

7. **Phyllosticta alnea** Oud. Zitt. Versl. K. A. v. W. 1900, p. 291; id. N. K. A. 3, II, 222. — Sacc. Syll. XVI, 847. — Wint. Kr. Fl. VII, 753. — F. de l'*Alnus glutinosa*.

8. **Phyllosticta alniperda** Oud. N. K. A. 3, III, 1111. — F. de l'*Alnus glutinosa*.

9. **Phyllosticta Aloidis** Oud. Beibl. z. bot. Centr. bl. 1902; id. N. K. A. 3, II, 742. — F. du *Stratiotes aloides*.

10. **Phyllosticta argillacea** Bresad. — Oud. N. K. A. 3, II, 742. — Sacc. Syll. XI, 742. — Wint. Kr. Fl. VI, 85. — Depazea arcolata Fuck. — Oud. Arch. Néerl. II (1867), 37. — F. du *Rubus idaeus*.

11. **Phyllosticta Aspidistrae** Oud. Beibl. z. bot. Centr. bl. 1902; id. N. K. A. 3, II, 713. — F. de l'*Aspidistra elatior*.

*__Phyllosticta Atriplicis__ West. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 96. — Voir: *Septoria*.

12. **Phyllosticta aucubicola** Sacc. Syll. III, 30. — Wint. Kr. Fl. VI, 22 et 344. — Oud. N. K. A. 3, I, 485. — F. de l'*Aucuba japonica*.

13. **Phyllosticta baldensis** Massal. — Oud. N. K. A. 3, II, 743. — Sacc. Syll. X, 126. — Wint. Kr. Fl. VI, 135. — F. du *Paeonia peregrina* cultivé.

14. **Phyllosticta Berberidis** Massal. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 96. — Sacc. Syll. III, 26. — Wint. Kr. Fl. VI, 26. — F. du *Berberis vulgaris*.

15. **Phyllosticta Betae** Oud. N. K. A. 2, II, 181. — Sacc. Syll. III, 54. — Wint. Kr. Fl. VI, 105. — F. du *Beta vulgaris* var. *Rapa*.

16. **Phyllosticta Betulae** Oud. N. K. A. 3, II, 743. — F. du *Betula verrucosa*.

17. **Phyllosticta bractearum** Oud. Zitt. Versl. K. A. v. W. 1900, p. 291; N. K. A. 3, III, 223. — Sacc. Syll. XVI, 845. — Wint. Kr. Fl. VII, 768. — Bractées des cônes fructifères du *Humulus Lupulus*.

18. **Phyllosticta Brassicae** (Curr.) West. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 96. — Sacc. Syll. III, 38. — Wint. Kr. Fl. VI, 106. — F. d'une espèce de *Brassica* cultivée.

19. **Phyllosticta Bufonii** Oud. Zitt. Versl. K. A. v. W. 1900, p. 291; N. K. A. 3, II, 223. — Sacc. Syll. XVI, 849. — Wint. Kr. Fl. VII, 769. — Phoma Bufonii Oud. in Hedw. 1898, p. 314. — F. du *Juncus bufonius*.

20. **Phyllosticta buxina** Sacc. Syll. III, 24. — Wint. Kr. Fl. VI, 25. — Oud. N. K. A. 3, I, 485. — F. du *Buxus sempervirens*.

21. **Phyllosticta Camelliae** West. Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 97. — Sacc. Syll. III, 25. — Wint. Kr. Fl. VI, 26 et 344. — F. du *Camellia japonica*.

22. **Phyllosticta Campanulae** Sacc. et Speg. in Sacc. Syll. III, 51. — Wint. Kr. Fl. VI, 108. — Oud. Arch. Néerl. II (1867), 37. — F. du *Campanula Medium*.

23. **Phyllosticta catalpicola** Oud. N. K. A. 3, II, 891. — Fruits du *Catalpa syringifolia*.

24. **Phyllosticta chaenomelina** Thüm. — N. K. A. 3, II, 223. — Sacc. Syll, III, 5. — Wint. Kr. Fl. VI, 30. — F. du *Cydonia japonica*.

25. **Phyllosticta Chamaenerii** Allescher in Wint. Kr. Fl. VI, 119. — Sacc. Syll. XIV, 850. — N. K. A. 3, II, 223. — F. de l'*Epilobium (Chamaenerium) angustifolium*.

26. **Phyllosticta cirratula** (Desm.) Oud. N. K. A. 3, III, 1114. — Phoma cirratula Sacc. Syll. III, 115. — Wint. Kr. Fl. VI,

204. — Oud. Arch. Néerl. VIII, 357 (. . . lum). — F. du *Daphne Laureola.*

27. **Phyllosticta coniothyrioides** Sacc. Syll. X, 104. — Wint. Kr. Fl. VI, 37. — N. K. A. 3, II, 224.

28. **Phyllosticta cornicola** (D. C.) Rab. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 97; Oud. N. K. A. 3, I, 485. — Sacc. Syll. III, 21. — Wint. Kr. Fl. VI, 33. — Sphaeria cornicola D. C. — N. K. A. 1, I, 52. — F. du *Cornus sanguinea.*

29. **Phyllosticta coronaria** Pass. — Oud. N. K. A. 3, II, 714. — Sacc. Syll. X, 102. — Wint. Kr. Fl. VI, 63. — F. du *Philadelphus coronarius.*

30. **Phyllosticta Coryli** West. in Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 97. — Sacc. Syll. III, 31. — Wint. Kr. Fl. VI, 34. — F. du *Corylus Avellana.*

31. **Phyllosticta cruenta** (Fr.) Kickx. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 97. — Sacc. Syll. III, 58. — Wint. Kr. Fl. III, 162 et 349. — Sphaeria cruenta Kunze. — N. G. XI, 395. — F. des *Convallaria majalis, Polygonatum multiflorum* et *P. officinale.*

32. **Phyllosticta Cyclaminis** Brun. — Sacc. Syll. XI, 481. — N. K. A. 3, III, 1111. — F. du *Cyclamen persicum.*

33. **Phyllosticta destructiva** Desm. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 97. — Var. **Fraxini** Desm. — Oud. Arch. Néerl. VIII, 365; id. N. K. A. 2, I, 256. — F. du *Fraxinus juglandifolia.*

Phyllosticta destructiva var. **Hederae** in N. K. A. 2, I, 257; Arch. Néerl. VIII, 365. — Wint. Kr. Fl. VI, 45. — Voir: *Phyll. hedericola.*

Phyllosticta destructiva var. **Lilacis** West. — N. K. A. 2, I, 257; Arch. Néerl. VIII, 365. — Voir: *Phyll. Syringae.*

34. **Phyllosticta destructiva** β. **Malvacearum** Desm. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 97. — Phyll. destructiva Desm. — Sacc. Syll. III, 40. — Wint. Kr. Fl. VI, 130. — F. des espèces indigènes de *Malva.*

35. **Phyllosticta Elaeagni** (Sacc.) Allescher in Wint. Kr. Fl. VI, 39. — N. K. A. 3, II, 224. — Phoma Elaeagni Sacc. Syll. III, 111. — F. de l'*Elaeagnus angustifolius.*

36. **Phyllosticta Evonymi** Sacc. Syll. III, 15. — Wint. Kr. Fl. VI, 40. — Oud. N. K. A. 1, I, 169. — Phyll. destructiva Desm. — N. K. A. 2, VI, 591. — F. de l'*Evonymus europaea.*

37. **Phyllosticta Fagi** Oud. Zitt. V. K. A. v. W. 1900, p. 291; Beibl. z. bot. Centralbl. 1902, N. K. A. 3, II, 225 et 714. — Sacc. Syll. XVI, 816. — Wint. Kr. Fl. VII, 765. — F. du *Fagus silvatica.*

38. **Phyllosticta Forsythiae** Sacc. Syll. III, 27. — Wint. Kr. Fl. VI, 43. — N. K. A. 3, II, 320. — F. du *Forsythia viridissima.*

38. **Phyllosticta fragaricola** Rob. et Desm. — Sacc. Syll. III, 40. — Wint. Kr. Fl. VI, 122. — Sphaeria vagans γ. fragariaecola Fr. T. N. G. XI. 395; Phyll. fragariaecola Rob. Prodr. Fl. Bat. II, 1, p. 98. — F. du *Fragaria vesca* et d'autres espèces et variétés cultivées.

39. **Phyllosticta hedericola** (Dur. et Mont.) Sacc. Syll. III, 20. — Wint. Kr. Fl. VI, 45. — Phyll. destructiva var. Hederae Oud. Arch. Néerl. VIII, 365, id. N. K. A. 2, I, 257. — F. du *Hedera Helix.*

40. **Phyllosticta Hepaticae** Brunaud. — N. K. A. 3, II, 225. Sacc. Syll. XI, 447. — Wint. Kr. Fl. VI, 101. — F. du *Hepatica nobilis* (=H. triloba).

41. **Phyllosticta Hippocastani** Oud. N. K. A. 3, II, 892. — F. de l'*Aesculus Hippocastanum.*

42. **Phyllosticta holosteicola** Oud. Zitt. V. K. A. v. W. 1900, p. 291; id. N. K. A. 3, II, 225; Sacc. Syll. XVI, 832. — Wint. Kr. Fl. VII, 839. — F. du *Stellaria Holostea.*

43. **Phyllosticta iliciperda** Oud. N. K. A. 3, II, 892; 33, III, 1114. — Phyll. Ilicis Oud. Zitt. V. K. A. v. W. 1900, p. 292; id. N. K. A. 3, II, 226. — Sacc. Syll. XVI, 832. — F. de l'*Ilex Aquifolium.*

***Phyllosticta Ilicis** Oud. — Voir: *Ph. iliciperda.* Oud.

44. **Phyllosticta Jasmini** Sacc. Syll. III, 22. — Wint. Kr. Fl. VI, 48. — Oud. N. K. A. 2, I, 169. — F. du *Jasminum revolutum.*

45. **Phyllosticta juglandina** Sacc. Syll. III, 31. — Wint. Kr. Fl. VI, 50. — N. K. A. 3, II, 226. — F. du *Juglans regia.*

46. **Phyllosticta Laburni** Oud. Zitt. V. K. A. v. W. 1900, p. 292; id. N. K. A. 3, II, 226. — Sacc. Syll. XVI, 833. — Wint. Kr. Fl. VII, 761.

47. **Phyllosticta Lantanoidis** Peck. — N. K. A. 3, II, 744. — Sacc. Syll. III, 113. — Wint. Kr. Fl. VI, 95. — F. du *Viburnum oxycoccos.*

48. **Phyllosticta Laureolae** Desm. — Oud. N. K. A. 3, I, 485. — Sacc. Syll. III, 26. — Wint. Kr. Fl. VI, 37. — Phoma Laureola Desm. — Oud. N. K. A. 2, I, 167. — F. du *Daphne Laureola.*

49. **Phyllosticta Letendrei** (Sacc.) Allescher in Wint. Kr. Fl. VI, 130. — Phoma Let. Sacc. Syll. III, 146. — Oud. N. K. A. 3, I, 488. — F. du *Lysimachia Nummularia.*

50. **Phyllosticta leucostigma** (D. C.) Allescher in Wint. Kr. Fl.

VI, 17. — Oud. N. K. A. 3, II, 745. — Phoma leucost. (D. C.) Sacc. Syll. III, 105. — F. du *Buxus sempervirens.*

51. **Phyllosticta Lonicerae** West. — Oud. N. K. A. 3, II, 745. — Wint. Kr. Fl. VI, 53 (sous n° 126 = Ph. vulgaris). — F. du *Lonicera Periclymenum.*

52. **Phyllosticta maculiformis** Sacc. Syll. III, 35. — Wint Kr. Fl. VI, 29. — N. K. A. 3, II, 227. — F. du *Castanea vesca.*

53. **Phyllosticta martialis** Oud. N. K. A. 3, III, 1114. — F. du *Stratiotes aloides.*

53. **Phyllosticta Mercurialis** Desm. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 98. — Sacc. Syll. III, 53. — Wint. Kr. Fl. V, 132. — F. du *Mercurialis annua.*

***Phyllosticta Narcissi** Oud. — Voir: *Phyll. Oudemansii* Sacc.

54. **Phyllosticta Negundinis** Sacc. Speg. in Sacc. Syll. III, 13. — Wint. Kr. Fl. VI, 17. — Oud. N. K. A. 2, I, 169. — F. d'une espèce de *Negundo* cultivée.

55. **Phyllosticta nitida** (Rob.) Allescher in Wint. Kr. Fl. VI, 159. — Phoma nitida Rob. et Desm. in Sacc. Syll. III, 167. — N. K. A. 2, VI, 598. — F. du *Psamma littoralis* (= Ps. arenaria.)

56. **Phyllotieta osteospora** Sacc. Syll. III, 34. — Wint. Kr. Fl. VI, 76. — Oud. N. K. A. 3, I, 185. — F. du *Quercus Robur.*

57. **Phyllosticta Oudemansii** Sacc. et Sydow, in Sacc. Syll. XVI, 849. — Phyll. Narcissi Oud. Zitt. V. K. A. v. W. 1900, p. 292; N. K. A. 3, II, 227. — F. d'une espèce de *Narcissus* cultivée.

58. **Phyllosticta Paeoniae** Sacc. et Speg. dans Sacc. Syll. III, 37. — Wint. Kr. Fl. VI, 134. — Oud. N. K. A. 3, III, 1115. — F. du *Paeonia officinalis.*

***Phyllosticta pallor** (Berk.) Oud. — N. K. A. 2, V, 486 et 2, VI, 591. Voir: *Phoma pallor.*

59. **Phyllosticta persicicola** Oud. Hedw. 1898, p. 313; Zitt. V. K. A. v. W. 1900, p. 292; N. K. A. 3, II, 227. — Sacc. Syll. XVI, 831. — Wint. Kr. Fl. VII, 771. — F. du *Persica vulgaris.*

60. **Phyllosticta phacidioides** (Sacc.) Allescher dans Wint. Kr. Fl. VI, 25. — Oud. N. K. A. 3, II, 892. — Phoma phac. Sacc. Syll. III, 106. — P. du *Buxus sempervirens.*

61. **Phyllosticta phaseolina** Sacc. Syll. III, 11. — Wint. Kr. Fl. VI, 137. — N. K. A. 3, II, 228. — F. du *Phasoolus vulgaris.*

62. **Phyllosticta Pisi** West. — N. K. A. 3, II, 228. — Sacc. Syll. III, 13. — Wint. Kr. Fl. VI, 139. — F. du *Pisum sativum.*

63. **Phyllosticta Platanoidis** Sacc. Syll. II, 13. — Wint. Kr. Fl. VI, 16. — Oud. N. K. A. 3, II, 746. — F. de l'*Acer Pseudo-Platanus.*

64. **Phyllosticta Podagrariae** Oud. Zitt. V. K. A. v. W. 1900, p. 292; N. K. A. 3, II, 228. — Sacc. Syll. XVI, 835. — Wint. Kr. Fl. VII, 752. — F. de l'*Aegopodium Podagraria*.

65. **Phyllosticta populina** Fuck. — Sacc. Syll. III, 33. — Wint. Kr. Fl. VI, 68. — Phyll. populnea Desm. Oud. Arch. Néerl. VIII (1873), 365; Oud. N. K. A. 2, I, 257. — F. du *Populus nigra* var. *pyramidalis*.

***Phyllosticta populnea** Desm. N. K. A. 2, I, 257; Arch. Néerl. VIII, 368. — Voir: *Phyll. populina*.

66. **Phyllosticta prominens** Oud. N. K. A. 3, II, 746. — F. du *Populus balsamifera*.

67. **Phyllosticta prunicola** (Schwein.) var. *Pruni spinosae* Allescher dans Wint. Kr. Fl. VI, 70. — Phyll. Pruni spinosae Alles. in Sacc. Syll. XI, 472. — F. du *Pr. spinosa*.

68. **Phyllosticta prunicola** (Schwein.) Oud. N. K. A. 3, II, 229. — F. du *Prunus virginiana*.

69. **Phyllosticta quercicola** Oud. Hedw. 1898, p. 176; Zitt. V. K. A. v. Wet. 1900, p. 293; N. K. A. 3, I, 486; 3, II, 229 et 331. — Sacc. Syll. XVI, 846. — Wint. Kr. Fl. VII, 777. — F. du *Quercus Robur*.

70. **Phyllosticta quernea** Thüm. — Oud. N. K. A. 3, I, 486. — Sacc. Syll. III, 35. — Wint. Kr. Fl. VI, 74.

71. **Phyllosticta Pruni spinosae** Allesch. Wint. Kr. Fl. VI, 70. — Sacc. Syll. XI, 472. — Oud. A. K. A. 3, III, 1115. — F. du *Prunus spinosa*.

72. **Phyllosticta Ralfsii** (B. Br.) Oud. — Phoma Ralfsii (B. Br.) Sacc. Syll. III, 113. — N. K. A. 2, VI, 599. — Sphaeropsis Ralfsii B. Br. — Arch. Néerl. VIII, 359; N. K. A. 2, I, 314 et 2, III, 253. — F. du *Hedera Helix*.

73. **Phyllosticta Rhamni** West. — N. K. A. 3, II, 230. — Sacc. Syll. III, 15. — Wint. Kr. Fl. VI, 76. — F. du *Frangula Alnus* (Rh. Frangula).

74. **Phyllosticta Rhododendri** West. Prodr. Fl. Bat. II, 4, 98. — Sacc. Syll. III, 23. — Wint. Kr. Fl. VI, 79. — F. du *Rhododendrum arboreum*.

75. **Phyllosticta rimosa** (West.) Oud. — Phoma rimosa West. Not. III, 13. — N. K. A. 2, VI, 598. — Gaînes du *Psamma littoralis*.

76. **Phyllosticta Roboris** Oud. N. K. A. 3, II, 746. — F. du *Quercus Robur*.

77. **Phyllosticta Rosarum** Pass. — N. K. A. 3, II, 230. — Sacc. Syll. X, 109. — Wint. Kr. Fl. VI, 84. — F. de plusieurs *Roses* cultivées (p. e. Captain Christie).

***Phyllosticta Rumicis** Prodr. Fl. Bat. II, 4, 98. — Voir: *Venturia.*

78. **Phyllosticta Sambuci** Desm. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 99; N. K. A. 2, VI. 594. — Sacc. Syll. III. 19. — Wint. Kr. Fl. VI. 87. — F. du *Sambucus nigra.*

79. **Phyllosticta Sorbi** West. — Oud. Arch. Néerl. VIII (1867) 366; Oud. N. K. A. 2, II, 37. — Wint. Kr. Fl. VI, 88. — F. du *Pirus* (Sorbus) *aucuparia.*

80. **Phyllosticta staphyleicola** Oud. — Beibl. z. bot. Centralbl. 1902; id. N. K. A. 3, II, 747. — F. du *Staphylea pinnata.*

***Phyllosticta Stratiotis** Oud. Beibl. bot. Centr. Bl. 1902; N. K. A. 3, II. 747. — Voir: *Phyll. militaris* Oud.

81. **Phyllosticta superflua** Oud. — N. K. A. 3, III, 1115. — Voir: *Ascochyta Syringae.*

82. **Phyllosticta Syringae** West. N. K. A. 2, VI, 594. — Phyll. destructiva var. Lilacis Desm.: Oud. Arch. Néerl. VIII (1873) 365; id. N. K. A. 2, I, 257. — Sacc. Syll. III, 22. — Wint. Kr. Fl. VI, 90. — F. du *Syringa vulgaris.*

83. **Phyllosticta syringiphila** Oud. N. K. A. 3, III. 1115. — F. du *Syringa vulgaris.*

84. **Phyllosticta Tabaci** Pass. — N. K. A. 3, II, 231. — Sacc. Syll. III, 48. — Wint. Kr. Fl. VI, 133. — F. du *Nicotiana Tabacum.*

85. **Phyllosticta tabifica** (Prill. et Delacr.) Allescher dans Wint. Kr. Fl. VI, 105. — Phoma tabif. Prill. et Delacr., Maladies des pl. agricoles, II, 263. — Oud. N. K. A. 3, II. 244. — Sacc. Syll. X, 189. — F. du *Beta vulgaris* var. *Rapa.*

86. **Phyllosticta Thalictri** West. — Oud. Arch. Néerl. VIII, 366; id. N. K. A. 2, I, 311. — Sacc. Syll. III. 37. — Wint. Kr. Fl. VI, 152. — F. du *Thalictrum flavum.*

87. **Phyllosticta thujana** (Thüm.) Oud. N. K. A. 3, II, 231. — Phoma thuj. Thüm dans Sacc. Syll. III, 102. — F. du *Thuja gigantea.*

88. **Phyllosticta tiliicola** Oud. N. K. A. 3, II, 747. — F. du *Tilia cordata.*

89. **Phyllosticta tinea** Sacc. Syll. III, 16. — Wint. Kr. Fl. VI, 94. — Oud. N. K. A. 3, II, 748. — F. du *Viburnum Tinus.*

90. **Phyllosticta Trappenii** Oud. Zitt. V. K. A. v. W. 1900, p. 293; id. N. K. A. 3, II, 231. — Sacc. Syll. XVI. 842. — Wint. Kr. Fl. VII, 765. — F. du *Fraxinus juglandifolia.*

91. **Phyllosticta Treleasii** Berl. et Vogl. — Oud. N. K. A. 3, II. 748. — Sacc. Syll. X, 108. — Wint. Kr. Fl. VI, 73. — F. du *Prunus serotina.*

92. **Phyllosticta Typhae** (Pass.) Allescher in Wint. Kr. Fl. VI, 166. — Oud. Beibl. Z. bot. Centrb. 1902; id. N. K. A. 3, II, 748. — Phoma Typhae Brun. in Sacc. Syll. X, 184. — F. du *Typha angustifolia*.

93. **Phyllosticta Ulmi** Wint. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 99. — Sacc. Syll. III, 33. — Wint. Kr. Fl. VI, 93. — F. de l'*Ulmus campestris*.

94. **Phyllosticta vincicola** Oud. Zitt. V. K. A. v. W. 1900, p. 293; N. K. A. 3, II, 232. — Sacc. Syll. XVI, 843. — Wint. Kr. Fl. VII, 782. — F. du *Vinca major*.

95. **Phyllosticta Violae** Desm. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 99. — Sacc. Syll. III, 38. — Wint. Kr. Fl. VI, 155. — F. du *Viola odorata*.

96. **Phyllosticta vulgaris** Rob. et Desm. a. *Lonicerae* Desm. — Oud. Arch. Néerl. VIII (1873), 366; N. K. A. 2, I, 257. — Sacc. Syll. III, 18. — Wint. Kr. Fl. VI, 53. — F. du *Lonicera Periclymenum*.

DEPAZEA.

***Depazea areolata** Fuck. — Oud. Arch. Néerl. II (1867) 37. — F. du *Rubus vulgaris*. — Voir: *Phyllost. argillacea*.

1. **Depazea calthaecola** Rab. — N. K. A. 3, II, 232. — Sacc. Syll. III, 62. — F. du *Caltha palustris*.

***Depazea Meliloti** Lasch. — Arch. Néerl. VIII, 366. — Voir: *Cercospora*.

2. **Depazea rhamnicola** Lasch. — Arch. Néerl. VIII (1873), 366; Oud. N. K. A. 2, I, 169. — F. du *Rhamnus Alaternus*.

3. **Depazea vagans** Fr. δ. **malvaecola** Fr. — T. N. G. XII, 271.

4. **Depazea vagans** Fr. ε. **scabiosaecola** D. C. — T. N. G. XII, 271.

5. **Depazea Vincae** Fuck. — Oud. Arch. Néerl. VIII (1873), 366; id. N. K. A. 2, I, 169. F. du *Vinca minor*.

PHOMA.

1. **Phoma Abrotani** Oud. N. K. A. 3, II, 734. — Rameaux de l'*Artemisia Abrotanum*.

2. **Phoma acaciicola** Oud. Beibl. z. bot. Centr. bl. 1902; id. N. K. A. 3, II, 735. — Ram. de l'*Acacia vertieillata*.

3. **Phoma accrvalis** Sacc. Syll. III, 97. — Wint. Kr. Fl. VI, 244. — Oud. N. K. A. 2, V, 170. — Ram. d'une espèce de *Salix*.

4. **Phoma Achilleae** Sacc. Syll. III, 124. — Wint. Kr. Fl. VI,

261. — Oud. N. K. A. 3, 1, 486. — Tiges sèches de l'*Achillea Millefolium*.

5. **Phoma acicola** (Lév.) Sacc. Syll. III, 100. — Wint. Kr. Fl. VI, 198. — Oud. N. K. A. 3, II, 735. — Aiguilles du *Pinus ponderosa*. [1])

***Phoma Acori** Cooke. — Oud. N. K. A. 3, 1, 487. — Sacc. Syll. X, 183. — Voir: *Phyllostieta*.

6. **Phoma acuta** (Fuck.) Sacc. Syll. III, 133. — Wint. Kr. Fl. VI, 326. — Oud. N. K. A. 3, II, 735. — Tiges sèches d'une Ombellifère.

7. **Phoma aesculana** Sacc. Syll. X, 144. — Oud in herb. — Conforme au *Phyllosticta aesculana*, mais habitant les rameaux de l'*Aesculus Hippocastanum*.

8. **Phoma albicans** Rob. et Desm. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 92. — Sacc. Syll. III, 123. — Wint. Kr. Fl. VI, 280. — Pédoncules de l'*Hypochoeris glabra*.

9. **Phoma allostoma** (Lév.) Sacc. Syll. III, 74. — Wint. Kr. Fl. VI, 254. — N. K. A. 2, VI, 289 et p. 598. — Ram. du *Taxus baccata*.

10. **Phoma ambiguella** Karst. et Hariot. — Sacc. Syll. X, 169. — Oud. in Herb. — Tiges du *Tanacetum vulgare*.

11. **Phoma Amorphae** Sacc. Syll. III, 68. — Wint. Kr. Fl. VI, 178 et 349. — N. K. A. 3, II, 232. — Ram. de l'*Amorpha fruticosa*.

12. **Phoma Amygdali** Oud. Zitt. V. K. A. v. W. 1900, p. 293; id. N. K. A. 3, II, 233. — Sacc. Syll. XVI, 859. — Wint. Kr. Fl. VII, 786. — Ram. de l'*Amygdalus nana*.

13. **Phoma anceps** Sacc. Syll. III, 120. — Wint. Kr. Fl. VI, 305. — Oud. N. K. A. 3, II, 888. — Tiges du *Medicago sativa*.

14. **Phoma Ariae** Oud. Hedw. 1898, p. 177; id. N. K. A. 3, 1, 487. — Sacc. Syll. XVI, 860. — Wint. Kr. Fl. VII, 827. — Ram. du *Pirus* (Sorbus) *Aria*.

15. **Phoma atriplicina** (West.) Sacc. Syll. III, 140. — Wint. Kr. Fl. VI, 270. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 93 (. . . . um). — Tiges mortes de l'*Atriplex hortensis*.

16. **Phoma Aucubae** Oud. — Phoma Aucubae West. f[a] ramulicola Oud. N. K. A. 2, VI, 38. — Wint. Fr. Fl. VI, 180. Sommet de rameaux jeunes de l'*Aucuba japonica*.

---

[1]) Les espèces de *Phoma*, produites par les aiguilles des Conifères, font exception au règle que les espèces foliicoles de ce genre doivent être adjugées au genre *Phyllosticta*. (Allescher in Wint. Kr. Fl. VI, p. 15.)

17. **Phoma aucupariae** Bresad. — N. K. A. 2, VI, 289 et 599. — Sacc. Syll. X, 141. — Wint. Kr. Fl. VI, 248. — Ram. du *Pirus* (Sorbus) *aucuparia*.

***Phoma Baptisiae** Oud. N. K. A. 3, II, 736. — Voir: *Ph. Baptisiicola*.

18. **Phoma Baptisiicola** Oud. N. K. A. 3, III, 1112. — Phoma Baptisiae Oud. Beibl. z. bot. Centralbl. 1902; id. N. K. A. 3, II, 736. — Ram. du *Baptisia australis*.

***Phoma Berberidis** Sacc. — N. K. A. 2, V, 488 et 2, VI, 597. — Voir: *Pyrenochaeta*.

19. **Phoma Bufonii** Oud. Hedw. 1898, p. 314, où, par erreur, le mot *Phyllosticta* fut remplacé par le mot *Phoma*.

20. **Phoma canadensis** Allescher dans Wint. Kr. Fl. VI, 291. — Sacc. Syll. XIV, 877. — Oud. N. K. A. 3, II, 736. — Tiges de l'*Erigeron canadensis*.

***Phoma Candollei** B. Br. — Voir: *Macrophoma*.

21. **Phoma Caraganae** Oud. Beibl. z. bot. Centralb. 1902. — id. N. K. A. 3, II, 736. — Ram. du *Caragana arborescens*.

***Phoma Caricis** Sacc. Syll. III, 164. — N. K. A. 2, VI, 39 et 597. — Voir: *Macrophoma*.

22. **Phoma castanea** Peck. — N. K. A. 2, VI, 290 et 598. — Sacc. Syll. X, 160. — Wint. Kr. Fl. VI, 186. — Ram du *Castanea sativa* (= C. vesca.)

23. **Phoma catalpicola** Oud. N. K. A. 3, II, 737. — Ram. du *Catalpa syringifolia*.

24. **Phoma caulographa** (Dur. Mont.) Sacc. Syll. III, 126. — Wint. Kr. Fl. VI, 280. — Oud. Arch. Néerl. VIII (1873), 357 (. . . um). Tiges de l'*Anthriscus silvestris*.

25. **Phoma Chamaenerii** Brun. — Oud. N. K. A. 3, II, 737. — Sacc. Syll. 178. — Wint. Kr. Fl. VI, 291. — Tiges de l'*Epilobium angustifolium*.

***Phoma cirratula** Desm. — Arch. Néerl. VIII, 357 (um.). — Voir: *Phyllosticta*.

26. **Phoma Colchicae** Oud. Zitt. V. K. A. v. W. 1900, p. 294; id. N. K. A. 3, II, 283. — Wint. Kr. Fl. VII, 828. — Pétioles du *Staphylea pinnata*.

27. **Phoma complanata** (Tode) Desm. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 93. — N. K. A. I, V, 345 (. . . um); II, 1, 92 et 2, VI, 594. — Sacc. Syll. III, 226. — Aposphaeria compl. Berk. — Oud. Herb. N. Pl. n° 484. — Tiges de plusieurs plantes herbacées. — Wint. Kr. Fl. VI, 262, 266, 267, 297, 317.

28. **Phoma conigena** Karst. N. K. A. 3, II, 233. — Sacc. Syll.

X, 163. — Wint. Kr. Fl. VI, 196. — Écailles séminifères du *Pinus Strobus*.

29. **Phoma consocia** Sacc. Syll. X, 145. — Wint. Kr. Fl. VI, 216. — N. K. A. 2, VI, 598. — Ram. du *Hippophaë rhamnoides*.

30. **Phoma controversa** (Nke) Sacc. Syll. III, 81. — Wint. Kr. Fl. VI, 211. — Oud. N. K. A. 3, II, 737. — Ram. du *Fraxinus excelsior*.

31. **Phoma Convallariae** West. — Oud. N. K. A. 3, II, 888. — Sacc. Syll. III, 161. — Phyllosticta Conv. Allescher dans Wint. Kr. Fl. VI, 162. — Tiges du *Polygonatum multiflorum*.

32. **Phoma Corni** Fuck. — N. K. A. 2, VI, 598. — Sacc. Syll. III, 86. — Wint. Kr. Fl. VI, 201. — Ram. du *Cornus sanguinea*.

33. **Phoma Corni albae** Sacc. et Syd. dans Sacc. Syll. XVI, 855. — Phoma cornicola Oud. Zitt. V. K. A. v. W. 1900, p. 294; id. N. K. A. 3, II, 234. — Ram. du *Cornus alba*.

***Phoma cornicola** Oud. Zitt. Versl. K. A. v. W. 1900, p. 294; N. K. A. 3, II, 231. — Voir: *Ph. Corni albae*.

34. **Phoma Corni suecicae** (Fr.) Sacc. Syll. III, 86. — Oud. N. K. A. 3, II, 737. — Ram. du *Cornus stricta*. — N. B. Le *Phoma Corni suecicae* Alles. dans Wint. Kr. Fl. VI, 201 = *Leptothyrium vulgare* (Fr.) Sacc., secundum Alles. ibidem. p. 350.

35. **Phoma Coronillae** (Desm.) West. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 93. — Sacc. Syll. III, 67. — Wint. Kr. Fl. VI, 202. — Ram. des *Coronilla Emerus* et *varia*.

36. **Phoma Cosmi** Oud. Zitt. V. K. A. v. W. 1900, p. 294; N. K. A. 3, II, 331. — Sacc. Syll. XVI, 868. — Tige du *Cosmus bipinnatus*.

37. **Phoma Crataegi** Sacc. Syll. III, 78. — Wint. Kr. Fl. VI, 202. — N. K. A. 2, VI, 598. — Ram. du *Crataegus Oxyacantha*.

38. **Phoma crustosa** Sacc., Bomm. et Rouss. dans Sacc. Syll. X, 149. — Wint. Kr. Fl. VI, 217. — N. K. A. 2, V, 488 et 596. — Ram. de l'*Ilex Aquifolium*.

39. **Phoma cryptica** (Nke) Sacc. Syll. III, 69. — Wint. Kr. Fl. VI, 221. — N. K. A. 2, V, 169 et 2, VI, 598. — Ram. des *Lonicera Periclymenum* et *tataricum*.

40. **Phoma Cydoniae** Sacc. et Schulz. dans Sacc. Syll. 75. — Wint. Kr. Fl. VI, 35. — Oud. N. K. A. 3, III, 1112. — Ram. du *Cydonia japonica*.

41. **Phoma decorticans** de Not. — Oud. Arch. Néerl. VIII (1873) 357.; id. N. K. A. 2, I, 167. — Sacc. Syll. III, 149. — Wint. Kr. Fl. VI, 284. — Fruits pourrissants du *Cucumis sativus*.

42. **Phoma depressa** (Lév.) Sacc. Syll. III, 82. — Wint. Kr. Fl.

VI, 251. — Oud. N. K. A. 2, IV, 525. — Sphaeropsis depr. Lév. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 88. — Ram du *Syringa vulgaris*. — N. B. Le Phoma depressa, mentionné dans les Arch. Néerl. VIII (1873), 357 (sous 92) et le N. K. A. 2, I, 167, comme venant sur les rameaux du *Robinia Pseudo-Acacia*, doit changer de nom, et prendre celui de *Phoma planiuscula* Sacc. Syll. III, 99.

43. **Phoma descissens** Oud. Hedw. 1898, p. 314; id. Zitt. V. K. A. v. W. 1900, p. 294; id. N. K. A. 3, II, 234. — Sacc. Syll. XVI, 852. — Wint. Kr. Fl. VII, 832. — Ram. du *Vitis vinifera*.

44. **Phoma Deutziae** Allescher dans Wint. Kr. Fl. VI, 205. — Sacc. Syll. XIV, 869. — Oud. N. K. A. 3, II, 738. — Ram. du *Deutzia scabra*.

45. **Phoma divergens** Oud. N. K. A. 2, V, 488; ibid. 2, VI, 596. — Sacc. Syll. X, 147. — Wint. Kr. Fl. VI, 212. — Ram. du *Fraxinus excelsior*.

46. **Phoma Douglasii** Oud. Hedw. 1898, p. 314; Zitt. V. K. A. v. W. 1900, p. 294; id. N. K. A. 3, II, 235. — Sacc. Syll. XVI, 875. — Wint. Kr. Fl. VII, 817. — Écailles séminifères de l'*Abies Douglasii*.

47. **Phoma dryina** (Berk. Curt.) Sacc. Syll. III, 96. — N. K. A. 2, VI, 597. — Ram. du *Quercus Robur*.

48. **Phoma Dulcamarae** (Nke) Sacc. Syll. III, 127. — Wint. Kr. Fl. VI, 322. — N. K. A. 2, VI, 598 et 3, II, 235. — Tiges du *Solanum Dulcamara*.

49. **Phoma dulcamarina** (Nke) Sacc. Syll. III, 127. — Wint. Kr. Fl. VI, 322. — N. K. A. 2, VI, 596. — Tiges du *Solanum Dulcamara*.

50. **Phoma Durandiana** Sacc. et Roum. dans Sacc. Syll. III, 140. — Wint. Kr. Fl. VI, 318. — N. K. A. 2, VI, 39. — Tiges sèches du *Rumex Acetosa*.

51. **Phoma endolenca** Sacc. Syll. III, 98. — Wint. Kr. Fl. VI, 177. — N. K. A. 2, VI, 38 et p. 595. — Ram. de l'*Alnus glutinosa*.

52. **Phoma Epilobii** Preuss. — Sacc. Syll. III, 134. — Wint. Kr. Fl. VI, 290. — Oud. N. K. A. 3, I, 487. — Tiges de l'*Epilobium hirsutum*.

53. **Phoma epitricha** (B. Br.) Sacc. Syll. III, 168. — Wint. Kr. Fl. VI, 341. — Sphaeropsis epitr. B. Br. — Oud. N. K. A. 2, III, 253. — Tiges et ram. de l'*Equisetum arvense*.

54. **Phoma Equiseti** Desm. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 93. — Sacc. Syll. III, 168. — Wint. Kr. Fl. VI, 341. — Tiges de l'*Equisetum palustre*.

55. **Phoma eryngicola** Brun. — Oud. N. K. A. 3, I. 487. — Sacc. Syll. X, 176. — Wint. Kr. Fl. VI, 292. — Tiges de l'*Eryngium campestre*.

56. **Phoma Eryngii** Sacc. Roum. — Sacc. Syll. III, 126. — Wint. Kr. Fl. VI, 292. — N. K. A. VI, 598.

57. **Phoma euphorbiphila** Oud. Zitt. V. K. A. v. W. 1900, p. 295. — Oud. N. K. A. 3, II, 235. — Sacc. Syll. XVI, p. 871. — Wint. Kr. Fl. VII, 801. — Tiges de l'*Euphorbia Lathyris*.

58. **Phoma exigua** (Desm.) Sacc. Syll. III, 134. — Wint. Kr. Fl. VI, 302. — Oud. Arch. Néerl. VIII, 357 (. . .nm); id. N. K. A. 2, I, 167 (. . .nm). — Moëlle de Sureau (*Sambucus nigra*).

59. **Phoma fimicola** (West.) — Sacc. Syll. III, 169. — Wint. Kr. Fl. VI, 379. — Sphaeropsis fimicola West. Not. V, 20 et Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 89. — Bouse de vache.

60. **Phoma Forsythiae** Cooke. — N. K. A. 3, II, 235. — Sacc. Syll. X, 147. — Wint. Kr. Fl. VI, 211. — Ram. du *Forsythia viridissima*.

61. **Phoma foveolaris** (Fr.) Sacc. Syll. III, 72. — Wint. Kr. Fl. VI, 209. — N. K. A. 2, V, 170 et 2, VI, 596. — Ram. de l'*Evonymus europaea*.

62. **Phoma Frangulae** Oud. Hedw. XXXVII (1898) p. 314; id. Zitt. V. K. A. v. W. 1900, p. 295; id. N. K. A. 3, II, 236. — Sacc. Syll. XVI, 857. — Wint. Kr. Fl. VII, 823. — Ram. du *Frangula Alnus* (Rh. Frangula).

63. **Phoma Fraxinifolii** Allescher dans Wint. Kr. Fl. VI, 174. — Sacc. Syll. XIV, 869. — N. K. A. 3, II, 236 et 738. — Ram. du *Negundo fraxinifolia*.

64. **Phoma fuscata** (Bon.) Sacc. Syll. III, 123. — Wint. Kr. Fl. VI, 285. — Oud. N. K. A. 3, I, 487. — Tiges mortes du *Dahlia variabilis*.

65. **Phoma Gleditschiae** (Thüm.) Sacc. Syll. III, 66. — Wint. Kr. Fl. VI, 214. — N. K. A. 3, II, 236. — Épines du *Gleditschia triacanthos*.

66. **Phoma graminis** West. — Oud. N. K. A. 2, III, 150. — Sacc. Syll. III, 167. — Wint. Kr. Fl. VI, 338. — Tiges du *Poa nemoralis*.

67. **Phoma Grossulariae** Schulz et Sacc. dans Sacc. Syll. III, 88. — Wint. Kr. Fl. VI, 239. — N. K. A. 2, III, 150 et 3, II, 237. — Ram. du *Ribes Grossularia*.

68. **Phoma Halesiae** Oud. Zitt. V. K. A. v. W. 1900, p. 295. — Ph. Hamamelidis Oud. N. K. A. 3, I, 487. — Ram. du *Halesia tetraptera*.

69. **Phoma Hamamelidis** Oud. N. K. A. 3, I, 487. — Voir: *Ph. Halesiae.*

70. **Phoma herbarum** West, — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 94; N. K. A. 2, VI, 595 et 3, II, 237. — Sacc. Syll. III, 133. — Wint. Kr. Fl. VI, 329. — Tiges de plusieurs plantes herbacées (*Rubus idaeus*; in Oud. Fgi Neerl. exs. n° 283).

71. **Phoma hysterella** Sacc. Syll. III, 102. — Wint. Kr. Fl. VI, 251. — Oud. N. K. A. 3, II, 889. — F. du *Taxus baccata.*

72. **Phoma Idaei** Oud. Zitt. V. K. A. v. W. 1900, p. 295. — N. K. A. 3, II, 237. — Sacc. Syll. XVI, 860. — Wint. Kr. Fl. VII, 824. — Ram. du *Rubus idaeus.*

73. **Phoma incrustans** Sacc. Syll. III, 119. — Wint. Kr. Fl. VI, 273. — N. K. A. 2, VI, 39 et 595. — Tige d'une Crucifère.

74. **Phoma inexpectata** Oud. Hedw. 1898, p. 176; id. Zitt. V. K. A. v. W. 1900, p. 295; N. K. A. 3, I, 487. — Sacc. Syll. XVI, 875. — Wint. Kr. Fl. VII, 783. — Aiguilles de l'*Abies alba.*

75. **Phoma inopinata** Oud. Hedw. 1898, p. 177; Zitt. V. K. A. v. W. 1900, p. 295; N. K. A. 3, I, 488. — Sacc. Syll. XVI, 875. — Wint. Kr. Fl. VII, 818. — Aiguilles du *Pinus Strobus.*

76. **Phoma insularis** Cooke et Massee. — N. K. A. 3, II, 238. — Sacc. Syll. X, 149. — Ram. de l'*Aucuba japonica.*

77. **Phoma intermedia** Sacc. Syll. III, 131. — Wint. Kr. Fl. VI, 319. — N. K. A. 2, VI, 598; Oud. N. K. A. 3, I, 488. — Tiges du *Saponaria officinalis.*

78. **Phoma japonica** Sacc. Syll. III, 78. — Wint. Kr. Fl. VI, 218. — N. K. A. 2, VI, 597 et 3, II, 331. — Ram. du *Kerria japonica.*

79. **Phoma juglandina** (Fuck.) Sacc. Syll. III, 96. — Wint. Kr. Fl. VI, 217. — N. K. A. 2, VI, 595. — Ram. du *Juglans regia.*

80. **Phoma lagenicola** Sacc. Syll. III, 149. — Wint. Kr. Fl. VI, 299. — Oud. N. K. A. 2, VI, 290. — Fruits du *Lagenaria clavata.*

81. **Phoma Landeghemiae** (Nke) Sacc. Syll. III, 71. — Wint. Kr. Fl. VI, 230. — N. K. A. 2, VI, 38 et p. 595. — Ram. du *Philadelphus coronarius.*

82. **Phoma Laricis** Lév. — Zitt. V. K. A. v. W. 1900, p. 295; id. N. K. A. 3, II, 238. — Sacc. Syll. III 169. — Wint. Kr. Fl. VII, 809. — Ram. du *Larix decidua.*

***Phoma Laureolae** Desm. — N. K. A. 2, I, 167. — Voir: *Phyllosticta.*

83. **Phoma leguminum** West. — Sacc. Syll. III, 147. — Wint. Kr. Fl. VI, 187. — N. K. A. 2, VI, 596 et 3, II, 238. — Gousses du *Phaseolus compressus.*

*__Phoma Letendrei__ Sacc. Syll. III, 146. — Oud. N. K. A. 3, I, 488. — Voir: *Phyllosticta.*

84. __Phoma ligustrina__ Sacc. Syll. III, 98. — Wint. Kr. Fl. VI, 220. — N. K. A. 2, V, 190 et 2, VI, 597. — Ram. du *Ligustrum vulgare.*

85. __Phoma Liliaccarum__ West. — N. K. A. 3, II, 239. — Sacc. Syll. III, 158. — Wint. Kr. Fl. VI, 335. — Tiges du *Fritillaria persica.*

86. __Phoma lineolata__ (Desm.) Sacc. Syll. III, 150. — Wint. Kr. Fl. VI, 200. — N. K. A. 3, I, 239; Oud. ibid. p. 488. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 94 (...tum). — Écailles séminifères du *Larix decidua.*

87. __Phoma Lingam__ (Tode) Desm. — N. K. A. 3, II, 239. — Sacc. Syll. III, 119. — Wint. Kr. Fl. VI, 272. — Tiges pourries du *Cheiranthus Cheiri.*

88. __Phoma lirelliformis__ Sacc. var. __Viburni__ Brun. — Oud. N. K. A. 3, II, 738. — Sacc. Syll. X, 144. — Wint. Kr. Fl. VI, 257. — Ram. du *Viburnum Opulus.*

89. __Phoma longissima__ (P.) West. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 92; N. K. A. 2, VI, 39 et p. 596; Oud. Fgi Neerl. exs. n° 83. — Sacc. Syll. II, 125. — Wint. Kr. Fl. VI, 269. — Tiges d'une espèce de *Chenopodium* et du *Rumex Acetosa.*

90. __Phoma lusitanica__ Thüm. — Oud. N. K. A. 3, I, 488. — Sacc. Syll. III, 124. — Wint. Kr. Fl. VI, 279. — Tiges du *Centaurea nigra.*

91. __Phoma Lycii__ Sacc. Syll. III, 88. — Wint. Kr. Fl. VI, 222. — N. K. A. 3, I, 238; Oud. ibid. p. 488. — Tiges du *Lycium halimifolium* (= L. barbarum Auct.)

92. __Phoma Malvaccarum__ West. — Oud. Versl. Meded. K. A. v. W. 2, XVIII, 373; Oud. N. K. A. 2, IV, 234. — Sacc. Syll. III, 122. — Wint. Kr. Fl. VI, 263. — Tiges de l'*Althaea rosea.*

93. __Phoma melaena__ (Fr.) Mont. et Durieu. — Oud. N. K. A. 3, II, 739. — Sacc. Syll. III, 135. — Wint. Kr. Fl. VI, 208. — Tiges du *Silene inflata.*

94. __Phoma Mespili__ Oud. N. K. A. 2, V, 38. — Sacc. Syll. XI, 184. — Wint. Kr. Fl. VI, 225. — Ram. du *Mespilus germanica.*

*__Phoma Mirbelii__ Anersw. — N. K. A. 2, IV, 528. — Voir: *Macrophoma.*

*__Phoma Mori__ Mont. — N. K. A. 2, II, 36. — Voir: *Aposphaeria.*

95. __Phoma mororum__ Sacc. Syll. III, 95. — Wint. Kr. Fl. VI, 225. — N. K. A. 3, II, 240. — Ram. du *Morus alba.*

96. **Phoma mutica** (B. Br.) Sacc. Syll. III, 98. — Wint. Kr. Fl. VI, 177. — Sphaeropsis mutica B. Br. — Oud. Arch. Néerl. VIII (1873), 358; id. N. K. A. 2, I, 253. — Ram. du *Sambucus nigra.*

97. **Phoma nebulosa** (P.) Sacc. Syll. III, 135. — Wint. Kr. Fl. VI, 304. — Oud. Arch. Néerl. VIII (1873), 358 (...sum); id. N. K. A. 2, I, 167 (...sum). — Tiges de l'*Allium magicum.*

98. **Phoma Negundinis** Oud. Zitt. V. K. A. v. W. 1900, p. 148 et 295. — Sacc. Syll. XVI, 853. — Wint. Kr. Fl. VII, 815. — Ram. du *Negundo fraxinifolia.*

99. **Phoma nidulans** Grogn. et Sacc. — Sacc. Syll. III, 80. — Wint. Fr. Fl. VI, 179. — N. K. A. 2, V, 490 et 2, VI, 597. — Ram. de l'*Ampelopsis quinquefolia.*

***Phoma nitida** Rob. — N. K. A. 2, VI, 598. — Voir: *Phyllosticta.*

100. **Phoma oblonga** Desm. — Oud. Arch. Néerl. VIII, 359 (...gum); N. K. A. 2, I, 167 (...gum) et 2, VI, 597. — Sacc. Syll. III, 99. — Wint. Kr. Fl. VI, 256. — Ram. de l'*Ulmus campestris.*

101. **Phoma occidentalis** Sacc. Syll. III, 66. — Wint. Kr. Fl. VI, 214. — N. K. A. VI, 290, 595 et 599. — Ram. du *Gleditschia triacanthos.*

102. **Phoma oenotherella** Sacc. Syll. III, 134. — Wint. Kr. Fl. VI, 308. — Oud. N. K. A. 3, I, 489. — Fruits de l'*Oenothera biennis.*

103. **Phoma oenothericola** Oud. Zitt. V. K. A. v. W. 1900, p. 296; N. K. A. 3, II, 240. — Sacc. Syll. XVI, 854. — Wint. Kr. Fl. VII, 815. — Fruits de l'*Oenothera biennis.*

104. **Phoma oleracea** var. **Scrophulariae** Sacc. Syll. III, 135. — Wint. Kr. Fl. VI, 274. — N. K. A. 3, II, 889. — Tiges d'une espèce de *Scrophularia.*

105. **Phoma Onagraceanum** Cooke. — Sacc. Syll. X, 179. — Wint. Kr. Fl. VI, 291 et 309. — Tiges de l'*Epil. roseum.*

106. **Phoma oncostoma** Thüm. — Oud. N. K. A. 2, V, 169. — Sacc. Syll. III, 69. — Wint. Kr. Fl. VI, 239. — Ram. du *Robinia Pseudo-Acacia.*

107. **Phoma Opuli** Thüm. — N. K. A. 2, VI, 38 et p. 595. — Sacc. Syll. III, 115. — Ram. du *Viburnum Opulus.*

108. **Phoma palina** (Fr.) Sacc. Syll. III, 197. — Wint. Kr. Fl. VI, 245. — N. K. A. 2, V, 489 et 2, VI, 596. — Ram. d'une espèce de *Salix.*

109. **Phoma pallor** (Berk.) Oud. N. K. A. 3, III, 1112. —

Phyllosticta pallor Oud. N. K. A. 2, IV, 486. — Tiges du *Rubus idaeus*.

110. **Phoma Paulowniae** Thüm. — Oud. N. K. A. 3, II, 739. — Sacc. Syll. III, 92. — Wint. Kr. Fl. VI, 229. — Ram. du *Paulownia imperialis*.

111. **Phoma Persicae** Sacc. Syll. III, 74. — Wint. Kr. Fl. VI, 229. — N. K. A. 2, V, 490 et 2, VI, 598. — Ram. du *Persica vulgaris*.

112. **Phoma persicicola** Oud. N. K. A. 3, II, 889. — Ram. du *Persica vulgaris*.

113. **Phoma petiolorum** Roberge. — Arch. Néerl. VIII (1873), 358; N. K. A. 2, I, 167; 2, III, 253 et 2, VI, 597. — Sacc. Syll. III, 103. — Wint. Kr. Fl. VI, 241. — Ram. et pétioles du *Cytisus Laburnum;* ram. du *Fraxinus excelsior* var. *pendula*.

114. **Phoma Phaseoli** Desm. — Oud. Arch. Néerl. II, (1867), 37. — Sacc. Syll. III, 120. — Wint. Kr. Fl. VI, 312. — Tige du *Phaseolus vulgaris*.

115. **Phoma phyllostictoides** Desm. — Arch. Néerl. II (1867), 37; N. K. A. 3, II, 241. — Sacc. Syll. III, 147. — Wint. Kr. Fl. VI, 192. — Fruits du *Colutea arborescens* et du *Robinia Pseudo-Acacia*.

116. **Phoma Pinastri** (Oud.) Sacc. Syll. III, 150. — Wint. Kr. Fl. VI, 197. — Coniothyrium Pinastri Oud. N. K. A. 2, III, 149. — Ecailles séminifères du *Pinus Pinaster*.

117. **Phoma Pini** (Desm.) Sacc. Syll. III, 101. — Wint. Kr. Fl. VI, 193. — Oud. N. K. A. 3, I, 489. — Aiguilles du *Picea excelsa*.

118. **Phoma pitya** Sacc. Syll. III, 73. — Wint. Kr. Fl. VI, 196. — Oud. N. K. A. 3, I, 189. — Aiguilles du *Pinus silvestris*.

119. **Phoma planiuscula** Sacc. Syll. III, 99. — Wint. Kr. Fl. VI, 241 et 256. — N. K. A. 2, VI, 597. — Phoma depressa Oud. Arch. Néerl. VIII (1873), 357, sous 92), et N. K. A. 2, I, 167. — Ram. du *Robinia Pseudo-Acacia*.

120. **Phoma platanoides** Cooke. — N. K. A. 2, V, 489 et 2, VI, 595. — Sacc. Syll. X, 151. — Wint. Kr. Fl. VI, 173. — Ram. de l'*Acer Pseudo-Platanus*.

***Phoma Podagrariae** West. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 95. — Voir: *Phyllachora*.

121. **Phoma polygramma** (Fr.) Sacc. III, 130. — Wint. Kr. Fl. VI, 270. — Oud. N. K. A. 3, II, 739. — Tiges sèches du *Ballota nigra*.

122. **Phoma Pruni** Peck. — N. K. A. 3, II, 242. — Sacc.

Syll. X, 143. Wint. Kr. Fl. VI, 235. — Ram. du *Prunus Pissardi.*

123. **Phoma Pruni lusitanicae** Cooke. — N. K. A. 2, VI, 38 et p. 595. — Sacc. Syll. X, 141. — Wint. Kr. Fl. VI, 234. — Ram. du *Prunus lusitanica.*

124. **Phoma Pseudacaciae** Sacc. Syll. III, 69. — Wint. Kr. Fl. VI, 240. — N. K. A. 2, V, 488; 2, VI, 597 et 3, I, 489. — Ram. du *Robinia Pseudo-Acacia.*

125. **Phoma Pteleae** Oud. Beibl. bot. Centralbl. 1902. — Phoma samararum f^t. Pteleae Oud. N. K. A. 3, II, 740. — Fruits du *Ptelea trifoliata.*

126. **Phoma pulla** Sacc. Syll. III, 87. — Wint. Kr. Fl. VI, 215. — N. K. A. 2, V, 490 et 2, VI, 598. — Ram. du *Hedera Helix.*

127. **Phoma pusilla** Schulz et Sacc. dans Sacc. Syll. III, 77. — Wint. Kr. Fl. VI, 242. — Oud. N. K. A. 3, II, 740. — Ram. d'une espèce de *Rosa.*

***Phoma Pustula** Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 92. — Voir: *Hyposphila.*

128. **Phoma pustulata** Sacc. Syll. III, 91. — Wint. Kr. Fl. VI, 172. — N. K. A. 2, V, 489 et 2, VI, 595. — Ram. de l'*Acer Pseudo-Platanus.*

129. **Phoma quernea** Oud. N. K. A. 3, I, 189; id. Zitt. V. K. A. v. W. 1900, p. 296. — Sacc. Syll. XVI, 873. — Wint. Kr. Fl. VII, 822. — Ram. du *Quercus Robur.*

130. **Phoma Radula** B. Br. — Oud. N. K. A. 2, III, 150; Fgi Neerl. exs. n° 185. — **Diplodia acerina** Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 86 (pour ce qui concerne les rameaux du *Platanus orientalis*). Sacc. Syll. III, 94. — Wint Kr. Fl. VI, 233. — Ram. du *Platanus orientalis.*

***Phoma Ralfsii** B. et Br. — Sacc. N. K. A. 2, VI, 599. — Voir: *Phyllosticta.*

131. **Phoma ramealis** Desm. — Arch. Néerl. II (1867), 37 (... le); N. K. A. 2, VI, 596. — Sacc. Syll. 71. — Wint. Kr. Fl. VI, 208. — Ram. de l'*Evonymus europaea.*

132. **Phoma Resedae** Oud. Beibl. bot. Centrbl. 1902. — Id. N. K. A. 3. II, 740. — Tiges du *Reseda odorata.*

133. **Phoma revellens** Sacc. Syll. III, 99. — Wint. Kr. Fl. VI, 202. — N. K. A. 2, IV, 526; 2, V, 490 et 2, VI, 596. — Ram. du *Corylus Avellana.*

134. **Phoma Rhododendri** Cooke. — N. K. A. 2, V, 489 et 2, VI, 595. — Sacc. Syll. Addit. ad Vol. I—IV, 296, et Syll. X, 148. — Ram. d'une espèce arborescente de *Rhododendron.*

135. **Phoma Rhodotypi** P. Henn. dans Sacc. Syll. XVI (1899), 860. — Wint. Kr. Fl. VII, 823. — Oud. N. K. A. 3, II, 890 (1902). — Pédoncules du *Rhodotypus kerrioides*.

136. **Phoma ribesia** Sacc. Syll. III, 88. — Wint. Kr. Fl. VI, 238. — N. K. A. 2, VI, 596. — Ram. du *Ribes Grossularia*.

***Phoma rimosa** West. — Sacc. Syll. III, 165. — N. K. A. 2, VI, 598. — Voir: *Phyllosticta*.

137. **Phoma Rosae** (Schulz et Sacc.) Sacc. Syll. III, 76. — Wint. Kr. Fl. VI, 242. — N. K. A. 3, II, 242. — Ram. du *Rosa polyantha*.

138. **Phoma Ruborum** West. — Prodr. Fl. Bat. II. 4, p. 95; Oud. N. K. A. 2, VI, 290 et 3, I, 489. — Sacc. Syll. III, 76. — Wint. Kr. Fl. VI, 244. — Ram. du *Rubus idaeus*.

139. **Phoma rudis** Sacc. Syll. III, 68. — Wint. Kr. Fl. VI, 203. — N. K. A. 2, V, 488 et 2, VI, 595. — Ram. du *Cytisus Laburnum*.

140. **Phoma Rijckholtii** Sacc. Syll. III, 70. — Wint. Kr. Fl. VI, 250. — N. K. A. 2, IV, 525 et 2, VI, 597. — Ram. du *Symphoricarpus racemosus*.

141. **Phoma Saccardoi** Oud. Zitt. V. K. A. v. W. 1900, p. 296; id. N. K. A. 3, II, 242. — Phoma Sambuci Oud. N. K. A. 2, VI, 290. — Ram. du *Sambucus nigra*.

142. **Phoma salicella** Oud. Zitt. V. K. A. v. W. 1900, p. 297; N. K. A. 3, I, 490. — Phoma salicina Sacc. et Roum. Reliq. Libert, V, n° 63. — Ram. du *Salix cinerea*.

143. **Phoma Salisburyae** Oud. Zitt. V. K. A. v. W. 1900, p. 297; id. N. K. A. 3, II, 243. — Sacc. Syll. XVI, 876. — Wint. Kr. Fl. VII, 825. — Ram. du *Salisburya adianthifolia*.

144. **Phoma Salviae** Brun. — N. K. A. 3, II, 243. — Sacc. Syll. X, 179. — Wint. Kr. Fl. VI, 318. — Tiges du *Salvia officinalis*.

145. **Phoma samararum** (Desm.) Fuck. — T. N. G. XII, 271 (... rorum); Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 95 (... rorum); N. K. A. 2, I, 94; 2, VI, 596; 3, II, 740; Oud. Herb. N. Pl. n° 485. — Sacc. Syll. III, 153. — Wint. Kr. Fl. VI, 213. — Fruits du *Fraxinus excelsior*.

146. **Phoma sambucella** Sacc. Syll. III, 71. — Wint. Kr. Fl. VI, 245. — N. K. A. 2, V, 188 et 2, VI, 597.

***Phoma Sambuci** Oud. N. K. A. 2, VI, 290. — Voir: *Ph. Saccardoi*.

147. **Phoma sambucina** Sacc. Syll. III, 71. — Wint. Kr. Fl. VI, 245. — N. K. A. 2, V, 170 et 2, VI, 596. Ramilles du *Sambucus nigra*.

148. **Phoma sambuciphila** Oud. — Phoma Sambuci Oud. N. K. A. 2, VI, 290. — Phoma vicina Desm. — Sacc. Syll. III, 71; Wint. Kr. Fl. VI, 246. — L'expression *Phoma Sambuci*, par nous proposée en 1902, pour remplacer celle de *Ph. vicina*, ne peut subsister en présence du fait que, dès 1885, feu le Prof. Passerini s'en fut servi dans le Journal d'Hist. nat. Bord., à la page 135 (Voir Sacc. Syll. X, 144). — Ram. du *Sambucus nigra*.

149. **Phoma Sanguineae** Oud. N. K. A. 3, II, 741. — Phoma sanguinea Oud. Beibl. z. bot. Centrbl. 1902. — Ram. du *Cornus sanguinea*.

150. **Phoma Sarothamni** Sacc. Syll. III, 68. — Wint. Kr. Fl. VI, 247. — N. K. A. 2, V, 488 et 2, VI, 595. — Ram. du *Sarothamnus scoparius*.

151. **Phoma Sempervirentis** Oud. Hedw. XXXVII (1890), p. 314; id. Zitt. V. K. A. v. W. 1900, p. 297; id. N. K. A. 3, II, 244. — Sacc. Syll. XVI, 869. — Wint. Kr. Fl. VII, 811. — Ram. du *Lonicera sempervirens*.

152. **Phoma siliquastrum** Desm. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 95. — Ph. Siliquastri Sacc. Syll. III, 68. — Wint. Kr. Fl. VI, 187. — Fruits d'une espèce de *Brassica*.

153. **Phoma silvatica** Sacc. Syll. III, 128. — Wint. Kr. Fl. VI, 306. — Oud. N. K. A. 3, II, 741. — Tiges du *Melampyrum silvaticum*.

154. **Phoma solanicola** Prill. et Delacr. — Oud. N. K. A. 3, I, 490. — Sacc. Syll. X, 175. — Wint. Kr. Fl. VI, 323. — Tiges du *Solanum nigrum*.

155. **Phoma solaniphila** Oud. Zitt. V. K. A. v. W. 1900, p. 297; id. N. K. A. 3, II, 241. — Sacc. Syll. XVI, 870. — Wint. Kr. Fl. VII, 827. — Tiges du *Solanum nigrum*.

156. **Phoma stictica** (B. Br.) Sacc. Syll. III, 89. — Wint. Kr. Fl. VI, 183. — N. K. A. 2, II, 180 (. . . cum) et 2, VI, 596. — Ram. du *Buxus sempervirens*.

157. **Phoma Spiraeae** Desm. — Oud. Arch. Néerl. VIII (1873), 358; id. N. K. A. 2, I, 167. — Sacc. Syll. III, 132. — Wint. Kr. Fl. VI, 324. — Tiges du *Spiraea Aruncus*.

158. **Phoma striaeformis** (Dur. et Mont.) Sacc. Syll. III, 131. — Wint. Kr. Fl. VI, 246. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 94. — Ram. du *Kerria japonica*.

159. **Phoma strobiligena** Desm. — Oud. N. K. A. 3, I, 490. — Sacc. Syll. III, 150. — Wint. Kr. Fl. VI, 197. — Écailles séminifères des *Pinus silvestris* et *Thuja occidentalis*.

160. **Phoma subcomplanata** Cooke et Massee. — Oud. N. K. A.

3, II, 741. — Sacc. Syll. X, 177. — Wint. Kr. Fl. VI, 296 et 297. — Tiges du *Heracleum Sphondylium*.

161. **Phoma subtilissima** Oud. Hedw. 1898, p. 315; id. Zitt. V. K. A. v. W. 1900, p. 297; N. K. A. 3, II, 244. — Sacc. Syll. XVI, 863. — Wint. Kr. Fl. VII, 799. — Pédoncules du *Cytisus Laburnum*.

162. **Phoma syringina** Sacc. Syll. III, 82. — Wint. Kr. Fl. VI, 252. — Ram. du *Syringa vulgaris*.

***Phoma tabifica.** — Voir: *Phyllosticta*.

163. **Phoma Tamarisci** (Mont.) Sacc. Syll. III, 94. — Wint. Kr. Fl. VI, 253. — Oud. N. K. A. 3, II, 890. — Ram. du *Tamarix gallica*.

164. **Phoma tamariscina** Thüm. — N. K. A. 3, II, 245. — Sacc. Syll. III, 93. — Wint. Kr. Fl. VI, 253. — Ram. du *Tamarix gallica*.

165. **Phoma tatarica** Oud. Zitt. V. K. A. v. W. 1900, p. 297 (. . .lae); N. K. A. 3, II, 245 (. . .lae). — Sacc. Syll. XVI, 869. — Wint. Kr, Fl. VII, 810. — Ram. du *Lonicera tatarica*.

166. **Phoma taxicola** Oud. Hedw. 1894, p. 18; N. K. A. 2, VI, 290 et 598. — Sacc. Syll. XI, 487. — Wint. Kr. Fl. VI, 254. — Ram. du *Taxus baccata*.

167. **Phoma thalictrina** Sacc. et Malbr. Mich. II, 617; Sacc. Syll. III, 118; Wint. Kr. Fl. VI, 324. — Tiges du *Thalictrum flavum*.

168. **Phoma thujana** Thüm. — Oud. N. K. A. 3, II, 890. — Sacc. Syll. III, 102. — Ram. du *Thuja gigantea*.

169. **Phoma thyrsiflorae** Oud. Zitt. V. K. A. v. W. 1900, 298; id. N. K. A. 3, II, 246. — Sacc. Syll. XVI, 870. — Wint. Kr. Fl. VII, 811. — Tiges du *Lysimachia thyrsiflora*.

170. **Phoma Tiliae** Oud. Zitt. V. K. A. v. W. 1900, p. 146. — Sacc. Syll. XVI, 858. — Wint. Kr. Fl. VII, 830. — Ram. du *Tilia cordata*.

171. **Phoma Trachelii** Allescher Allgem. bot. Zeits. 1895, n° 2; Wint. Kr. Fl. VI, 277. — Sacc. Syll. XI, 491. — Oud. N. K. A. 3, III, 1113. — Tige du *Campanula Medium*.

172. **Phoma Triacanthi** Oud. Zitt. V. K. A. v. W. 1900, p. 298; id. N. K. A. 3, II, 246. — Sacc. Syll. XVI, 865. — Wint. Kr. Fl. VII, 804. — Épines du *Gleditschia triacanthos*.

***Phoma Typhae.** — Voir: *Phyllosticta*.

173. **Phoma typhicola** Oud. Zitt. V. K. A. v. W. 1900, p. 298; id. N. K. A. 3, II, 246. — Sacc. Syll. XVI, 878. — Wint. Kr. Fl. VII, 831. — Tiges du *Typha latifolia*.

174. **Phoma Urticae** Schulz et Sacc. dans Sacc. Syll. III, 140. —

Wint. Kr. Fl. VI, 326. — N. K. A. 2, V, 170 et 2, VI, 594. — Tiges des *Urtica*.

177. **Phoma velata** Sacc. Syll. III, 92. — Wint. Kr. Fl. VI, 255. — N. K. A. 2, V, 489 et 2, VI, 596. — Ram. du *Tilia cordata*.

178. **Phoma venenosa** Sacc. Syll. III, 127. — Wint. Kr. Fl. VI, 286. — Oud. N. K. A. 2, V, 490; ibid. 2, VI, 596 et 3, I, 238. — Tiges et ram. du *Datura Stramonium*.

179. **Phoma verbasicola** (Schwein.) Cooke. — Oud. N. K. A. 3, II, 890. — Sacc. Syll. III, 129. — Wint. Kr. Fl. VI, 327. Tiges du *Verbascum Thapsus*.

180. **Phoma viburnicola** Oud. Zitt. V. K. A. v. W. 1900, p. 298; id. N. K. A. 3, II, 247. — Sacc. Syll. XVI, 869. — Wint. Kr. Fl. VII, 831. — Ram. du *Viburnum oxycoccos*.

***Phoma vicina** Desm. — Oud. N. K. A. 3, I, 191. — Sacc. Syll. III, 71. — Wint. Kr. Fl. VI, 246. — Ram. du *Sambucus nigra*. — Voir: *Ph. sambuciphila*.

181. **Phoma viridarii** Sacc. Syll. III, 89. — Wint. Kr. Fl. VI, 224. — N. K. A. 2, VI, 597. — Ram. du *Magnolia grandiflora*.

182. **Phoma Vitis** Bon. — Oud. Arch. Néerl. VIII (1873), 358. — id. N. K. A. 2, I, 167. — Sacc. Syll. III, 79. — Wint. Kr. Fl. VI, 259. — Ram. du *Vitis vinifera*.

183. **Phoma Weigeliae** Speg. — Oud. N. K. A. 3, I, 491. — Sacc. Syll. III, 70. — Wint. Kr. Fl. VI, 260. — Capsules du *Weigelia amabilis*.

184. **Phoma Wellingtoniae** Oud. N. K. A. 3, III, 1113. — Ram. du *Wellingtonia gigantea*.

185. **Phoma Zopfii** Alles. Hedw. XXXIII (1894), 123. — Oud. N. K. A. 3, I, 491. — Sacc. Syll. XI, 489. — Ph. Zopfiana Alles. dans Wint. Kr. Fl. VI, 309. — Ram. de l'*Ononis spinosa*.

MACROPHOMA.

1. **Macrophoma acuaria** (Cooke) Berl. et Vogl. dans Sacc. Syll. Addit. ad vol. I—IV, 313; Sacc. Syll. X, 202. — Wint. Kr. Fl. VI, 371. — Oud. N. K. A. 3, II, 887. — Phoma acuaria Sacc. Syll. III, 100. — Aiguilles du *Pinus silvestris*.

2. **Macrophoma Candollei** (B. Br.) Berl. et Vogl. dans Sacc. Syll. Addit. ad vol. I—IV, 308; Sacc. Syll. X, 194. — Wint. Kr. Fl. VI, 358. — Phoma Candollei B. Br. — Oud. N. K. A. 2, IV, 526. — F. du *Buxus sempervirens*.

3. **Macrophoma Capsellae** Oud. Zitt. V. K. A. v. W. 1900, p.

298. — Sacc. Syll. XVI, 880. — Wint. Kr. Fl. VII, 834. — F. du *Capsella Bursa pastoris.*

1. **Macrophoma Caricis** (Fr.) Berl. et Vogl. dans Sacc. Syll. Addit. ad vol. I—IV, 311; Sacc. Syll. X. 205; Wint. Kr. Fl. VI. 360. — Phoma Caricis (Fr.) Sacc. Syll. III, 64. — Oud. N. K. A. 2, VI, 39; ibid. p. 597. — F. d'une espèce de *Carex.*

5. **Macrophoma Chenopodii** Oud. Beibl. z. bot. Centralbl. 1902; id. N. K. A. 3, II, 733. — F. du *Chenopodium rubrum.*

6. **Macrophoma cornina** (Peck) Sacc. Syll. X, 192. — Oud. N. K. A. 3, II, 733. — Ram. du *Cornus stricta.*

7. **Macrophoma corylina** (Thüm.). — Berl. et Vogl. dans Sacc. Syll. Addit. ad vol. I—IV, 307; Sacc. Syll. X, 90. — Wint. Kr. Fl. VI, 362. — Oud. N. K. A. 3, II. 733. Phoma corylina Sacc. Syll. III, 99. — Ram. du *Corylus Avellana.*

8. **Macrophoma fimicola** (West.) Berl. et Vogl., dans Sacc. Syll. Addit. ad vol. I—IV, 310; Sacc. Syll. X, 198. — Wint. Kr. Fl, VI, 379. — Phoma fimicola (West.) — Sacc. Syll. III, 169. — Sphaeropsis fimicola West. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 89. — Bouse de vache desséchée.

9. **Macrophoma Grossulariae** Oud. N. K. A. 3, II, 888. — Ram. du *Ribes Grossularia.*

10. **Macrophoma Ilicis** Oud. Zitt. V. K. A. v. W. 1900, p. 299; id. N. K. A. 3, II, 247. — F. de l'*Ilex Aquifolium.*

11. **Macrophoma Mirbelii** (Moug.) Berl. et Vogl. dans Sacc. Syll. Addit ad vol. I—IV, 308; Sacc. Syll. X, 194. — Phoma Mirbelii Anersw. — Oud. N. K. A. 2, IV, 528. — Sacc. Syll. III, 105. — Wint. Kr. Fl. VI, 358. — F. du *Buxus sempervirens.*

f^a **ramicola** Oud. N. K. A. 3, II, 734. — Ram. de la même plante.

APOSPHAERIA.

1. **Aposphaeria acuta** Berk. — Oud. N. K. A. 3, II, 721. — Tige d'une plante herbacée inconnue.

***Aposphaeria complanata** Berk. — Oud. Herb. N. Pl. n° 484. — Voir: *Phoma.*

2. **Aposphaeria humicola** Oud. Beibl. z. bot. Centralbl. 1902; id. N. K. A. 3, II, 721. — Sur gélatine préparée.

3. **Aposhaeria Mori** (Mont.) Sacc. Syll. III, 174. — Wint. Kr. Fl. VI, 388. — Phoma Mori Mont. — Oud. N. K. A. 2, II, 36. — Ram. de *Morus alba.*

4. **Aposphaeria rostrata** Oud. Beibl. z. bot. Centralbl. 1902. — N. K. A. 3, II, 879. — Tige d'une plante herbacée inconnue.

DENDROPHOMA.

1. **Dendrophoma pruinosa** (Fr.) Sacc. Syll. III, 179. — Wint. Kr. Fl. VI. 403. — Oud. N. K. A. 3, 1, 491. — Ram. du *Ligustrum vulgare*.

SCLEROTIOPSIS.

1. **Sclerotiopsis Cheiri** Oud. Versl. Med. K. A. v. W. 3, VII (1890), 315; id. N. K. A. 2, VI, 39. — Sacc. Syll. X, 213. — Wint. Kr. Fl. VI, 416. — Tiges du *Cheiranthus Cheiri*.

2. **Sclerotiopsis pityophila** (Cda) Oud. Zitt. V. K. A. v. W. 1900, p. 300; N. K. A. 3, II, 247. — Sacc. Syll. XVI, 887. — Phoma pith. Sacc. Syll. III. 101. — Wint. Kr. Fl. VI, 199. — Aiguilles du *Pinus silvestris*.

3. **Sclerotiopsis Potentillae** Oud. Zitt. V. K. A. v. W. 1900, p. 299; N. K. A. 3, II, 248. — Sacc. Syll. XVI, 887. — Wint. Kr. Fl. VII, 847. — F. du *Potentilla procumbens*.

PLENODOMUS.

1. **Plenodomus gallarum** Oud. N. K. A. 2, IV, 229; Zitt. V. K. A. v. W. 1896, 28 Nov. p. 229. — Sacc. Syll. XIV, 898. — Wint. Kr. Fl. VII, 847. — Dothiora gallarum Oud. Versl. Med. K. A. v. W. 2, XVIII, 371. — Noix de gale tombées des feuilles du *Quercus Robur*, longtemps après leur chute.

MYCOGALA.

1. **Mycogala parietinum** (Schrad.) Sacc. Syll. III, 185. — Wint. Kr. Fl. VI, 419. — Lycogala pariet. Fr. — T. N. G. XI, 398; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 24. — Papier et bois, en train de décomposition.

SPHAERONAEMA.

***Sphaeronema Anemones** Lib. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 89. — Voir: *Synchytrium*.

***Sphaeronema Ari** Dozij et Molk. — N. K. A. 1, I, 52. — Est f. spermogonium ad. *Aecidium Ari*.

1. **Sphaeronaema conicum** (Tode) Fr. — T. N. G. XI, 396; Prodr. Fl. Bat. II, p. 89. — Sacc. Syll. III, 194. — Wint. Kr. Fl. VI, 425. — Tiges de plantes herbacées robustes.

2. **Sphaeronaema cylindricum** (Tode) Fr. — Prodr. Fl. Bat II, 4, p. 89. — Sacc. Syll. III, 190. — Wint. Kr. Fl. VI, 436. — Bois ramolli des Saules (*Salix*).

3. **Sphaeronaema Fagi** Oud. N. K. A. 3, II, 775; id. Arch. Néerl. 2, VII, 281. — F. du *Fagus silvatica* pourrissantes.

4. **Sphaeronaema truncatum** Fr. — T. N. G. XI, 396. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 89. — Sacc. Syll. III, 193. — Wint. Kr. Fl. VI, 429. — Bois ramolli des Pins et Sapins (*Pinus Abies* et *Picea*).

ASTEROMA.

1. **Asteroma atratum** Chev. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 118. — Sacc. Syll. III, 212. — Wint. Kr. Fl. VI, 452. — F. d'une espèce de *Scabiosa*.

2. **Asteroma Betulae** Rob. et Desm. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 118. — Sacc. Syll. III, 208. — Wint. Kr. Fl. VI, 454. — F. du *Betula verrucosa*.

3. **Asteroma Brassicae** Chev. — T. N. G. XII, 272; N. K. A. 3, II, 248. — Sacc. Syll. III, 209. — Wint. Kr. Fl. VI, 455. — F. du *Brassica oleracea*.

4. **Asteroma delicatulum** Desm. — Prod. Fl. Bat. II, 4, p. 119. — Sacc. Syll. III, 213. — Wint. Kr. Fl. VI, 458. — Fruits du *Lunaria rediviva*.

5. **Asteroma geographicum** (D. C.) Desm. — Sacc. Syll. III, 202. — Wint. Kr. Fl. VI, 472. — Dothidea geographica Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 72. — F. mortes du *Pirus Malus*.

6. **Asteroma graminis** West. dans Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 119; N. K. A. 3, II, 249. — Sacc. Syll. III, 215. — Wint. Kr. Fl. VI, 153. — F. et chaumes du *Psamma littoralis* (Ammophila arenaria).

7. **Asteroma Hederae** (Desm. Exs. 2e Série n° 774). — Asterina Hederae Desm. — Oud. N. K. A. 2, III, 154. — F. du *Hedera Helix*.

8. **Asteroma Mali** Desm. — N. K. A. 3, II, 249. — Sacc. Syll. III, 206. — Wint Kr. Fl. VI, 467. — F. du *Pirus Malus*.

9. **Asteroma Populi** Rob. et Desm. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 119. — N. K. A. 3, II, 250. — Sacc. Syll. III, 208. — Wint. Kr. Fl. VI, 170. — F. du *Populus Tremula*.

10. **Asteroma reticulatum** (D. C.) Chev. — Sacc. Syll. III, 214. — Wint. Kr. Fl. VI, 458. — Dothidea Asteroma Fr. — T. N. G. XI, 396. — F. du *Convallaria majalis*.

11. **Asteroma Rosae** Lib. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 120. — Voir: *Actinonema*.

12. **Asteroma Ulmi** (Chev.) Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 120. — F. de l'*Ulmus campestris.*

13. **Asteroma vernicosum** (D. C.) Fuck. — Oud. Arch. Néerl. VIII (1873), 366; id. N. K. A. 2, I, 169. — Sacc. Syll. III, 211. — Wint. Kr. Fl. VI, 475. — Dothidea vernicosa Fl. Bat. II, 4, p. 70. — Tiges des *Spiraea Ulmaria* et *Anthriscus silvestris.*

CICINNOBOLUS.

1. **Cicinnobolus Cesatii** de Bary. — N. K. A. 3, II, 250. — Sacc. Syll. III, 216. — Wint. Kr. Fl. VI, 481. — Mycélium de l'*Oidium erysiphoides*, sur plusieurs plantes.

2. **Cicinnobolus Plantaginis** Oud. N. K. A. 2, V, 490; ibid. VI, 599. — Sacc. Syll. X, 220. — Wint. Kr. Fl. VI, 481. — Mycélium de l'*Oidium erysiphoides*, parasitant sur les f. du *Plantago major.*

SELENIA.

1. **Selenia perforans** Oud. Rév. II, 218. — *Sphaeria perforans* Rob.

* * Setosae.

PYRENOCHAETA.

1. **Pyrenochaeta Berberidis** (Sacc.) Brun. Liste des Sphaerops. (1886), 23. — Sacc. Syll. XI, 503. — Wint. Kr. Fl. 486. — Phoma Berberidis Sacc. Syll. III, 72. — Wint. Kr. Fl. VI 181. — N. K. A. 2, 488 et VI, 597. — Ram. du *Berberis vulgaris.*

2. **Pyrenochaeta humicola** Oud. Herbier. — Sur gélatine préparée. — Laboratoire de Mr. le Prof. Beyerinck à Delft.

VERMICULARIA.

1. **Vermicularia acuum** Oud. N. K. A. 2, IV, 528. — Sacc. Syll. X, 225. — Wint. Kr. Fl. VI, 491. — Aiguilles du *Picea excelsa.*

2. **Vermicularia Chenopodii** West. Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 112. — Oud. N. K. A. 2, I, 168. — Sacc. Syll. III, 228. — Wint. Kr. Fl. VI, 498. — Tiges du *Chenopodium album.*

3. **Vermicularia compacta** Cooke et Ellis. — Oud. N. K. A. 3, II, 753. — Sacc. Syll. III, 222. — Tige du *Dahlia variabilis.*

4. **Vermicularia culmigena** Desm. — Oud. N. K. A. 2, VI, 11. — Sacc. Syll. III, 235. — Wint. Kr. Fl. VI, 501. — F. d'une Graminée.

5. **Vermicularia Dematium** Fr. — Prodr. Fl. Bat. II. 4. p. 112. — N. K. A. 2, I, 168 et 2, VI, 599. — Sacc. Syll. III, 225. — Wint. Kr. Fl. VI, 495. — Sphaeria Dem. T. N. G. XI, 394. — Tiges fanées de pl. herb. robustes.

***Vermicularia depazoides** West. in Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 114. — Voir: *Cercospora*.

6. **Vermicularia epixyla** Fr. — Oud. Arch. Néerl. VIII (1873) 363; id. K. K. A. 2, I, 169. — Sacc. Syll. III, 223. — Wint. Kr. Fl. VI, 494. — Bois ramolli.

7. **Vermicularia Eryngii** (P.) Desm. — Prodr. Fl. Bat. II. 4, p. 112. — Sacc. Syll. III, 227. — Wint. Kr. Fl. VI, 502. — Helminthosp. Er. Fr. — T. N. G. XI, 402. — Tiges de l'*Er. campestre*.

8. **Vermicularia graminicola** West. — Oud. Arch. Néerl. VIII (1873), 363; id. N. K. A. 2, I, 169. — Sacc. Syll. III, 235. — Wint. Kr. Fl. VI, 508. — F. du *Poa trivialis*.

9. **Vermicularia herbarum** West. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 113. — N. K. A. 2, VI, 599. — Sacc. Syll. III, 226. — Wint. Kr. Fl. VI. 502. — Tiges fanées des *Dianthus superbus*, *Sedum Telephium* et autres.

10. **Vermicularia hesperidicola** Oud. N. K. A. 2, VI, 11. — Sacc. Syll. XI, 504. — Wint. Kr. Fl. VI, 499. — Écorce des fruits du *Citrus nobilis* (Mandarine).

11. **Vermicularia hispidula** West. in Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 114. — Exosporium hispidulum Lk. — Prodr. Fl. Bat. II. 4, p. 157. — Feuilles et tiges de quelques Graminées.

12. **Vermicularia hypodermia** (Lk.) Fr. — Wint. Kr. Fl. VI, 511. — Exosporium hypodermium Lk. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 157. — Tige de pl. herbacées.

13. **Vermicularia Liliacearum** West. in Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 113. — Oud. N. K. A. 2, I, 168 (f. Colchici). — Sacc. Syll. III. 233. — Wint. Kr. Fl. VI, 506. — Tiges d'*Ornithogalum*, d'*Allium*, et de *Scilla*.

14. **Vermicularia maculans** Desm. — Prodr. Fl. Bat. II, p. 114. — Sacc. Syll. III, 228. — Wint. Kr. Fl. VI, 512. — Tiges pourrissantes du *Solanum tuberosum*.

15. **Vermicularia minuta** (Lk.) Lib. — Prodr. Fl. Bat. II. 4, p. 111. — Sacc. Syll. III, 228. — Wint. Kr. Fl. VI, 515. — Feuilles du *Hedera Helix*.

16. **Vermicularia Ophiopogonis** Patouill. Rev. Myc. 1886, p.

83. — Sacc. Syll. XI, 126. — Oud. N. K. A. 3, III, 1117. — F. de l'*Ophiopogon spicatum*.

17. **Vermicularia Silphii** Schwein. — N. K. A. 2, I, 168 p.p. — Sacc. Syll. III, 229. — Tiges d'une espèce de *Silphium* cultivé.

18. **Vermicularia Syringae** Oud. N. K. A. 2, IV, 234. — Sacc. Syll. X, 225. — Wint. Kr. Fl. 513. — Capsules du *Syringa vulgaris*.

19. **Vermicularia trichella** Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 114. — N. K. A. 2, IV, 233 et 2, VI, 599. — Sacc. Syll. III, 224. — Wint. Kr. Fl. VI, 496. — F. du *Hedera Helix*.

B. **Compositae.**

DOTHIORELLA.

1. **Dothiorella Aesculi** Oud. Beibl. z. bot. Centrbl. 1902; N. K. A. 3, II, 729. — Eclats de bois de l'*Aesculus Hippocastanum*.

2. **Dothiorella aterrima** (Fuck). Sacc. Syll. III, 239. — Wint. Kr. Fl. VI, 530. — Oud. N. K. A. 3, II, 885. — Ram. de l'*Ulmus campestris*.

3. **Dothiorella Cydoniae** Oud. N. K. A. 3, III, 1109. — Ram. de *Cyd. vulgaris*.

4. **Dothiorella Dasycarpi** Oud. N. K. A. 3, II, 885. — Ram. de l'*Acer dasycarpum*.

5. **Dothiorella ilicicola** Oud. N. K. A. 2, V, 490. — Sacc. Syll. X, 230. — Wint. Kr. Fl. V, 522. — Ram. de l'*Ilex opaca*.

6. **Dothiorella Liriodendri** (Cooke) Sacc. Syll. I, 465 et III, 236. — Ecorce int. âgée du *Liriodendron tulipifera*. — Oud. Herb.

RABENHORSTIA.

1. **Rabenhorstia clandestina** Fr. — Oud. Hedw. 1898, p. 315; id. Zitt. V. K. A. v. W. 1900, p. 300. — N. K. A. 3, II, 250; Sacc. Syll. III, 244 et XVI, 897. — Wint. Kr. Fl. VII, 861.

2. **Rabenhorstia rudis** Fr. — Arch. Néerl. VIII (1873), 366. — N. K. A. 2, I, 169 et 2, VI, 599. — Sacc. Syll. III, 243. — Wint. Kr. Fl. VI, 533. — Ram. du *Cytisus Laburnum*.

3. **Rabenhorstia Salicis** Oud. Hedw. 1898, p. 317; Zitt. V. K. A. v. W. 1900, p. 300; N. K. A. 3, II, 893. — Sacc. Syll. XVI, 897. — Wint. Kr. Fl. VII, 860.

4. **Rabenhorstia Tiliae** Fr. — Arch. Néerl. II (1867), 38; N. K. A. 2, VI, 599. — Sacc. Syll. III, 240. — Wint. Kr. Fl. VI, 534. — Ram. du *Tilia cordata*.

FUCKELIA.

1. **Fuckelia Ribis** Bon. — N. K. A. 3, II, 252. — Sacc. Syll. III, 214. — Wint. Kr. Fl. VI, 535. — Ram. du *Ribes rubrum*.

PLACOSPHAERIA.

1. **Placosphaeria Pruni** Oud. Zitt. V. K. A. v. W. 1900, p. 300; id. N. K. A. 3, II, 253. — Sacc. Syll. XVI, 898. — Wint. Kr. Fl. VII, 863. — Ram. du *Prunus domestica*.

2. **Placosphaeria Piri** Oud. N. K. A. 3, II, 892. — Fruits jeunes du *Pirus communis*.

3. **Placosphaeria punctiformis** Fuck. — Oud. N. K. A. 3, II, 749. — Sacc. Syll. VIII, 726, sous n° 15. — Wint. Kr. Fl. VI, 540. — F. du *Galium Mollugo*.

4. **Placosphaeria rimosa** Oud. N. K. A. 2, V, 491; ibid. VI, 599. — Sacc. Syll. X, 237. — Wint. Kr. Fl. VI, 543. — Chaumes du *Phragmites communis*.

FUSICOCCUM.

1. **Fusicoccum Corni** Oud. Zitt. V. K. A. v. W. 1900, p. 301; id. N. K. A. 3, II, 331. — Sacc. Syll. XVI, 899. — Wint. Kr. Fl. VII, 864. — Ram. du *Cornus alba*.

2. **Fusicoccum malorum** Oud. N. K. A. 2, IV, 529. — Sacc. Syll. X, 239. — Wint. Kr. Fl. VI, 554. — Fruits du *Pirus Malus*.

3. **Fusicoccum quercinum** Sacc. Syll. III, 248. — Wint. Kr. Fl. VI, 555. — N. K. A. 2, V, 193; 2, VI, 599; 3, II, 730. — Ram. du *Quercus Robur*.

4. **Fusicoccum Quercus** Oud. N. K. A. 2, V, 494; ibid. 2, VI, 600. — Sacc. Syll. X, 240. — Wint. Kr. Fl. VI, 556. — Ram. du *Quercus Robur*.

5. **Fusicoccum Ulmi** Oud. N. K. A. 2, VI, 41. — Sacc. Syll. XI, 507. — Wint. Kr. Fl. VI, 558. — Ram. de l'*Ulmus campestris*.

CYTOSPORELLA.

***Cytosporella Aceris dasycarpi** Oud. N. K. A. 3, I, 492. — Voir: *C. Dasycarpi*.

1. **Cytosporella Aesculi** (West.) Sacc. Syll. III, 251. — Wint. Kr. Fl. VI, 559. — N. K. A. 2, VI, 600. — Ram. de l'*Aesculus Hippocastanum*.

2. **Cytosporella Ampelopsidis** Oud. — N. K. A. 2, VI, 600. — Ram. de l'*Ampelopsis quinquefolia*.

3. **Cytosporella Clarkiae** Oud. N. K. A. 3, II, 883.

4. **Cytosporella Dasycarpi** Oud. — C. Aceris dasycarpi Hedw. 1898, p. 177 et N. K. A. 3, I, 492. — Ram. de l'*Acer dasycarpum*. — Cytospora D. Zitt. V. K. A. v. W. 1900, p. 301; N. K. A. 3, II, 253. — Sacc. Syll. XVI, 903. — Wint. Kr. Fl. VII, 867.

5. **Cytosporella Forsythiae** Oud. N. K. A. 3, II, 883. — Ram. du *Forsythia viridissima*.

6. **Cytosporella Hibisci** Oud. N. K. A. 3, II, 728. — Ram. de l'*Hibiscus syriacus*.

7. **Cytosporella Platani** Oud. Hedw. 1898, p. 177; id. N. K. A. 3, I, 192. — Sacc. Syll. XVI, 901. — Wint. Kr. Fl. VII, 866. — Ram. du *Platanus occidentalis*.

8. **Cytosporella Populi** Oud. N. K. A. 2, V, 494; ibid. VI, 600. — Sacc. Syll. X, 242. — Wint. Kr. Fl. VI, 561. — Ram. d'une espèce de *Populus*.

9. **Cytosporella Quercus** Oud. Zitt. V. K. A. v. W. 1900, p. 301; N. K. A. 3, II, 253. — Sacc. Syll. XVI, 901. — Wint. Kr. Fl. VII, 866. — Ram. du *Quercus Robur*.

CYTOSPORA.

1. **Cytospora Acaciae** Oud. Beibl. z. bot. Centrbl. 1902; id. N. K. A. 3, II, 726. — Ram. de l'*Acacia verticillata*.

2. **Cytospora Aquifolii** (Fr.) Oud. Arch. Néerl. VIII (1873), 367; N. K. A. 2, I, 169 (..ae) et 257 (..ae); ibid. 2, VI, 601. — Sacc. Syll. III, 271. — Wint. Kr. Fl. VI, 583. — Ram. de l'*Ilex Aquifolium*.

3. **Cytospora atronitens** (Chev.) Oud. Arch. Néerl. VIII (1873), 367; N. K. A. 2, I, 169 et 2, VI, 601. — Sacc. Syll. III, 262 (1884). — Wint. Kr. Fl. VI, 605. — Ram. du *Cornus alba*.

4. **Cytospora carbonacea** (Fr.) Oud. Arch. Néerl. VIII (1873), 367; N. K. A. 2, I, 169 et 2, VI, 601. — Sacc. Syll. III (1884), 260. — Wint. Kr. Fl. VI, 610. — Ram. de l'*Ulmus campestris*.

5. **Cytospora carphosperma** (Fr.) Oud. Arch. Néerl. VIII (1873), 367; N. K. A. 2, I, 170; V, 495; 2, VI, 601. — Sacc. Syll. III (1884), 271. — Wint. Kr. Fl. VI, 588. — Ram. des *Pirus Malus*, *Tilia cordata* et *Hippophaë rhamnoides* (?)

6. **Cytospora ceratophora** Sacc. Syll. III, 268. — Wint. Fr. Fl. VI, 572. — Arch. Néerl. 2, VI, 600; N. K. A. 2, VI, 600. — Ram. du *Castanea vulgaris*.

7. **Cytospora chrysosperma** (P.) Sacc. Syll. III, 260. — Wint. Kr. Fl. VI, 591. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 100. — Ram. du *Populus Tremula*.

8. **Cytospora cincta** Sacc. Syll. III, 254. — Wint. Kr. Fl. VI, 593. — N. K. A. 2, V, 495 et 2, VI, 601. — Ram. du *Prunus lusitanica*.

9. **Cytospora Clematidis** Oud. N. K. A. 2, V, 495; 2, VI, 601. — Wint. Kl. Fl. VI, 573. — Sacc. Syll. X, 241. — Ram. du *Clematis Vitalba*.

10. **Cytospora clypeata** Sacc. Syll. III, 252. — Wint. Kr. Fl. VI, 600. — N. K. A. 3, II, 253. — Ram. d'une espèce de *Rubus*.

11. **Cytospora Corni** (West.) Sacc. Syll. X, 216. — Wint. Kr. Fl. VI, 576. — Prod. Fl. Bat. II, 4, p. 100 (Cytisp.) — Ram. du *Cornus sanguinea*.

12. **Cytospora cornicola** Oud. Beibl. z. bot. Centrbl. 1902. — Oud. N. K. A. 3, II, 726.

Cytospora Dasycarpi Oud. Zitt. V. K. A. v. W. 1900, p. 301; N. K. A. 3, II, 253. — Sacc. Syll. XVI, 903. — Wint. Kr. Fl. VII, 867. — Voir: *Cytosporella*.

13. **Cytospora decorticans** Sacc. Syll. III, 265. — Wint. Kr. Fl. VI, 572. — N. K. A. 2, V, 495 et VI, 601. — Ram. du *Fagus silvatica*.

14. **Cytospora diatrypa** Sacc. Syll. III, 258. — Wint. Kr. Fl. VI, 568. — N. K. A. 3, II, 251. — Ram. de l'*Alnus glutinosa*.

15. **Cytospora diffórmis** Schwein. — Sacc. Syll. III, 265. — Oud. N. K. A. 3, III, 1106.

16. **Cytospora durella** Sacc. Syll. III, 266. — Wint. Kr. Fl. VI, 581. — N. K. A. 3, II, 251. — Ram. du *Fagus silvatica*.

17. **Cytospora epileuca** Sacc. Syll. III, 273. — Wint. Kr. Fl. VI, 598. — N. K. A. 2, VI, 601. — Ram. du *Rhamnus cathartica*.

18. **Cytospora foliicola** (Lib.) — Sacc. Syll. III, 275. — N. K. A. 2, VI, 12 et 602. — Ram. du *Prunus lusitanica*.

19. **Cytospora fraxinicola** Oud. Zitt. V. K. A. v. W. 1900, p. 301; id. N. K. A. 3, II, 251. — Sacc. Syll. XVI, 905. — Wint. Kr. Fl. VII, 868. — Ram. du *Fraxinus excelsior*.

20. **Cytospora Friesii** Sacc. Syll. III, 269. — Wint. Kr. Fl. VI, 571. f. **Douglasii** Oud. N. K. A. 3, II, 882. — Aig. du *Pseudotsuga Douglasii*.

21. **Cytospora fugax** (Bull.) Sacc. Syll. III, 263. — Wint. Kr. Fl. VI, 576 et 605. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, 100 (Cytispora). — Ram. d'une espèce de *Salix*.

22. **Cytospora Hibisci** Oud. — N. K. A. 3, II, 727. — Ram. du *Hibiscus syriacus*.

23. **Cytospora Hippocastani** Oud. Beibl. z. bot. Centr. bl. 1902; id. N. K. A. 3, II, 727. — Ram. de l'*Aesc. Hippocastanum*.

24. **Cytospora incarnata** Fr. — Sacc. Syll. III, 263. — Wint. Kr. Fl. VI, 572. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 100 (Cytispora). — Ram. du *Carpinus Betulus* et du *Robinia Pseudo-Acacia*.

25. **Cytospora Laurocerasi** Fuck. — Oud. N. K. A. 3, III, 1107. — Sacc. Syll. III, 276. — Wint. Kr. Fl. VI, 593.

***Cytospora leucomyxa** Rab. — N. K. A. 2, I, 170. — Arch. Néerl. VIII, 367. — Voir: *Cytosporina*.

26. **Cytospora leucosperma** (P.) Sacc. Syll. III, 268. — Wint. Kr. Fl. VI, 567 et 594. — T. N. G. XI, 396. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 100 (Cytispora). — Ram. d'espèces de *Populus* et *Salix*.

27. **Cytospora leucostoma** (P.) Sacc. Syll. III, 254. — Wint. Kr. Fl. VI, 592. — N. K. A. 2, V. 170 et VI, 601. — Ram. du *Prunus Padus*.

28. **Cytospora macilenta** (Rob. et Desm.) Sacc. Syll. III, 258. — Wint. Kr. Fl. VI, 565. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 101 (Cytispora). — Ram du *Cornus sanguinea*.

29. **Cytospora macularis** Schulz et Sacc. — Sacc. Syll. III, 256. — Wint. Kr. Fl. VI, 587. — N. K. A. 2, V, 495 et VI, 602. — Ram. du *Persica vulgaris*.

30. **Cytospora Mespili** Oud. N. K. A. 2, VI, 42. — Sacc. Syll. XI, 509. — Wint. Kr. Fl. VI, 586. — Ram du *Mespilus germanica*.

31. **Cytospora microspora** (Cda) Rab. — N. K. A. 2, VI, 42, 600 et 601, et 3, II, 882. — Sacc. Syll. III, 253. — Wint. Kr. Fl. VI, 578 et 589. — Ram. des *Pirus* (Sorbus) *Aria* et *Aucuparia*.

32. **Cytospora nivea** (Hoffm.) Sacc. Syll. III, 260. — Wint. Kr. Fl. VI, 590. — N. K. A. 3, II, 254 et 2, VI, 601. — Ram. du *Populus nigra*.

33. **Cytospora opaca** Oud. Hedw. 1898, p. 177; id. Zitt. V. K. A. v. W. 1900, p. 301; id. N. K. A. 3, I, 192. — Sacc. Syll. XVI, 902. — Wint. Kr. Fl. VII, 869. — Ram de l'*Ilex opaca*.

34. **Cytospora Oxyacanthae** (Rab.) Sacc. Syll. III, 255. — Wint. Kr. Fl. VI, 579. — N. K. A. 2, V, 495 et 2, VI, 600. — Ram. du *Crat. monogyna*.

35. **Cytospora Persicae** Schwein. — N. K. A. 3, II, 255. — Sacc. Syll. III, 256. — Ram. du *Persica vulgaris*.

36. **Cytospora persoonata** (Fr.) — Sacc. Syll. III, 267. — Wint. Kr. Fl. VI, 570 et 598. — N. K. A. 2, VI, 600. — Ram du *Frangula Alnus*.

37. **Cytospora Pinastri** Fr. S. M. II, 544; Oud. N. K. A. 3, III, 1107. — Sacc. Syll. III, 274. — Wint. Kr. Fl. VI, 575. — Aiguilles de l'Abies lasiocarpa (A. concolor). — Nunspeet, Mars 1904, Mr. Beins.

38. **Cytospora Platani** (Fuck.) Sacc. Syll. III, 267. — Wint. Kr. Fl. VI, 590. — Arch. Néerl. VIII (1873), 367; N. K. A. 2, I, 257; 2, III, 150; 2, VI, 601; Oud. Fgi Neerl. exs. n° 182. — Ram. du *Platanus occidentalis*.

Cytospora Pruni lusitanicae N. K. A. 2, VI, 601; espèce non créée par nous, semble devoir être rayée.

39. **Cytospora Pseudoplatani** Sacc. Syll. III, 258; Wint. Kr. Fl. VI, 565. — Oud. N. K. A. 3, II, 727. — Ram. de l'*Acer Pseudo-Platanus*.

40. **Cytospora rhodophila** Sacc. Syll. III, 253. — Wint. Kr. Fl. VI, 599. — N. K. A. 3, II, 255. — Rameaux d'un Rosier.

41. **Cytospora rhoicola** Oud. Beibl. z. bot. Centr. bl. 1902. — id. N. K. A. 3, II, 728. — Ram. du *Rhus typhina*.

42. **Cytospora Ribis** (Ehrenb.) Sacc. Syll. III, 273. — Wint. Kr. Fl. VI, 599. — N. K. A. 3, II, 255. — Ram. du *Ribes rubrum*.

43. **Cytospora rubescens** (Fr.) Arch. Néerl. VIII (1873), 367; N. K. A. 2, I, 257 et 2, VI, 600. — Sacc. Syll. III, 253. — Wint. Kr. Fl. VI, 592 et 607. — Ram. du *Prunus Amygdalus*.

44. **Cytospora Rubi** (Schwein.) Sacc. Syll. III, 252. — N. K. A. 2, VI, 600 et 3, II, 255. — Ram. d'une espèce de *Rubus*.

45. **Cytospora Salicis** Corda. (Rab.) Sacc. Syll. III, 261. — Wint. Kr. Fl. VI, 603. — N. K. A. 2, VI, 600 et 3, II, 883. — Ram. du *Salix vitellina*.

46. **Cytospora scleuospora** Oud. Zitt. V. K. A. v. W. 1900, p. 302; id. N. K. A. 3, I, 193. — Sacc. Syll. XVI, 903. — Wint. Kr. Fl. VII, 869. — Ram. du *Pirus* (Sorbus) *Aucuparia*.

47. **Cytospora stenospora** Sacc. Syll. III, 259. — Wint. Kr. Fl. VI, 568. — Oud. N. K. A. 3, II, 728. — Ram. de l'*Alnus glutinosa*.

48. **Cytospora taxifoliae** Cooke et Massee. — Oud. Hedw. 1898, p. 188; id. N. K. A. 3, I, 193. — Sacc. Syll. X, 248. — Wint. Kr. Fl. VI, 608. — F. du *Taxus baccata*.

CEUTHOSPORA.

1. **Ceuthospora fraxinicola** Oud. Zitt. V. K. A. v. W. 1900, p. 302; id. N. K. A. 3, II, 255. — Sacc. Syll. XVI, 905. — Wint. Kr. Fl. VII, 870. — Ram. du *Fraxinus excelsior*.

2. **Ceuthospora phacidioides** Grev. — Prodr. Fl. Bat. II, 1,

p. 91; N. K. A. 3, II, 880. — Sacc. Syll. III, 277. — Wint. Kr. Fl. VI, 615. — F. de l'*Ilex Aquifolium*.

3. **Ceuthospora umbonata** Wallr. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 91. — Sacc. Syll. III, 280. — Wint. Kr. Fl. VI, 615. — F. du *Cochlearia anglica*.

2. Phaeosporae.

A. Simplices.

* Calvae.

CONIOTHYRIUM.

1. **Coniothyrium conoideum** Sacc. Syll. III, 316. — Wint. Kr. Fl. VII, 26. — N. K. A. 2, VI, 602 et 3, II, 256. — Tiges du *Campanula Medium*.

2. **Coniothyrium cytisellum** (Pass. et Thüm.) Sacc. Syll. III, 308. — Wint. Kr. Fl. VII, 34. — Oud. N. K. A. 3. II, 724. — F. du *Cytisus alpinus*.

3. **Coniothyrium Fragariae** Oud. Versl. Med. K. A. v. W. 2, XVIII (370); N. K. A. 2, IV, 229. — Sacc. Syll. X, 261. — Wint. Kr. Fl. VII, 38. — Réceptacles mûrs du *Fragaria vesca*.

4. **Coniothyrium Fuckelii** Sacc. Syll. III, 306. — Wint Kr. Fl. VII, 25 et 40. — N. K. A. 2, V, 170 et 196; 2, VI, 602; 3, I, 494 et 3, II, 256. — F. des *Centaurea nigra*, *Berberis vulgaris*, *Evonymus japonica*; ram. du *Ribes Grossularia*.

5. **Coniothyrium genisticola** Oud. Beibl. z. bot. Centrbl 1902; id. N. K. A. 3, II, 881. — Légumes mûres du *Genista anglica*.

6. **Coniothyrium herbarum** Schulz et Sacc. — Sacc. Syll. III, 317. — Wint. Kr. Fl. VII, 28. — N. K. A. 3, II, 256. — Ram. de l'*Artemisia gracilis*.

7. **Coniothyrium Hyssopifoliae** Oud. N. K. A. 3, I, 494. — Sacc. Syll. XVI, 909. — Wint. Kr. Fl. VII, 920. — Tiges du *Lythrum hyssopifolia*.

8. **Coniothyrium laburniphilum** Oud. Zitt. V. K. A. v. W. 1900, p. 302; id. N. K. A. 3, II, 257. — Sacc. Syll. XVI, 910. — Wint. Kr. Fl. VII, 919. — F. du *Cytisus Laburnum*.

9. **Coniothyrium lignorum** Sacc. Syll. III, 315. — Wint Kr. Fl. VII, 59. — N. K. A. 2, V, 496 et 2, VI, 602. — Eclats de bois.

10. **Coniothyrium mixtum** Fuck. — Oud. N. K. A. 2, III, 149. — Sacc. Syll. III, 313. — Wint. Kr. Fl. VII, 47. — Ram. du *Platanus occidentalis*.

11. **Coniothyrium Mughi** Oud. Herb. — Ecailles séminifères.

12. **Coniothyrium olivaceum** Bon. — N. K. A. 2, VI, 602; 3, II, 257 et 721. — Sacc. Syll. III, 305. — Wint. Kr. Fl. VII, 26, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 42, 43, 44, 46, 48, 51, 53, 54, 56, 60. — F. du *Hedera Helix*; ram. de l'*Ononis repens*.

Coniothyrium Persicae Oud. N. K. A. 2, VI, 602. — Voir: *Trullula nitida*.

***Coniothyrium Pinastri** Oud. N. K. A. 2, III, 149. — Voir: *Phoma*.

13. **Coniothyrium Pini** Oud. Arch. Néerl. II (1867), 36; id. N. K. A. 3, II, 725. — Aig. du *Pinus silvestris*.

14. **Coniothyrium Populi** Oud. N. K. A. 2, V, 496; ibid. VI, 602. — Sacc. Syll. X, 268. — Wint. Kr. Fl. VII, 49. — Eclats de bois du *Populus nigra*.

15. **Coniothyrium Psammae** Oud. Hedw. 1898, p. 177. — id. Zitt. V. K. A. v. W. 1900, p. 302; id. N. K. A. 3, I, 494. — Sacc. Syll. XVI, 911. — Wint. Kr. Fl. VII, 918. — F. du *Psamma littoralis* (Ammophila arenaria).

16. **Coniothyrium Pyxidatae** Oud. Zitt. V. K. A. v. W. 1900, 302; id. N. K. A. 3, II, 882. — Sacc. Syll. XVI, 911. — Wint. Kr. Fl. VII, 918. — Thalle du *Cladonia pyxidata*.

17. **Coniothyrium quercicola** Oud. N. K. A. 3, II, 725. — F. du *Quercus Robur*.

18. **Coniothyrium Tamaricis** Oud. Zitt. V. K. A. v. W. 1900, p. 303; id. N. K. A. 3, II, 257. — Sacc. Syll. XVI, 909. — Wint. Kr. Fl. VII, 921. — Ram. du *Tamarix gallica*.

19. **Coniothyrium vagabundum** Sacc. Syll. III, 310. — Wint. kr. Fl. VII, 33. — N. K. A. 2, V, 196 et VI, 602. — Ram. du *Berberis vulgaris*.

SPHAEROPSIS.

***Sphaeropsis depressa** Lév. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 88. — Voir: *Phoma*.

Sphaeropsis epitricha B. Br. — N. K. A. 2, III, 253. — Voir: *Phoma*.

Sphaeropsis fimicola West. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 89. — Voir: *Phoma*.

Sphaeropsis mutica B. Br. — N. K. A. 2, I, 253. — Arch. Néerl. VIII, 358. — Voir: *Phoma*.

1. **Sphaeropsis** (Macroplodia) **quercicola** Oud. N. K. A. 3, II, 752. — F. du *Quercus Robur*.

*Sphaeropsis Ralfsii B. Br. — N. K. A. 2, I, 314; 2, III, 253. — Arch. Néerl. VIII, 359. — Voir: *Phyllosticta*.

2. **Sphaeropsis Scopariae** Oud. N. K. A. 2, VI, 12 et 602. — Sacc. Syll. XI, 511. — Wint. Kr. Fl. VII, 17. — Ram. du *Sarothamnus scoparius*.

** **Setosae.**

CHAETOMELLA.

1. **Chaetomella beticola** Oud. Beibl. z. bot. Centr.bl. 1902; N. K. A. 3, II, 724. — Tiges en train de décomposition du *Beta vulgaris* var. *rapacea rubra*.

2. **Chaetomella horrida** Oud. Arch. Néerl. 2, VII, 280. — N. K. A. 3, II, 880. — Eclat de bois de Bouleau (*Betula verrucosa*) ramolli.

3. **Chaetomella tortilis** Delacroix. — Oud. Arch. Néerl. 2, VII, 281; id. N. K. A. 3, II, 881. — Sacc. Syll. X, 272. — Wint. Kr. Fl. VII, 66. — Eclat de bois de Bouleau (*Betula verrucosa*) ramolli.

B. **Compositae.**

HAPLOSPORELLA.

1. **Haplosporella Avellanae** Oud. Hedw. 1894. p. 18; N. K. A. 2, VI, 291 et 602. — Sacc. Syll. XI, 517. — Wint. Kr. Fl. VII, 71. — Ram. du *Corylus Avellana*.

2. **Haplosporella juglandina** Sacc. et Syd. dans Sacc. Syll. XVI, 915. — Wint. Kr. Fl. VII, 922. — Hapl. Juglandis Oud. Zitt. V. K. A. v. W. 1900, p. 303; id. N. K. A. 3, II, 256. — Ram. du *Juglans regia*.

*Haplosporella Juglandis Oud. Zitt. V. K. A. v. W. 1900, p. 303; N. K. A. 3, II, 257. — *H. juglandina*.

3. Phaeodidymae.

A. **Simplices.**

DIPLODIA.

1. **Diplodia Abrotani** Fuck. — N. K. A. 3, II, 258. — Sacc. Syll. III, 368. — Wint. Kr. Fl. VII, 105. — Tiges de l'*Artemisia Abrotanum*.

*Diplodia acerina Lév. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 86. — Voir:

D. subtecta, et pour ce qui concerne les rameaux du Platanus orientalis: *Phoma Radula*.

2. **Diplodia Aesculi** Lév. — N. K. A. 2, VI, 603. — Sacc. Syll. III, 331. — Wint. Kr. Fl. VII, 100. — Ram. de l'*Aesculus Hippocastanum*.

3. **Diplodia Alni** Fuck. — N. K. A. 2, V, 497; 2, VI, 605 et 3, II, 258. — Sacc. Syll. III, 355. — Wint Kr. Fl. VII, 101.

4. **Diplodia atrata** (Desm.) Sacc. Syll. III, 331. — Wint. Kr. Fl. VII, 99. — N. K. A. 2, VI, 604. — Ram. de l'*Acer Negundo*.

5. **Diplodia caricina** Sacc. Syll. III, 373. — Wint. Kr. Fl. VII, 112. — N. K. A. 2, VI, 604. — Sur des *Carex*.

6. **Diplodia Clematidis** Sacc. Syll. III, 368. — Wint. Kr. Fl. VII, 115. — N. K. A. 2, VI, 604. — Ram. du *Clematis Vitalba*.

7. **Diplodia conigena** Desm. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 87. — Sacc. Syll. III, 359. — Wint. Kr. Fl. VII, 141. — Ecailles séminifères du *Pinus Pinaster*.

8. **Diplodia Corni** West. 5e Not. p. 17. — Prod. Fl. Bat. II, 4, p. 85. — Ram. du *Cornus sanguinea*.

9. **Diplodia Coronillae** Brun. — Oud. N. K. A. 3, II, 729. — Sacc. Syll. X, 276. — Wint. Kr. Fl. VII, 117. — Tiges du *Coronilla Emerus*.

10. **Diplodia Cratacgi** West. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 85; N. K. A. 2, VI, 604. — Sacc. Syll. III, 340. — Wint. Kr. Fl. VII, 118. — Ram. du *Crataegus Oxyacantha*.

11. **Diplodia Cydoniae** Sacc. Mich. II, 269; Sacc. et Sch. Microm. Slavoniae n° 32; Sacc. Syll. III, 340; Wint. Kr. Fl. VII, 118. — Oud. N. K. A. 3, III, 1108. — Ram. du *Cyd. vulgaris*, accompagnant le Phoma Cydoniae Sacc. et Sch.

***Diplodia Fraxini** Fr. — Arch. Néerl. II, 37. — Voir: *Botryodiplodia*.

12. **Diplodia Evonymi** West. — N. K. A. 3, II, 258. — Sacc. Syll. III, 360. — Wint. Kr. Fl. VII, 122. — F. de l'*Evonymus japonica*.

13. **Diplodia faginea** Fr. — N. K. A. 2, V, 197 et VI, 603. — Sacc. Syll. III, 351. — Wint. Kr. Fl. VII, 122. — Ram. du *Fagus silvatica*.

14. **Diplodia Gleditschiae** Pass. — N. K. A. 2, VI, 291 et p. 606. — Sacc. Syll. III, 335. — Wint. Kr. Fl. VII, 126. — Ram. du *Gleditschia triacanthos*.

15. **Diplodia Hederae** Desm. — Arch. Néerl. VIII (1873), 359; N. K. A. 2, I, 168 et 605. — Sacc. Syll. III, 344. — Wint. Kr. Fl. VII, 126. — F. du *Hedera Helix*.

16. **Diplodia herbarum** (Cda) Lév. — Arch. Néerl. VIII (1873), 359; N. K. A. 2, I, 254; 2, VI, 605. — Sacc. Syll. III, 370. — Wint. Kr. Fl. VII, 110. — Tiges du *Cochlearia anglica*.

17. **Diplodia ilicicola** Desm. — Arch. Néerl. VIII (1873), 359; N. K. A. 2, I, 168; 2, III, 152; 2, VI, 605. — Sacc. Syll, III, 333. — Wint. Kr. Fl. VII, 128. — Ram. de l'*Ilex Aquifolium*.

18. **Diplodia Ilicis** Fr. — Oud. Arch. Néerl. VIII (1873), 359. — id. N. K. A. 2, I, 168. — Sacc. Syll. III, 360. — Wint. Kr. Fl. VII, 128. — Sphaeria Ilicis Fr. — T. N. G. XI, 394. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 61. — F. de l'*Ilex Aquifolium*.

19. **Diplodia inquinans** (Tode) West. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 85. — Sacc. Syll. III, 346. — Wint. Kr. Fl. VII, 124. — Ram. et souches de l'*Alnus glutinosa*.

20. **Diplodia Kerriae** Berk. — N. K. A. 2, VI, 603. — Sacc. Syll. III, 339. — Wint. Kr. Fl. VII, 131. — Ram. du *Kerria japonica*.

21. **Diplodia Lantanae** Fuck. — Oud. N. K. A. 3, II, 884. — Sacc. Syll. III, 346. — Wint. Kr. Fl. VII, 169, f^a^ **Viburni oxycocci** Oud. l.c. — Ram. du *Vib. oxycoccum*.

22. **Diplodia Leguminis Cytisi** (Desm). Lév. — Arch. Néerl. VIII (1873), 359. — N. K. A. 2, I, 168 et 2, VI, 605. — Sacc. Syll. III, 358. — Wint. Kr. Fl. VII, 85. — Dipl. leguminum Desm. — Gousses des *Cytisus Laburnum* et *Colutea arborescens*.

***Diplodia leguminum** Desm. — N. K. A. 2, I, 168. — Voir: *D. Leguminis Cytisi*.

23. **Diplodia Ligustri** West. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 87; N. K. A. 3, II, 259. — Sacc. Syll. III, 347. — Wint. Kr. Fl. VII, 133. — Ram. du *Ligustrum vulgare*.

24. **Diplodia Lonicerae** Fuck. — N. K. A. 2, VI, 603. — Sacc. Syll. III, 345. — Wint. Kr. Fl. VII, 134. — Ram. du *Lonicera Periclymenum*.

25. **Diplodia mamillana** Fr. — N. K. A. 2, VI, 605 et 3, II, 259. — Sacc. Syll. III, 344. — Wint. Kr. Fl. VII, 116. — Ram. des *Cornus alba* et *sanguinea*.

26. **Diplodia Mamma** Fuck. — Arch. Néerl. VIII (1873), 360, N. K. A. 2, I, 254 et VI, 605. — Sacc. Syll. III, 347. — Wint. Kr. Fl. VII, 133. — Ram. du *Ligustrum vulgare*.

27. **Diplodia maura** Cooke et Ellis. — N. K. A. 2, VI, 605; Oud. N. K. A. 3, I, 191. — Sacc. Syll. III, 311. — Ram. du *Pirus* (Sorbus) *Aria*.

28. **Diplodia melaena** Lév. — N. K. A. 2, VI, 43 et 604. — Sacc. Syll. III, 349. — Wint. Kr. Fl. VII, 168. — Ram. de l'*Ulmus campestris*.

29. **Diplodia Mori** West. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 87; N. K. A. 2, VI, 603. — Sacc. Syll. III, 351. — Wint. Kr. Fl. VII, 138. — Ram. du *Morus alba*.

30. **Diplodia mutila** (Fr. et Mont.) Fr. — Arch. Néerl. VIII (1873), 360; N. K. A. 2, I, 254; 2, III, 151; 2, VI, 603. — Oud. Fgi Néerl. exs. n° 183. — Sacc. Syll. III, 353. — Wint. Kr. Fl. VII, 147. — Ram. des *Populus nigra* var. *pyramidalis* et du *Fraxinus excelsior*.

31. **Diplodia Oudemansii** Sacc. et Syd. dans Sacc. Syll. XIV, 939. — Wint. Kr. Fl. VII, 160. — D. Sarothamni Oud. Hedw. 1894, p. 18; id. N. K. A. 2, VI. 291; ibid. p. 604 et 605. — Ram. du *Sarothamnus scoparius*.

32. **Diplodia Padi** Brun. — N. K. A. 2, VI, 604. — Sacc. Syll. III, 340. — Wint. Kr. Fl. VII, 148. — Ram. du *Prunus Padus*.

33. **Diplodia Persicae** Sacc. Syll. III, 341. — Wint. Kr. Fl. VII, 142. — N. K. A. 2, V, 497 et VI, 605. — Ram. du *Persica vulgaris*.

34. **Diplodia pinea** (Desm.) West. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 86. — Sacc. Syll. III, 359. — Wint. Kr. Fl. VII, 144. — Écorce du *Pinus silvestris*.

35. **Diplodia populina** Fuck. — N. K. A. VI, 604. — Sacc. Syll. III, 353. — Wint. Kr. Fl. VII, 147. — Ram. du *Populus nigra*.

36. **Diplodia Preussii** (Preuss) Sacc. Syll. III, 339. — Wint. Kr. Fl. VII, 158. — Oud. N. K. A. 3, II, 884. — Ram. du *Rubus idaeus*.

37. **Diplodia profusa** de Not. N. K. A. 2, VI, 603. — Sacc. Syll. III, 336. — Wint. Kr. Fl. VII, 155. — Ram. du *Robinia Pseudo-Acacia*.

38. **Diplodia ramulicola** Desm. — N. K. A. 2, VI, 603 et 604. — Sacc. Syll. III, 333. — Wint. Kr. Fl. VII, 122. — F. et Ram. de l'*Evonymus japonica*.

39. **Diplodia Ribis** Sacc. Syll. III, 344. — Wint. Kr. Fl. VII, 154. — N. K. A. 2, VI, 604.

40. **Diplodia Rosarum** Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 86; N. K. A. 2, VI, 603. — Sacc. Syll. III, 338. — Wint. Kr. Fl. VII, 152. — Ram. du *Rosa rubiginosa*.

41. **Diplodia Rommegueri** Sacc. Syll. III, 340. — Wint. Kr. Fl. VII, 148. — N. K. A. 2, V, 497 et VI, 605. — Ram. du *Prunus lusitanica*.

42. **Diplodia Rubi** Fr. — N. K. A. 2, VI, 605; 3, II, 280. — Sacc. Syll. III, 339. — Wint. Kr. Fl. VII, 157. — Ram. du *Rubus fruticosus*.

43. **Diplodia rudis** Desm. — N. K. A. 2, VI, 43 et 604; Oud. Fgi Neerl. exs. n° 184. — Sacc. Syll. III, 337. — Wint. Kr. Fl. VII, 119. — Ram. du *Cytisus Laburnum*.

44. **Diplodia salicella** Sacc. Syll. III, 361. — Wint. Kr. Fl. VII, 159. — N. K. A. 2, VI, 603. — Ram. du *Salix vitellina*.

45. **Diplodia salicina** Lév. — N. K. A. 2, V, 197. — Sacc. Syll. X, 286. — Wint. Kr. Fl. VII, 159. — Ram. d'une espèce de *Salix*.

***Diplodia Salicis** West. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 88. — Voir: *Diplodina*.

46. **Diplodia sambucina** Sacc. Syll. III, 345. — Wint. Kr. Fl. VII, 160. — Oud. in Herb. — Ram. du *Sambucus nigra*.

***Diplodia Sarothamni** Oud. Hedw. 1894, p. 18; N. K. A. 2, VI, 291, 604 et 605. — Voir: *D. Oudemansii*.

***Diplodia scabrosa** West. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 86. — Voir: *Botryodiplodia*.

47. **Diplodia seriata** de Not. — Oud. N. K. A. 3, I, 494. — Sacc. Syll. III, 339. — Wint. Kr. Fl. VII, 157. — Sarments d'une espèce de *Rubus*.

48. **Diplodia Sorbi** Sacc. Syll. III, 342. — Wint. Kr. Fl. VII, 162. — N. K. A. 3, II, 260. — Ram. du *Pirus* (Sorbus) *Aria*.

49. **Diplodia subtecta** Fr. — N. K. A. 2, V, 496; 2, VI, 496; 3, I, 495. — Sacc. Syll. III, 331. — Wint. Kr. Fl. VII, 99. — Ram. des *Acer campestre* et *Pseudo-Platanus*. — D. acerina Lév., Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 86. — Sur *Acer platanoides*.

50. **Diplodia Taxi** (Sow.) de Not. — Sacc. Syll. III, 359. — Wint. Kr. Fl. VII, 165. — Sphaeria Taxi Sow. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 61.

51. **Diplodia tephrostoma** Lév. N. K. A. 2, VI, 604. — Sacc. Syll. III, 350. — Wint. Kr. Fl. VII, 168. — Ram. de l'*Ulmus campestris*.

***Diplodia Visci** Kx. — Prodr. Fl. Bat. 2, 4, p. 85. — Mentionné par erreur comme indigène.

52? **Diplodia vulgaris** Lév. — N. K. A. 2, 170 et VI, 604. — Sacc. Syll. III, 370. — Ram. du *Quercus Robur*.

B. Compositae.

DOTHIORA.

***Dothiora gallarum** Oud. Versl. Med. K. A. v. W. 2, XVIII, 374. — Voir: *Plenodomus*.

***Dothiora sphaeroides** Oud. — N. K. A. 2, III, 152. Voir: *Botryodiplodia*.

BOTRYODIPLODIA.

1. **Botryodiplodia Forsythiae** Oud. N. K. A. 3, III, 1105.

2. **Botryodiplodia Fraxini** (Fr.) Sacc. Syll. III, 378. — Wint. Kr. Fl. VII, 184. — N. K. A. 2, VI, 606. — Diplodia Fraxini Fr. — Arch. Néerl. II (1867), 37. — Ram. du *Fraxinus excelsior*.

3. **Botryodiplodia pyrenophora** Sacc. Syll. III, 380. — Wint. Kr. Fl. VII, 185. — N. K. A. 2, VI, 606. — Ram. du *Pirus* (Sorbus) *Aucuparia*.

4. **Botryodiplodia scabrosa** (West.) Sacc. Syll. III, 378. — Wint. Kr. Fl. VII, 182. — Diplodia scabrosa West Exsicc. n° 1372. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 86. — Tronc d'un arbre mort inconnu.

5. **Botryodiplodia sphaerioides** (Fr.) Sacc. Syll. III, 379. — Wint. Kr. Fl. VII, 184. — Dothiora Sphaeroides (Fr.) Cooke. — Oud. N. K. A. 2, III, 152. — Ram. du *Fraxinus excelsior*.

6. **Botryodiplodia Spiraeae** Oud. N. K. A. 3, III, 1106. — Ram. du *Spiraea callosa*.

4. Hyalodidymae.

A. **Simplices.**

ASCOCHYTA.

1. **Ascochyta Acori** Oud. Hedw. 1898, p. 177; id. Zitt. V. K. A. v. W. 1900, p. 303; id. N. K. A. 3, I, 496. — Sacc. Syll. XVI, 934. — Wint. Kr. Fl. VI, 627. — F. de l'*Acorus Calamus*.

***Ascochyta ampelina** Sacc. β. **cladogena** Sacc. — Voir: *Diplodina*.

2. **Ascochyta Armoraciae** Oud. Fuck. — Sacc. Syll. III, 397. — Wint. Kr. Fl. VI; 630. — Septoria Armor. Oud. N. K. A. 2, II, 180. — F. du *Cochlearia Armoracia*.

3. **Ascochyta Aucubae** Sacc. et Speg. — Sacc. Syll. III, 389. — Wint. Kr. Fl. VI, 632. — Oud. N. K. A. 3, I, 196. — F. de l'*Aucuba japonica*.

***Ascochyta berberidina** Sacc. — N. K. A. 2, V, 498 et 2, VI, 606. — Voir: *Diplodina*.

***Ascochyta contubernalis** Oud. N. K. A. 2, V, 170. — Voir: *Darluca*.

1. **Ascochyta Dianthi** Lib. — Oud. Versl. Med. K. A. v. W. 3, VII (1890), 97; id. N. K. A. 2, VI, 13. — Sacc. Syll. III, 398 et X, 301. — Wint. Kr. Fl. VI, 640. — Sphaeria Dianthi A. S. — T. N. G. XI, 395. — F. d'espèces de *Dianthus* cultivées.

5. **Ascochyta Dicentrae** Oud. Beibl. z. bot. Centr. bl. 1903. — id. N. K. A. 3, II, 721. — F. du *Dicentra spectabilis.*

***Ascochyta Epilobii** Oud. N. K. A. 3, II, 722. — Voir: *Diplodina.*

***Ascochyta Euphrasiae** Oud. N. K. A. 3, I, 496. — Voir: *Diplodina.*

***Ascochyta Evonymi** Oud. N. K. A. 2, VI, 292 et 607. — Voir: *Diplodina.*

****Ascochyta Fraxini** Oud. — N. K. A. 2, V, 197 et 2, VI, 607. — Voir: *Diplodina.*

6. **Ascochyta graminicola** Sacc. Syll. III, 407. — Wint. Kr. Fl. VI, 644. — N. K. A. 2, V, 499 et 2, VI, 606. — Oud. N. K. A. 3, I, 496. — F. du *Triticum repens.*

***Ascochyta Grossulariae** Oud. N. K. A. 3, I, 177. — Voir: *Diplodina Oudemansii.*

***Ascochyta Hypochoeridis** Oud. N. K. A. 3, 2, 260. — Voir: *Diplodina.*

***Ascochyta Idaei** Oud. N. K. A. 3, I, 497. — Voir: *Diplodina.*

***Ascochyta ignobilis** Oud. N. K. A. 3, II, 261. — Voir: *Diplodina.*

7. **Ascochyta Iridis** Oud. N. K. A. 2, V, 498 et 2, VI, 606. — Sacc. Syll. X, 307. — Wint. Kr. Fl. VII, 647. — F. de Fl. Pseudacorus.

8. **Ascochyta Laburni** Sacc. Syll. III, 395. — Wint. Kr. Fl. VI, 684. — N. K. A. 2, VI, 43 et 606. — F. du *Cytisus Laburnum.*

***Ascochyta Lactucae** Oud. N. K. A. 3, II, 261. — Voir: *Diplodina.*

9. **Ascochyta ledicola** Oud. Zitt. V. K. A. v. W. 1900, p. 304; id. N. K. A. 3, II, 261. — Sacc. Syll. XVI, 933. — Wint. Kr. Fl. VII, 876. — F. du *Ledum palustre.*

***Ascochyta Lysimachiae** Oud. N. K. A. 3, II, 262. — Voir: *Diplodina.*

10. **Ascochyta Matthiolae** Oud. — Hedw. 1898, p. 178. — id. Zitt. V. K. A. v. W. 1900, p. 305; id. N. K. A. 3, I, 497. — Sacc. Syll. XVI, 925. — Wint. Kr. Fl. VII, 652. — Fruits d'un *Matthiola.*

11. **Ascochyta Menyanthis** Oud. Zitt. V. K. A. v. W. 1900, p. 305; id. N. K. A. 3, II, 262. — Sacc. Syll. XVI, 932. — Wint. Kr. Fl. VII, 876. — F. du *Men. trifoliata.*

***Ascochyta Millefolii** Oud. — N. K. A. 2, VI, 606. — Voir: *Diplodina.*

Diplodina. — F. de l'*Achillea Millefolium*.

12. **Ascochyta misera** Oud. Hedw. 1898, p. 178; id. Zitt. V. K. A. v. W. 1900, p. 305; N. K. A. 3, I. 497. — Sacc. Syll. XVI, 929. Wint. Kr. Fl. VII, 874. — Au. = *Asc. crataegicola*. Allesch. dans Wint. Kr. Fl. VII, 639? — F. du *Crataegus monogyna*.

***Ascochyta Myrtilli** Oud. N. K. A. 3. II. 262. — Voir: *Diplodina*.

***Ascochyta Opuli** Oud. N. K. A. 2, VI, 13 et 607. — Voir: *Diplodina*.

13. **Ascochyta perforans** (Rob.) Sacc. Syll. III, 406. — Wint. Kr. Fl. VI, 629. — N. K. A. 2, VI, 606. — F. du *Psamma littoralis* (= Ammophila arenaria).

14. **Ascochyta Periclymeni** Thüm. — Oud. N. K. A. 2, IV, 531. — Sacc. Syll. III, 388. — Wint. Kr. Fl. VI, 651. — F. du *Lonicera Periclymenum*.

15. **Ascochyta Philadelphi** Sacc. et Speg., Syll. III, 386. — Wint. Kr. Fl. VI, 656. — N. K. A. 3, III, 1104. — F. du *Philad. coronarius*.

***Ascochyta physalicola** Oud. N. K. A. 3, II, 722. — Voir: *Diplodina*.

16. **Ascochyta Pisi** Lib. — Oud. N. K. A. 2, IV, 530. — Sacc. Syll. III, 397. — Wint. Kr. Fl. VI, 658. — Septoria Leguminum *z.* Pisorum Desm. dans Prodr. Fl. Bat. II, 1, 106. — Fruits des *Pisum sativum* et de l'*Ervum hirsutum*.

***Ascochyta Polygoni** Rab. — N. K. A. 2, I, 169. — A supprimer.

17. **Ascochyta Psammae** Oud. Zitt. V. K. A. v. W. 1900, p. 348; id. N. K. A. 3, II, 263. — Sacc. Syll. XVI, 935. — Wint. Kr. Fl. VII, 878. — F. du *Psamma littoralis*.

***Ascochyta Rhei** Ell. Everh. — Oud. N. K. A. 3, II, 264. — Voir: *Diplodina*.

***Ascochyta Salsolae** Oud. — N. K. A. 2, VI, 292 et 606. — Voir: *Diplodina*.

Ascochyta sambucella Pass. — Sacc. Syll. X, 296. — Oud. N. K. A. 3, I, 498. — Voir: *Diplodina*.

18. **Ascochyta socialis** Sacc. Syll. III, 405. — N. K. A. 2, VI, 15 et 607. — F. d'une espèce de *Carex*.

Var. **herbarum**. — *Saponaria aff.* — N. K. A. 2, VI, 607.

***Ascochyta Solani** Oud. N. K. A. 2, VI, 44 et 606. — Voir: *Diplodina*.

19. **Ascochyta solanicola** Oud. Zitt. V. K. A. v. W. 1900, p. 350; id. N. K. A. 3, II, 264. — Sacc. Syll. XVI, 931. — Wint. Kr. Fl. VII, 879. — F. du *Solanum nigrum*.

20. **Ascochyta Syringae** Bres. — Sacc. Syll. XI. 524. Wint. Kr. Fl. VI, 666. — N. K. A. 3, III, 1105. — F. du *S. vulgaris.*

***Ascochyta tatarica** Allesch. — N. K. A. 3, II, 722. — Voir: *Diplodina.*

***Ascochyta Tussilaginis** Oud. N. K. A. 3, I, 498. — Voir: *Darluca.*

***Ascochyta viburnicola** Oud. N. K. A. 3, II, 365. — Voir: *Diplodina.*

DIPLODINA.

1. **Diplodina Aceris** Sacc. et Brun. — Sacc. Syll. Addit. aux vol. I à IV, 333; id. Syll. X, 312. — Wint. Kr. Fl. VI, 676. — N. K. A. 2, V., 199 et VI, 607. — Ram. de l'*Acer Pseudo-Platanus.*

2. **Diplodina ampelina** Allesch. dans Wint. Kr. Fl. VI, 669 (sous n° 1931). — Ascochyta ampelina β. cladogena Sacc. Syll. III, 389. — Oud. Hedw. 1898, p. 319; id. N. K. A. 3, II, 260. — Ram. du *Vitis vinifera.*

3. **Diplodina berberidina** (Sacc.) Allesch. dans Wint. Kr. Fl. VI, 680. — Ascochyta berberidina Sacc. Syll. III, 395; Oud. N. K. A. 2, V, 498 et 2, VI, 606.

4. **Diplodina Coronillae** Brun. — Oud. N. K. A. 3, II, 729. — Sacc. Syll. XI, 526. — Wint. Kr. Fl. VI, 684. — Ram. du *Coronilla Emerus.*

5. **Diplodina Dasycarpi** Oud. Zitt. V. K. A. v. W. 1900, p. 352; id. N. K. A. 3, II, 266. — Sacc. Syll. XVI, 937. — Wint. Kr. Fl. VII, 881. — Ram. de l'*Acer dasycarpum.*

6. **Diplodina deformis** (Karst.) Sacc. Syll. III, 413. — N. K. A. 2, V, 199; 2, VI, 292 et 607; 3, I, 499. — Wint. Kr. Fl. VI, 696. — Ram. des *Sambucus nigra* et *racemosa.*

7. **Diplodina Dianthi** (Ces.) Sacc. Syll. III, 412. — Wint. Kr. Fl. VI, 685. — N. K. A. 2, VI, 607. — Tiges du *Saponaria officinalis.*

8. **Diplodina Epilobii** Oud. — Ascochyta Epilobii Oud. Beibl. z. bot. Centr. bl., 1902; id. N. K. A. 3, II, 722. — Tiges de l'*Epil. angustifolium.*

9. **Diplodina Eschscholtziae** Oud. N. K. A. 3, III, 1108.

10. **Diplodina Euphrasiae** (Oud.) Allesch. dans Wint. Kr. Fl. VI, 686. — Sacc. Syll. XVI, 939. — Ascochyta Euphrasiae Oud. Zitt. V. K. A. v. W. 1900, p. 303; id. N. K. A. 3, I, 496. — Tiges de l'*Euphrasia officinalis.*

11. **Diplodina Evonymi** (Oud.) Allesch. dans Wint. Kr. Fl. VI.

686. — Ascochyta Evonymi Oud. Hedw. 1894, p. 18; N. K. A. 2, VI, 292 et 607. — Ram. de l'*Evonymus europaea.*

12. **Diplodina Fraxini** (Oud.) Allesch. dans Wint. Kr. Fl. VI, 687. — Ascochyta Fraxini Oud. N. K. A. 2, V, 497 et 2, VI, 607. — Ram. du *Fraxinus excelsior.*

13. **Diplodina Hypochoeridis** (Oud.) Sacc. et Syd. Syll. XVI, 938. — Wint. Kr. Fl. VII, 882. — Ascochyta Hypoch. Oud. Zitt. V. K. A. v. Wet. 1900 p. 304; id. N. K. A. 3, II, 260. — Pédonc. du *Hypochoeris glabra.*

14. **Diplodina Idaei** (Oud.) Allesch. dans Wint. Kr. Fl. VI, 695. — Sacc. Syll. XVI, 937. — Ascochyta Idaei Oud. Hedw. 1898, p. 178; id. Zitt. V. K. A. v. W. 1900, p. 304; id. N. K. A. 3, I, 497. — Tiges du *Rubus idaeus.*

15. **Diplodina ignobilis** (Oud.) Sacc. et Syd. dans. Sacc. Syll. XVI, 940. — Wint. Kr. Fl. VII, 881. — Ascochyta ignobilis Oud. N. K. A. 3, II, 261. — Tiges de l'*Alisma Plantago.*

16. **Diplodina Jacobaeae** Oud. N. K. A. 3, III, 1108. — Tiges du *Senecio Jacobaea.*

17. **Diplodina Junci** Oud. N. K. A. 3, III, 1109. — Chaumes du *Juncus squarrosus.*

18. **Diplodina Lactucae** (Oud.) Sacc. Syd. dans Sacc. Syll. XVI, 939. — Wint. Kr. Fl. VII, 882. — Ascochyta Lactucae Oud. N. K. A. 3, II, 261. — Tiges fleuries du *Lactuca sativa.*

19. **Diplodina Lysimachiae** (Oud.) Sacc. Syd. in Sacc. Syll. XVI, 939. — Wint. Kr. Fl. VII, 882. — Ascochyta Lysim. Oud. N. K. A. 3, II, 262. — Tiges du *Lysim. thyrsiflora.*

20. **Diplodina Medicaginis** Oud. N. K. A. 3, II, 884. — Tiges d'une espèce de *Medicago.*

21. **Diplodina Millefolii** Oud. — Wint. Kr. Fl. VI, 676. — Ascochyta Millef. Oud. N. K. A. 2, VI, 44 et 606. — Sacc. Syll. XI, 524. — Tiges de l'*Achillea Millefolium.*

22. **Diplodina Myrtilli** (Oud.) Allesch. dans Wint. Kr. Fl. VII, 884. — Sacc. Syll. XVI, 932. — Oud. Hedw. 1898, p. 317. — id. Zitt. V. K. A. v. W. 1900, p. 305; id. N. K. A. 3, II, 262. — Ram. du *Vaccinium Myrtillus.*

23. **Diplodina Negundinis** Oud. Zitt. V. K. A. v. W. 1900, p. 352; id. N. K. A. 3, II, 267. — Sacc. Syll. XVI, 937. — Wint. Kr. Fl. VII, 883. — Ram. du *Negundo fraxinifolia.*

24. **Diplodina Opuli** (Oud.) Alles. in Wint. Kr. Fl. VI, 700. — Ascochyta Opuli Oud. — Ram. du *Viburnum Opulus.*

25. **Diplodina Oudemansii** Allesch. dans Wint. Kr. Fl. VI, 694. — Sacc. Syll. XVI, 936. — Ascochyta Grossulariae Oud. Hedw.

1898, p. 178; Zitt. V. K. A. v. W. 1900, p. 303; id. N. K. A. 3, I, 497. — Ram. du *Ribes Grossularia.*

26. **Diplodina physalidicola** Oud. — Ascochyta physalicola Oud. N. K. A. 3, II, 722. — Tiges du *Physalis Alkekengi.*

27. **Diplodina Poae** Oud. — Septoria Poae Oud. N. K. A. 2, III, 150. — Septoria Oudemansii Sacc. Syll. III, 563. — Rhabdospora Oudemansii (Sacc.) All. in Wint. Kr. Fl. VI, 917. — Tiges du *Poa nemoralis.*

28. **Diplodina Pseudacaciae** Oud. N. K. A. 2, VI, 607.

29. **Diplodina Rhei** (Ell. Everh.) Oud. — Ascochyta Rhei Ell. Everh. forma caulincola Oud. N. K. A. 3, II, 264. — Tiges et ram. du *Rheum Rhaponticum.*

30. **Diplodina Salicis** West. Not. V, 29; Bull. Acad. r. de Belgique 2, II, n° 7. — Sacc. Syll. III, 411. — Wint. Kr. Fl. VI, 695. — Diplodia Salicis West. Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 88. — Ram. d'une espèce de *Salix.*

29. **Diplodina Salsolae** Oud. — Wint. Kr. Fl. VI, 696. — Ascochyta Salsolae Oud. Hedw. 1894, p. 19; id. N. K. A. 2, VI, 292; ibid. p. 606. — Sacc. Syll. XI, 524. — Tiges du *Salsola Kali.*

30. **Diplodina sambucella** (Pass.) Allesch. dans Wint. Kr. Fl. VI, 696. — Ascochyta sambuc. Pass. — Oud. N. K. A. 3, I, 198. — Sacc. Syll. X, 296. — Ram. du *Sambucus nigra.*

31. **Diplodina Solani** (Oud.) Allesch. in Wint. Kr. Fl. VI, 698. — Ascochyta Solani Oud. Versl. Med. K. A. v. W. 3, VII (1890), 317; id. N. K. A. 2, VI, 44; ibid. p. 606. — Sacc. Syll. X, 304. — Tiges du *Solanum tuberosum.*

32. **Diplodina Spiraeae** Pass. — Oud. N. K. A. 3, III, 1109. — Sacc. Syll. X, 313. — Wint. Kr. Fl. VI, 698. — Ram. du *Sp. opulifolia.*

33. **Diplodina tatarica** Allesch. dans Wint. Kr. Fl. VI, 690. — Ascochyta tatar. Allesch. Bayer. bot. Ges. IV, 31. — Oud. N. K. A. 3, II, 722. — Ram. du *Lonicera tatarica.*

34. **Diplodina viburnicola** (Oud.) Sacc. et Syd. Syll. XVI, 938. — Wint. Kr. Fl. VII, 884. — Ascochyta viburnicola Oud. N. K. A. 3, II, 265.

VERMICULARIELLA.

1. **Vermiculariella Elymi** Oud. N. K. A. 3, I, 195. — Sacc. Syll. XVI, 944. — Allesch. dans Wint. Kr. Fl. VII, 885. — F. de l'*Elymus arenarius.*

ACTINONEMA.

1. **Actinonema Rosae** (Lib.) Fr. — N. K. A. 2, VI, 607. — Sporotrichum macularum T. N. G. XI, 403. — Asteroma Rosae Lib. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 120. — Sacc. Syll. III, 408. — Wint. Kr. Fl. VI, 708. — F. du *Rosa rubiginosa* et autres.

DARLUCA.

1. **Darluca ammophila** Sacc., Bomm., Rouss. — Sacc. Syll. X, 311. — Wint. Kr. Fl. VI, 703. — N. K. A. 2, VI, 607. — F. du *Psamma littoralis* (Ps. arenaria).

2. **Darluca contubernalis** Oud. — Ascochyta contub. Oud. N. K. A. 2, V, 170. — Sacc. Syll. X, 306. — Wint. Kr. Fl. VI, 662. — F. du *Rumex Acetosa*.

3. **Darluca Filum** (Biv.) Cast. — N. K. A. 2, VI, 607; N. K. A. 3, II, 265. — Sacc. Syll. III, 410. — Wint. Kr. Fl. VI, 704. — F. des *Galium Mollugo* et *uliginosum*.

4. **Darluca mucronulata** Oud. Beibl. z. bot. Centr. bl. 1902; id. N. K. A. 3, II, 728. — F. d'une Graminée, en compagnie d'un *Puccinia*.

5. **Darluca Tussilaginis** Oud. — Ascochyta Tussil. Oud. Hedw. 1898, p. 178; id. Zitt. V. K. A. v. W. 1900, p. 350; id. N. K. A. 3, I, 198. — Sacc. Syll. XVI, 931. — Wint. Kr. Fl. VII, 880. — F. du *Tussilago Farfara*.

B. Compositae.

THORACELLA.

1. **Thoracella Ledi** Oud. Zitt. V. K. A. v. W. 1900, p. 352; id. N. K. A. 3, II, 267. — Sacc. Syll. XVI, 941. — Allesch. dans Wint. Kr. Fl. VII, 885. — F. du *Ledum palustre*.

CYTODIPLOSPORA.

1. **Cytodiplospora Aceruni** Oud. Zitt. V. A. v. W. 1900, p. 351; id. N. K. A. 3, II, 266. — Cytod. Aceris Sacc. Syll. XVI, 941. — Wint. Kr. Fl. VII, 886. — Ram. des *Acer dasycarpum* et *Pseudo-Platanus*.

2. **Cytodiplospora Betulae** Oud. Hedw. 1898, p. 317; id. N. K. A. 3, II, 266. — Sacc. Syll. XVI, 942. — Wint. Kr. Fl. VII, 886.

3. **Cytodiplospora Castaneae** Oud. Hedw. 1894, p. 19. — N. K. A. 2, VI, 292 et 608. — Sacc. Syll. XI, 528. — Wint. Kr. Fl. VI, 712. — Ram. du *Castanea vesca*.

4. **Cytodiplospora Tiliae** Oud. Beibl. z. bot. Centr. bl. 1902; id. N. K. A. 3, II, 726. — Ram. du *Tilia cordata* (= T. ulmifolia.)

5. Hyalophragmiae.

STAGONOSPORA.

1. **Stagonospora Aceris dasycarpi** Oud. Hedw. 1898, p. 179; id. N. K. A. 3, I, 500. — Sacc. Syll. XVI, 948. — Wint. Kr. Fl. VI, 966; VII, 912. — Stag. Dasycarpi Oud. Zitt. V. K. A. v. W. 1900, p. 353. — Ram. de l'*Acer dasycarpum*.

2. **Stagonospora bufonia** Bresad. — Oud. N. K. A. 3, II, 753. — Sacc. Syll. XIV, 963. — Wint. Kr. Fl. VI, 978. — Chaumes du *Juncus bufonius*.

3. **Stagonospora Caricis** (Oud.) Sacc. Syll. III, 152. — Wint. Kr. Fl. VI, 969. — N. K. A. 2, VI, 15 et 609. — Hendersonia Caricis Oud. Arch. Néerl. VIII (1873), 361; id. N. K. A. 2, I, 255. — F. du *Carex muricata*.

4. **Stagonospora macrosperma** (Sacc. et Roum.) Sacc. Syll. III, 453. — Wint. Kr. Fl. VI, 975. — Oud. N. K. A. 3, II, 753. — Chaumes du *Scirpus Tabernaemontani*.

5. **Stagonospora Mespili** (West.) Sacc. Syll. III, 446. — Hendersonia Mesp. West. Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 82. — Wint. Kr. Fl. VII, 217. — Oud. N. K. A. 3, II, 268. — Ram. du *Mespilus germanica*.

6. **Stagonospora Sparganii** (Fuck.) Allesch. dans Wint. Kr. Fl. VI, 989. — Sacc. Syll. III, 451 (comme sous-espèce). — Oud. N. K. A. 3, II, 895. — F. de *Sparganium ramosum*.

7. **Stagonospora subseriata** (Desm.) Sacc. Syll. III, 451. — Wint. Kr. Fl. VI, 979. — Hendersonia subs. Desm. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 83. — Chaumes du *Molinia caerulea*.

8. **Stagonospora turgida** Sacc. Syll. III, 447. — Wint. Kr. Fl. VI, 974. — N. K. A. 2, VI, 609. — Ram. du *Fraxinus excelsior*.

9. **Stagonospora typhicola** Oud. N. K. A. 3, II, 895.

10. **Stagonospora Typhoidearum** (Desm.) Sacc. Syll. III, 451. — Wint. Kr. Fl. VI, 989. — Oud in Herb. — F. du *Typha latifolia*.

6. Phaeophragmiae.

HENDERSONIA.

1. **Hendersonia Agropyri repentis** Oud. Zitt. V. K. A. v. W.

1900, p. 353; N. K. A. 3, I, 500. — Sacc. Syll. XVI, 946. — Wint. Kr. Fl. VII, 931. — F. du *Triticum* (= Agropyrum) *repens*.

2. **Hendersonia arundinacea** (Desm.) Sacc. Syll. III, 436. — Wint. Kr. Fl. VII, 219. — N. K. A. 2, V, 117 et 2, VI, 608. — Tiges du *Phragmites communis*.

3. **Hendersonia Beinsi** Oud.[1]) N. K. A. 3, II, 885. — F. du *Thujopsis dolabrata*.

4. **Hendersonia Caraganae** Oud. Beibl. z. bot. Centrbl. 1902; id. N. K. A. 3, II, 730. — Axes primaires de l'inflorescence du *Caragana arborescens*.

***Hendersonia Caricis** Oud. N. K. A. 2, I, 255; Arch. Néerl. VIII, 361. — Voir: *Stagonospora*.

5. **Hendersonia culmiseda** Sacc. Syll. III, 437. — Wint. Kr. Fl. VII, 193. — N. K. A. 2, VI, 45, 293 et 608. — F. et tiges du *Psamma arenaria* et d'une esp. de *Bambusa* cultivée.

6. **Hendersonia Fiedleri** West. Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 83; N. K. A. 2, VI, 608. — Sacc. Syll. III, 421. — Wint. Kr. Fl. VII, 202. — Ram. du *Cornus sanguinea*.

7. **Hendersonia fissa** (Fr.) Sacc. Syll. III, 124. — N. K. A. 2, VI, 609. — Camarosporium fissum (P.) Starb. — Wint. Kr. Fl. VII, 281. — Ram. du *Rosa rubiginosa*.

8. **Hendersonia Fuckelii** Sacc. Syll. III, 137. — Wint. Kr. Fl. VII, 220. — N. K. A. 2, IV, 532 et 2, VI, 608. — Gaînes du *Phragmites communis*.

9. **Hendersonia Gleditschiae** Kickx. — N. K. A. 2, VI, 609. — Sacc. Syll. III, 120. — Wint. Kr. Fl. VII, 209. — Ram. du *Gleditschia triacanthos*.

10. **Hendersonia Grossulariae** Oud. Zitt. V. K. A. v. W. 1900, p. 353; N. K. A. 3, II, 268. — Sacc. Syll. XVI, 943. — Wint. Kr. Fl. VII, 230. — Ram. du *Ribes Grossularia*.

11. **Hendersonia lichenicola** (Oda) Fr. — N. K. A. 1, V, 345; Arch. Néerl. VIII (1873), 362. — Sacc. Syll. III, 139. — Wint. Kr. Fl. VII, 214. — Ram. du *Rosa canina*.

Hendersonia Mespili West. — Prod. Fl. Bat. II, 1, p. 82; N. K. A. 3, II, 268. — Voir: *Stagonospora*.

Hendersonia mutabilis B. Br. — N. K. A. 2, I, 255; Arch. Néerl. VIII, 361. — Voir: *Dichomera*.

12. **Hendersonia Opuli** Oud. N. K. A. 2, VI, 608. — Ram. du *Viburnum Opulus*.

[1]) A l'honneur de Mr. C. A. G. Beins, l'explorateur zélé de la flore mycologique de Nunspeet.

13. **Hendersonia Oudemansii** Sacc. Syd. in Sacc. Syll. XVI, 960. — Wint. Kr. Fl. VII, 229. — H. Rhododendri Oud. Hedw. 1894, p. 19; N. K. A. 2, VI, 293 et 608. — Ram. d'une espèce de Rhododendrum arborescente.

14. **Hendersonia Periclymeni** Oud. N. K. A. 2, V, 499 et 2, VI, 608. — Sacc. Syll. X, 322. — Wint. Kr. Fl. VII, 215. — Ram. du *Lonicera Periclymenum*.

15. **Hendersonia Phragmitis** Desm. — Sacc. Syll. III, 137. — Wint. Kr. Fl. VII, 219. — Oud. N. K. A. 2, IV, 531. — H. Phragmitidis Desm. Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 82. — Gaînes du *Phragm. communis*.

16. **Hendersonia pulchella** f^a **Saponariae** Sacc. Syll. III, 431. Wint. Kr. Fl. VII, 236. — Oud. N. K. A. 3, I, 199. — Tiges du *Saponaria officinalis*.

***Hendersonia Rhododendri** Oud. N. K. A. 2, VI, 293 et 608. — Voir: *H. Oudemansii*.

17. **Hendersonia Rubi** (West.) — Sacc. Syll. III, 424. — Wint. Kr. Fl. VII, 232. — N. K. A. 3, II, 885. — Ram. d'une esp. de *Rubus*.

18. **Hendersonia sarmentorum** West. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 83; N. K. A. 2, VI, 293 et 608; 3, I, 500; 3, II, 269; 3, III, 1109. — Ram. du *Rhododendron ponticum* et du *Spiraea opulifolia*.

19. **Hendersonia Typhae** Oud. Arch. Néerl. VIII (1873), 361. id. N. K. A. 2, I, 255. — Sacc. Syll. III, 435. — Wint. Kr. Fl. VII, 243. — Chaumes du *T. angustifolia*.

20. **Hendersonia typhicola** Oud. Zitt. V. K. A. v. W. 1900, p. 353; id. N. K. A. 3, II, 269 et 730. — Sacc. Syd. Syll. XVI, 946. — Wint. Kr. Fl. VII, 933. — Chaumes du *T. latifolia*.

21. **Hendersonia vagans** Fuck. — Arch. Néerl. II (1867), 37; N. K. A. 2, I, 168 et 2, VI, 608. — Sacc. Syll. III, 419. — Wint. Kr. Fl. VII, 208.

22. **Hendersonia Weigeliae** Oud. Zitt. V. K. A. v. W. 1900, p. 353; id. N. K. A. 3, I, 500. — Sacc. Syd. Syll. XVI, 945. — Wint. Kr. Fl. VII, 933. — Ram. du *Weigelia amabilis*.

PROSTHEMIUM.

1. **Prosthemium betulinum** Kze. — Prod. Fl. Bat. II, 4, p. 115; N. K. A. 2, VI, 293 et 609; 3, I, 501. — Sacc. Syll. III, 444. — Wint. Kr. Fl. VII, 255. — Ram. du *Betula alba*.

2. **Prosthemium stellare** Riess. — N. K. A. 2, VI, 609; Oud.

ibid. 3. II, 749. — Sacc. Syll. III, 445. — Wint. Kr. Fl. VII, 235. — Ram. de l'*Alnus glutinosa*.

CRYPTOSTICTIS.

1. **Cryptostictis Niesslii** Oud. N. K. A. 3, II. 725. — F. du *Fagus silvatica*.

7. Phaeodictyae.

A. **Simplices.**

CAMAROSPORIUM.

1. **Camarosporium Aceris dasycarpi** Oud. Hedw. 1898, p. 179; id. N. K. A. 3, II, 501. — Sacc. Syll. XVI, 952. — Wint. Kr. Fl. VII, 935. — Cam. Dasycarpi Oud. Zitt. V. K. A. v. W. 1900, p. 353; id. N. K. A. 3, II, 331. — Ram. de l'*Acer dasycarpum*.

2. **Camarosporium Ariae** Oud. N. K. A. 2. VI, 293; id. Hedw. 1894, p. 20. — Sacc. Syll. XI, 537. — Wint. Kr. Fl. VII, 284. — Ram. du *Sorbus Aria*.

3. **Camarosporium Coluteae** (Peck et Cooke) Sacc. Syll. III, 460. — Wint. Kr. Fl. VII, 264. — Oud. N. K. A. 3, II. 722. — Ram. du *Colutea arborescens*.

4. **Camarosporium Coronillae** Sacc. et Speg., Syll. III, 460. — Wint. Kr. Fl. VII, 264. — Oud. N. K. A. 2, 5, 500. — Ram. du *Cytisus Laburnum*.

5. **Camarosporium Crataegi** Oud. Beibl. z. bot. Centrbl. 1902; id. N. K. A. 3. II. 723. — Ram. du *Cr. Oxyac.*

6. **Camarosporium cruciatum** (Fuck.) Sacc. Syll. III, 464. — Wint. Kr. Fl. VII, 287. — N. K. A. 2, VI, 610 et 3, II, 723. — Ram. de l'*Ulmus campestris*.

***Camarosporium Dasycarpi** Oud. N. K. A. 3, II, 331. — Voir: *C. Aceris dasycarpi*.

7. **Camarosporium Gleditschiae** Oud. Hedw. 1894, p. 19. — N. K. A. 2, VI, 294 et p. 610. — Sacc. Syll. XI, 536. — Wint. Kr. Fl. VII, 269. — Ram. du *Gled. triacanthos*.

8. **Camarosporium Ilicis** Oud. Hedw. 1898, p. 179; Zitt. V. K. A. v. W. 1900, p. 353; id. N. K. A. 3, 1, 502. — Sacc. Syd. Syll. XVI, 952. — Wint. Kr. Fl. VII, 937. — Ram. de l'*Ilex Aquifolium*.

9. **Camarosporium incrustans** Sacc. Syll. III, 463. — Wint. Kr. Fl. VII, 258. — N. K. A. 2. VI, 610. — Ram. de l'*Evonymus europaea*.

10. **Camarosporium Ligustri** Berl. et Destr. N. K. A. 2, VI, 609. — Sacc. et Syd., Syll. XIV, 965. — Wint. Kr. Fl. VII, 270. — Ram. du *Ligustrum vulgare.*

11. **Camarosporium macrosporum** Sacc. Syll. III, 461. — N. K. A. 2, V, 500 et 2, VI, 610. — Wint. Kr. Fl. VII, 276. — Ram. du *Philadelphus coronarius.*

12. **Camarosporium Mori** Sacc. Syll. III, 464. — Wint. Kr. Fl. VII, 273. — N. K. A. 2, VI, 45 et 609. — Ram du *Morus alba.*

13. **Camarosporium Oudemansii** Sacc. et Syd., Syll. XIV, 966. — Wint. Kr. Fl. VII, 286. — Cam. Syringae Oud. Hedw. 1894, p. 20; N. K. A. 2, VI, 294 et 610. — Ram. du *Syringa vulgaris.*

14. **Camarosporium Periclymeni** Oud. Hedw. 1898, p. 179; id. Zitt. V. K. A. v. W. 1900, p. 353; id. N. K. A. 3, I, 502; ibid. 2, VI, 608. — Sacc. Syll. XVI, 954 — Wint. Kr. Fl. VII, 937. — Ram. du *Lonicera Periclymenum.*

15. **Camarosporium Persicae** Oud. — N. K. A. 2, VI, 610. — Ram. du *Persica vulgaris.*

16. **Camarosporium Pruni lusitanicae** Oud. — N. K. A. 2, VI, 609. — Ram. du *Prunus lusitanica.*

17. **Camarosporium quaternatum** (Harzlinsky) Sacc. Syll. III, 467. — Wint. Kr. Fl. VII, 272. — Oud. N. K. A. 3, I, 502; ibid. p. 239. — Ram. du *Lycium halimifolium* (= L. barbarum Auct., non L.)

18. **Camarosporium Robiniae** (West.) Sacc. Syll. III, 459. — Wint. Kr. Fl. VII, 280. — N. K. A. 2, VI, 610 et 3, II, 723. — Ram. du *Robinia Pseudo-Acacia.*

19. **Camarosporium Rosarum** (West.) Sacc. Syll. III, 462. — Wint. Kr. Fl. VII, 281, N. K. A. 2, VI, 610. — Ram. du *Rosa rubiginosa.*

20. **Camarosporium rubicolum** Sacc. Syll. III, 462. — Wint. Kr. Fl. VII, 282. — N. K. A. 2, VI, 610. — Ram. du *Rubus idaeus.*

21. **Camarosporium subfenestratum** (Berk. et Curt.) Sacc. Syll. III, 459. — Wint. Kr. Fl. VII, 280. — Oud. N. K. A. 3, II, 879. — Ram. du *Robinia Pseudo-Acacia.*

***Camarosporium Syringae** Oud. N. K. A. 2, VI, 294 et 610. — Voir: *C. Oudemansii.*

22. **Camarosporium Tanaceti** Oud. Zitt. V. K. A. v. W. 1900, 354; id, N. K. A. 3, II, 269. — Sacc. Syll. XVI, 954. — Wint. Kr. Fl. VII, 939. — Tiges du *Tanacetum vulgare.*

23. **Camarosporium Triacanthi** Sacc. Syll. III, 460. — Wint. Kr. Fl. VII, 268. — N. K. A. 2, VI, 609. — Ram. du *Gleditschia triacanthos.*

B. **Compositae.**

DICHOMERA.

1. **Dichomera mutabilis** (Berk. et Br.) Sacc. Syll. III, 471. — Wint. Kr. Fl. VII, 291. — Hendersonia mut. Oud. Arch. Néerl. VIII, (1873), 361; N. K. A. 2, I, 255 et 2, VI, 611. — Ram. du *Platanus occidentalis.*

2. Scolecosporae.

A. **Simplices.**

SEPTORIA.

Septoria Aceris Lib. — N. K. A. 2, II, 36. — Voir: *Phleospora.*

1. **Septoria Acetosae** Oud. Hedw. 1894, p. 20; id. N. K. A. 2, VI, 294. — Sacc. Syll. XI, 545. — Wint. Kr. Fl. VI, 848. — Sphaeria vagans β. rumicicola T. N. G. XI, 395. — F. du *Rumex Acetosa.*

2. **Septoria acuum** Oud. N. K. A. 2, IV, 234. — Sacc. Syll. XI, 360. — Wint. Kr. Fl. VI, 829. — Aiguilles du *Pinus silvestris.*

Septoria Aegopodii Desm. — N. K. A. 2, 94 et Fgi Neerl. exs. n° 95. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 101. — Voir: *S. Podagrariae.*

3. **Septoria Aesculi** (Lib.) West. — Sacc. Syll. III, 479. — Wint. Kr. Fl. VI, 725. — Sphaeria aesculicola Fr. — T. N. G. XI, 395; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 102. — F. de l'*Aesc Hippocastanum.*

4. **Septoria Alismatis** Oud. Hedw. 1876, p. 101; id. N. K. A. 2, II, 100. — Sacc. Syll. III, 569. — Wint. Kr. Fl. VI, 726. — F. de l'*Alisma Plantago.*

5. **Septoria Alliorum** West. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 102. — Sacc. Syll. III, 571. — Wint. Kr. Fl. VI, 727. — F. de l'*Allium Porrum.*

6. **Septoria Anemones** Desm. — Oud. N. K. A. 2, II, 180. — Sacc. Syll. III, 521. — Wint. Kr. Fl. VI, 730. — F. de l'*Anemone nemorosa.*

***Septoria Ari** Desm. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 102. — Confondu avec les spermogones de l'*Aecidium Ari.*

7. **Septoria Armoraciae** Sacc. Syll. III, 519. — Wint. Kr. Fl. VI, 733. — N. K. A. 2, II, 180 et 3, II, 270. — F. du *Cochlearia Armoracia.*

***Septoria Arundinis** (Mont.) Sacc. Syll. III, 564. — N. K. A. 2, VI, 611. — Voir: *Rhabdospora.*

8. **Septoria Atriplicis** (West) Fuck. — Oud. Arch. Néerl. VIII (1873), 363; id. N. K. A. 2, I, 169. — Sacc. Syll. III, 556. —

Wint. Kr. Fl. VI, 737. — Sphaeria vagans α atriplicicola Fr. — T. N. G. XI, 395; Phyllosticta Atriplicis West. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 96. — F. de l'*Atriplex patula*.

***Septoria Aucuparlae** Oud. Fgi Néerl. exs. n° 93. — Voir: *S. aucuparicola*.

9. **Septoria Aucuparicola** Oud. — N. K. A. 3, II, 893. — F. du *Pirus* (Sorbus) *Aucuparia*; id. Fgi Neerl. exs. n° 93 (sub S. Aucupariae).

***Septoria Sorbi** in Rab. F. E. n° 3498, a. P. Magnus propre Noviomagum lecta, eadem videtur.

10. **Septoria Badhami** Berk. Br. — Oud. N. K. A. 2, I, 169. — Sacc. Syll. III, 480. — Wint. Kr. Fl. VI, 878. — F. du *Vitis vinifera*.

11. **Septoria Betae** West. Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 102. — Sacc. Syll. III, 556. — Wint. Kr. Fl. VI, 741. — F. du *Beta vulgaris* var. *Rapa*, cultivé.

12. **Septoria bractearum** Mont. — N. K. A. 3, II, 270. — Sacc. Syll. III, 515. — Wint. Kr. Fl. VI, 779. — Bractées d'une espèce d'*Euphorbia*.

13. **Septoria calycina** Kickx. — Oud. Arch. Néerl. VIII (1873), 365. — id. N. K. A. 2, II, 37. — Sacc. Syll. III, 517. — Wint. Kr. Fl. VI, 773. — F. d'une esp. de *Dianthus*.

14. **Septoria Capsellae** Oud. Zitt. V. K. A. v. W. 1900, p. 354; id. N. K. A. 3, II, 270. — Sacc. Syll. XVI, 956. — Wint. Kr. Fl. VII, 889. — F. du *Caps. Bursa pastoris*.

15. **Septoria caricicola** Sacc. Syll. III, 556. — Wint. Kr. Fl. VI, 749. — N. K. A. 3, II, 270. — F. d'une esp. de *Carex*.

16. **Septoria Caricis** Pass. — N. K. A. 2, VI, 295 et 613. — Sacc. Syll. III, 566. — Wint. Kr. Fl. VI, 750. — F. d'une esp. de *Carex*.

17. **Septoria castanicola** (Desm.) Sacc. Syll. III, 504. — Wint. Kr. Fl. VI, 752. — Arch. Néerl. VIII (1873), 363. — S. castaneaecola Oud. N. K. A. 2, I, 92 et 169; ibid. 2, VI, 612; Oud. Herb. N. Pl. n° 252 et Fgi Neerl. exs. n° 99. — F. du *Castanea sativa*.

18. **Septoria Cerastii** Rob. et Desm. — Oud. Versl. Med. K. A. v. W. 2, XVIII, 373; id. N. K. A. 2, IV, 235. — Sacc. Syll. III, 518. — Wint. Kr. Fl. VI, 734. — F. du *Cerastium triviale*.

19. **Septoria Cheiranthi** Rob. et Desm. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 103. — Sacc. Syll. III, 521. — Wint. Kr. Fl. VI, 755. — F. du *Cheiranthus Cheiri*.

20. **Septoria Chelidonii** Desm. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 103.

N. K. A. 2, I, 94 et 2, VI, 611; Oud. Herb. N. Pl. n° 394 et Fgi Neerl. exs. n° 91. — Sacc. Syll. III, 521. — Wint. Kr. Fl. VI, 756. — F. du *Chelidonium majus.*

21. **Septoria Chenopodii** West. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 103. — Sacc. Syll. III, 556. — Wint. Kr. Fl. VI, 754. — F. du *Chenopodium viride.*

22. **Septoria conigena** Sacc. et Roum. Mich. II, 625; Sacc. Syll. III, 559. — Wint. Kr. Fl. VI, 719. — Oud. N. K. A. 3, III, 1116.

23. **Septoria conorum** (Sacc.) Oud. Zitt. V. K. A. v. W. 1900, p. 354; id. N. K. A. 3, II, 270. — Phoma conorum Sacc. Syll. III, 150. — Ecailles séminifères du *Picea excelsa.*

24. **Septoria Convolvuli** Desm. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 103; N. K. A. 2, VI, 612; Oud. Fgi Néerl. exs. n° 94. — Sacc. Syll. III, 536. — Wint. Kr. Fl. VI, 764. — F. des *Calystegia sepium* et *Convolvulus arvensis.*

25. **Septoria cornicola** (Desm.) Sacc. Syll. III, 492. — Wint. Kr. VI, 766. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 104. — F. du *Cornus sanguinea.*

26. **Septoria corylina** Peck. — N. K. A. 3, II, 751. — Sacc. Syll. III, 503. — Wint. Kr. Fl. VI, 767. — F. du *Corylus Avellana.*

27. **Septoria Crataegi** Desm. — Oud. N. K. A. 2, II, 180. — Sacc. Syll. III, 486. — Wint. Kr. Fl. VI, 767. — F. du *Crat. monogyna.*

28. **Septoria curvata** (Rab. et Br.) Sacc. Syll. III, 434. — Wint. Kr. Fl. VI, 846; N. K. A. 3, II, 271. — Folioles du *Robinia Pseudo-Acacia.*

29. **Septoria Dianthi** Desm. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 104; Oud. Versl. Med. K. A. v. W. 3, VII, 106. — Sacc. Syll. III, 516. — Wint. Kr. Fl. VI, 772. — F. d'une esp. de *Dianthus.*

a. **Saponariae** Desm. — Prodr. Fl. Bat. ibid. — Voir: *S. Saponariae.*

30. **Septoria Dulcamarae** Desm. — N. K. A. 2, V, 501 et VI, 612. — Sacc. Syll. III, 535. — Wint. Kr. Fl. VI, 858. — F. du *Solanum Dulcamara.*

31. **Septoria Elaeagni** (Chev.) Desm. — N. K. A. 2, I, 94 et 3, II, 271; Oud. Herb. N. Pl. n° 160. — Sacc. Syll. X, 357. — Wint. Kr. Fl. VI, 775. — F. de l'*Elaeagnus angustifolius.*

Septoria eryngicola Oud. et Sacc. in Sacc. Syll. X, 367, sub n° 298 et N. K. A. 3, II, 277, sub n° 300. — Voir: *Rhabdospora Eryngii.*

32. **Septoria Epilobii** West. — N. K. A. 2, VI, 45 et 611. — Sacc. Syll. III, 513. — Wint. Kr. Fl. VI, 776. — F. de l'*Epilobium angustifolium*.

***Septoria Euphorbiae** Desm. — Oud. N. K. A. 2, IV, 235. — Voir: *Rhabdospora Thümeniana* Sacc.

33. **Septoria Ficariae** Desm. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 104. — Sacc. Syll. III, 522. — Wint. Kr. Fl. VI, 782. — F. du *Ficaria verna*.

34. **Septoria filispora** (Cooke) Sacc. Syll. III, 569. — Wint. Kr. Fl. VI, 872. — Oud. N. K. A. 3, III, 1116. — F. du *Typha latifolia*.

35. **Septoria flexuosa** Oud. Beibl. z. bot. Centralbl. 1902; id. N. K. A. 3, II, 751. — F. du *Sparganium ramosum*.

36. **Septoria Fragariae** Desm. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 104. — Sacc. Syll. III, 511. — Wint. Kr. Fl. VI, 783. — F. du *Frag. resca*.

37. **Septoria Galeopsidis** West. — N. K. A. 3, II, 272. — Sacc. Syll. III, 539. — Wint. Kr. Fl. VI, 785. — F. du *Galeopsis Tetrahit*.

38. **Septoria Gei** Rob. et Desm. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 105. — Sacc. Syll. III, 510. — Wint. Kr. Fl. VI, 788. — F. du *Geum urbanum*.

39. **Septoria graminum** Desm. — Oud. N. K. A. 3, I, 503. — Sacc. Syll. III, 565. — Wint. Kr. Fl. VI, 789. — F. du *Holcus mollis*.

40. **Septoria Grossulariae** (Lib.) West. — N. K. A. 2, III, 150 et 2, VI, 612; Oud. Fgi Neerl. exs. n° 186. — Sacc. Syll. III, 491. — Wint. Kr. Fl. VI, 845. — F. du *Ribes Grossularia*.

41. **Septoria Hederae** Desm. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 105. — Sacc. Syll. III, 490. — Wint. Kr. Fl. VI, 790. — Sphaeria hederaecola Fr. — T. N. G. XI, 395. — F. du *Hedera Helix*.

42. **Septoria Heraclei** Desm. — Arch. Néerl. VIII (1873), 364; N. K. A. 2, I, 314 et 2, VI, 611. — Sacc. Syll. III, 528. — Wint. Kr. Fl. VI, 792. — F. du *Her. Sphondylium*.

43. **Septoria heterochroa** Rob. et Desm. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, 105. — Oud. N. K. A. 2, II, 180. — Sacc. Syll. III, 538. — Wint. Kr. Fl. VI, 813. — F. du *Malva neglecta* (= M. vulgaris).

44. **Septoria Hippocastani** Berk. Br. — N. K. A. 2, VI, 612 et N. K. A. 3, II, 272; — Oud. Fgi Neerl. exs. n° 92. — Sacc. Syll. III, 479. — Wint. Kr. Fl. VI, 721. — F. de l'*Aesculus Hippocastanum*.

45. **Septoria Hydrocotyles** Desm. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 106. — Sacc. Syll. III, 531. — Wint. Kr. Fl. VI, 795. — F. du *Hydrocotyle vulgaris.*

46. **Septoria Hyperici** Desm. γ. **humifusi** N. K. A. 3, II, 273. — Sacc. Syll. III, 515. — Wint. Kr. Fl. VI, 796. — F. de l'*Hypericum humifusum.*

47. **Septoria incondita** Desm. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 106. — Oud. N. K. A. 3, I, 503; ibid. 2, VI, 45. — Sacc. Syll. III, 479. — Wint. Kr. Fl. VI, 721. — F. de l'*Acer campestre.*

48. **Septoria Japonicae** Oud. Zitt. V. K. A. v. W. 1900, p. 354; id. N. K. A. 3, II, 273. — Sacc. in Syd. Syll. XVI, 960. — Wint. Kr. Fl. VI, 893. — F. de l'*Evonymus japonica.*

49. **Septoria Leguminum** Desm. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 106. — Sacc. Syll. III, 559. — Wint. Kr. Fl. VI, 830. — Fruits des *Phaseolus* et *Pisum.*

50. **Septoria Levistici** West. — N. K. A. 2, III, 150; Oud. Fgi Neerl. exs. n° 187. — Sacc. Syll. III, 531. — Wint. Kr. Fl. VI, 805. — F. du *Levisticum officinale.*

51. **Septoria lincolata** Sacc. et Speg. — Sacc. Syll. III, 567. — Wint. Kr. Fl. VI, 750. — Oud. N. K. A. 3, I, 503. — F. du *Carex glauca?*

52. **Septoria Lychnidis** Desm. — N. K. A. 2, II, 99 et 2, VI, 611. — Sacc. Syll. III, 517. — Wint. Kr. Fl. VI, 810. — F. du *Coronaria* (Lychnis) *Flos cuculi.*

53. **Septoria Lysimachiae** Desm. — N. K. A. 3, II, 273. — Sacc. Syll. III, 533. — Wint. Kr. Fl. VI, 811. — F. du *Lysim. vulgaris.*

54. **Septoria Menthae** (de Thüm.) Oud. N. K. A. 2, II, 100 et 2, VI, 611; id. Fgi Neerl. exs. n° 96. — Sacc. Syll. III, 538. — Wint. Kr. Fl. VI, 815. — F. du *Mentha arvensis.*

55. **Septoria Menyanthes** Desm. — N. K. A. 3, II, 274. — Sacc. Syll. III, 532. — Wint. Kr. Fl. VI, 816. — F. du *Menyanthes trifoliata.*

56. **Septoria Narcissi** Pass. — N. K. A. 3, II, 274. — Sacc. Syll. X, 382. — Wint. Kr. Fl. VI, 818. — F. d'une esp. de *Narcissus* cultivée.

***Septoria nebulosa** Desm. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 107. — Voir: *Rhabdospora.*

57. **Septoria obesispora** Oud. Zitt. V. K. A. v. W. 1901, p. 355; id. N. K. A. 3, II, 275. — Sacc. Syll. XVI, 966. — Wint. Kr. Fl. VII, 891. — F. du *Convolvulus sepium.*

58. **Septoria Oenotherae** West. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 107;

N. K. A. 2, VI, 612. — Sacc. Syll. III, 513. — Wint. Kr. Fl. VI, 819. — F. de l'*Oenothera biennis.*

59. **Septoria Orchidearum** West. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 107. — Oud. N. K. A. 2. V, 595. — Sacc. Syll. III, 575. — Wint. Kr. Fl. VI, 820. — F. des *Orchis latifolia* et *maculata.*

60. **Septoria ornithogalea** Sacc. Syll. III. 571. — Wint. Kr. Fl. VI, 821. — Sept. Ornithogali Oud. N. K. A. 2, II, 181. — F. de l'*Ornithogalum umbellatum.*

***Septoria ornithogali** Oud. N. K. A. 2, II, 181. — Voir: *Sept. ornithogalea.*

***Septoria Oudemansii** Sacc. Syll. III, 563. — Wint. Kr. Fl. VI, 917. — S. Poae Oud. N. K. A. 2, III, 150. — F. du *Poa nemoralis.* — Voir: *Diplodina Poae.*

***Septoria Oxyacanthae** Kze. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 108; T. N. G. XI, 404. — Voir: *Phleospora.*

61. **Septoria Paconiae** West. — N. K. A. 2, III, 150; Oud. Fgi Neerl. exs. n° 188. — Sacc. Syll. III, 526. — Wint. Kr. Fl. V, 822. — F. d'un Paeonia cultivé.

62. **Septoria Petroselini** Desm. var. *Apii* Berk. Br. — Oud. N. K. A. 2, II, 100; 3, II, 994. — Sacc. Syd., Syll. XIV, 972. — Wint. Kr. Fl. VI, 825. — F. de l'*Apium graveolens.*

63. **Septoria Petroselini** Desm. — N. K. A. 2, II, 100 et 2, VI, 611. — Sacc. Syll. III, 530. — Wint. Kr. Fl. VI, 824. — F. du *Petroselinum sativum.*

64. **Septoria Phlogis** Sacc. Speg. — Sacc. Syll. III, 533. — Wint. Kr. Fl. VI, 826. — N. K. A. 3, II, 275. — F. du *Phlox decussata.*

65. **Septoria Pini** Fuck. — Oud. N. K. A. 2, IV. 234. — Sacc. Syll. III, 506. — Wint. Kr. Fl. VI, 719. — Aiguilles du *Pinus silv.*

66. **Septoria piricola** Desm. — Sacc. Syll. III, 487. — Wint. Kr. Fl. VI, 829. — S. Piri West. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 108.

67. **Septoria plantaginea** Pass. *β.* Plantaginis majoris Sacc. Syll. III, 554. — Wint. Kr. Fl. VI, 831. — Oud. N. K. A. 3, I, 504.

***Septoria Poae** Oud. N. K. A. 2, III, 150. — Voir: *Diplodina.*

68. **Septoria Podagrariae** Lasch. — Sacc. Syll. III, 529. — Wint. Kr. Fl. VI, 724. — N. K. A. 2, VI, 612. — S. Aegopodii Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 101; N. K. A. 2, I, 94; id. Versl. Med. K. A. v. W. 2, X (1876), 53; Oud. Herb. N. Pl. n° 442 et Fgi Neerl. exs. n° 95. — F. de l'*Aegopodium Podagraria.*

69. **Septoria Polygonorum** Desm. Arch. Néerl. VIII (1873),

364. — Oud. Fgi Neerl. exs. n° 189. — Sacc. Syll. III, 555. — Wint. Kr. Fl. VI, 833. — Ascochyta Polygoni N. K. A. 2, I, 169. — F. du *Polygonum lapathifolium*.

70. **Septoria Populi** Desm. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 108; N. K. A. 2, VI, 612. — Sacc. Syll. III, 502. — Wint. Kr. Fl. VI, 834. — F. du *Populus nigra* f^a^ *fastigiata*.

71. **Septoria Pseudoplatani** Rob. Desm. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 108. — Sacc. Syll. III, 478. — Wint. Kr. Fl. VI, 719. — F. de l'*Acer Pseudo-Platanus*.

72. **Septoria quercicola** Sacc. Syll. III, 505. — Wint. Kr. Fl. VI, 840. — S. incondita *α*. Quercicola Desm. in Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 106. — F. du *Quercus Robur*.

73. **Septoria quercina** Desm. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 109; Sacc. Syll. III, 504. — Wint. Kr. Fl. VI, 840. — F. du *Quercus Robur*.

74. **Septoria quevellensis** Sacc. Syll. III, 512. — Wint. Kr. Fl. VI, 564. — Oud. N. K. A. 3, II, 894.

***Septoria ramealis** — Voir: *Rhabdospora*.

75. **Septoria Ranunculi** West. — Oud. Arch. Néerl. VIII (1873), 364; id. N. K. A. 2, I, 256. — Sacc. Syll. III, 523. — Wint. Kr. Fl. VI, 842. — F. du *Ranunculus sceleratus*.

76. **Septoria rhamnella** (Oud.) Sacc. Syll. III, 481. — Wint. Kr. Fl. VI, 842. — S. Rhamni Oud. Arch. Néerl. VIII (1878) 364; id. N. K. A. 2, I, 256.

***Septoria Rhamni** Oud. N. K. A. 2, I, 256; Arch. Néerl. VIII, 364. — Voir: S. rhamnella.

77. **Septoria Ribis** (Lib.) Desm. — Arch. Néerl. VIII (1873), 365; N. K. A. 2, I, 256 et 2, VI, 612. — Sacc. Syll. III, 491. — Wint. Kr. Fl. VI, 845. — F. des *Ribes nigrum* et *rubrum*.

78. **Septoria Robiniae** Desm. — Sacc. Syll. III, 484. — Wint. Kr. Fl. VI, 845. — Oud. in herb.

79. **Septoria Rosae** Desm. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 109. — N. K. A. 2, I, p. 94; Oud. Herb. N. Pl. n° 147 et Fgi Néerl. exs. n° 191. — Sacc. Syll. III, 485. — Wint. Kr. Fl. VI, 846. — F. de Roses cultivées.

80. **Septoria Rosae arvensis** Sacc. — Syll. III, 486. — Wint. Kr. Fl. VI, 846. — Oud. N. K. A. 3, II, 895. — F. du *Rosa canina*.

81. **Septoria Rosarum** West. — Sacc. Syll. III, 486. — Wint. Kr. Fl. VI, 846. — Oud in herb.

82. **Septoria Rubi** West. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 109; N. K. A. 2, VI, 611; Oud. Fgi Neerl. sicc. n° 191. — Sacc. Syll.

III, 486. — Wint. Kr. Fl. VI, 847. — F. du *Rubus fruticosus.*

83. **Srptoria Salicariae** West. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 109.

84. **Septoria Salicis** West. — N. K. A. 2, II, 181 et 2, VI, 612; Oud. Fgi Neerl. exs. n° 100. — Sacc. Syll. III, 502. — Wint. Kr. Fl. VI, 849. — F. du *Salix amygdalina.*

85. **Septoria Saponariae** (D. C.) Savi et Becc. — N. K. A. 2, V, 501 et 2, VI, 612. — Sacc. Syll. III, 516. — Wint. Kr. Fl. VI, 850. — S. Dianthi a. Saponariae Prodr. Fl. Bat. II, p. 104. — F. du *Saponaria officinalis.*

86. **Septoria scabiosaecola** Desm. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 110; Oud. Fgi Neerl. exs. n° 192. — S. scabiosicola (Desm.) Sacc. Syll. III, 553. — Wint. Kr. Fl. VI, 851. — Sphaeria Depazea vagans f^a^ scabiosaecola Fr. — T. N. G. XII, 271. — F. du *Succisa pratensis.*

87. **Septoria Scleranthi** Desm. — N. K. A. 3, II, 276. — Sacc. Syll. III, 518. — Wint. Kr. Fl. VI, 852. — F. du *Scleranthus perennis.*

88. **Septoria Scorodoniae** Pass. — N. K. A. 2, VI, 611. — Sacc. Syll. III, 540. — Wint. Kr. Fl. VI, 867. — F. du *Teucrium Scorodonia.*

89. **Septoria Senecionis** West. — Oud. N. K. A. 2, II, 100. — Sacc. Syll. III, 549. — Wint. Kr. Fl. VI, 854. — F. du *Senecio Fuchsii.*

90. **Septoria Sii** Rob. et Desm. — Oud. N. K. A. 2, II, 181. — Sacc. Syll. III, 529. — Wint. Kr. Fl. VI, 857. — F. du *Berula angustifolia.*

91. **Septoria silvicola** Desm. — N. K. A. 2, VI, 611. — Sacc. Syll. III, 522. — Wint. Kr. Fl. VI, 730. — F. de l'*Anemone nemorosa.*

92. **Septoria Sparganii** Pass. — Oud. N. K. A. 3, II, 751. — Sacc. Syll. III, 569. — Wint. Kr. Fl. VI, 861. — F. du *Sparganium ramosum.*

93. **Septoria Spinaciae** West. — Oud. Arch. Néerl. II (1867), 38. — Sacc. Syll. III, 518. — Wint. Kr. Fl. VI, 863. — F. du *Spinacia oleracea.*

94. **Septoria Stachydis** Rob. Desm. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 110. — Oud. N. K. A. 3, I, 534. — Sacc. Syll. III, 539. — Wint. Kr. Fl. VI, 865. — F. du *Stachys silvatica.*

95. **Septoria Stellariae** Rob. Desm. — N. K. A. 2, II, 99 et 2, VI, 611; Oud. Fgi Neerl. exs. n° 284. — Sacc. Syll. III, 518. — Wint. Kr. Fl. VI, 865. — F. du *Stellaria media.*

96. **Septoria stemmatea** (Berk.) Sacc. Syll. III, 493. — Oud. N. K. A. 3, I, 504. — F. du *Vaccinium Vitis idaea.*

97. **Septoria stipata** (Lib.) Sacc. Syll. X, 352. — Wint. Kr. Fl. VI, 838. — N. K. A. 3, II, 276. — F. du *Prunus Padus.*

98. **Septoria Stratiotis** Oud. Beibl. z. bot. Centr. Bl. 1902. — id. N. K. A. 3, II, 751. — F. du *Stratiotes aloides.*

99. **Septoria Tiliae** West. — Prodr. Fl. Bat. II, p. 110; N. K. A. 2, VI, 612. — Sacc. Syll. III, 476. — Wint. Kr. Fl. VI, 868. — F. du *Tilia cordata.*

100. **Septoria Tormentillae** Rob. Desm. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 110. — Sacc. Syll. III, 511. — Wint. Kr. Fl. VI, 868.

101. **Septoria Tritici** Rob. Desm. — N. K. A. 3, II, 276. — Sacc. Syll. III, 561. — Wint. Kr. Fl. VI, 870. — F. des *Triticum repens* et *vulgare* et du *Secale cereale.*

102. **Septoria Ulmariae** Oud. N. K. A. 2, II, 99; id. Fgi Neerl. exs. n° 193. — Sacc. Syll. III, 511. — Wint. Kr. Fl. VI, 863. — F. du *Filipendula* (Spiraea) *Ulmaria.*

103. **Septoria Tussilaginis** West. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 111. — Sacc. Syll. III, 545. — Wint. Kr. Fl. VI, 872. — F. du *Tussilago Farfara.*

***Septoria Ulmi** Kze. — T. N. G. XI, 404; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 111. — Oud. Fgi Neerl. exs. n° 98. — Voir: *Phleospora.*

104. **Septoria Urticae** Rob. Desm. — N. K. A. 3, II, 277; Oud. Fgi Neerl. exs. n° 97. — Sacc. Syll. III, 557. — Wint. Kr. Fl. VI, 873. — F. de l'*Urtica dioica.*

105. **Septoria Veronicae** Rob. Desm. — Oud. N. K. A. 2, IV, 529. — Sacc. Syll. III, 534. — Wint. Kr. Fl. VI, 874. — F. du *Veronica Anagallis.*

106. **Septoria Villarsiae** Desm. — Oud. Arch. Néerl. VIII (1873) 365; id. N. K. A. 2, I, 256. — Sacc. Syll. III, 541. — Wint. Kr. Fl. VI, 806. — F. du *Limnanthemum nymphaeoides.*

***Septoria Virgaureae** Desm. — N. K. A. 2, I, 100 et 3, II, 277. — Voir: *Cercosporella.*

RHABDOSPORA.

1. **Rhabdospora Arundinis** (Sacc.) Alles. in Wint. Kr. Fl. VI, 916. — Septoria Ar. (Mont.) Sacc. Syll. III, 564. — N. K. A. 2, VI, 611. — Chaumes du *Phragmites communis.*

2. **Rhabdospora Aucubae** Brun. — Oud. N. K. A. 3, I, 502. — Sacc. Syll. X, 397. — Wint. Kr. Fl. VI, 892. — Ram. de l'*Aucuba japonica.*

3. **Rhabdospora cercosperma** (Rostr.) Sacc. Syll. X, 391. — Oud. N. K. A. 3, II, 893. — Tiges d'une espèce d'*Artemisia.*

4. **Rhabdospora Cirsii** Karst. — Oud. N. K. A. 3, II, 750. — Sacc. Syll. III, 592. — Wint. Kr. Fl. VI, 897. — Tiges d'une espèce de *Cirsium*.

5. **Rhabdospora continua** (Berk. Curt.) Sacc. Syll. III, 593. — Oud. N. K. A. 3, I, 502. — Pédoncules du *Plantago lanceolata*.

6. **Rhabdospora curvula** Berl. — N. K. A. 2, VI, 46 et p. 613. — Sacc. Syll. Addit. ad vol. I—IV, 444; Syll. X, 390. — Wint. Kr. Fl. VI, 913. — Ram. du *Morus alba*.

7. **Rhabdospora Dahliae** Oud. N. K. A. 3, III, 1115. — Tige du *Dahlia variabilis*.

***Rhabdospora Eryngii** Oud. N. K. A. 3, II, 277. — Voir: *Rh. Oudemansii*.

8. **Rhabdospora inaequalis** Sacc. Roum. — Sacc. Syll. III, 580. — Wint. Kr. Fl. VI, 925. — N. K. A. 2, VI, 46 et 613. — Rameaux du *Sorbus* (Pirus) *Aucuparia*.

9. **Rhabdospora Millefolii** Oud. Zitt. V. K. A. v. W. 1900, p. 355. — Oud. N. K. A. 3, II, 278. — Sacc. Syd., Syll. XVI, 979. — Wint. Kr. Fl. VI, 904. — Tiges de l'*Achillea Millefolium*.

10. **Rhabdospora nebulosa** (Desm.) Sacc. Syll. III, 589. — Wint. Kr. Fl. VI, 889. — Septoria nebulosa Desm. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 107. — Tiges du *Foeniculum vulgare*.

11. **Rhabdospora Oudemansii** P. Henn. Hedw. 1900, p. (164). — Sacc. Syd., Syll. XVI, 978. — Wint. Kr. Fl. VII, 906. — Rhabdos. Eryngii Oud. N. K. A. 3, II, 277; Rh. eryngicola Oud. Zitt. V. K. A. v. W. 1900, p. 355. — Tiges de l'*Eryngium maritimum*.

***Rhabdospora Oudemansii** Allescher, in Wint. Kr. Fl. VI, 917. (non Henn.) — Voir: *Diplodina Poae*.

12. **Rhabdospora Phlogis** Oud. N. K. A. 3, III, 1116. — Septoria Phlogis Sacc. Speg?. — Oud. N. K. A. 3, II, 275. — Tiges du *Phlox decussata*.

13. **Rhabdospora Preussii** (Preuss) Sacc. Syll. III, 335. — Wint. Kr. Fl. VI, 900. — N. K. A. 2, V, 501 et 2, VI, 613. — Ram. du *Cytisus Laburnum*.

14. **Rhabdospora ramealis** (Rob. et Desm.) Sacc. Syll. III, 580. — Wint. Kr. Fl. VI, 919. — Septoria ramealis Rob. et Desm. — Oud. Versl. en Med. K. A. v. W. 3, XVIII (1883), 373 et N. K. A. 2, IV, 235. — Ram. d'une esp. de *Rubus*.

15. **Rhabdospora Rhinanthi** (Lib.) N. K. A. 2, V, 502 et 2, VI, 613. — Sacc. Syll. X, 393. — Wint. Kr. Fl. VII, 919. — Sphaeronema Rh. Lib. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 90. — Tiges et capsules des *Rhinanthus minor* et *Odontites verna*.

16. **Rhabdospora Tanaceti** Oud. Zitt. V. K. A. v. W. 1900, p. 356; N. K. A. 3, II, 278. — Sacc. Syd., Syll. XVI, 678. — Wint. Kr. Fl. VII, 908. — Tiges du *Tanacetum vulgare*.

17. **Rhabdospora Thümeniana** Sacc. Syll. III, 587. — Wint. Kr. Fl. VI, 902. — Septoria Euphorbiae Desm. — Oud. N. K. A. 2, IV, 235. — Tige de l'*Euphorbia Gerardiana*.

18. **Rhabdospora verbenicola** Sacc. Syll. III, 590. — Wint. Kr. Fl. VI, 928. — Oud. N. K. A. 3, II, 750. — Tiges du *Verbena officinalis*.

19. **Rhabdospora Vincae** Oud. Beibl. z. bot. Centrbl. 1902; id. N. K. A. 3, II, 750. — Tiges du *Vinca minor*.

CHEILARIA.

***Cheilaria Agrostidis** Lib. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 91. — Voir: *Labrella*.

***Cheilaria Mori** Desm. — N. K. A. 2, II, 100. — Voir: *Phleospora maculans*.

PHLEOSPORA.

1. **Phleospora Aceris** (Lib.) Sacc. Syll. III, 577. — Wint. Kr. Fl. VI, 933. — N. K. A. 3, II, 277 et 2, VI, 613. — Septoria Aceris Lib. — Oud. N. K. A. 2, II, 36. — F. de l'*Acer campestre*.

2. **Phleospora maculans** (Béreng.) Phl. Mori (Lév.) Sacc. Syll. III, 577. — Wint. Kr. Fl. VI, 935. — Cheilaria Mori Desm. — Oud. N. K. A. 2, II, 100. — F. du *Morus nigra*.

3. **Phleospora Oxyacanthae** (Kze u. Schm.) Wallr. — Sacc. Syll. III, 578. — Wint. Kr. Fl. VI, 935. — Septoria Oxyac. Kze u. Schm. — T. N. G. XI, 404; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 108. — F. du *Crataegus Oxyacantha*.

4. **Phleospora ulmicola** (Biv. Bernh.) — Wint. Kr. Fl. VI, 936. — Phleosp. Ulmi (Fr.) Wallr. — N. K. A. 2, VI, 613. — Sacc. Syll. III, 578. — Septoria Ulmi Kze. T. N. G. XI, 404; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 111 (Oud. Fgi Neerl. exs. n° 98). — F. de *Ulmus campestris*.

PHLYCTAENA.

1. **Phlyctaena vagabunda** Desm. — Sacc. Syll. III, 594. — Wint. Kr. Fl. VI, 940 et 942. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 111; Tiges de pl. herbacées.

MICROPERA.

1. **Micropera Drupaceaeum** Lév. Sacc. Syll. III, 605. — Wint. Kr. Fl. VI, 961. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 101; Oud. N. K. A. 3, III, 1111. — Ram. des *Prunus Cerasus* et *domestica*.

B. Compositae.

SEPTORIELLA.

1. **Septoriella Phragmitidis** Oud. N. K. A. 2, V, 504 et 2, VI, 613. — Sacc. Syll. X, 403. — Wint. Kr. Fl. VI, 949. — Chaumes et gaînes du *Phragmites communis*.

CYTOSPORINA.

1. **Cytosporina Abietis** Oud. Hedw. 1898, p. 317; — id. Zitt. V. K. A. v. W. 1900, p. 356; id. N. K. A. 3, II, 278. — Sacc. et Syd., Syll. XVI, 983. — Wint. Kr. Fl. VII. 911. — Écailles séminifères du *Picea excelsa*.

2. **Cytosporina leucomyxa** (Cda) Sacc. Syll. III, 604. — Wint. Kr. Fl. VI, 957. — Cytispora leuc. Rab. — Oud. Arch. Néerl. VIII (1873), 367; id. N. K. A. 2, I, 170. — Ram. de l'*Alnus glutinosa*.

3. **Cytosporina Sorbi** Oud. Beibl. z. bot. Centr. bl. 1902; id. N. K. A. 3, II, 728. — Ram. du *Sorbus* (Pirus) *Aucuparia*.

4. **Cytosporina Syringae** Oud. Zitt. V. K. A. v. W. 1900, p. 356; id. N. K. A. 3, II, 279. — Sacc. et Syd., Syll. XVI, 982. — Wint. Kr. Fl. VII, 911. — Ram. du *Syringa vulgaris*.

†[54] Nectrioidaceae.

1. Hyalosporae.

ZYTHIA.

1. **Zythia Galii** Oud. N. K. A. 2, IV, 534. — Sacc. Syll. X, 405. — Wint. Kr. Fl. VII, 299. — F. du *Galium Mollugo*.

SPHAERONAEMELLA.

1. **Sphaeronaemella Wenthi** Oud. Zitt. V. K. A. v. W. 1900, p. 356; id. N. K. A. 3, II, 279. — Sacc. Syll. XVI, 984. — Wint. Kr. VII, 309. — Tiges pntrides du *Vicia Faba*.

†[55] Leptostromaceae.

1. Hyalosporae.

A. **Simplices.**

LEPTOTHYRIUM.

1. **Leptothyrium Aesculi** Oud. Beibl. z. bot. Centr. bl. 1902; id. N. K. A. 3, II, 731. — Pétioles de l'*Aesculus rubicunda.*

2. **Leptothyrium alneum** (Lév.) Sacc. Syll. III, 627. — Wint. Kr. Fl. VII, 325. — N. K. A. 3, II, 280. — F. de l'*Alnus glutinosa.*

3. **Leptothyrium Betuli** Oud. — Zitt. V. K. A. v. W. 1900, p. 357; id. N. K. A. 3, II, 347. — Sacc. et Syd., Syll XVI, 987, — Wint. Kr. Fl. VII, 941. — F. du *Carpinus Betulus.*

4. **Leptothyrium Blechni** Oud. Beibl. z. bot. Centr. bl. 1902; id. N. K. A. 3, II, 732. — F. du *Blechnum Spicant.*

5. **Leptothyrium botryoides** Sacc. Syll. III, 627. — Wint. Kr. Fl. VII, 332. — N. K. A. 3, II, 331. — F. du *Fagus silvatica.*

6. **Leptothyrium clypeosphaeroides** Sacc. Syll. III, 631. — Wint. Kr. Fl. VII, 341. — N. K. A. 2, V, 505 et 2, VI, 613. — Ram. d'une espèce de *Rubus.*

7. **Leptothyrium Coryli** Lib. et Cooke. — N. K. A. 3, II, 280 et 332. — Sacc. Syll. III, 626. — Wint. Kr. Fl. VII, 330.

8. **Leptothyrium Cotini** Oud. N. K. A. 3, II, 887. — Pédoncules du *Rhus Cotinus.*

9. **Leptothyrium Dahliae** Oud. Beibl. z. bot. Centr. Bl. 1902. — id. N. K. A. 3, II, 732. — Tige du *Dahlia variabilis.*

10. **Leptothyrium Funckiae** Oud. Zitt. V. K. A. v. W. 1900, p. 357; id. N. K. A. 3, II, 280. — Sacc. Syll. XVI. 988. — Wint. Kr. Fl. VII, 333. — F. du *Funckia ovata.*

11. **Leptothyrium Godetiae** Oud. N. K. A. 3, III, 1111. — Tige d'une espèce de *Godetia.*

12. **Leptothyrium Gypsophilae** Oud. N. K. A. 3, II, 887. — Tiges du *Gypsophila paniculata.*

13. **Leptothyrium ilicinum** Sacc. Syll. III, 629. — Wint. Kr. Fl. VII, 310. — N. K. A. 3, II, 281. — F. du *Quercus Aegilops.*

Leptothyrium Juglandis Lib. — Prodr. Fl., Bat. II, 4, p. 117. — Voir: *Marsonia.*

14. **Leptothyrium litigiosum** (Desm.) Sacc. Syll. III, 636. — Wint. Kr. Fl. VII, 339. — Leptostroma litigiosum Desm. Prodr. Fl. Bat. II. 4, p. 116. — Tiges et ram. du *Pteris aquilina.*

15. **Leptothyrium Lunariae** Kze. — N. K. A. 3, II, 281. — Sacc. Syll. III, 634. — Wint. Kr. Fl. VII, 336. — Fruits du *Lunaria annua*.

16. **Leptothyrium Lycopi** Richon. — Oud. N. K. A. 3, I, 504. — Sacc. Syll. X, 415. — Tige du *Lycopus europaeus*.

17. **Leptothyrium Pini** (Cda.) Sacc. Syll. III, 627. — Wint. Kr. Fl. VII, 329. — Coniothyrium Pini Cda. — Oud. Arch. Néerl. II, (1867), 36. — Aiguilles de l'*Abies alba*.

***Leptothyrium Populi** Lib. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 118. — Voir: *Marsonia*.

18. **Leptothyrium Ptarmicae** (Desm.) Sacc. Syll. III, 635. — Wint. Kr. Fl. VII, 323. — Labrella Pt. Desm. — T. N. G. XI, 396. — Schizothyrium Ptarmicae Prodr. Fl. Bat. II, 4, 115. — Tige de l'*Achillea Ptarmica*.

19. **Leptothyrium Quercus rubrae** Oud. Beibl. z. bot. Centr. Bl. 1902; id. N. K. A. 3, II, 732. — F. du *Quercus rubra*.

20. **Leptothyrium Scorodoniae** (Lib.) Sacc. Syll. III, 634. — Wint. Kr. Fl. VII, 342. — N. K. A. 3, II, 733. — Tige du *Teucrium Scorodonia*.

21. **Leptothyrium silvestre** Sacc. et Cavara. — Oud. N. K. A. 3, II, 887. — Sacc. Syll. XVI, 987. — Wint. Kr. Fl. VII, 942.

22. **Leptothyrium vulgare** (Fr.) Sacc. Syll. III, 633. — Wint. Kr. Fl. VII, 324. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 117; N. K. A. 3, II, 733. — Tiges des *Cirsium palustre*, *Foeniculum vulgare*, *Heracleum Sphondylium* et *Mentha aquatica*.

PIGGOTIA.

1. **Piggotia atronitens** Oud. Arch. Néerl. VIII (1873), 363, id. N. K. A. 2, I, 255. — Sacc. Syll. III, 637. — Wint. Kr. Fl. VII, 345. — Ram. d'une esp. de *Salix*.

2. **Piggotia Gneti** Oud. Versl. Med. K. A. v. W. 3, VII (1890), 317; id. N. K. A. 2, VI, 46. — Sacc. Syll. X, 418. — Wint. Kr. Fl. VII, 344. — F. du *Gnetum Gnemon* cultivé.

MELASMIA.

1. **Melasmia acerina** Lév. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 92; N. K. A. 2, VI, 613 et 3, I, 505. — Sacc. Syll. III, 637. — Wint. Kr. Fl. VII, 571. — F. de l'*Acer Pseudo-Platanus*.

2. **Melasmia Mali** Oud. N. K. A. 3, III, 1111. — F. du *Pirus Malus*.

3? **Melasmia punctata** Sacc. et Roum., Syll. III, 638. — Wint. Kr. Fl. VII, 371. — Oud. N. K. A. 3, 1, 505. — F. de l'*Acer Pseudo-Platanus*.

LEPTOSTROMA.

1. **Leptostroma Abrotani** Oud. Zitt. V. K. A. v. W. 1900, p. 357; id. N. K. A. 3, II, 886. — Sacc. Syll. XVI, 990. — Wint. Kr. Fl. VII, 913. — Tige de l'*Artemisia Abrotanum*.

2. **Leptostroma Caraganae** Oud. N. K. A. 3, II, 731. — Ram. du *Caragana arborescens*.

3. **Leptostroma caricinum** Fr. — N. K. A. 3, II, 281. — Sacc. Syll. III, 645. — Wint. Kr. Fl. VII, 359. — F. du *Carex muricata*.

4. **Leptostroma Convallariarum** Oud. N. K. A. 3, II, 731. — Tige du *Polygonatum officinale*.

5. **Leptostroma Dianthi** Oud. N. K. A. 3, II, 836. — Tige du *Dianthus barbatus*.

6. **Leptostroma filicinum** Fr. — Sacc. Syll. III, 645. — Wint. Kr. Fl. VII, 358. — T. N. G. XII, 272; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 116. — Pétioles du *Pteris aquilina*.

7. **Leptostroma Fraxini** Oud. Beibl. z. bot. Central. Bl. 1902; id. N. K. A. 3, II, 731. — Ram. jeunes du *Fraxinus excelsior*.

8. **Leptostroma fructigenum** Schwein. Syn. N. Am. 667. — Thüm. Fgi pomic. 57. — Sacc. Syll. III, 642. — Oud. N. K. A. 3, III, 1110. — Surface d'une pomme.

9. **Leptostroma herbarum** (Fr.) Link. — Arch. Néerl. VIII (1873), 357; N. K. A. 2, 1, 167; 2, V, 171; 2, VI, 614. — Sacc. Syll. III, 645. — Wint. Kr. Fl. VII, 348. — Tiges des *Euphorbia Lathyris*, *Fritillaria persica* et *Teucrium Scorodonia*.

10. **Leptostroma hypodermoides** Secc. Syll. III, 646. — Wint. Kr. Fl. VII, 350. — N. K. A. 3, II, 281. — Tige du *Dianthus barbatus*.

***Leptostroma litigiosum** Desm. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 116. — Voir: *Leptothyrium*.

***Leptostroma juncinum** M. et N. — T. N. G. XII, 271; Prodr. Fl. Bat. II, 4, 116. — Voir: *Leptostromella*.

***Leptostroma hysterioides** Fr. — Arch. Néerl. VIII, 357. — Voir: *Leptostromella*.

11. **Leptostroma lonicericolum** Rab. — Zitt. V. K. A. v. W. 1900, p. 357; id. N. K. A. 3, II, 282. — Sacc. Syll. III, 647. — Wint. Kr. Fl. VII, 351. — Ram. du *Lonicera Caprifolium*.

12. **Leptostroma ocellatum** P. West. in Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 117 et T. N. G. XI, 396 (quid?).

13. **Leptostroma Pinastri** Desm. — Oud. N. K. A. 3, II, 731. — Sacc. Syll. III, 641. — Wint. Kr. Fl. VII, 353. — Aiguilles du *Pinus ponderosa* cultivé.

14. **Leptostroma Pteridis** Ehrenb. — Sacc. Syll. III, 645. — Wint. Kr. Fl. VII, 360. — Oud. N. K. A. 3, III, 140. — Pétioles du *Pteris aquilina*.

15. **Leptostroma punctiforme** Wallr. — N. K. A. 3, II, 282; 3, III, 1110. — Sacc. Syll. III, 642. — Wint. Kr. Fl. VII, 361. — Tiges de l'*Asparagus officinalis*; rameaux du *Lonicera tatarica*; f. du *Vaccinium Vitis idaea*.

16. **Leptostroma Scirpi** Rab. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 116. — Tiges du *Sc. lacustris*.

17. **Leptostroma scirpinum** Fr. — T. N. G. XII, 271; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 117. — Sacc. Syll. III, 644. — Tiges du *Scirpus lacustris*.

18. **Leptostroma Spiraeae** Fr. — Arch. Néerl. VIII (1873), 357; N. K. A. 2, 1, 167 et 2, VI, 614. — Sacc. Syll. III, 646. — Wint. Kr. Fl. VII, 356. — Tiges des *Filipendula Ulmaria* et *Spiraea Aruncus*.

19. **Leptostroma Stellariae** Kirchner. — Zitt. V. K. A. v. W. 1900, p. 358; id. N. K. A. 3, II, 282. — Sacc. Syll. III, 647. — Wint. Kr. Fl. VII, 356. — F. du *Stellaria Holostea*.

20. **Leptostroma virgultorum** Sacc. Syll. III, 639. — Wint. Kr. Fl. VII, 354. — Oud. N. K. A. 3, II, 886. — Ram. du *Rubus fruticosus*.

***Leptostroma vulgare** Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 117. — Voir: *Leptothyrium*.

LABRELLA.

1. **Labrella Agrostidis** (Lib.) Sacc. Syll. X, 421. — Wint. Kr. Fl. VII, 362. — Cheilaria Agrostidis Lib. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 91. — Tiges de l'*Agrostis vulgaris*.

***Labrella Ptarmicae** Desm. — Voir: *Leptothyrium*.

SACIDIUM.

1. **Sacidium Abietis** Oud. Hedw. 1998, p. 317; id. Zitt. V. K. A. v. W. 1900, p. 358; id. N. K. A. 3, II, 333. — Sacc. et Syd., Syll. XVI, 992. — Wint. Kr. Fl. VII, 944. — Aiguilles de l'*Abies grandis* cultivé à Schovenhorst (Putten en Gueldre).

2. **Sacidium Quercus** Oud. Hedw. 1898, p. 317; id. Zitt. V. K. A. v. W. 1900, p. 358; id. N. K. A. 3. II, 283. — Sacc. et Syd., Syll. XVI, 991. — Wint. Kr. Fl. VII, 367. — F. d'une espèce de *Quercus* de l'Amérique du Nord (Q. rubra?)

B. **Compositae.**

TRICHOPHILA.

1. **Trichophila Myrmecophagae** Oud. Hedw. 1889 n° 6; Sacc. Syll. X, 423. — Wint. Kr. Fl. VII, 373. — Sur les poils du *Myrmecophaga jubata*, au jardin Zoologique d'Amsterdam. Découvert par Mr. le Pr. Max Weber.

? 2. Phaeosporae.

PIROSTOMA.

1. **Pirostoma circinans** Fr. — Zitt. V. K. A. v. W. 1900 p. 359; id. N. K. A. 3. II, 283. — Sacc. Syll. III, 653. — Wint. Kr. Fl. VII, 374. *Coniosporium circinans* Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 38. — F. et gaînes du *Phragmites communis*.

4. Hyalophragmeae.

DISCOSIA.

1. **Discosia alnea** (P.) Berk. — Sacc. Syll. III, 654. — Wint. Kr. Fl. VII, 378. — Dothidea alnea Fr. — T. N. G. XII, 271; Prodr. Fl, Bat. III, 4, p. 71. — F. de l'*Alnus glutinosa*.

2. **Discosia Artocreas** (Tode.) Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 88; N. K. A. 3. I, 505 et 2, VI, 614. — Sacc. Syll. III, 653. — Wint. Kr. Fl. VII, 377. — F. du *Fagus silvatica*. — Tige du *Lythrum hyssopifolium*.

3. **Discosia quercicola** Oud. N. K. A. 2, IV, 534. — Ram. du *Quercus rubra*.

4. **Discosia strobilina** Lib. — N. K. A. I. V, 345. — Oud. Arch. Neerl. VIII (1873) 363. — Sacc. Syll. III, 656. — Wint. Kr. Fl. VII, 378. — Ecailles séminifères du *Picea excelsa*.

ENTOMOSPORIUM.

1. **Entomosporium maculatum** Lév. — N. K. A. 3, II, 287 et

332. — Sacc. Syll. III, 657. — Wint. Kr. Fl. VII, 384. — F. du *Mespilus germanica*.

var. **Cydoniae** Cooke et Ellis. — Oud. N. K. A. 3, III, 332. — F. du *Cydonia vulgaris*.

3. Scolecosporae.

ACTINOTHYRIUM.

1. **Actinothyrium graminis** Kze. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 115; N. K. A. 1, V, 345. — Sacc. Syll. III, 658. — Wint. Kr. Fl. VII, 386. — Chaumes de quelques Graminées.

LEPTOSTROMELLA.

1. **Leptostromella hysterioides** (Fr.) Sacc. Syll. III, 659. — Wint. Kr. Fl. VII, 389. — Leptostroma hyst. Fr. — Oud. Arch. Néerl. VIII (1873) 357; id. N. K. A. 2, I, 167. — Tige d'un *Paeonia* cultivé.

2. **Leptostromella juncina** (Fr.) Sacc. Syll. III, 660. — Wint. Kr. Fl. VII, 390. — Leptostroma juncinum. Fr. — T. N. G. XII, 271; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 116. — Chaumes du *Juncus conglomeratus*.

†[56] Excipulaceae.

1. Hyalosporae.

EXCIPULA.

1. **Excipula Empetri** Fr. — Oud. Hedw. 1898, p. 188; id. N. K. A. 3, I, 505. — Sacc. Syll. III, 668. — Wint. Kr. Fl. VII, 400. — F. de l'*Empetrum nigrum*.

***Excipula Heraclei** Rab. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 81. — Voir: *Phyllachora*.

***Excipula Rubi** Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 81. — Voir: *Pyrenopeziza*.

DOTHICHIZA.

1. **Dothichiza populina** Sacc. Syll. III, 672. — Wint. Kr. Fl. VII, 405. — N. K. A. 2, VI, 295 et 615. — Ram. d'une espèce de *Populus*.

DISCULA.

1. **Discula acerina** Oud. N. K. A. 2, V, 505 et 2, VI, 614. — Sacc. Syll. X, 431. — Ram. de l'*Acer campestre*.

2. **Discula Crataegi** Oud. N. K. A. 2, V, 171; 2, VI, 614. — Sacc. Syll. X, 438. — Wint. Kr. Fl. VII, 409. — Ram. du *Crataegus monogyna*.

3. **Discula Fagi** Oud. N. K. A. 2, V, 505 et 2, VI, 614. — Sacc. Syll. X, 133. — Wint. Kr. Fl. VII, 409.

4. **Discula Platani** (Peck) Sacc. Syll. III, 674. — Wint. Kr. Fl. VII, 409. — Discella Pl. Oud. N. K. A. 2, III, 150; id. Fgi Neerl. exs. n° 194. — Ram. du *Platanus occidentalis* (neque *orientalis*, uti prius scripsi).

5. **Discula platyspora** (Berk. Br. Sacc. Syll. III, 674. — Wint. Kr. Fl. VII, 410. — Discella plat. Oud. Arch. Néerl. VIII (1873), 308; id. N. K. A. 2, I, 257; id. Fgi Neerl. exs. n° 195.

6. **Discula quercicola** Oud. N. K. A. 2, IV, 534. — Sacc. Syll. X, 133. — Wint. Kr. Fl. VII, 410. — Ram. du *Quercus rubra*.

7. **Discula quercina** Cooke Sacc. Syll. III, 675. — N. K. A. 2, V, 505 et 2, VI, 614. — Ram. du *Quercus Robur*.

8. **Discula Rosae** Oud. N. K. A. 2, V, 506; 2, VI, 614. — Sacc. Syll. X, 134. — Wint. Kr. Fl. VII, 410. — Ram. d'une espèce du *Rosa*.

SPORONEMA.

1. **Sporonema rameale** Desm. — Sacc. Syll. III, 678. — Wint. Kr. Fl. VII, 116. — Prodr. Fl. Bat. II, 1, p. 90 (. . . lis). — Ram. du *Sambucus nigra*.

2. **Sporonema strobilinum** Desm. — Sacc. Syll. III, 678. — Wint. Kr. Fl. VII, 111. — Prodr. Fl. Bat. II, 1, p. 90 (. . . lina). — Ecailles séminifères du *Picea excelsa*.

var. **microsporum** Allescher, Wint. Kr. Fl. VII, 112. — Sacc. Syd., Syll XIV, 1001. — Oud. N. K. A. 3, II, 752.

PSILOSPORA.

1. **Psilospora faginea** (P.) Rab. — Sacc. Syll. III, 680. — Wint. Kr. Fl. VII, 417. — Hysterium rugosum a. faginea Fr. Prodr. Fl. Bat. II, 1, p. 78. — Tronc du *Fagus silvatica*.

2. **Psilospora quercus** Rab. — N. K. A. 2, V, 171 et 2, VI,

614. — Sacc. Syll. III, 680. — Wint. Kr. Fl. VII, 118. — Hysterium rugosum b. quercinum Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 78. — Ecorce lisse du *Quercus Robur*.

POLYNEMA.

***Polynema hispidulum** (Schrad.) Fr. — N. K. A. 1, V, 340. — Voir: *Dinemasporium*.

***Polynema graminum** Fr. — N. K. A. 1, V, 340. — Voir: *Dinemasporium*.

DINEMASPORIUM.

1. **Dinemasporium graminum** (Lib.) Lév. — Arch. Néerl. VIII (1873), 366; N. K. A. 2, I, 169; 2, VI, 47 et 614. — Sacc. Syll. III, 683. — Wint. Kr. Fl. VII, 121. — Polynema strigosum Fr. — N. K. A. 1, V, 340. — Tige de l'*Arundo Donax* (face interne), de l'*Elymus arenarius*; tige et feuilles d'une espèce de *Carex*.

2. **Dinemasporium hispidulum** (Schrad.) Sacc. Syll. III, 685. — Wint. Kr. Fl. VII, 121. — Polynema hispidulum (Schrad.) Fr. — N. K. A. 1, V, 340; Arch. Néerl. VIII (1873), 100. — Conoplea hispidula Cda. — N. K. A. 2, I, 172. — Bois ramolli d'une espèce de *Salix* et tige du *Phalaris arundinacea*.

3. **Dinemasporium strigosum** (Fr.) Sacc. Syll. III, 683. — Wint. Kr. Fl. VII, 126. — Polynema strigosum Fr. N. K. A. 1, V, 340; Arch. Néerl. VIII (1873), 100. — F. du *Phragmites communis*.

2. Hyalodidymae.

DISCELLA.

1. **Discella Aesculi** (Cda) Oud. — N. K. A. 2, V, 507 et VI, 615. — Ram. de l'*Aesculus Hippocastanum*.

2. **Discella Ariae** Oud. Hedw. 1894, p. 20; N. K. A. 2, VI, 295 et 2, VI, 615. — Sacc. Syll. XI, 500. — Wint. Kr. Fl. VII, 134. — Ram. du *Pirus* (Sorbus) *Aria*.

3. **Discella Berberidis** Oud. — Zitt. V. k. A. v. W. 1900, p. 379; id. N. K. A. 3, II, 288. — Disc. Grossulariae Oud. N. K. A., V, 506. — Sacc. Syll. X, 140 et XVI, 993. — Wint. Kr. Fl. VII, 132. — Ram. du *Berberis vulgaris*.

4. **Discella carbonacea** (Kze u. Schm.) Berk. Br. — Arch. Néerl. VIII (1873), 367; N. K. A. 2, I, 92 et 170; ibid. 2, VI, 615; Oud. Herb. N. Pl. n° 186. — Sacc. Syll. III, 687. — Wint. Kr.

Fl. VII, 433. — Pilidium carbonaceum Kze. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 91. — Ram. de quelques espèces de *Salix*.

5. **Discella Coryli** Oud. N. K. A. 2, VI, 615. — Ram. du *Corylus Avellana*.

***Discella Desmazierii** B. Br. — N. K. A. 2, I, 170; Arch. Néerl. VIII, p. 367. — Voir: *Melanconium*.

6. **Discella Grossulariae** Oud. N. K. A. 2, V, 506 et 2, VI, 615. — Ram. du *Ribes Grossularia*.

***Discella Platani** Oud. N. K. A. 2, III, 150. — Voir: *Discula*.

***Discella platyspora** B. Br. — N. K. A. 2, I, 257. — Arch. Néerl. VIII, 368. — Voir: *Discula*.

7. **Discella Pseudoplatani** Oud. N. K. A. 2, V, 597 et 2, VI, 615. — Sacc. Syll. X, 140. — Wint. Kr. Fl. VII, 432. — Ram. de l'*Acer Pseudo-Platanus*.

***Discella Ulmi** Oud. — Voir: *Hyxosporium*.

3. Phragmosporae.

PILIDIUM.

***Pilidium carbonaceum** Kze. — Prodr. Fl. Bat. II, 1, p. 91.

SPHAEROPSIDACEAE DUBIAE.

1. **Microsticta vagans** Desm. — Prodr. Fl. Bat. II, 1, p. 39. — Sacc. Syll. III, 693. — Wint. Kr. Fl. VII, 142. — Tige et F. de plusieurs pl. herbacées.

†57 Melanconiaceae.

1. Hyalosporae.

HAINESIA.

1. **Hainesia Castaneae** Oud. N. K. A. 3, II, 755. — F. du *Castanea sativa*.

2. **Hainesia Dietelii** Oud. Beibl. z. bot. Centrbl. 1902; id. N. K. A. 3, II, 755. — F. du *Quercus rubra*.

3. **Hainesia piricola** Oud. N. K. A. 3, II, 897. — F. du *Pirus communis*.

4. **Hainesia Rostrupi** Oud. Beibl. z. bot. Centrbl. 1902; id. N. K. A. 3, II, 756. — F. du *Quercus rubra*.

GLOEOSPORIUM.

1. **Gloeosporium acerinum** West. Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 151. — Sacc. Syll. III, 703. — Wint. Kr. Fl. VII, 452. — F. de l'*Acer campestre*.

2. **Gloeosporium alneum** West. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 151. — Sacc. Syll. III, 715. — Wint. Kr. Fl. VII, 454. — F. de l'*Alnus glutinosa*.

3. **Gloeosporium antherarum** Oud. Hedw. 1898, p. 179; id. N. K. A. 3, I, 506; id. Zitt. V. K. A. v. W., 1900, p. 380. — Sacc. Syll. XVI, 1001. — Wint. Kr. Fl. VII, 948. — Anthères du *Convolvulus* (Calystegia) *sepium*.

4. **Gloeosporium Aucubae** Oud. Zitt. V. K. A. v. W. 1900, p. 380; id. N. K. A. 3, II, 347. — Sacc. Syll. XVI, 998. — Wint. Kr. Fl. VII, 948. — F. de l'*Aucuba japonica*.

5. **Gloeosporium Betulae** (Lib.) Mont. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 152. — Sacc. Syll. III, 714. — Wint. Kr. Fl. VII, 158. — F. du *Betula alba*.

6. **Gloeosporium Callae** Oud. N. K. A. 3, II, 896. — F. du *Calla aethiopica*.

7. **Gloeosporium Capreae** Allesch., Wint. Kr. Fl. VII, 500. — Sacc. Syll. XIV, 1010. N. K. A. 3, II, 289. — F. du *Salix Caprea*.

8. **Gloeosporium Carpini** (Lib.) Desm. — Oud. N. K. A. 3, II, 754. Sacc. Syll. III, 712. — Wint. Kr. Fl. VII, 161. — F. du *Carpinus Betulus*.

9. **Gloeosporium Coryli** (Desm.) Sacc. III, 713. — Wint. Kr. Fl. VII, 168. — N. K. A. 3, II 318. — F. du *Corylus Avellana*.

10. **Gloeosporium curvatum** Oud. Arch. Néerl. VIII (1873), 370; id. N. K. A. 2, I, 171. — Sacc. Syll. III, 707. — Wint. Kr. Fl. VII, 199. — F. du *Ribes nigrum*.

11. **Gloeosporium Cydoniae** Mont. — N. K. A. 3, II, 290. — Sacc. Syll. III, 705. — Wint. Kr. Fl. VII, 170. — F. du *Cydonia vulgaris*.

12. **Gloeosporium cylindrospermum** (Bon.) Sacc. Syll. III, 715. — Wint. Kr. Fl. VII, 153. — N. K. A. 3, II, 290. F. de l'*Alnus glutinosa*.

***Gloeosporium Daphnes** Desm. — N. K. A. 2, I, 258. Arch. Néerl. VIII, 370. — Voir: *Marsonia*.

***Gloeosporium Delastrei** de Lacr. — N. K. A. 2, I, 100. — Voir: *Marsonia*.

13. **Gloeosporium Fagi** (Rob. Desm.) West. — Arch. Néerl. VIII (1873), p. 371; N. K. A. 2, I, 258 et 2, VI, 615. —

Sacc. Syll. III, 713. — Wint. Kr. Fl. VII, 474. — F. du *Fagus silvatica*.

14. **Glocosporium Ficariae** (Berk.) Cooke. — N. K. A. 2, I, 172 et 2, VI, 615. — Syll. III, 700. — Wint. Kr. Fl. VII, 496. — F. du *Ficaria verna*.

15. **Glocosporium Fragariae** (Lib.) Mont. — N. K. A. 2, II, 182 et 2, VI, 615; Oud. Fgi Neerl. exs. n° 90. — Sacc. Syll. III, 705. — Wint. Kr. Fl. VII, 476. — F. des *Fragaria* cultivés.

16. **Glocosporium Helicis** (Desm.) Oud. N. K. A. 2, III, 153 et Fgi Neerl. exs. n° 196. — Sacc. Syll. III, 707. — Wint. Kr. Fl. VII, 477. — F. du *Hedera Helix*.

17. **Glocosporium leguminis** Cooke et Harkn. var. Robiniae Karst. et Hariot. — Oud. N. K. A. 3, II, 897. — Sacc. Syll. X, 451. — Wint. Kr. Fl. VII, 499. — Fruits du *Robinia Pseudo-Acacia*.

18. **Glocosporium Lychnidis** Oud. Arch. Néerl. VIII (1873), 371; id. N. K. A. 2, I. 314. — Sacc. Syll. III, 707. — Wint. Kr. Fl. VII. 483. — F. du *Melandrium rubrum* (= Lychnis diurna).

19. **Glocosporium nervisequum** (Fuck.) Sacc. Syll. III, 711. — Wint. Kr. Fl. VII. 490. — N. K. A. 3, II, 290. — F. du *Platanus occid.*

20. **Glocosporium Oncidii** Oud. N. K. A. 2, VI. 18 et 3, II, 291. — Sacc. Syll. XI, 567. — Wint. Kr. Fl. VII, 486. — F. de l'*Oncidium lanceanum* cultivé.

21. **Glocosporium pachybasium** Sacc. Syll. III, 710. — Wint. Kr. Fl. VII, 459. — Oud. N. K. A. 3, II, 754. — F. du *Buxus sempervirens*.

22. **Glocosporium Palmarum** Oud. N. K. A. 2, VI; 18. — Sacc. Syll. XI, 567. — Wint. Kr. Fl. VII, 457. — F. de l'*Areca sapida*.

23. **Glocosporium paradoxum** (de Not.) Fuck. — Oud. N. K. A. 2, IV, 264 et 265, sub Trochila Cr. — Sacc. Syll. III, 707. — Wint. Kr. Fl. VII, 478. — Fusarium pezizoides Desm. — Prodr. Fl. Bat. II, 1, p. 150. — F. du *Hedera Helix*.

24. **Glocosporium Pini** Oud. N. K. A. 3, II, 754. — Aiguilles du *Pinus silvestris*.

25. **Glocosporium Platani** (Mont.) Oud. Arch. Néerl. VIII (1873), 371; id. N. K. A. 2, I, 258. — Sacc. Syll. III, 711. — Wint. Kr. Fl. VII, 491. — F. du *Platanus occidentalis*.

***Glocosporium Populi** (Lib.) Desm. — N. K. A. I, 258. — Arch. Néerl. VIII, 371. — Voir: *Marsonia*.

***Glocosporium Potentillae** Desm. et Oud. N. K. A. 2, I, Arch. Néerl. VIII, 372, 259. — Voir: *Marsonia*.

26. **Gloeosporium quercinum** West. — Prodr. Fl. Bat. II, 1, p. 151; N. K. A. 2, VI, 47 et 2, VI, 615. — Sacc. Syll. III, 714. — Wint. Kr. Fl. VII, 195. — F. du *Quercus Robur*.

27. **Gloeosporium Ribis** (Lib.) Desm. et Mont. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, 118; N. K. A. 2, I, 171; 2, III, 153; 2, VI, 616; Oud. Fgi Neerl. exs. n° 197. — Sacc. Syll. III, 706. — Wint. Kr. Fl. VII, 498. — F. des *Ribes Grossularia* et *rubrum*.

28. **Gloeosporium Robergei** Desm. Arch. Néerl. VIII (1873), 373; N. K. A. 2, I, 260 et 2, VI, 616. — Sacc. Syll. III, 712. — Wint. Kr. Fl. 462. — F. du *Carpinus Betulus*.

29. **Gloeosporium Salicis** West. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 152. — Sacc. Syll. III, 711. — Wint. Kr. Fl. VII, 500. — F. de quelques espèces de *Salix*.

30. **Gloeosporium subfalcatum** Sacc. Bomm. Rouss. — Sacc. Syll. X, 451. — Wint. Kr. Fl. VII, 531. — N. K. A. 2, VI, 295 et 2, VI, 616. — Ram. du *Sarothamnus scoparius*.

31. **Gloeosporium Tiliae** Oud. Arch. Neerl. VIII (1873), 373; N. K. A. 2, I, 260 et 2, VI, 615. — Sacc. Syll. III, 701. — Wint. Kr. Fl. VII, 503. — F. du *Tilia cordata*.

32. **Gloeosporium Tremulae** (Lib.) Pass. — N. K. A. 2, VI, 616. — Sacc. Syll. III, 712. — Wint. Kr. Fl. VII, 494. — Sphaeria frondicola Fr. — T. N. G. XI, 395. — F. du *Populus Tremula*.

Gloeosporium truncatum (Bon.) Sacc. Reliq. Lib. Ser. IV, n° 175 et Syll. III, 708. — Oud. N. K. A. 3, III, 1117. — F. du *Vacc. Vitis idaea*.

MYXOSPORIUM.

1. **Myxosporium Corni** Allescher Hedw. 1894, p. 73 et Wint. Kr. Fl. VII, 516. — Sacc. Syll. XI, 568. — Oud. N. K. A. 3, II, 756. — Ram. du *Cornus sanguinea*.

2. **Myxosporium corniphilum** Oud. Beibl. z. bot. Centralbl. 1902; id. N. K. A. 3, II, 757. — Ram. du *Cornus stricta* cultivé.

3. **Myxosporium Coryli** Oud. N. K. A. 3, I, 507; id. Zitt. V. K. A. v. W. 1900, p. 380. — Sacc. Syll. XVI, 1005. — Wint. Kr. Fl. VII, 954. — Ram. du *Corylus Avellana*.

4. **Myxosporium croceum** (P.) Link. — Sacc. Syll. III, 727. — Wint. Kr. Fl. VII, 520. — Naemaspora crocea P. — T. N. G. XI. 404 et Prodr. Fl. Bat. II, 1, p. 156. — Ram. du *Tilia cordata*.

***Myxosporium fagineum** Cda. — Prodr. Fl. Bat. II, 1, p. 157. — Voir: *Phyllocdia fagínea*.

5. **Myxosporium juglandinum** Oud. N. K. A. 3, II, 292; id. Zitt. V. K. A. v. W. 1900, p. 380. — Sacc. Syll. XVI, 1005. — Wint. Kr. Fl. VII, 954. — Ram. du *Juglans regia*.

6. **Myxosporium Lanceola** Sacc. et Roum. in Sacc. Syll. III, 726. — Wint. Kr. Fl. VII, 527. — N. K. A. 3, II, 293.

7. **Myxosporium melanotrichum** (Cast.) Sacc. Syll. X, 465. — Wint. Kr. Fl VII, 531. — Oud. N. K. A. 3, II, 757. — Ram. du *Salix cinerea*.

8. **Myxosporium Negundinis** Oud. N. K. A. 3, II, 897. — Ram. du *Negundo fraxinifolia*.

9. **Myxosporium platanicolum** Ell. Ev. — Sacc. Syll. XI, 569. — Oud. N. K. A. 3, III, 1118. — Ram. du *Platanus occidentalis*.

***Myxosporium punicenm** Cda. — Arch. Néerl. VIII, 387. — Voir: *Phyllocdia punicea*.

10. **Myxosporium Russellii** (B. Br.) Sacc. Syll. III, 722. — Oud. N. K. A. 3, III, 1118. — Ram. du *Robinia Pseudo-Acacia*.

11. **Myxosporium Staphyleae** Oud. N. K. A. 3, II, 757; id. Beibl. z. bot. Centr. Bl. 1902. — Ram. du *Staphylea pinnata*.

12. **Myxosporium Tulasnei** Sacc. Syll. III, 723. — Wint. Kr. Fl. VII, 511. — N. K. A. 2, VI, 616. — Ram. de l'*Acer Pseudo-Platanus*.

13. **Myxosporium tumidum** (Bon.) Sacc. Syll. III, 727 et X, 465. — Wint. Kr. Fl. VII, 512. — N. K. A. 2, V, 508 et 2, VI, 616.

14. **Myxosporium Ulmi** (Oud.) Sacc. Syll. III, 723. — Wint. Kr. Fl. VII, 533. — Discella Ulmi Oud. Hedw. 1883, p. 116; id. N. K. A. 2, IV, 235 et 3, II, 897. — Ram. de l'*Ulmus campestris*.

15. **Myxosporium Urostigmatis** Oud. N. K. A. 3, II, 897. — Ram. de l'*Urostigma Neumanni*.

*BLENNORIA.

***Blennoria Buxi** Fr., mentionné dans le Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 155, doit être rayé, n'étant pas encore rencontré dans les Pays-Bas.

NAEMASPORA.

1. **Naemaspora crocea** (Bon.) Sacc. Syll. III, 747. — Wint. Kr. Fl. VII, 539. — N. K. A. VI, 616. — Ram. du *Fagus silvatica*.

2. **Naemaspora croceola** Sacc. Syll. III, 746. — Wint. Kr. Fl., VII, 537. — Oud. N. K. A. 2, VI, 49. — Ecorce du *Fagus silvatica*.

3. **Naemáspora microspora** Desm. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 156. — Sacc. Syll. III, 747. — Wint. Kr. Fl. VII, 537. — Souche d'un Peuplier abattu.

TRULLULA.

1. **Trullula nitidula** Sacc. Syll. III, 732. — Wint. Kr. Fl. VII, 548. — N. K. A. 3, II, 293 et 898. — Ram. du *Gleditschia triacanthos* et du *Persica vulgaris* (Coniothyrium Persicae Oud. in N. K. A. 2, VI, 602).

2. Phaeosporae.

MELANCONIUM.

1. **Melanconium Alni** Ell. Everh. — Sacc. Syll. XIV, 1018. — N. K. A. 2, VI, 617. — Ram. de l'*Alnus glutinosa*.

2. **Melanconium apiocarpum** Lk. — Oud. Arch. Néerl. VIII (1873), 368; id. N. K. A. 2, I, 170. — Sacc. Syll. III, 755. — Wint. Kr. Fl. VII, 570. — Ram. de l'*Alnus glutinosa*.

3. **Melanconium betulinum** Schm. et Kze. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 151; N. K. A. 2, VI, 616. — Sacc. Syll. III, 356. — Wint. Kr. Fl. VII, 572. — Ram. du *Betula alba*.

4. **Melanconium bicolor** Nees. — N. K. A. 3, II, 296 et 2, VI, 617. — Sacc. Syll. III, 755. — Wint. Kr. Fl. VII, 571. — Ram. du *Betula alba*.

5. **Melanconium Desmazierii** (B. Br.) Sacc. Syll. III, 751. — Wint. Kr. Fl. VII, 583. — Discella Desmazierii B. Br. — Arch. Néerl. VIII (1873), 367; id. N. K. A. 2; I, 170. — Epidochium Martensii West. Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 4. — Ram. du *Tilia cordata*.

6. **Melanconium disseminatum** Lk. — T. N. G. XI, 404; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 154. — Sacc. Syll. III, 757. — Wint. Kr. Fl. VII, 585. — Bois pourri.

7. **Melanconium griseum** Schwein. — N. K. A. 3, I, 508. — Sacc. Syll. III, 750. — Sarments de Rubus.

8. **Melanconium juglandinum** Kze. — N. K. A. 3, II, 296. — Sacc. Syll. III, 753. — Wint. Kr. Fl. VII, 577. — Ram. du *Juglans regia*.

9. **Melanconium magnum** (Grev. Berk. — N. K. A. 2, II, 182. — Sacc. Syll. III, 753. — Wint. Kr. Fl. VII, 577. — Ram. du *Juglans regia*.

10. **Melanconium microspermum** (Nees) Sacc. Syll. III, 751. —

Wint. Kr. Fl. VII, 577. — N. K. A. 2, I, 170. — Mel. microsporum Arch. Néerl. VIII, (1873), 368. — Morceau d'écorce d'origine dubieuse.

11. **Melanconium olivaceum** (Cda) Sacc. Syll. III, 757. — Wint. Kr. Fl. VII, 585. — Oud. N. K. A. 2, V, 508. — Tige du *Brassica oleracea*.

12. **Melanconium ovatum** (P.) Lk. — Prodr. Fl. Bat. II, p. 4, p. 151. — Sacc. Syll. III, 758. Wint. Kr. Fl. VII, 586. — Stilbospora ovata P. — T. N. G. XI, 101. — Ecorce d'arbre rejetée.

13. **Melanconium Persicae** Oud. Hedw. 1898, p. 180; id. N. K. A. 3, I, 508; id. Zitt. V. K. A. v. W. 1900, p. 382. — Sacc. Syll. XVI, 1008. — Wint. Kr. Fl. VII, 957. — Ram. du *Persica vulgaris*.

14. **Melanconium Pruni lusitanicae** Oud. N. K. A. 2, VI, 50 et 617. — Sacc. Syll. XI, 571. — Wint. Kr. Fl. VII, 581. — Ram. du *Pr. lusitanica*.

15. **Melanconium quercinum** Oud. Beibl. z. bot. Centrbl. 1902; id. N. K. A. 3, II, 756. — Ram. décortiqués du *Quercus Robur*.

16. **Melanconium sphaeroideum** Lk. — N. K. A. 2, VI, 617. — Sacc. Syll. III, 755. Wint. Kr. Fl. VII, 568. — Ram. de l'*Alnus glutinosa*.

17. **Melanconium sphaerospermum** (P.) Lk. — T. N. G. XI, 101; Prod. Fl. Bat. II, 4, p. 154. — Sacc. Syll. III, 759. — Wint. Kr. Fl. VII, 579.

18. **Melanconium stromaticum** Cda. — Oud. N. K. A. 2, II, 182; 2, V, 509; 2, VI, 617; Oud. Fgi Neerl. exs. n° 294. — Chaumes du *Phragmites communis*.

EPIDOCHIUM.

Epidochium Martensii West. Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 4. — Voir: *Melanconium Desmazierii*.

THYRSIDIUM.

1. **Thyrsidium botryosporum** Mont. — N. K. A. 2, VI, 617. — Sacc. Syll. III, 761. — Wint. Kr. Fl. VII, 591. — Ram. du *Fagus silvatica*.

2. **Thyrsidium salicinum** Oud. — N. K. A. 3, III, 1121. — Ram. du *Salix babylonica*.

3. Phacodidymae.

DIDYMOSPORIUM.

1. **Didymosporium atrocaeruleum** Oud. Arch. Néerl. VIII (1873), 368; id. N. K. A. 2, 1, 170. — Sacc. Syll. III, 763. — Wint. Kr. Fl. VII, 619. — Ram. de l'*Urostigma Neumanni* cultivé.

BULLARIA.

1. **Bullaria Umbelliferarum** D. C. — Sacc. Syll. III, 766. — Wint. Kr. Fl. VII, 619. — Phragmotrichum bullaria Cda. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 160. — Tige de l'*Angelica silvestris*.

4. Hyalodidymae.

MARSONIA.

1. **Marsonia Castagnei** (Desm. et Mont.) Sacc. Syll. III, 768. — Wint. Kr. Fl. VII, 606. — N. K. A. 3, 1, 309. — Glocosporium Populi (Lib.) Desm. — Oud. N. K. A. 2, 1, 258. — F. du *Populus nigra*.

var. **Monilliferae** Oud. N. K. A. 3, II, 296. — Sacc. Syll. XVI, 1011. — Wint. Kr. Fl. VII, 607. — F. du *Populus monilifera*.

2. **Marsonia Daphnes** (Rob. et Desm.) Sacc. Syll. III, 769. — Wint. Kr. Fl. VII, 599. — Glocosporium D. Oud. Arch. Néerl. VIII (1873), 370; id. N. K. A. 2, 1, 258. — F. du *Daphne Mezereum*.

3. **Marsonia Delastrei** (de Lacr.) Sacc. Syll. III, 770. — Wint. Kr. Fl. VII, 596. — N. K. A. 2, VI, 617. — Oud. Fgi Neerl. exs. n° 89. Glocosporium Delastrei de Lacr. — Oud. N. K. A. 2, II, 100. — F. du *Coronaria* (Lychnis) *Flos cuculi*.

4. **Marsonia Grossulariae** Oud. N. K. A. VI, 50 et 618. — Sacc. Syll. XI, 573. — Wint. Kr. Fl. VII, 608. — F. du *Ribes Grossularia*.

5. **Marsonia Juglandis** (Lib.) Sacc. Syll. III, 768. — Wint. Kr. Fl. VII, 602. — Laptothyrium Jugl. Lib. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 117.

6. **Marsonia obscura** Romell. — Oud. Hedw. 1898, p. 319; id. N. K. A. 3, II, 296. — Sacc. Syll. X, 178. — Wint. Kr. Fl. VII, 609. — F. du *Persica vulgaris*.

7. **Marsonia Panattoniana** Berl. — N. K. A. 3, II, 297 et 3, III, 1117. — Sacc. Syll. XIV, 1021. — Wint. Kr. Fl. VII, 602. — F. du *Lactuca sativa* et du *Cichorium Endivia*.

8. **Marsonia piriformis** (Riess) Sacc. Syll. III, 767. — Wint. Kr. Fl. VII, 605. — Didymosporium pyriforme Riess. — Oud. N. K. A. 2, I, 262 et 2, II, 11. — F. du *Populus nivea*.

9. **Marsonia Populi** (Lib.) Sacc. Syll. III, 767. — Wint. Kr. Fl. VII, 605. — Gloeosporium P. (Lib.) Mont. et Desm. — Oud. Arch. Néerl. VIII (1873), 371; id. N. K. A. 2, I, 258. — Leptothyrium Populi Lib. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 118. — F. du *Populus nigra*.

10. **Marsonia Potentillae** (Desm.) Fisch. — Sacc. Syll. III, 770. — Wint. Kr. Fl. VII, 607. — N. K. A. 3, II, 756. — Gloeosporium Pot. (Desm.) Oud. Arch. Néerl. VIII (1873), p. 372; id. N. K. A. 2, I, 259. — F. du *Potentilla reptans*.

var. **Tormentillae** Trail. — Oud. N. K. A. 3, II, 756. — Sacc. Syll. X, 749. — Wint. Kr. Fl. VII, 608. — F. du *Comarum palustre*.

11. **Marsonia Saccardoi** Oud. — M. Populi Sacc. Tgi ital. del. tab. 1062.

12. **Marsonia Secales** Oud. Hedw. 1898, p. 181; id. N. K. A. 3, I, 509. — id. Zitt. V. K. A. v. W. 1900, p. 382. — Sacc. Syll. XIV, 1022. — Wint. Kr. Fl. VII, 610. — F. du *Secale cereale*.

13. **Marsonia truncatula** Sacc. Syll. III, 768. — Wint. Kr. Fl. VII, 595. — N. K. A. 2, VI, 50 et 617. — Didymosporium Aceris (Lib.) Mont. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 161. — F. de l'*Acer campestre*.

SEPTOMYXA.

1. **Septomyxa Aesculi** Sacc. Syll. III, 766. — Wint. Kr. Fl. VII, 612. — N. K. A. 2, VI, 617. — Ram. de l'*Acer Negundo* (lapsu calami loco *Aesculi Hippocastani?*).

2. **Septomyxa Ariae** Oud. Zitt. V. K. A. v. W. 1900, p. 382; id. N. K. A. 3, II, 297. — Sacc. Syll. XVI, 1010. — Wint. Kr. Fl. VII, 614. — Ram. du *Pirus* (Sorbus) *Aria*.

3. **Septomyxa Corni** Oud. Zitt. V. K. A. v. W. 1900, p. 383; id. N. K. A. 3, II, 297. — Sacc. Syll. XVI, 1009. — Wint. Kr. Fl. VII, 612. — Ram. du *Cornus alba*.

4. **Septomyxa Negundinis** Allesch. — Sacc. et Syd., Syll. XIV, 1020. — Wint. Kr. Fl. VII, 611. — Oud. Hedw. 1898, p. 180;

id. Zitt. V. K. A. v. W. 1900, p. 383; id. N. K. A. 3, I, 510 et 3, II, 298. — Ram. du *Negundo fraxinifolia*.

5. **Septomyxa Rhododendri** Oud. N. K. A. 2, VI, 50 et p. 617. — Ram. d'un *Rhododendrum* cultivé.

5. Hyalophragmiae.

SEPTOGLOEUM.

1. **Septogloeum Angelicae** (Cooke) Sacc. III, 801. — Oud. N. K. A. 3, II, 758. — Tiges de l'*Angelica silvestris*.

2. **Septogloeum Corni** Oud. Zitt. V. K. A. v. W. 1900, p. 383; id. N. K. A. 3, II, 299; Sacc. et Syd., Syll. XVI, 1012. — Wint. Kr. Fl. VII, 623. — Ram. du *Cornus sanguinea*.

3. **Septogloeum Pomi** Oud. N. K. A. 3, III, 1120. — Ram. du *Pirus Malus*.

PSAMMINA.

1. **Psammina Rommeriae** Rouss. Sacc. Syll. X, 198. — Wint. Kr. Fl. VII, 628. — N. K. A. 3, I, 128 et 510. — F. du *Psamma littoralis* (= Ammophila arenaria.)

6. Phaeophragmiae.

STILBOSPORA.

1. **Stilbospora angustata** P. — N. K. A. 2, VI, 618. — Sacc. Syll. III, 772. — Wint. Kr. Fl. VII, 635. — Ram. de différents arbres.

2. **Stilbospora Kickxii** West. — N. K. A. 2, V, 509 et 2, VI, 618. — Sacc. Syll. III, 771. — Wint. Kr. Fl. VII, 635. — Ram. du *Fagus silvatica*.

3. **Stilbospora macrosperma** P. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 153; Oud. N. K. A. 2, VI, 51. — Sacc. Syll. III, 772. — Wint. Kr. Fl. VII, 637. — Ram. de l'*Ulmus campestris*.

***Stilbospora ovata** P. — T. N. G. XI, 404. — Voir: *Stagonosporium piriforme*.

4. **Stilbostoma Robiniae** Oud. N. K. A. 3, III, 1120. — Ram. tombés du *Rob. Pseudo-Acacia*.

5. **Stilbospora thelebola** Sacc. Syll. III, 771. — Wint. Kr. Fl. VII, 634. — N. K. A. 2, V, 172 et 2, VI, 618. — Écorce du *Betula alba*.

CORYNEUM.

1. **Coryneum Beyerinckii** Oud. Hedw. 1883, p. 113; N. K. A. 2, IV, 236 et 2, VI, 618. — Sacc. Syll. III, 774. — Wint. Kr. Fl. VII, 640. — Ram. de plusieurs Amygdalées (*Amygdalus, Persica*).

2. **Coryneum Corni-albae** (Romm.) Sacc. Syll. III, 774. — Wint. Kr. Fl. VII, 647. N. K. A. 3, II, 753 et 2, VI, 618. — Ram. du *Cornus alba*.

3. **Coryneum disciforme** Kze u. Schm. — Arch. Néerl. VIII (1873), 368; N. K. A. 2, I, 258 et 2, VI, 618. — Sacc. Syll. III, 778. — Wint. Kr. Fl. VII, 643. — Ram. des *Mespilus germanica* et *Tilia cordata* (ulmifolia).

4. **Coryneum Kunzei** Cda. — Arch. Néerl. II, (1867), 38. — Sacc. Syll. III, 778. — Wint. Kr. Fl. VII, 642. — Ram. de l'*Alnus glutinosa*.

β. **Castaneae** Sacc. Syll. III, 778. — Wint. Kr. Fl. VII, 642. — Oud. N. K. A. 2, V, 540. — Cor. Kunzei N. K. A. 2, VI, 618. — Ram. du *Castanea sativa*.

5. **Coryneum macrospermum** B. Br. — N. K. A. 3, II, 298. — Sacc. Syll. III, 776. — Wint. Kr. Fl. VII, 639. — Ram. décortiqués du *Fagus silvatica*.

Coryneum macrosporum B. Br. — N. K. A. 2, IV, 237. — Voir: *Scolecosporium*.

6. **Coryneum microstictoides** Sacc. et Penzig in Sacc. Syll. III, 774. — Wint. Kr. Fl. VII, 651. N. K. A. 2, VI, 51 et p. 618. — Tiges de l'*Oenothera biennis*.

7. **Coryneum microstictum** B. Br. — Arch. Nat. VIII (1873), p. 369; N. K. A. 2, I, 168 (sous 16) et 170; 2, VI, 618. — Sacc. Syll. III, 775. — Wint. Kr. Fl. VII, 640. — Hendersonia vagans Oud. Arch. Neerl. II, 37. — Ram. de plusieurs espèces de *Rosa* et *Rubus*.

8. **Coryneum Populi** Oud. — Hedw. 1898, p. 181; id. N. K. A. 3, I, 510, id. Zitt. V. K. A. v. W. 1900, p. 383; Sacc. et Syd., Syll. XVI, 1013. — Wint. Kr. Fl. VII, 654.

9. **Coryneum pulvinatum** Kz. u. Sch. — Prodr. Fl. Bat. II, 1, p. 159. N. K. A. 3, I, 239. — Sacc. Syll. III, 777. — Wint. Kr. Fl. VII, 639. — Éclats de bois ramollis.

10. **Coryneum Rubarum** Oud. Hedw. 1894, p. 20; id. N. K. A. 2, VI, 295. — Sacc. Syll. XI, 576. — Wint. Kr. Fl. VII, 657. — Ram. d'une espèce de *Rubus*.

11. **Coryneum salicinum** (Cda.) Sacc. Syll. III, 777. — Wint.

Kr. Fl. VII, 658. — Didymosporium salic. Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 161.

12. **Coryneum umbonatum** Nees. — N. K. A. 1, I. 56. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 158. — Sacc. Syll. III, 777. — Wint. Kr. Fl. VII, 645.

SCOLECOSPORIUM.

1. **Scolecosporium Fagi** Lib. — Sacc. Syll. III, 782. — Wint. Kr. Fl. VII, 662. — N. K. A. 2, VI, 618. — Coryneum macrosporum Oud. Versl. Med. K. A. v. W. 2, XVIII (1883), 373; N. K. A. 2, IV, 237; Oud. Fgi Neerl. exs. n° 296. — Cor. macrospermum Berk. et Br. — Oud. N. K. A. 3, II, 298. — Ram. décortiqués du *Fagus silvatica*.

PESTALOZZIA.

1. **Pestalozzia camptosperma** Peck. — Sacc. Syll. X, 195. — N. K. A. 3, III, 1119. — Aig. de l'*Abies alba*.

2. **Pestalozzia Cryptomeriae** Cooke. — Oud. N. K. A. 3, II, 758. — Sacc. Syll. III, 792. — F. du *Cryptomeria japonica*.

3. **Pestalozzia funerea** Desm. — N. K. A. 2, VI, 619; 3, I, 510; 3, II, 758. — Sacc. Syll. III, 791. — Wint. Kr. Fl. VII, 681. — F. du *Rhododendron ponticum*, *Taxus baccata*, *Thuya occidentalis*, *Quercus rubra*.

4. **Pestalozzia Guepini** Desm. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 84. — Sacc. Syll. III, 791. — Wint. Kr. Fl. VII, 680. — F. du *Camellia japonica*.

5. **Pestalozzia intermedia** Sacc. Bomm. Rouss. — Sacc. Syll. X, 486. — Wint. Kr. Fl. VII, 702. — N. K. A. 3, II, 298. — Ram. d'une espèce de *Rosa*.

6. **Pestalozzia lignicola** Cooke. — Arch. Néerl. VIII (1873), 370; id. N. K. A. 2, I, 171. — Sacc. Syll. III, 791. — Wint. Kr. Fl. VII, 679. — Bois d'une souche d'*Alnus glutinosa*.

7. **Pestalozzia monochaetoidea** Sacc. et Ellis. — Sacc. Syll. III, 798. — Oud. N. K. A. 3, III, 1119. — Ram. du *Spiraea opulifolia*.

8. **Pestalozzia Mori** (Cast.) Mont. — N. K. A. 2, VI, 619. — Sacc. Syll. III, 793. — Wint Kr. Fl. VII, 695. — Ram. du *Morus alba*.

9. **Pestalozzia neglecta** Thüm. — Oud. N. K. A. 2, V, 172. — Sacc. Syll. III, 788. — Wint. Kr. Fl. VII, 690. — F. de l'*Evonymus japonica*.

10. **Pestalozzia Rosae** West. — Prodr. Fl. Bat II, 4, p. 84. —

Sacc. Syll. III, 786. — Wint. Kr. Fl. VII, 702. — Ram. d'une espèce de *Rosa*.

11. **Pestalozzia Saccardoi** Speg. — N. K. A. 3, II, 758. — Sacc. Syll. III, 797. — F. du *Quercus Robur*.

12. **Pestalozzia Syringae** Oud. N. K. A. 2, V, 510 et 2, VI, 619. — Sacc. Syll. X, 194. — Ram. du *Syringa vulgaris*.

13. **Pestalozzia truncata** Lév. — N. K. A. 3, II, 299. — Sacc. III, 794. — Wint. Kr. Fl. VII, 676. — Ram. décortiqués d'une espèce de *Populus*.

ASTEROSPORIUM.

1. **Asterosporium Hoffmanni** Kze. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 153; N. K. A. 1, V, 352 et 2, VI, 619. — Sacc. Syll. III, 782. — Wint. Kr. Fl. VII, 663. — Ram. du *Fagus silvatica*.

7 Phaeodictyae.

STEGANOSPORIUM.

1. **Steganosporium cellulosum** Cda. — Arch. Néerl. II (1867), 38; N. K. A. 2, I, 94; 2, VI, 619 et 3, II, 299. — Oud. Herb. N. Pl. n°. 389. — Sacc. Syll. III, 804. — Wint. Kr. Fl. VII, 744. — Ram. de l'*Acer Pseudoplatanus*, *Platanus occidentalis* et *Tilia cordata* (Oud. Fgi Neerl. exs. n° 295, sous le nom. de n° 2).

?2. **Steganosporium piriforme** (Hoffm.) Cda. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 154. N. K. A. 2, VI, 619. — Sacc. Syll. III, 803. — Wint. Kr. Fl. VII, 712. — Stilbospora ovata P. — T. N. G. XI, 104. — Ram. de l'*Acer campestre*, du *Fagus silvatica* et du *Juglans regia*.

8. Scolecosporae.

CYLINDROSPORIUM.

***Cylindrosporium Cordae** Sacc. — Voir: *Ramularia Lampsanae*.

1. **Cylindrosporium Ficariae** Berk. — Sacc. Syll. III, 737. — Wint. Kr. Fl. VII, 725. — Gloeosporium Fic. Cooke. — Oud. N. K. A. 2, I, 172. — F. du *Ficaria verna*.

CRYPTOSPORIUM.

1. **Cryptosporium Aucupariae** Allesch. — N. K. A. 3, II, 896. — Sacc. Syll. XIV, 1034. — Wint. Kr. Fl. VII, 749. — Ram. du *Pirus* (Sorbus) *Aucuparia*.

2. **Cryptosporium conicum** Bon. — N. K. A. 3, II, 294. — Sacc. Syll. III, 741. — Wint. Kr. Fl. VII, 717. — Ram. du *Quercus Robur*.

3. **Cryptosporium leptostromiforme** J. Kühn in Frank, Kampfbuch gegen die Schädlinge unserer Feldfrüchte, 1897, p. 242. — Tiges putrides d'une espèce de *Lupinus*. — Parce que l'auteur fait mention de périthèces, il semble que sa place doit être cherchée ailleurs. — Saccardo et Winter n'en font point mention.

4. **Cryptosporium Neesii** Cda. — Arch. Néerl. II (1867), 37; N. K. A. 2, VI, 616. — Sacc. Syll. III, 740. — Wint. Kr. Fl. VII, 742. — Ram. de l'*Alnus glutinosa*.

5. **Cryptosporium Populi** Bon. — N. K. A. 2, V, 171 et 2, VI, 616. — Sacc. Syll. III, 742. — Wint. Kr. Fl. VII, 747. — Ram. d'une espèce de *Populus*.

6. **Cryptosporium Siphonis** Oud. N. K. A. 3, II, 294; Zitt. V. K. A. v. W. 1900, p. 381. — Sacc. et Sydow, Syll. XVI, 1019. — Wint. Kr. Fl. VII, 744. — Ram. de l'*Aristolochia Sipho*.

LIBERTELLA.

***Libertella acerina** West. Not. V, 29. — Sacc. Syll. III, 745. — Oud. N. K. A. 3, III, 1117. — Ram. de l'*Acer platanoides*.

1. **Libertella alba** Lib. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 156. — Sacc. Syll. III, 745. — Wint. Kr. Fl. VII, 731. — Ram. de l'*Alnus glutinosa*.

2. **Libertella Aucupariae** Oud. Zitt. V. K. A. v. W. 1900, p. 381; id. N. K. A. 3, II, 294. — Sacc. et Syd., Syll. XVI, 1020. — Wint. Kr. Fl. VII, 740. — Ram. du *Pirus* (Sorbus) *Aucuparia*.

3. **Libertella betulina** Desm. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 156. — Sacc. Syll. III, 745. — Wint. Kr. Fl. VII, 734. — Ram. du *Betula alba*.

4. **Libertella faginea** Desm. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 156. — Sacc. Syll. III, 744. — Wint. Kr. Fl. VII, 735. — Ram. du *Fagus silvatica*.

5. **Libertella fusca** Bon. — N. K. A. 3, II, 295. — Sacc. Syll. III, 744. — Wint. Kr. Fl. VII, 736. — Ram. du *Fagus silvatica*.

6. **Libertella Lonicerae** Cooke et Harkn. — N. K. A. 3, II, 295. — Sacc. Syll. III, 745. — Ram. du *Lonicera Ledebourii*.

7. **Libertella Opuli** Oud. Zitt. V. K. A. v. W. 1900, p. 381; id. N. K. A. 3, II, 295. — Sacc. et Syd., Syll. XVI, 1021. — Wint. Kr. Fl. VII, 741. — Ram. du *Viburnum Opulus*.

8. **Libertella Syringae** Oud. Zitt. V. K. A. v. W. 1900, p. 382; id. N. K. A. 3, II. 348. — Sacc. et Syd., Syll. XVI. 1021. — Wint. Kr. Fl. VII. 740. — Ram. du *Syringa vulgaris*.

9. **Libertella Ulmi suberosae** Oud. Hedw. 1898, p. 180. — id. N. K. A. 3, I, 507; id. Zitt. V. K. A. v. W. 1900. p. 382. — Sacc. Syll. XIV. 1022. — Wint. Kr. Fl. VII. 740. — Ram. de l'*Ulmus suberosa*.

†58 Mucedinaceae.

1. Hyalosporae.

a. Micronemeae.

CHROMOSPORIUM.

1. **Chromosporium Malvacearum** (West.) Sacc. Syll. IV. 8. — Wint. Kr. Fl. VIII, 11. — Gymnosporium Malv. West. — Oud. N. K. A. 2. III. 154. — Tige d'une espèce de *Malva*.

SPORENDONEMA.

***Sporendonema casei** Desm. — N. K. A. 1, 1, 55; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 139. — Voir: *Oospora crustacea*.

1. **Sporendonema terrestre** Oud. Versl. Med. K. A. v. W. 3, II, 115. — Ann. Mag. Nat. Hist. 5, XIX, 426. — Wint. Kr. Fl. VIII, 22. — Fragments de terre, distribués à la surface d'une couche de tannée, dans une serre chaude.

OOSPORA.

1. **Oospora Abietum** Oud. Zitt. V. K. A. v. W. 1896, p. 224 et 1900, p. 384; id. Hedw. 1898, p. 181; id. N. K. A. 3, I, 511. — Sacc. Syll. XIV, 1038. — Wint. Kr. Fl. VIII, 25. — Aiguilles des *Picea excelsa*, *Pinsapo*, *Nordmanniana* et *Douglasii*, cultivés.

2. **Oospora crustacea** (Bull.) Sacc. Syll. IV, 20. — Sporendonema casei Desm. — N. K. A. 1, 1, 55; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 139. — Croûte de fromage suranné.

3. **Oospora Lactis** (Fres.) — Sacc. Syll. IV, 15. — Wint. Kr. Fl. VIII, 32. — Écoulement blanc de quelques arbres (Beijerinck).

4. **Oospora ovalispora** (Berk.) Sacc. Syll. IV, 13. — N. K. A. 3, II, 300. — Wint. Kr. Fl. VIII, 39. — Torula ovalispora Berk. — Arch. Néerl. VIII (1873), 371. et N. K. A. 2, I, 172. — Ram. du *Persica vulgaris*.

FUSIDIUM.

1. **Fusidium Anchusae** Oud. Beibl. z. bot. Centrbl. 1902; id. N. K. A. 3. II, 760. — Wint. Kr. Fl. VIII, 63. — F. de l'*Anchusa italica* cultivé.

2. **Fusidium candidum** Lk. — Sacc. Syll. IV, 27. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 155. — Wint. Kr. Fl. VIII, 61. — Ram. du *Fagus silvatica*.

***Fusidium clandestinum** Cda. — Arch. Néerl. II, 43 et VIII, 390. — N. K. A. 2, I, 180. — Voir: *Cylindrium*.

3. **Fusidium griseum** Lk. — Sacc. Syll. IV, 26. — Wint. Kr. Fl. VIII, 61. — Oud. N. K. A. 3, II, 761. — F. du *Quercus Robur*.

4. **Fusidium hysteriiforme** West. — Sacc. Syll. IV, 28. — Wint. Kr. Fl. VIII, 64. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 155. — Fruits mous du *Cucumis Melo*.

5. **Fusidium parasiticum** West. — Sacc. Syll. IV, 31. — Wint. Kr. Fl. VIII, 64. — Prodr. Fl. Bat. 4, II, p. 155. — Strome stéril du *Xylaria cornuta*.

6. **Fusidium pirinum** Cda. — Sacc. Syll. IV, 27. — Oud. Arch. Néerl. II (1867), 43. — F. du *Pirus communis*.

***Fusidium Ranunculi** Bon. — Arch. Néerl. VIII, 390; N. K. A. 2, I, 316. — (=Sporidiola *Entylomatis Ranunculi*).

7. **Fusidium sulphureum** (Schlecht.) Lk. — Sacc. Syll. IV, 28. — Wint. Kr. Fl. VIII, 65. — Fusarium sulph. Schlecht. — T. N. G. XII, 274; Prodr. Fl. Bat. II, 4, 150. — Pommes de terre putrescentes.

MONILIA.

1. **Monilia Acremonium** Delacr. — Sacc. Syll. XIV, 1041. — Wint. Kr. Fl. VIII, 55. — Arch. Néerl. 2, VII, 285; id. N. K. A. 3, II, 903. — Produit d'une culture sur gélatine préparée, de terre humeuse pulvérisée.

2. **Monilia aurea** (Lk.) Gmel. — Sacc. Syll. IV, 33. — Oidium aureum T. N. G. XII, 274 et Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 134. — Wint. Kr. Fl. VIII, 56. — Bois ramolli.

3. **Monilia candida** Bon. — Sacc. Syll. IV, 32. — N. K. A. 3, II, 333 et 761. — Wint. Kr. Fl. VIII, 54. — Ram. de l'*Acer Pseudo-Platanus* ramollis.

4. **Monilia cinerea** Bon. — Sacc. Syll. IV, 34. — Wint. Kr. Fl. VIII, 52. — Arch. Néerl. II (1867), 42, et N. K. A. 3, II, 300. — Fruits d'*Amygdalacées* et de *Pomacées* gâtés.

5. **Monilia fructigena** P. — Sacc. Syll. IV, 34. — Wint. Kr. Fl. VIII, 57. — N. K. A. 3, II, 300. — Oidium fructigenum Kze. — T. N. G. XII, 274; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 134. — Fruits d'*Amygdalacées* et de *Pomacées* gâtés.

6. **Monilia geophila** Oud. Arch. Néerl. 2, VII, 286 et N. K. A. 3, II, 903. — Wint. Kr. Fl. VIII, 56. — Produit d'une culture, sur gélatine préparée, de terre humeuse pulvérisée.

7. **Monilia humicola** Oud. Arch. Néerl. 2, VII, 286 et N. K. A. 3, II, 904. — Wint. Kr. Fl. VIII. 60. — Produit d'une culture, sur gélatine préparée, de terre humeuse pulvérisée.

8. **Monilia Koningi** Oud. Arch. Néerl. 2, VII, 287 et N. K. A. 3, II, 904. — Wint. Kr. Fl. VIII. 59. — Produit d'une culture, sur gélatine préparée, de terre humeuse pulvérisée.

***Monilia penicillata** Arch. Nat. II, (1867). p. 42. doit être supprimé.

9. **Monilia Tabaci** Oud. N. K. A. 3, II, 904. — F. pourrissantes du *Nicotiana Tabacum* cultivé.

CYLINDRIUM.

1. **Cylindrium aureum** (Lk.) Bon. — Sacc. Syll. IV, 37. — Wint. Kr. Fl. VIII, 73. — Fusisporium aureum (Lk.) Fr. — Arch. Néerl. VIII (1873), 393 et N. K. A. 2, I, 181. — F. du *Nereum odoriferum*.

2. **Cylindrium clandestinum** (Cda) Sacc. Syll. IV, 37. — Wint. Kr. Fl. VIII, 71. — Fusidium cland. Cda. — Oud. Arch. Néerl. II (1867), 43 et VIII (1873), 390; id. N. K. A. 2, I, 181. — Pommes pourries.

POLYSCYTALUM.

1. **Polyscytalum murinum** Oud. Hedw. 1882, p. 166; id. Versl. en Meded. K. A. v. W. 2, XVIII. 377; id. N. K. A. 2, IV, 251. — Sacc. Syll. IV, 39. — Wint. Kr. Fl. VIII, 75. — Crottin de souris.

GEOTRICHUM.

1. **Geotrichum candidum** Lk. — Sacc. Syll. IV, 39. — Wint. Kr. Fl. VIII, 76. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 138. — Terre fertile aux lieux ombragés.

OIDIUM.

***Oidium aureum** Lk. — T. N. G. XII, 271; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 131. — Voir: *Monilia*.

1. **Oidium Balsamii** Mont. — N. K. A. 3, II, 300. — Sacc. Syll. IV, 46. — Wint. Kr. Fl. VIII, 86. — F. du *Brassica Napus*.

2. **Oidium Crataegi** Grogn. — N. K. A. 3, II, 301. — Wint. Kr. Fl. VIII, 82. — F. du *Crataegus monogyna*.

3. **Oidium erysiphoides** Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 134. — Oud. N. K. A. 3, I, 513. — O. leucoconium p. p. Arch. Néerl. II, (1867), 11. — Sacc. Syll. IV, [illegible] — Wint. Kr. Fl. VIII. 79. — F. de *Cucurbitacées*, du *Trifolium minus*, et autres.

4. **Oidium farinosum** Cooke. — N. K. A. 3, II, 302. — Sacc. Syll. X, 520. — Wint. Kr. Fl. VIII, 83. — F. du *Pirus Malus*.

***Oidium fructigenum** Kze. — T. N. G. XII, 274; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 134. — Voir: *Monilia*.

***Oidium fusisporioides** Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 134. — Voir: *Ramularia Lampsanae*.

5. **Oidium leucoconium** Desm. — Arch. Néerl. II (1867), p. 41 p. p.; id. N. K. A. 3, II, 303. — Sacc. Syll. IV, 41. — Wint. Kr. Fl. VIII, 82. — F. de plusieurs espèces et variétés de *Rosa*.

6. **Oidium monilioides** Lk. — T. N. G. XI, 403; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 134; N. K. A. 3, II, 303. — Sacc. Syll. IV, 46. — Wint. Kr. Fl. VIII, 78. — F. des *Secale cereale* et *Triticum repens*.

7. **Oidium monilioides** Lk. var. **ochraceum** Thüm. — Oud. N. K. A. 3, II, 303. — Sacc. Syll. IV, 46. — Wint. Kr. Fl. VIII, 79. — F. du *Secale cereale*.

***Oidium Tritici** (Cda.) Lib. — Oud. N. K. A. 3, II, 906. — Sacc et Vogl. in Sacc. Syll. IV, 46. — Voir: *O. monilioides*.

8. **Oidium Tuckeri** Berk. — Oud. Arch. Néerl. II (1867), p. 45. — Sacc. Syll. IV, 41. — Wint. Kr Fl. VIII, 84. — F. du *Vitis vinifera*.

9. **Oidium zymoticum** Beyer. — Dans l'écoulement blanc de nos arbres.

10. **Oidium Violae** Pass. — Oud. N. K. A. 2, V, 172. — Sacc. Syll. IV, 43. — Wint. Kr. Fl, VIII, 85. — F. du *Viola tricolor*.

b. Macronemeae.

RHOPALOMYCES.

Voir sous les Dématiées.

OEDOCEPHALUM.

1. **Oedocephalum beticola** Oud. N. K. A. 3, II, 905. — Wint. Kr. Fl. VIII, 96. — Racine du *Beta vulgaris* var. *Rapa* cultivé.

2. **Oedocephalum fimetarium** (Riess) Sacc. Syll. IV, 48. — Wint. Kr. Fl. VIII, 97. — Oud. N. K. A. 3, II, 761. — Crottin de cheval.

3. **Oedocephalum glomerulosum** (Bull.) Sacc. Syll. IV, 47. — Wint. Kr. Fl. VIII, 93. — Oud. N. K. A. 3, I, 513. — Calyces desséchés et noircis d'une espèce de *Dianthus*.

4. **Oedocephalum griseum** Oud. N. K. A. 3, II, 761. — Wint. Kr. Fl. VIII, 96. — F. en état de fermentation du *Tilia cordata*.

5. **Oedocephalum Nicotianae** Oud. N. K. A. 3, II, 906. — Wint. Kr. Fl. VIII, 96. — F. en état de putréfaction du *Nicotiana Tabacum*.

BOTRYOSPORIUM.

1. **Botryosporium diffusum** (Grev.) Cda. — Oud. Arch. Néerl. II (1867), 13. — Sacc. Syll. IV, 55. — Tiges pourries d'une espèce d'*Urtica*. — Wint. Kr. Fl. VIII, 114.

2. **Botryosporium pulchrum** Cda. — N. K. A. 3, I. 127 et 513. — Sacc. Syll. IV, 55. — Botrytis (Physmatotrichum) longibrachiata Oud. Versl. Med. K. A. v. W. 3, VII (1890), 318; id. N. K. A. 2, VI, 51. — Sacc. Syll. X, 735. — Wint. Kr. Fl. VIII, 115. — F. et tiges de plusieurs plantes herbacées, tant sauvages que cultivées en serre (*Curcuma rubricaulis*).

KICKXELLA.

***Kickxella alabastrina** Coemans. — N. K. A. 2, IV, 251. — Voir: *Coemansiella*.

COEMANSIELLA.

1. **Coemansiella alabastrina** (Coemans) Sacc. Syll. IV, 56. — Wint. Kr. Fl. VIII, 121. — Kickxella alabastrina Oud. in Versl. en Med. K. A. v. W. 2, XVIII (1883) p. 377 et N. K. A. 2, IV, 251. — Crottin de cheval.

CEPHALOSPORIUM.

1. **Cephalosporium Acremonium** Cda. — Oud. Arch. Néerl. 2, VII, 284 et N. K. A. 3, II, 900. — Sacc. Syll. IV, 56. — Wint. Kr. Fl. VIII, 103. — Produit d'une culture, sur gélatine préparée, de terre humeuse pulvérisée.

2. **Cephalosporium humicola** Oud. Arch. Néerl. 2, VII (1902), 285. — Wint. Kr. Fl. VIII, 108. — Produit, etc. (voir n° 2).

3. **Cephalosporium Koningi** Oud. Arch. Néerl. (1902), 285. — Wint. Kr. Fl. VIII, 108. — Produit, etc. (voir n° 2).

4. **Cephalosporium roseum** Oud. Versl. Med. K. A. v. W. 2, XVIII, 375; id. N. K. A. 2, IV, 249. — Sacc. Syll. IV, 58. — Wint. Kr. Fl. VIII, 108. — Sur une muraille blanchie humide.

TRICHODERMA.

***Trichoderma aeruginosum** Chev. — Prodr. Fl. Bat. II, 1, p. 17. — Écorce d'arbre putrescent. — Voir n° 1.

1. **Trichoderma dubium** Alb. Schw. — T. N. G. XI, 100; Prodr. Fl. Bat. II, p. 17. — Sacc. Syll. IV, 61. — Wint. Kr. Fl. VIII, 112. — Tronc d'un *Betula alba* carié.

2. **Trichoderma Koningi** Oud. Arch. Néerl. 2, VII (1902), 291; id. N. K. A. 3, II, 911. — Wint. Kr. Fl. VIII, 111. — Produit d'une culture, sur gélatine préparée, de terre humeuse pulvérisée.

3. **Trichoderma lignorum** (Tode) Harz. — Sacc. Syll. IV, 59. — Wint. Kr. Fl. VIII, 110. — Tr. viride P. — T. N. G. XI, 400; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 17; N. K. A. 3, I, 128. — Ram. pourrissants.

4. **Trichoderma violaceum** Oud. N. K. A. 3, III, 1123. — F. pourries du *Nicotiana Tabacum*.

***Trichoderma viride** T. — T. N. G. XI, 400; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 17. — *Tr. lignorum*.

ASPERGILLUS.

1. **Aspergillus calyptratus** Oud. Arch. Néerl. 2, VII, 283; id. N. K. A. 3, II, 899. — Wint. Kr. Fl. VIII, 139. — Morceau de bois de Chêne ramolli, enfoui dans la terre humeuse.

2. **Aspergillus candidus** Lk. — N. K. A. 1, I, 54; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 132; Oud. ibid. 3, II, 760. — Sacc. Syll. IV, 66. — Wint. Kr. Fl. VIII, 149. — Tiges de plusieurs herb. fânées, et f. tombées et humides du *Quercus rubra*.

3. **Aspergillus clavatus** Desm. — Oud. N. K. A. 2, IV, 246. — Sacc. Syll. IV, 67. — Wint. Kr. Fl. VIII, 130. — Crottin du *Camelus bactrianus*.

4. **Aspergillus dubius** Cda. — T. N. G. XII, 274; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 131. — Sacc. Syll. IV, 67. — Wint. Kr. Fl. VIII, 152. — Fromage vieilli.

5. **Aspergillus glaucus** (L.) Lk. — T. N. G. XI, 403; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 131. — Sacc. Syll. IV, 61. — Wint. Kr. Fl. VIII, 126. — Débris végétaux.

6. **Aspergillus griseus** Lk. — Oud. Arch. Néerl. VIII (1873), 389; id. N. K. A. 2, I, 179. — Sacc. Syll. IV, 65. — Wint. Kr. Fl. VIII, 135. — F. de l'*Aucuba japonica* pourrissantes.

7. **Aspergillus Koningi** Oud. Arch. Néerl. 2, VII, 284 et N. K. A. 3, II, 899. — Wint. Kr. Fl. VIII, 147. — Produit d'une culture, sur gélatine préparée, de terre humeuse pulvérisée.

8. **Aspergillus nanus** Oud. N. K. A. 3, III, 1121. — Wint. Kr. Fl. VIII, 150. — Morceau de papier parcheminé trempé de marmelade de framboises.

9. **Aspergillus virens** Lk. — N. K. A. 3, I, 127; Oud. ibid. p. 514 — Sacc. Syll. IV, 65. — Wint. Kr. Fl. VIII, 134. — Agaries pourrissants.

STERIGMATOCYSTIS.

1. **Sterigmatocystis candida** Sacc. Syll. IV, 72. — Oud. N. K. A. 2, IV, 246. — Crottin de chèvre.

2. **Sterigmatocystis dubia** (Berk. Br.) — Sacc. Syll. IV, 72. —

Oud. Versl. Med. K. A. v. W. 2, XVIII, 375 et N. K. A. 2, IV, 246. — Morceau de fromage gâté.

3. **Sterigmatocystis nigra** v. Tieghem. — Oud. Versl. en Med. K. A. v. W. 2, XVIII, 375 et N. K. A. 2, IV, 246 et 3, I, 514. — Sacc. Syll. IV, 75. — Écorce de citron pourrissante; caverne dans une noix de galle.

4. **Sterigmatocystis phaeocephala** (Durieu et Mont.) — Sacc. Syll. IV, 76. — Oud. Versl. en Med. K. A. v. W. 2, XVIII, 375 et N. K. A. 2, IV, 246. — Gélatine gâtée.

5. **Sterigmatocystis sulphurea** Fres. — Oud. N. K. A. 2, VI, 296. — Sacc. Syll. IV, 73. — Son gâté.

AMBLYOSPORIUM.

1. **Amblyosporium echinulatum** Oud. Beibl. z. bot. Centrbl. 1902; id. N. K. A. 3, II, 759; id. Arch. Néerl. 2, VII, 282. — Tiges pourrissantes du *Nicotiana Tabacum*.

PENICILLIUM.

1. **Penicillium bicolor** Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 132; N. K. A. 3, III, 1122. — Sacc. Syll. IV, 82. — Pommes et poires pourrissantes.

2. **Penicillium brevicaule** Sacc. Syll. IV, 84. — Oud. Versl. en Meded. K. A. v. W. 2, XVIII, 377, id. N. K. A. 2 VI, 249. — Wint. Kr. Fl. VIII, 169. — Papier pourrissant.

3. **Penicillium candidum** Lk. — N. K. A. 1, I, 54; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 132. — Sacc. Syll. IV, 79. — Wint. Kr. Fl. VIII, 164. — Débris végétaux.

Penicillium candidum β **Coremium** Fr. — N. K. A. 1, I, 54. — Voir: *Coremium candidum*.

4. **Penicillium desciscens** Oud. Arch. Néerl. 2, VII, 288; id. N. K. A. 3, II, 907. — Wint. Kr. Fl. VIII, 162. — Produit d'une culture, sur gélatine préparée, de terre humeuse pulvérisée.

5. **Penicillium geophilum** Oud. Arch. Néerl. 2, VII, 288; id. N. K. A. 3, II, 907. — Wint. Kr. Fl. VIII, 161. — Produit d'une culture, etc.; voir sous 1.

6. **Penicillium glaucum** Lk. — T. N. G. XI, 403; Prodr. Fl. Bat. II, 1, p. 132; Oud. Arch. Néerl. 2, VII, p. 289. — Sacc. Syll. IV, 78. — Wint. Kr. Fr. VIII, 155, sub: „P. crustaceum". — Débris végétaux et autres substances organiques en train de décomposition.

7. **Penicillium humicola** Oud. Arch. Néerl. 2, VII, 289; N. K. A. 3, II, 907. — Wint. Kr. Fl. VIII, 161. — Produit d'une culture, etc. (voir sous 4).

8. **Penicillium Hypomycetis** Sacc. Syll. IV, 80. — Wint. Kr. Fl. VIII, 164. — Oud. N. K. A. 2, VI, 51. — Écailles pourrissantes du tronc d'un *Cycas*.

9. **Penicillium pannosum** Oud. N. K. A. 2, VI, 145. — A la surface de vinaigre dilué, ayant servi à conserver de la viande cuite.

10. **Penicillium roseum** Lk. — Oud. N. K. A. 2, IV, 535. — Sacc. Syll. IV, 83. — Wint. Kr. Fl. VIII, 168. — Racines du *Daucus Carota* en train de décomposition.

11. **Penicillium silvaticum** Oud. Arch. Néerl. 2, VII, 289; id. N. K. A. 3, II, 908. — Wint. Kr. Fl. VIII, 167. — Produit d'une culture, etc. (voir sous 4).

***Penicillium verticillatum** Lk. — N. K. A. 1, I, 54. — Voir: *Spicaria*.

GLIOCLADIUM.

1. **Gliocladium Nicotianae** Oud. N. K. A. 3, II, 901; Wint. Kr. Fl. VIII, 176. — F. pourrissantes du *Nicotiana Tabacum*.

HAPLARIA.

1. **Haplaria grisea** Lk. — Oud. N. K. A. 3, I, 514; ibid. p. 127. — Sacc. Syll. IV, 85. — Tiges et feuilles sèches de Graminées (?)

ACLADIUM.

1. **Acladium pallidum** Harz. — Oud. N. K. A. 3, II, 898. — Sacc. Syll. IV, 87. — Feuilles et aiguilles tombées du *Fagus silvatica* et du *Pinus silvestris*.

HAPLARIOPSIS.

1. **Haplariopsis fagicola** Oud. N. K. A. 3, II, 902. — F. pourrissantes du *Fagus silvatica*.

HYPHODERMA.

1. **Hyphoderma roseum** (P.) Fr. — Sacc. Syll. IV, 89. — Hyphalia rosea Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 1, p. 16. — Bois de Peuplier ramolli.

SPOROTRICHUM.

1. **Sporotrichum aureum** Lk. — Prodr. Fl. Bat. II, 1, p. 137. — Sacc. Syll. IV, 103. — Écorce et bois pourris de l'*Alnus glutinosa*.

2. **Sporotrichum bombycinum** (C'de) Rab. — Oud. N. K. A. 3, II, 910. — Sacc. Syll. IV, 100. — Gélatine préparée pourrissante.

*Sporotrichum bryophilum P. — N. K. A. 1, 1, 55; Prodr. Fl. Bat. II, 4. p. 138. — Voir: *Botrytis*.

3. **Sporotrichum caesiellum** Fr. — Oud. N. K. A. 2, 1, 180; id. Arch. Néerl. VIII (1873), p. 390. — Sacc. Syll. IV, 110. — F. tombées de l'*Acer Pseudo-Platanus*.

4. **Sporotrichum candidum** Lk. — N. K. A. 1, 1, 55. — Prodr. Fl. Bat. II, 4. 137; Sacc. Syll. IV, 97. — Morceau de vessie de vache desséchée pourrissante, et souches d'arbre ramollies.

*Sporotrichum cinerec-virens Fr. — T. N. G. XI, 403; Prodr. Fl. Bat. II, 1, p. 138. — Voir: *Botrytis*.

*Sporotrichum collae Lk. — N. K. A. 1, 1, 55. — Voir: *Trichosporium*.

5. **Sporotrichum densum** Lk. — N. K. A. 3, II, 303. — Sacc. Syll. IV, 102. — Insecte desséché à la surface d'un *Anthurium*.

6. **Sporotrichum flavicans** Fr. — T. N. G. XI, 403; Prodr. Fl. Bat. II, 1, p. 137. — Sacc. Syll. IV, 103. — Rameaux tombés et bois vermoulu.

7. **Sporotrichum foliicola** Oud. Beibl. z. bot. Centr. Bl. 1902; id. N. K. A. 3, II, 764. — Feuilles tombées des *Quercus Robur* et *Fagus silvatica*.

8. **Sporotrichum fusco-album** Lk. — N. K. A. 1, 1, 55. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 138; Sacc. Syll. IV, 113. — Bois ramolli.

9. **Sporotrichum griseum** Lk. — Sacc. Syll. IV, 110. — Oud. in herbario. — Ram. décortiqués du *Quercus Robur*, tressés en corbeille pour la culture d'Orchidées dans la serre chaude. Échantillons à part, cultivés sur du papier brouillard au Laboratoire de Mr. le prof. Beijerinck à Delft.

10. **Sporotrichum Gunnerae** Oud. Hedw. 1891, p. 21; id. N. K. A. 2, VI, 296. — Sacc. Syll. XI, 596. — Résidu pourri d'un exemplaire de *Gunnera scabra* succombé.

11. **Sporotrichum Hellebori** Oud. Zitt. V. K. A. v. W. 1900, p. 384; id. N. K. A. 3, II, 303. — Sacc. Syll. XVI, 1031. — F. languissantes du *Helleborus foetidus*.

12. **Sporotrichum lactum** Lk. — Prodr. Fl. Bat. II, 1, p. 137. — Sacc. Syll. IV, 103. — Ram. secs entassés dans un endroit humide.

13. **Sporotrichum lanatum** Wallr. — Oud. N. K. A. 2, 1, 180; id. Arch. Neerl. VIII (1873), 390. — Sacc. Syll. IV, 102. — Morceau de parchemin pourri.

*Sporotrichum nitens P. — T. N. G. XII, 274. — Voir: Himantia.

14. **Sporotrichum olivaceum** Lk. Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 1, p. 138. — Sacc. Syll. IV, 112. — Bois et écorce pourris.

15. **Sporotrichum roseolum** Oud. et Beijr. — N. K. A. 3, II, 911. — Papier brouillard.

16. **Sporotrichum roseum** Lk. — Oud. N. K. A. 2, I, 262; Arch. Néerl. VIII (1873), 391. — Sacc. Syll. IV, 106. — Plumes d'oie pourrissantes.

17. **Sporotrichum sporulosum** (Nees) Lk. — Oud. N. K. A. 2, V, 519. — Sacc. Syll. IV, 109. — Écorce pourrissante.

18. **Sporotrichum tenue** (Cda) Rab. — Oud N. K. A. 2, V, 511. — Sacc. Syll. IV, 109. — Parties souterraines putrescentes d'une fougère.

19. **Sporotrichum virescens** (P.) Lk. — Oud. N. K. A. 2, IV, 536. — Sacc. Syll. IV, 111. — Sur la tannée dans les serres.

MONOSPORIUM.

1. **Monosporium flavum** Bon. — Oud. Arch. Néerl. II (1867), 43. — Sacc. Syll. IV, 115. — Tiges desséchées du *Convolvulus arvensis*.

2. **Monosporium Galanthi** Oud. Zitt. V. K. A. v. W. 21 April 1897, p. 460 et 1900 p. 384; id. Hedw. 1898, p. 181; id. N. K. A. 3, I, 514. — Sacc. Syll. XIV, 1051. — Bulbes pourris du *Galanthus nivalis*.

3. **Monosporium silvaticum** Oud. Arch. Néerl. 2, VII, 287; id. N. K. A. 3, II, 905. — Produit d'une culture, sur gélatine préparée, de terre humeuse pulverisée.

POLYACTIS.

***Polyactis fascicularis** Cda. — N. K. A. 2, IV, 249. — Voir: *Botrytis*.

***Polyactis cana** Cda. — N. K. A. 1, 1, 55. — Voir: *Botrytis*.

Polyactis vulgaris Lk. — N. K. A. 1, 1, 55. — Voir: *Botrytis*.

BOTRYTIS.

1. **Botrytis Bassiana** Balsamo. — N. K. A. 3, II, 303. — Sacc. Syll. IV, 119. — Chenille pourrissante.

2. **Botrytis bryophila** (P.) Sacc. Syll. IV, 122. — Sporotrichum bryophilum N. K. A. 1, 1, 54. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 138; Mousses croissant à la surface d'un tronc de *Salix*.

3. **Botrytis cana** Kze u. Schm. — Sacc. Syll. IV, 129. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 130; N. K. A. 3, I, 127. — Polyactis cana Bon. N. K. A. 1, 1, 55. — F. pourrissantes et autres débris végétaux.

1. **Botrytis cinerea** P. — Sacc. Syll. IV, 129. — T. N. G. XI, 403; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 130. — Débris végétaux pourrissants et surface du *Sclerotium durum*.

5. **Botrytis cinereo-virens** Kze u. Schm. — Sacc. Syll. IV, 126. — Sporotrichum cin.-vir. Fr. T. N. G. XI, 403; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 138. — Tiges pourrissantes d'Ombellifères robustes.

6. **Botrytis densa** Ditmar. Sacc. Syll. IV, 118. — Trichosporium densum Fr. — Arch. Néerl. II (1867), 43. — Tessons de poterie jetés au rebut.

7. **Botrytis Douglasii** Tubeuf. — Oud. N. K. A. 3, I, 518. — Sacc. Syll. X, 536. — Aiguilles du *Pseudotsuga* (Abies) *Douglasii*.

***Botrytis effusa** Desm. — T. N. G. XI, 403. — Voir: *Peronospora Radii*.

***Botrytis epigaea.** — Voir: *Phymatotrichum*.

Botrytis farinosa Fr. — T. N. G. XI, 403; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 130. — Voir: *Bremia Lactucae*.

8. **Botrytis fascicularis** (Cda) Sacc. Syll. IV, 133. — Polyactis fasciculatis Cda. — Oud. Versl. Med. K. A. v. W. 2, XVIII, 377 et N. K. A. 2, IV, 249. — Sacc. Syll. IV, 133. — Débris pourrissants de matières végétales.

9. **Botrytis galanthina** (B. Br.) Sacc. Syll. IV, 137. — Oud. Zitt. V. K. A. v. W. 1897, p. 455 et N. K. A. 3, I, 519. — Bulbes et parties vertes du *Galanthus nivalis*.

***Botrytis lanea.** — Voir: *Phymatotrichum*.

Botrytis longibrachiata Oud. N. K. A. 2, VI, 51. — Voir: *Botryosporium pulchrum*.

10. **Botrytis minutula** Schwein. — Oud. N. K. A. 3, I, 515. — Sacc. Syll. IV, 125. — Racines pourrissantes déterrées du *Syringa vulgaris*.

11. **Botrytis olivacea** (Cda) Sacc. Syll. IV, 131. — Oud. N. K. A. 3, II, 899. — F. du *Brassica oleracea* var. *capitata*.

***Botrytis Paeoniae** Oud. N. K. A. 3, I, 516. — Voir: *Phymatotrichum*.

12. **Botrytis parasitica** Cavara. — Sacc. Syll. X, 536. — Oud. N. K. A. 3, I, 515. — F. tiges et fleurs des Tulipes cultivées.

***Botrytis parasitica** P. — T. N. G. XI, 403; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 130. — Voir: *Peronospora parasitica*.

13. **Botrytis pilulifera** Sacc. Syll. IV, 118. — Oud. Versl. en Med. K. A. v. W. 2, XVIII, 377 et N. K. A. 2, IV, 218. — Crottin de souris.

14. **Botrytis tenella** Sacc. Syll. IV, 119 (sous 15). — Oud. N. K. A. 3, I, 520. — Larves desséchées du *Cossus ligniperda*.

*__Botrytis tenera__ P. — T. N. G. XI, 403. — Voir: *Cylindrophora.*

*__Botrytis violacea__ Lév. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 131. — Voir: *Peronospora Radii.*

15. __Botrytis vulgaris__ Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 130; N. K. A. 3, 1, 127; Oud. Arch. Néerl. 2, VII, 284. — Sacc. Syll. IV, 128. — Polyactis vulgaris Lk. N. K. A. 1, 1, 55. — Parties pourrissantes de plusieurs plantes: tiges du *Circaea lutetiana*; fruits pourrissants du *Pirus Malus* et du *Cucurbita Pepo.*

PACHYBASIUM.

(Voir: *Phymatotrichum*).

PHYMATOTRICHUM.

1. __Phymatotrichum baccarum__ Oud. Zitt. V. K. A. v. W. 1900, p. 386; id. N. K. A. 3, II, 349. — Sacc. Syll. XVI, 1033. — Au dedans des baies presque mûres du *Ribes Grossularia.*

2. __Phymatotrichum epigaeum__ (Lk.) Oud. — Botrytis epigaea Lk. — Sacc. Syll. IV, 136. — Oud. N. K. A. 2, IV, 248. — Sur la terre d'un jardin.

3. __Phymatotrichum hamatum__ (Bon.) Oud. N. K. A. 3, II, 908. — Pachybasium hamatum (Bon.) Sacc. Syll. IV, 149. — Aiguilles du *Pinus silvestris* tombées et rameaux tombés et pourrissants.

4. __Phymatotrichum laneum__ Bon. — Botrytis lanea (Bon.) Sacc. Syll. IV, 136. — Oud. N. K. A. 3, 1, 520. — F. et tiges pourrissantes du *Solanum tuberosum.*

5. __Phymatotrichum Paeoniae__ Oud. — Botrytis (Phymatotrichum) Paeoniae Oud. Zitt. V. K. A. v. W. 1897, p. 455; id. N. K. A. 3, 1, 518. — Botrytis Paeoniae Oud. Zitt. V. K. A. v. W. 1900, p. 384; id. Hedw. 1898, p. 182. — Sacc. Syll. XIV, 1052.

6. __Phymatotrichum pyramidale__ Oud. — Arch. Néerl. II (1867), 44. — Pachybasium pyramidale — N. K. A. 2, V, 511; ibid. 3, 1, 128. — Verticillium pyramidale Bon. — Sacc. — Syll. IV, 157. — Oud. N. K. A. 2, IV, 248; id. Vers. Med. K. A. v. W. 2, XVIII (1883), 377. — Différentes parties de plantes herbacées, en train de décomposition.

7. __Phymatotrichum Tilletii__ (Desm.) Oud. — Pachybasium Tilletii Oud. N. K. A. 2, IV, 536. — Botrytis Till., Sacc. Syll. IV, 128. — Mousses du genre *Hypnum.*

CYLINDROPHORA.

1. **Cylindrophora Fagi** Oud. N. K. A. 3, II, 900. — F. du *Fagus silvatica*.

2. **Cylindrophora tenera** Bon. — Sacc. Syll. IV, 138. — Botrytis tenera P. — T. N. G. XI, 403. — Bois ramolli.

OVULARIA.

1. **Ovularia Bistortae** (Fuck.) Sacc. Syll. IV, 145. — Oud. N. K. A. 3, II, 906. — F. du *Polygonum Bistorta*.

2. **Ovularia Buxi** Oud. N. K. A. 2, V, 173. — F. du *Buxus sempervirens*.

3. **Ovularia decipiens** Sacc. Syll. IV, 139. — Oud. N. K. A. 3, I, 523. — F. du *Ranunculus repens*.

4. **Ovularia farinosa** (Bon.) Sacc. Syll. IV, 142. — Hormodendron farinaceum Rab. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 135. — F. du *Symphytum officinale*.

5. **Ovularia obliqua** (Cooke) Oud. Hedw. 1883, p. 85. — Sacc. Syll. IV, 145. — Ramularia obovata Fuck. — Oud. Arch. Néerl. VIII (1873), 391; id. N. K. A. 2, I, 262. — F. du *Rumex obtusifolius*.

6. **Ovularia oxalidis** Oud. Hedw. 1894, p. 21. — Sacc. Syll. XI, 598. — F. de l'*Oxalis tropaeoloides*.

7. **Ovularia Pini** Oud. N. K. A. 3, II, 762. — Aiguilles du *Pinus silvestris*.

8. **Ovularia Ranunculi** Oud. Hedw. 1898, p. 182; id. N. K. A. 3, I, 521; id. Zitt. V. K. A. v. W. 1900, p. 281. — Sacc. Syll. XVI, 1034. — F. du *Ranunculus acer*.

9. **Ovularia sphaeroidea** Sacc. Syll. IV, 140. — N. K. A. 3, II, 304. — F. du *Lotus corniculatus*.

SEPEDONIUM.

1. **Sepedonium chrysospermum** (Bull.) Fr. — T. N. G. XI, 403 — Sacc. Syll. IV, 146. — Sep. mycophilum Lk. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, 138. — Espèces de *Boletus* et autres champignons charnus.

PACHYBASIUM.

(Voir: *Phymatotrichum*.)

HYPHELIA.

*__Hyphelia terrestris__ Fr. — T. N. G. XI, 400. — Voir: *Verticillium*.

VERTICILLIUM.

1. __Verticillium agaricinum__ (Lk.) Cda. — Oud. N. K. A. 3, II, 765. — Sacc. Syll. IV, 153. — Chapeau d'un *Pleurotus subpalmatus*.

2. __Verticillium Buxi__ Auersw. et Fleischak. — N. K. A. 2, IV, 539 et 3, 1, 521; ibid. 3, 1, 128. — Sacc. Syll. IV, 155. — F. du *Buxus sempervirens*.

3. __Verticillium candidulum__ var. __Solani__ Sacc. Syll. IV, 150. — Oud. N. K. A. 3, 1, 521. — Penic. verticillatum Lk. — N. K. A. 1, 1, 54. — Tubercules pourris du *Solanum tuberosum*.

4. __Verticillium capitatum__ Ehrenb. — Oud. N. K. A. 3, II, 766. — Sacc. Syll. IV, 152. — Exemplaire du *Hydnum Schiedermayeri* pourrissant.

5. __Verticillium Croci__ Oud. N. K. A. 2, IV, 538. — Sacc. Syll. X, 546. — Tubercules du *Crocus vernus*.

6. __Verticillium fimeti__ Oud. N. K. A. 2, IV, 249. — Sacc. Syll. X, 545. — Crottin de lapin.

7. __Verticillium Lactarii__ Peck. — N. K. A. 3, II, 304. — Sacc. Syll. IV, 153. — *Lactarius rufus* pourrissant.

8. __Verticillium lateritium__ (Berk.) Cooke. — N. K. A. 3, II, 304. — Sacc. Syll. IV, 156. — Plusieurs plantes pourrissantes.

9. __Verticillium nanum__ B. Br. — N. K. A. 3, II, 305. — Sacc. Syll. IV, 152. — Pommes de terre pourries.

*__Verticillium ochroleucum__ Desm. — N. K. A. 2, IV, 249. — Voir: *V. ochro-rubrum*.

10. __Verticillium ochro-rubrum__ Desm. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, 129. — Sacc. Syll. IV, 156. — Vert. ochroleucum Oud. N. K. A. 2, IV, 249. — Bois ramolli.

11. __Verticillium tenerum__ (P.) Nees. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 129. — Sacc. Syll. IV, 158. — Botrytis tenera P. — T. N. G. XI, 403. — Bois ramolli.

12. __Verticillium terrestre__ (P.) Sacc. Syll. IV, 152. — Hyphelia terrestris P. — T. N. G. XI, 400; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 16. — Sur la terre humide.

13. __Verticillium tuberculariodes__ Speg. — Oud. N. K. A. 2. VI, 54. — Sacc. Syll. IV, 155. — F. du *Lycopodium Selago*.

ACROCYLINDRIUM.

1. **Acrocylindrium granulosum** Bon. — Oud. Arch. Néerl. VIII (1873), 392; id. N. K. A. 2, I, 180. — Sacc. Syll. IV, 161. — Pommes de terre pourries.

ACROSTALAGMUS

1. **Acrostalagmus albus** Preuss. — Oud. N. K. A. 2, VI, 54. — Sacc. Syll. IV, 163. — Echantillons pourris d'un *Aechyranthes*.

2. **Acrostalagmus aphidum** Oud. Beibl. z. bot. Centr.bl. 1902; id. N. K. A. 3, II, 759. — Squelettes accumulées d'une Aphidée, à la surface des f. languissantes d'un *Aristolochia gigas* cultivé.

3. **Acrostalagmus cinnabarinus** Cda. — N. K. A. 1, I, 55; Prodr. Fl. Bat. II, 1, p. 129. — Sacc. Syll. IV, 163. — Pommes de terre pourries, tiges fanées, bois ramolli, etc.

var. **nana** Oud. — Arch. Néerl. 2, VII, 282. — Produit d'une culture, sur gélatine préparée, de terre humeuse pulvérisée.

CLONOSTACHYS.

1. **Clonostachys Araucaria** Cda. — Oud. N. K. A. 2, II, 184. — Sacc. Syll. IV, 165. — Pommes de terre pourries.

2. **Clonostachys Gneti** Oud. — Versl. Med. K. A. v. W. 3, VII (1890), 321; id. N. K. A. 2, VI, 54. — Sacc. Syll. X, 548. — F. du *Gnetum Gnomon* cultivé.

3. **Clonostachys Populi** Harz. Hyphom. 29. — Sacc. Syll. IV, 165. — Oud. N. K. A. 3, III, 1124. — Écorce pourrissante de l'*Aesculus Hippocastanum*.

4. **Clonostachys spectabilis** (Harz.) Oud. et Sacc. N. K. A. 2, IV, 539. — Tannée dans les serres chaudes.

SPICARIA.

1. **Spicaria decumbens** Oud. — Arch. Néerl. 2, VII, 290; id. N. K. A. 3, II, 909. — Produit d'une culture, sur gélatine préparée, de terre humeuse préparée.

2. **Spicaria elegans** (Cda.) Harz. — Oud. Arch. Néerl. 2, VII, 290; id. N. K. A. 3, II, 909. — Sacc. Syll. IV, 166. — Morceau de bois ramolli, enfouie dans la terre humeuse.

3. **Spicaria silvatica** Oud. Arch. Néerl. 2, VII, 291; id. N. K. A. 2, II, 910. — Produit, etc.; voir sous 1.

4. **Spicaria simplicissima** Oud. N. K. A. 3, II, 763. — Produit, etc.; voir sous 1.

5. **Spicaria Smithii** Oud. — Beibl. z. bot. Centr.bl. 1902; id. N. K. A. 3, II, 763. — F. pourrissantes du *Nicotiana Tabacum*.

6. **Spicaria verticillata** (Cda.) Harz. — Sacc. Syll. IV, 167. — Penicillium verticillatum Cda. — N. K. A. 1, I, 54. — Pommes de terre pourries.

GONATOBOTRYS.

1. **Gonatobotrys ramosa** Riess. — Oud. Arch. Néerl. VIII (1873), 391; id. N. K. A. 2, I, 180. — Sacc. Syll. IV, 169. — Bois mort du *Tecoma radicans*.

2. **Gonatobotrys simplex** Cda. — Oud. Arch. Néerl. II (1867), 43. — Sacc. Syll. IV, 169. — Tiges fanées de l'*Asparagus officinalis*.

NEMATOGONIUM.

1. **Nematogonium aurantiacum** Desm. — Oud. N. K. A. 2, IV, 248 et 2, V, 173. — Sacc. Syll. IV, 170. — Écorce de Boulean (*Betula alba*) pourrie.

2. **Nematogonium humicola** Oud. Arch. Néerl. 2, VII, 288; N. K. A. 3, II, 905. — Produit d'une culture, sur gélatine préparée, de terre humense pulvérisée.

***Nematogonium simplex** Bon. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 131. — Voir: *Sporodinia Aspergillus*.

2. Hyalodidymae.

a. Micronemeae.

HORMIACTIS.

1. **Hormiactis hemisphaerica** Oud. Hedw. 1898, p. 182; N. K. A. 3, I, 521; Zitt. Versl. K. A. v. W. 1900, p. 385. — Sacc. Syll. XVI, 1040. — Anthères ramollies de l'*Iris Pseudacorus*.

b. Macronemeae.

DIDYMOSPORIUM.

***Didymosporium pyriforme** Rab. — N. K. A. 2, I, 262; 2, II, 41. — Voir: *Marsonia*.

TRICHOTHECIUM.

1. **Trichothecium obovatum** (Berk.) Sacc. Syll. IV, 179. — N. K. A. 3, II, 765. — Ram. pourrissants de l'*Aucuba japonica*.

2. **Trichothecium roseum** (P.) Lk. — T. N. G. XI, 403· Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 136; N. K. A. 2, I, 94; 3, I, 128; Oud. Herb. N. Pl. n° 580. — Sacc. Syll. IV. 178. — Toutes sortes de débris végétaux, surtout les écorces d'arbres ramollies.

BOSTRICHONEMA.

1. **Bostrichonema ochraceum** (Fuck.) Sacc. Syll. IV, 186. — N. K. A. 2, V. 595; Scolecotrichum ochraceum Fuck. — Oud. Arch. Néerl. VIII (1873), 391; N. K. A. 2, I, 180. — F. du *Phyteuma nigrum*.

DIDYMARIA.

1. **Didymaria Asteris** Oud. N. K. A. 3, II, 901. — F. d'une espèce d'*Aster* cultivée.

2. **Didymaria Ungeri** Cda. — N. K. A. 2, VI, 297. — Sacc. Syll. IV. 184. — Ramularia didyma Ung. — Arch. Néerl. VIII (1873), 391; id. N. K. A. 2, I, 180. — F. des *Ranunculus acer* et *Melandrium rubrum*.

MYCOGONE.

1. **Myeogone puccinioides** Preuss. Sacc. Syll. IV, 184. — Oud. N. K. A. 3, III. 1122. — Papier bronillard.

DIPLOCLADIUM.

1. **Diplocladium majus** Bon. — N. K. A. 3, II, 760. — Sacc. Syll. IV. 177. — Dactylium mycophilum Oud. Arch. Néerl. II, 42. — Feuillets de l'*Agaricus carptus*.

2. **Diplocladium penicilloides** Sacc. Syll. IV. 177. — Dactylium dendroides Fr. — T. N. G. XII, 274; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 131. — Feuillets du *Lactarius trivialis*. Dactylium mycophilum Arch. Néerl. II. 42.

***Arthrobotrys oligospora** Fres. — N. K. A. 2, IV. 250. — Voir: *A. superba*.

ARTHROBOTRYS.

***Arthrobotrys oligospora** Fres. — N. K. A. 2, IV, 250. — Voir: *A. superba*.

1. **Arthrobotrys superba** Cda var. oligospora (Fres.) Cocm. — Sacc. Syll. IV, 181. — Oud. Arch. Néerl. 2, VII, 283. — Arthr. oligospora Fres. — Oud. N. K. A. 2, IV, 250. — Produit d'une culture, sur gélatine préparée, de terre humeuse pulvérisée; puis, sur le crottin de chèvre.

Hyalophragmiae.

a. Micronemeae.

FUSOMA.

1. **Fusoma Galanthi** Oud. Zitt. Versl. K. A. v. W. 21 Apr. 1897, p. 460 et 1900, p. 385; Hedw. 1898, p. 183; N. K. A. 3, I, 522. — Sacc. Syll. XIV, 1065. — Tissu des bulbes ramollis du *Galanthus nivalis*.

2. **Fusoma Heraclei** Oud. Zitt. Versl. K. A. v. W. 1900, p. 385; id. N. K. A. 3, II, 306. — Sacc. Syll. XVI, 1048. — F. du *Heracleum Sphondylium*.

SEPTOCYLINDRIUM.

1. **Septocylindrium Morchellae** Oud. Hedw. 1898, p. 183; id. N. K. A. 3, I, 522; id. Zitt. Versl. K. A. v. W. 1900, p. 385. — Sacc. Syll. XVI, 1049. — Exemplaire de *Morchella esculenta* pourrissant.

2. **Septocylindrium Secalis** Oud. Zitt. Versl. K. A. v. W. 1900, p. 385; id. N. K. A. v. W. 3, II, 306. — Sacc. Syll. XVI, 1049. — F. du *Secale cereale*.

DACTYLARIA.

1. **Dactylaria candida** (Nees) Sacc. Syll. IV, 195. — Dactylium candidum Nees. — Oud. N. K. A. 2, IV, 249. — Crottin de chèvre.

MONACROSPORIUM.

1. **Monacrosporium elegans** Oud. N. K. A. 2, IV, 250. — Sacc. Syll. IV, 193. — Crottin de lapin.

2. **Monacrosporium subtile** Oud. N. K. A. 2, IV, 251. — Sacc. Syll. IV, 193. — Surface des périthèces de *Sordaria minuta*, venu sur le crottin de lapin.

CYLINDROSPORIUM.

*__Cylindrosporium concentricum__ Grev. — Arch. Néerl. VIII, 392; N. K. A. 2, I, 93 et 180; Oud. Fgi Neerl. exs. n° 300. — Oidium fusisporioides Oud. — Voir: *Ramularia cylindroides* (Lamium album) et *calcea* (Glechoma).

*__Cylindrosporium majus__ Ung. — Arch. Néerl. VIII. 392. — N. K. A. 2, I, 93 et 180. — Oidium fusisporioides Oud. — Voir: *Ramularia Lampsanae.*

*__Cylindrosporium Grevillianum__ Tul. — N. K. A. 2, I, 315. — Voir: *Ramularia Tulasnei.*

*__Cylindrosporium Heraclei__ Oud. — Arch. Néerl. VIII, 392; N. K. A. 2, I, 316. — Voir: *Ramularia.*

RAMULARIA.

1. __Ramularia Adoxae__ Karst. — N. K. A. 3, I, 128; Oud. ibid. p. 522. — Sacc. Syll. IV, 206. — F. de l'*Adoxa Moschatellina.*

2. __Ramularia agrestis__ Sacc. Syll. IV, 202. — N. K. A. 3, II, 305. — F. du *Viola tricolor.*

3. __Ramularia Ajugae__ (Niessl) Sacc. Syll. IV, 212. — Oud. N. K. A. 2, VI, 56 et 3, I, 523; ibid. 3, I, 129. — F. de l'*Ajuga reptans.*

4. __Ramularia Anchusae__ Massal. — N. K. A. 3, II, 505. — Sacc. Syll. XI, 604. — F. de l'*Anchusa officinalis.*

5. __Ramularia Armoraciae__ Fuck. — N. K. A. 2, II, 103. — Sacc. Syll. IV, 201. — F. du *Cochlearia Armoracia.*

6. __Ramularia calcea__ (Desm.) Ces. — N. K. A. 3, II, 306. — Sacc. Syll. IV, 212. — Cylindrosporium concentricum Oud. Fgi. Neerl. exs. n°. 300. — F. du *Glechoma hederacea.*

7. __Ramularia cylindroides__ Sacc. Syll. IV, 206. — Cylindrosporium concentricum Ung. — Arch. Néerl. VIII (1873), 392; N. K. A. 2, I, 93 et 180. — Oidium fusisporioides Oud. Herb. N. Pl. n° 158. — F. du *Lamium album.*

8. __Ramularia destructiva__ Phill. et Plowr. — Versl. Med. K. A. v. W. 2, XVIII, 377; id. N. K. A. 2, IV, 251. — Sacc. Syll. IV, 198. — F. du *Myrica Gale*

__Ramularia didyma__ Ung. — Arch. Néerl. VIII, 391; N. K. A. 2, I, 180. — Voir: *Didymaria Ungeri.*

*__Ramularia Violae__ Fuck. — Arch. Néerl. VIII, 391. — Voir: *R. lactea.*

9. __Ramularia farinosa__ (Bon.) Sacc. Syll. IV, 206. — Oud. N. K. A. 3, I, 523, ibid. p. 128. — F. du *Symphytum officinale.*

10. **Ramularia Geranii** (West.) Fuck. — N. K. A. 2, V, 511; ibid. 3, I, 128. — Sacc. Syll. IV, 204.

11. **Ramularia Hellebori** Fuck. — N. K. A. 2, VI, 56. — Sacc. Syll. IV, 200. — F. du *Helleborus foetidus*.

12. **Ramularia Heraclei** (Oud.) Sacc. Syll. IV, 206. — Cylindrosporium Heraclei Oud. Arch. Néerl. VIII (1873), 392; id. N. K. A. 2, I, 316. — F. de l'*Heracleum Sphondylium*.

13. **Ramularia lactea** (Desm.) Sacc. Syll. IV, 201. — N. K. A. 3, I, 522; ibid. p. 129. — Ram. Violae Fuck. — Oud. Arch. Néerl. VIII (1873), 391; N. K. A. 2, I, 93 et 180. — Oud. Herb. N. Pl. n° 191 (sous le nom fautif d'Oidium fusisporioides). — F. du *Viola odorata*.

14. **Ramularia Lampsanae** (Desm.) Sacc. Syll. IV, 207. — Cylindrosporium Cordae Sacc. — Oud. Fgi Neerl. exs. n° 200; Cyl. majus Oud. Arch. Néerl. VIII (1873), 392; id. N. K. A. 2, I, 180. — Botrytis farinosa Fr. p. p. T. N. G. XI, 103; Oidium fusisporioides a Lapsanae Fl. Bat. II, 1, p. 134 et Oud. Herb. N. Pl. n° 134. — F. du *Lampsana communis*.

15. **Ramularia Levistici** Oud. N. K. A. 2, IV, 540. — Sacc. Syll. X, 555. — F. du *Levisticum officinale*.

16. **Ramularia Lysimachiae** Thüm. — Oud. N. K. A. 3, II, 762. — Sacc. Syll. IV, 213. — F. du *Lysimachia thyrsiflora*.

***Ramularia obovata** Fuck. — Arch. Néerl. VIII, 391; N. K. A. 2, I, 262. — Voir: *Ovularia obliqua*.

17. **Ramularia plantaginea** Sacc. et Berl. dans Sacc. Syll. IV, 214. — Oud. N. K. A. 2, V, 173. — F. du *Plantago lanceolata*.

18. **Ramularia Plantaginis** Ellis et Mart. — N. K. A. 3, I, 129; Oud. ibid. p. 523. — F. du *Plantago major*.

19. **Ramularia Primulae** Thüm. — Oud. N. K. A. 2, IV, 251. — Sacc. Syll. IV, 214. — F. du *Primula acaulis*.

20. **Ramularia Prismatocarpi** Oud. N. K. A. 2, III, 155. — Sacc. Syll. IV, 211. — F. du *Prismatocarpus Speculum*.

21. **Ramularia Repentis** Oud. Beibl. z. bot. Centrbl. 1902; id. N. K. A. 3, II, 763. — F. du *Ranunculus repens*.

22. **Ramularia sambucina** Sacc. Syll. IV, 197. — Oud. N. K. A. 2, VI, 56; ibid. 3, I, 128.

23. **Ramularia Tulasnei** Sacc. Syll. IV, 203. — Cylindrosporium Grevilleanum Tul. — Arch. Néerl. VIII (1873), 392; id. N. K. A. 2, I, 315. — F. des *Fragaria* cultivés.

24. **Ramularia tumescens** (Fuck.) Sacc. Syll. IV, 214. N. K. A. 3, II, 306. — Ram. et axes de l'inflorescence du *Vaccinium Vitis idaea*.

25. **Ramularia Ulmariae** Cooke. — N. K. A. 2, V, 511; ibid. 3, I, 128. — Sacc. Syll. IV, 204. — F. du *Filipendula Ulmaria*.

26. **Ramularia Urticae** Ces. — N. K. A. 3, I, 523; ibid. p. 129; Oud. Fgi Neerl. exs. n° 88. — Sacc. Syll. IV, 216. — F. de l'*Urtica dioica*.

27. **Ramularia Valerianae** (Speg.) Sacc. Syll. IV, 207. — N. K. A. 3, I, 523; ibid. p. 128.

28. **Ramularia variabilis** Fuck. — Oud. Fgi Neerl. exs. n° 299. — F. du *Verbascum thapsiforme*.

***Ramularia Violae** Fuck. — N. K. A. 2, I, 180. — Voir: *Ram. lactea*.

DACTYLIUM.

1. **Dactylium mycophylium** Oud. — Arch. Néerl. II, 42. — Voir: *Diplocladium*.

***Dactylium candidum** Nees. — N. K. A, 2, I, 219. — Voir: *Dactylaria*.

***Dactylium dendroides** Fr. — T. N. G. XII, 274; Prodr. Fl. Bat. II, 4, 131. — Voir: *Diplocladium penicilloides*.

CERCOSPORELLA.

1. **Cercosporella Virgaureae** Allescher, Hedw. 1895, p. 286. — Cercospora Virg. Oud. N. K. A. 3, II, 315. — Septoria Virg. N. K. A. 2, II, 100; 3, II, 277. — F. du *Solidago Virga aurea*.

I. Staurosporae.

PRISMARIA.

1. **Prismaria subtilissima** Oud. — N. K. A. 3, II, 762. — F. pourrissantes du *Tilia cordata*.

TRINACRIUM.

1. **Trinacrium subtile** Fres. — Oud. Hedw. XXXVII (1898) p. 319; id. N. K. A. 3, II, 912. — Sacc. Syll. IV. 231. — Tronc du *Fagus silvatica*. Faisant partie d'une bande verte descendante, formée principalement des cellules vivantes d'un *Protococcus*.

TITAEA.

1. **Titaea callispora** Sacc. Syll. IV, 231. — Oud. Hedw. XXXVII

(1898), p. 319. — Oud. N. K. A. 3, II, 911. — F. du *Triticum sativum*.

2. **Titaea maxilliformis** Rostrup. — Oud. N. K. A. 3, II, 764. — Sacc. Syll. XI, 608. — F. du *Stratiotes aloides*.

†[59] Dematiaceae.

1. Hyalosporae.

CHLORIDIUM.

1. **Chloridium Festucae** Cda. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 138.

2. Phaeosporae.

a. Micronemeae.

GYMNOSPORIUM.

(Voir: *Chromosporium*).

CONIOSPORIUM.

1. **Coniosporium Arundinis** (Cda) Sacc. Syll. IV, 243. — Oud. N. K. A. 2, V, 511; ibid. 3, I, 129. — Tiges du *Phragmites communis*.

2. **Coniosporium Asparagi** Oud. — N. K. A. 3, I, 129 et 523. — Tiges pourrissantes de l'*Asparagus officinalis*.

3. **Coniosporium Bambusae** (Thüm. et Bolle) Sacc. Syll. IV, 244. — Oud. N. K. A. 3, II, 769. — Tige d'une espèce de Bambusa.

4. **Coniosporium Buxi** West. Prodr. Fl Bat. II, 4, p. 170. — Sacc. Syll. IV, 241. — Ram. du *Buxus sempervirens*.

*Coniosporium circinans** Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 38. — Voir: *Pirostoma*.

5. **Coniosporium Dasylirii** Oud. Hedw. 1894, p. 21; id. N. K. A. 2, VI, 297. — Sacc. Syll. XI, 610. — F. du *Dasylirion acrotrichum* cultivé.

6. **Coniosporium incertum** Karst. — N. K. A. 3, II, 307. — Sacc. Syll. X, 570. — Ram. du *Robinia Pseudo-Acacia*.

7. **Coniosporium Piri** Oud. N. K. A. 3, II, 913. — F. du *Pirus communis*.

8. **Coniosporium rhizophilum** (Pr.) Sacc. Syll. IV, 244. — Torula rhizophila Cda. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 136. — Racines déterrées de Graminées.

9. **Coniosporium socium** Sacc. et Roum. Syll. IV, 242. — N. K. A. 2, VI, 56; ibid. 3. I, 129. — F. du *Carlina vulgaris*.

10. **Coniosporium Vuillemini** Oud. N. K. A. 3, II, 769. — F. du *Quercus rubra*.

ECHINOBOTRYUM.

1. **Echinobotryum atrum** Cda. — N. K. A. 2, IV, 243. — Sacc. Syll. IV, 268. — Pédicelles du *Stysanus Stemonites*, venu sur le crottin de chèvre.

TORULA.

1. **Torula chartarum** (Lk.) Cda. — Prodr. Fl. Bat. 4, p. 135. — Papier brouillard gris, p. ou m. humide.

2. **Torula dimidiata** Penzig. — N. K. A. 3, II, 773. — Sacc. Syll. IV, 248. — Ram. tombés de l'*Aesc. Hippocastanum*.

3. **Torula expansa** (Kze) Sacc. Syll. IV, 256. — Oud. Arch. Néerl. VIII (1873), 373; id. N. K. A. 2, I, 172. — A l'intérieur d'une tige de *Malva*.

4. **Torula graminicola** Cda. — Prodr. Fl. Bat. II. 4, p. 135. — Sacc. Syll. IV, 259. — Tiges fraîches du *Holcus lanatus*.

5. **Torula herbarum** Lk. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 135; N. K. A. 3, I, 130. — Sacc. Syll. IV, 256. — Tiges pourrissantes de diverses plantes.

6. **Torula lucifuga** Oud. Arch. Néerl. 2, VII, 294; id. N. K. A. 3, II, 916. — Produit d'une culture, sur gélatine préparée, de terre humeuse pulvérisée.

7. **Torula murorum** Cda. — Oud. Versl. Meded. K. A. v. W. 2, XVIII, 373; id. N. K. A. 2, IV, 238. — Sacc. Syll. IV, 261. — Murs platrés humides.

***Torula laxa** Rabh. — Arch. Néerl. VIII, 373. — Voir: *Hormiscium*

***Torula ovalispora** Berk. — N. K. A. 2, I, 172; Arch. Néerl. VIII, 374. — Voir: *O. oospora*.

8. **Torula Periclymeni** Oud. N. K. A. 3, I, 523. — Ram. du *Lonicera Periclymenum*.

Torula pinophila Chev. — Prodr. Fl. Bat. II. 4, p. 135. — Voir: *Hormiscium pityophilum*.

Torula populina Peck — Sacc. Syll. IV, 255. — Oud. N. K. A. 3, III, 1127. — F. du *Populus balsamifera*.

9. **Torula pulveracea** Cda. — Oud. Arch. Néerl. VIII (1873), 374; id. N. K. A. 2, I, 172. — Sacc. Syll. IV, 254. — Bois ramolli de l'*Alnus glutinosa* et de *Fraxinus excelsior*.

***Torula rhizophila** Cda. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 136. — Voir: *Coniosporium*.

10. **Torula Rhododendri** Kze. — Oud. N. K. A. 3, 112s. — Sacc. Syll. IV, 254. — F. du *Rhododendron ferrugineum* cultivé.

11. **Torula Sacchari lactis** Oud. Hedw. 1894, p. 21; N. K. A. 2, VI, 297. — Sacc. Syll. XI, 611. — Cristaux de sucre de lait.

***Torula Stilbospora** Cda. — N. K. A. 1, V, 351; Arch. Néerl. VIII (1873), 374. — Voir: *Hormiscium*.

12. **Torula tenera** Lk. — N. K. A. 1, I, 55. — Sacc. Syll. IV, 256.

HORMISCIUM.

1. **Hormiscium Arbuscula** (Cda) Sacc. Syll. IV, 266. — Oud. N. K. A. 2, V, 512; ibid. 3, I, 129. — Bois de Pin ramolli.

2. **Hormiscium caulicola** (Rab.) Oud. — H. caulicolum Rab. — N. K. A. 3, I, 129 et 239; Oud. ibid. p. 524. — Sacc. Syll. IV, 266. — Tige d'un *Hypericum*.

3. **Hormiscium laxum** Wallr. — Sacc. Syll. IV, 266. — Torula laxa Rab. — Oud. Arch. Néerl. VIII (1873), 373; id. N. K. A. 2, I, 172.

4. **Hormiscium pityophilum** (Wallr.) Sacc. Syll. IV, 265. — N. K. A. 3, I, 129. — Torula pinophila Chev. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, 135; Antennaria pinophila Wallr. — T. N. G. XI, 400; Oud. Arch. Néerl. VIII (1873), 393. — Rameaux du *Picea excelsa*.

5. **Hormiscium stilbosporum** (Cda) Sacc. Syll. IV, 264. — Torula Stilbospora Cda. — N. K. A. 1, V, 352; — Arch. Néerl. VIII (1873), 374. — Ram. d'une espèce de *Populus*.

b. Macronemeae.

CAMPTOUM.

1. **Camptoum curvatum** (Kze.) Lk. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 129. — Sacc. Syll. IV, 276. — F. d'une espèce de *Carex*.

RHOPALOMYCES.

1. **Rhopalomyces elegans** Cda. — N. K. A. 3, II, 308. — Sacc. Syll. IV, 50. — Débris d'origine végétale (branche pourrie; pomme de terre pourrie).

PERICONIA.

1. **Periconia atra** Cda. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 123. — Sacc. Syll. IV, 271. — Tiges désséchées du *Paeonia officinalis*.

2. **Periconia bulbipes** Cda. — Oud. Arch. Néerl. II (1867), 40. — Sacc. Syll. IV, 273. — Gaînes desséchées des f. du *Grammatophyllum speciosum* cultivé.

3. **Periconia nigriceps** (Peck) Sacc. Syll. IV, 274. — Oud. N. K. A. 2, VI, 57. — Tiges du *Juncus diffusus*.

STACHYOBOTRYS.

1. **Stachyobotrys alternans** Bon. — Oud. N. K. A. 2, IV, 541. — Sacc. Syll. IV, 269.

2. **Stachyobotrys lobulata** Berk. — Oud. N. K. A. 3, II, 915. — Sacc. Syll. IV, 269. — F. pourrissantes du *Nicotiana Tabacum*.

*SPORODUM.

***Sporodum Solani** Oud. — Arch. Neerl. II, 41. — Voir: *Hormodendron*.

HORMODENDRUM.

***Hormodendrum farinaceum** Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 135. — Voir: *Ocularia*.

1. **Hormodendrum pallidum** Oud. Arch. Néerl. 2, VII, 293; id. N. K. A. 3, II, 914. — Produit d'une culture, sur gélatine préparée, de terre humeuse pulvérisée.

2. **Hormodendrum Solani** (Oud.) Sacc. Syll. IV, 310. — Sporodum Solani Oud. Arch. Néerl. II (1867), p. 41. — Tiges fanées du *Solanum tuberosum*.

GONIOSPORIUM.

1. **Goniosporium puccinioides** (Kze.) Lk. — Oud. Arch. Néerl. VII (1873), 388. — Sacc. Syll. IV, 280. — Arthrinium puccinioides Kze. — N. K. A. 1, V, 351. — F. du *Carex hirta*.

ARTHRINIUM.

1. **Arthrinium caricicola** Kze. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 129. — Sacc. Syll. IV, 279. — F. du *Carex riparia*.

*__Arthrinium puccinioides__ Kze. — N. K. A. 1, V, 351. — Voir: *Goniosporium*.

2. __Arthrinium sporophlaeum__ Kze. — Oud. N. K. A. 2, II, 184; id. 3, III, 1124; ibid. 3, I. 129. — F. du *Carex riparia* et du *Typha latifolia*.

MONOTOSPORA.

1. __Monotospora megalospora__ Berk. Br. — Oud. N. K. A. 2, IV, 549. — Sacc. Syll. IV, 299. — Tubercules pourrissants du *Crocus vernus*.

HADROTRICHUM.

1. __Hadrotrichum Phragmitis__ Fuck. N. K. A. 3, II, 307. — Sacc. Syll. IV, 301. — F. du *Phragmites communis*.

2. __Hadrotrichum virescens__ Sacc. Roum. Syll. IV, 301. — N. K. A. 3, II, 308. — F. du *Lolium perenne*.

TRICHOSPORIUM.

1. __Trichosporium Collae__ (Lk.) Sacc. Syll. IV, 295. — Sporotrichum Collae Lk. N. K. A. 1, I, 55. — Collarium nigrispermum Lk. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 139. — Colle pourrissante.

2. __Trichosporium contaminans__ Oud. N. K. A. 2, IV, 549. — Sacc. Syll. X, 585. — Arbres, mûrs etc. dans la ville de Schiedam.

3. __Trichosporium densum__ Fr. — Arch. Néerl. II, 43. — Voir: *Botrytis*.

3. __Trichosporium Evonymi__ Oud. N. K. A. 2, V, 174. — Sacc. Syll. X, 583. — F. de l'*Ev. japonica*.

4. __Trichosporium fuscescens__ Cooke et Harkness. — Oud. N. K. A. 3, I, 524. — Sacc. Syll. IV, 289. — Ram. de l'*Abies Douglasii*.

ZYGODESMUS.

1. __Zygodesmus fuscus__ Cda. — N. K. A. 1, V, 351; Oud. Arch. Néerl. VIII, (1873), 391; id. N. K. A. 2, I, 262. — Sacc. Syll. IV, 284. — Bois ramolli; plumes de canard pourries.

CONOPLEA.

(Voir: *Dematium*).

DEMATIUM.

1. **Dematium hispidulum** (P.) Fr. — Sacc. Syll. IV, 308. — Exosporium hispidulum Lk. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 107; Conoplea hispidula P — Oud. Arch. Néerl. VIII (1873), 374; id. N. K. A. 2, I, 172. — F. du *Phalaris arundinacea*; f., tiges, épis de diverses Graminées.

***Dematium pullulans.** — Voir: *Cladosporium herbarum.*

2. **Dematium sphaericum** P. Obs. Myc. I, 25. — Sacc. Syll. X, 590. — Oud. N. K. A. 3, III, 105. — Ram. du Fagus silv.

TORULOPSIS.

1. **Torulopsis Scrotinae** Oud. N. K. A. 3, II, 917. — F. pourrissantes du *Prunus serotina.*

BOLACOTRICHA.

1. **Bolacotricha grisea** B. Br. — N. K. A. 2, IV, 245.

VERTICICLADIUM.

1. **Verticladium acuum** Oud. N. K. A. 2, IV, 550. — F. du *Picea excelsa.*

2. **Verticicladium trifidum** Preuss — Oud. N. K. A. 2, IV, 244. — Sacc. Syll. IV, 327. — Aiguilles du *Pinus silvestris.*

3. **Verticicladium unilaterale** Oud. Beibl. z. bot. Centr. Bl. 1902; id. N. K. A. 3, II, 774. — Bois de chêne ramolli.

GONYTRICHUM.

1. **Gonytrichum caesium** Nees. — Oud. Arch. Neerl. VIII (1873), 391; id. N. K. A. 2, I, 180. — Ram. pourris.

STACHYLIDIUM.

1. **Stachylidium formosum** Oud. N. K. A. 3, II, 915. — F. pourrissantes.

HAPLOGRAPHIUM.

1. **Haplographium chartarum** (Cooke) Sacc. Syll. IV, 305. — Oud. N. K. A. 2, V, 512. — Gélatine préparée.

2. **Haplographium delicatum** Berk. et Br. Oud. N. K. A. 2, IV, 243. — Sacc. Syll. IV, 304. — Crottin de lapin.

3. **Haplographium flexuosum** (Preuss) Sacc. Syll. IV, 307. — Oud. N. K. A. 3, II, 770. — Aiguilles pourrissantes du *Pinus silvestris*.

2. Phaeodidymae.

a. Micronemeae.

DICOCCUM.

1. **Dicoccum minutissimum** Cda. — Oud. N. K. A. 2, V, 174. — Sacc. Syll. IV, 342.

BISPORA.

1. **Bispora monilioides** Cda. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 136; N. K. A. 1, V, 351; Oud. N. K. A. 2, I, 93; ibid. 3, I, 130. — Sacc. Syll. IV, 342. — Torula antennata P. — T. N. G. XI, 405. — Bois ramolli.

2. **Bispora pusilla** Sacc. Syll. IV, 343. — Oud. Arch. Néerl. 2, VII, 292; N. K. A. 3, II, 766. — Bois ramolli.

3. **Bispora Trabutiana** Sacc. Syll. XI, 616. — N. K. A. 3, II, 334 et 767. — F. du *Rhododendron ponticum* cultivé.

TRICHOCLADIUM.

1. **Trichocladium asperum** Harz. var. charticolum Sacc. Syll. IV, 376. — Oud. N. K. A. 3, II, 917 et 3, III, 1128. — Papier brouillard humide.

CLADOSPORIUM.

1. **Cladosporium compactum** Berk. Curt. — N. K. A. 3. I, 239. — Sacc. Syll. IV, 364. — Tiges d'un *Hypericum*.

***Cladosporium dendriticum** Wallr. — N. K. A. 2, I, 93; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 125. — Voir: *Fusicladium*.

***Cladosporium depressum** B. Br. — Arch. Néerl. VIII, 388; N. K. A. 2, I, 41. — Voir: *Fusicladium*.

2. **Cladosporium epiphyllum** (P.) Nees. — T. N. G. XII, 274; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 125; Oud. Fgi Neerl. exs. n° 298. — Sacc. Syll. IV, 360. — F. d'une espèce de *Populus*.

3. **Cladosporium Fagi** Oud. — Beibl. z. bot. Centr. bl. 1902, id. N. K. A. 3, II, 768. — F. du *Fagus silvatica.*

4. **Cladosporium fasciculare** Fr. — T. N. G. XII, 274; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 125. — Sacc. Syll. IV, 367. — Tiges de plantes herbacées desséchées.

5. **Cladosporium fasciculatum** Cda. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, 125. — Sacc. Syll. IV, 366. — Chaumes du *Scirpus lacustris.*

6. **Cladosporium fuligineum** (Bon.) — Oud. N. K. A. 2, V, 512. — Sacc. Syll. IV, 368. — Chapeau d'un *Boletus* pourrissant.

7. **Cladosporium fulvum** Cooke. — Oud. N. K. A. 3, II, 768. — Sacc. Syll. IV, 363. — F. du *Lycopersicum esculentum.*

***Cladosporium Fumago** Lk. — T. N. G. XI, 102; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 124. — Voir: *Fumago vagans.*

8. **Cladosporium fuscum** Lk. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 124. — Sacc. Syll. IV, 352. — F. de l'*Artemisia vulgaris.*

9. **Cladosporium graminum** Cda. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 125. — Oud. N. K. A. 2, V, 174 et 3, I, 524; ibid. 3, I, 130. — Sacc. Syll. IV, 365. — F. des *Avena sativa* et *Secale cereale*; puis d'autres Graminées et d'une espèce de *Carex.*

10. **Cladosporium herbarum** (P.) Lk. T. N. G. XI, 402; Prodr. Fl. Bat. II, 1, p. 124; N. K. A. 3, I, 130. — Sacc. Syll. IV, 350. — F., tiges etc. de plusieurs pl. herbacées.

11. **Cladosporium juglandinum** Cooke. — N. K. A. 3, III, 1125. — Sacc. Syll. X, 601. — F. du *Juglans regia.*

***Cladosporium Lythri** West. — Arch. Néerl. VIII, 388; N. K. A. 2, I, 261. — Voir: *Cercospora.*

12. **Cladosporium Nicotianae** N. K. A. 3, II, 769; id. Beibl. z. bot. Centr. Bl. 1902 (errore habet Cl. Tabaci.) — F. pourrissantes du *Nicotiana Tabacum.*

13. **Cladosporium nodulosum** Cda. — N. K. A. 3, II, 769. — Sacc. Syll. IV, 351. — F. du *Prunus serotina.*

14. **Cladosporium Phragmitis** Opiz. — N. K. A. 2, VI, 57; ibid. 3, I, 130. — Sacc. Syll. IV, 370. — F. du *Phragmites communis.*

15. **Cladosporium polysporum** Lk. — N. K. A. 2, I, 315. — Sacc. Syll. IV, 354. — Rameaux décortiqués.

16. **Cladosporium punctulatum** Sacc. et Ellis, Syll. IV, 359. — N. K. A. 3, II, 311. — F. languissantes de l'*Evonymus japonica.*

***Cladosporium Tabaci** Oud. — Voir: *Cl. Nicotianae.*

17. **Cladosporium Typharum** Desm. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 125. — N. K. A. 3, II, 311. — F. du *Typha latifolia.*

PASSALORA.

1. **Passalora bacillgera** (Mont.) Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 1. p. 126. — Sacc. Syll. IV, 345. — F. languissantes de l'*Alnus glutinosa*.

SCOLECOTRICHUM.

1. **Scolecotrichum graminis** Fuck. — Oud. N. K. A. 3, I, 525; ibid. 239. — Sacc. Syll. IV, 349. — F. du *Dactylis glomerata*.

2. **Scolecotrichum melophthorum** Prill. et Delacr. — Oud. N. K. A. 3, I, 525. — Sacc. Syll. X, 599. — F. tiges et fruits du *Cucumis Melo*.

***Scolecotrichum ochraceum** Fuck. — Arch. Néerl. VIII, 391; N. K. A. 2, I, 180. — Voir: *Bostrichonaema*.

3. **Scolecotrichum sticticum** (Berk. et Br.) Sacc. Syll. IV, 349. — Helminthosporium st. B. Br. — Oud. Arch. Néerl. VIII (1873), 388; id. N. K. A. 2, I, 315 et 2, II, 41; ibid. 3, I, 130.

FUSICLADIUM.

1. **Fusicladium carpophilum** (Thüm.) Oud. Zitt. Versl. K. A. v. W. 1900, p. 388; id. N. K. A. 3, II, 359. — Sacc. Cladosporium carp. Thüm. — Sacc. Syll. IV, 353. — Fruits jeunes tombés du *Persica vulgaris*.

2. **Fusicladium Cerasi** (Rab.) Sacc. Syll. IV, 346. — N. K. A. 3, II, 309. — Fruits très jeunes du *Prunus acida*.

3. **Fusicladium dendriticum** (Wallr.) Fuck. — Sacc. Syll. IV, 345. — Cladosporium dendr. Wallr. — Prodr. Fl. Bat. II, 1, 125; N. K. A. 2, I, 93; Oud. Herb. N. Pl. n° 60 et Fgi Neerl. exs. n° 198. — F. des *Pirus communis* et *Malus*.

var. **orbiculatum** (Desm.) Sacc. l. c. — Oud. N. K. A. 3, II, 770. — F. du *Crataegus pyracantha*.

4. **Fusicladium depressum** (Berk. Br.) Sacc. Syll. IV, 346. — Cladosporium depr. B. Br. — Arch. Néerl. VIII (1873), 388; N. K. A. 2, II, 41; Oud. Fgi Neerl. exs. n° 87. — F. de l'*Angelica silvestris*.

5. **Fusicladium Fagopyri** Oud. Hedw. 1898, p. 183; id. N. K. A. 3, I, 524; id. Zitt. V. K. A. v. W. 26 Juin 1897, p. 88; 1900, p. 388. — F. du *Fagopyrum esculentum*.

6. **Fusicladium pirinum** (Lib.) Fuck. — N. K. A. 3, II, 310. — Sacc. Syll. IV, 346. — F. et fruits du *Pirus communis*.

POLYTHRINCIUM.

1. **Polythrincium Trifolii** Kze. — T. N. G. XI, 402; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 124; N. K. A. 3, I, 130; Oud. Fgi Neerl. exs. n° 297. — Sacc. Syll. IV, 350. — F. des *Trifolium pratense* et *repens*.

EPOCHNIUM.

1. **Epochnium monilioides** Lk. — Oud. Arch. Néerl. II, (1867). 44. — Sacc. Syll. IV, 375. — Fruits pourris du *Cucumis sativus*.

HORMODENDRON.

(Voir: *page.* 506)

3. Phaeophragmiae.

a. Micronemeae.

CLASTEROSPORIUM.

1. **Clasterosporium Amygdalearum** (Pass.) Sacc. Syll. IV, 391. — N. K. A. 3, II, 312. — F. des *Prunus Persica* et *Pr. acida*.

2. **Clasterosporium Iridis** Oud. — Hedw. 1898, p. 318; id. N. K. A. 3, II, 312; id. Zitt. Versl. K. A. v. W. 1900, p. 389. — Sacc. Syll. XVI, 1060. — F. de l'*Iris xyphoides* (I. anglica.)

3. **Clasterosporium Lini** Oud. Zitt. Versl. K. A. v. W. 1900, p. 389; id. N. K. A. 3, II, 313. — Sacc. Syll. XVI, 1060. — Racines du *Linum usitatissimum*.

4. **Clasterosporium opacum** (Cda) Sacc. Syll. IV, 387. — Sporodesmium opacum Cda. — Arch. Néerl. VIII (1873), 374; N. K. A. 2, I, 172 et 3, I, 526; ibid. 3, I, 130. — Bois d'une souche d'*Alnus glutinosa*.

5. **Clasterosporium tenuissimum** (Nees) Sacc. Syll. IV, 393. Helminthosporium ten. Nees. Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 127. — F. pourrissantes d'un *Pancratium*.

CRYPTOCORYNEUM.

1. **Cryptocoryneum obovatum** Oud. N. K. A. 3, II, 313. — Morceau de bois-de-chêne ramolli.

2. **Cryptocoryneum Psammae** Oud. N. K. A. 2, VI, 57. — F. du *Psamma littoralis*.

SPOROSCHISMA.

1. **Sporoschisma mirabile** Berk et Br. — N. K. A. 3, I, 132 et 530. — Sacc. Syll. IV, 186. — Bois ramolli.

POLYDESMUS.

1. **Polydesmus exitiosus** Kühn. — Oud. Arch. Néerl. VIII (1873), 393; id. N. K. A. 2, I, 180. — Sacc. Syll. IV, 402. F. du *Cochlearia anglica*.

var. **Solani** Schrank in Frank Krh. 2te Ed. II, 301. — Oud. N. K. A. 3, I, 530 (sous Sporodermium). — F. pourries du *Solanum tuberosum*.

b. Macronemeae.

ACROTHECIUM.

1. **Acrothecium simplex** Berk. Br. — Oud. N. K. A. 3, I, 529; ibid. p. 130. — Sacc. Syll. IV, 185. — Tiges de pl. herbacées.

HETEROSPORIUM.

1. **Heterosporium Allii** Ell. et Mart. — Sacc. Syll. IV, 480, var. *Lilii lanceolati* et *Tritomae Uvariae* Oud. N. K. A. 3, II, 315.

var. *Polygonati* Oud. Zitt. Versl. K. A. v. W. 1900, p. 390; id. N. K. A. 3, II, 315. — Sacc. Syll. XVI, 1065. — F. du *Polygonatum multiflorum*.

2. **Heterosporium Avenae** Oud. Hedw. 1898, p. 318; Zitt. Versl. K. A. v. W. 1900 p. 391; id. N. K. A. 3, II, 316. — Sacc. Syll. XVI, 1065. — F. des *Avena sativa*, *Hordeum sativum* et *Secale cereale*.

3. **Heterosporium Chamaeropis** Oud. Beibl. z. bot. Centr. Bl. 1902; id. N. K. A. 3, II, 771. — F. du *Chamaerops excelsa*.

4. **Heterosporium echinulatum** (Berk.) Cooke. — Oud. N. K. A. 2, V, 513; id. 2, VI, 60; ibid. 3, I, 132. — Sacc. Syll. IV, 481. — F. sèches du *Saponaria officinalis* et de quelques *Dianthus* cultivés.

5. **Heterosporium gracile** (Wallr.) Sacc. Syll. IV, 480. — Helminthosporium gr. Wallr. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 127. — F. fanées de quelques espèces de *Gladiolus* et *Iris*.

6. **Heterosporium Laburni** Oud. N. K. A. 2, V, 171. — Sacc. Syll. X, 657. — F. du *Cytisus Laburnum*.

7. **Heterosporium Ornithogali** Klotzsch. Herb. Myc. I, n° 69. — Sacc. Syll. IV, 480. — Cooke, Black Moulds tab. 25 f. 13. — Helminthosp. echinulatum Cooke Grev. IV, tab. 63 f. 8. — F. de l'*Ornith. umbellatum.*

8. **Heterosporium Syringae** Oud. Hedw. 1898, p. 183; id. N. K. A. 3, I, 529. — id. Versl. Med. K. A. v. W. 1900, p. 391. — Sacc. Syll. XVI, 1065.

9. **Heterosporium Typharum** Cooke et Massee. — N. K. A. 3, II, 316. Sacc. Syll. X, 660. — F. du *Typha angustifolia.*

10. **Heterosporium variabile** Cooke. — Oud. N. K. A. 2, V, 513; ibid. 3, I, 132. — Sacc. Syll. IV, 481. — Ram. du *Sambucus nigra.*

HELMINTHOSPORIUM.

1. **Helminthosporium apiculatum** Cda. — N. K. A. 3, I, 131 et 527. — Sacc. Syll. IV, 413. — Bois ramolli.

2. **Helminthosporium appendiculatum** Cda. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 128. — Sacc. Syll. IV, 413. — Ram. tombés du *Fraxinus excelsior.*

***Helminthosporium arundinaceum** Cda. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 127; Oud. Fgi Neerl. exs. n° 86. — Voir: *Napicladium.*

***Helminthosporium betulinum** Cda. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 128. — Voir: *Brachysporium oosporum.*

***Helminthosporium Eryngii** Fr. — T. N. G. XI, 403. — Voir: Vermic. Eryngii.

3. **Helminthosporium fasciculare** Cda. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 128. — Sacc. Syll. IV, 104. — Bois ramolli.

***Helminthosporium flexuosum** Cda. — N. K. A. 2, I, 178. — Arch. Néerl. VIII, 387. — Voir: *Brachysporium.*

4. **Helminthosporium folliculatum** Cda. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 127. — Sacc. Syll. IV, 414. — H. folliculosum N. K. A. 2, VI, 58. — Bois ramolli du *Corylus Avellana.*

var. **dilutellum** Oud. N. K. A. 2. VI. 58. — Ram. de l'*Abutilon striatum.*

5. **Helminthosporium fusiforme** Cda. N. K. A. 3, I, 131 et 527. — Sacc. Syll. IV, 413. — Ram. tombés du *Corylus Avellana.*

6. **Helminthosporium fusisporum** Berk. — Oud. Arch. Néerl. VIII (1873), 387; id. N. K. A. 2, I, 261; ibid. 3, I, 132. — Sacc. Syll. IV, 418. — Tiges à demi pourries de l'*Epilobium montanum.*

Helminthosporium gracile Rabh. — Prodr. Fl. Bat. II. 4, p. 127. — Voir: *Brachysporium.*

7. **Helminthosporium gramineum** Rab. et Oud. Hedw. 1898, p. 183 (où par erreur se trouve „H. Graminum Rob"); Oud. Zitt. Versl. K. A. v. W. 26 Juin 1879, p. 98 et 1900, p. 389; id. N. K. A. 3, I, 527. — Sacc. Syll. X, 615. — E. du *Hordeum vulgare*.

***Helminthosporium heteronemum** (Desm.) Arch. Néerl. VIII, 387; Oud. N. K. A. 2, I, 178. — Voir: *Macrosporium*.

***Helminthosporium longipilum** Cda. — Prodr. Fl. Bat. II, 1, p. 128. — Voir: *Brachysporium*.

8. **Helminthosporium macrocarpum** (Grev.) Sacc. Syll. IV, 412. — N. K. A. 1, I, 54. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, 127; (*H. . . pon*); Oud. N. K. A. 2, V, 512; ibid. 3, I, 131. — Ram. des *Alnus glutinosa*, *Fraxinus excelsior* et *Tilia cordata*.

***Helminthosporium oosporum** Cda. — N. K. A. 2, II, 184. — Voir: *Brachysporium*.

9. **Helminthosporium Psammae** Oud. N. K. A. 2, VI, 58; ibid. 3, I, 131. — Sacc. Syll. XI, 624. — F. du *Psamma arenaria* (= Ammophila).

10. **Helminthosporium rhopaloides** Fres. — Oud. Arch. Néerl. VIII (1873), 388; id. N. K. A. 2, I, 179; ibid. 3, I, 132. — Sacc. Syll. IV, 420. — Tiges pourrissantes des *Asparagus officinalis* et *Solanum tuberosum*.

11. **Helminthosporium scolecoides** Cda. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 128. — N. K. A. 3, I, 131. — Sacc. Syll. IV, 414. — Bois ramolli et troncs de Choux pourrissants.

***Helminthosporium stictieum** B. Br. — Arch. Néerl. VIII, 388; N. K. A. 2, I, 315. — Voir: *Scolecotrichum stictieum*.

***Helminthosporium tenuissimum** Nees. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 127. — Voir: *Clasterosporium*.

***Helminthosporium Tiliae** Fr. — T. N. G. XI, 402. — Voir: *Exosporium*.

12. **Helminthosporium velutinum** P. — N. K. A. 1, I, 54. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, 127. — Ram. tombés des *Alnus glutinosa* et *Betula alba*.

HELMISPORIUM.

***Helmisporium arundinaceum** Cda. — N. K. A. 1, I, 54. — Voir: *Naplicadium*.

BRACHYSPORIUM.

1. **Brachysporium flexuosum** (Cda.) — Sacc. Syll. IV, 429. — Oud. N. K. A. 3, I, 529; ibid. p. 131. — Helm. fl. Cda. — Oud.

Arch. Néerl. VIII (1873), 387 et N. K. A. 2, I, 178. — F. de l'*Avena sativa* et d'autres Graminées.

2. **Brachysporium gracile** (Wallr.) — Sacc. Syll. IV, 430. — Helm. gracile Wallr. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 127. — F. fanées d'*Iris* et de *Gladiolus*.

3. **Brachysporium graminis** Boyer et Janczewsky. — Oud. N. K. A. 3, II, 767. — Sacc. Syll. XI, 624. — Tiges d'une Graminée inconnue.

4. **Brachysporium longipilum** (Cda.) — Sacc. Syll. IV, 425. — Helm. brachyp. Cda. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 128. — Écorce du *Betula alba*.

5. **Brachysporium oosporum** (Cda) Sacc. Syll. IV, 424. — Helm. oosporum Cda. — Oud. N. K. A. 2, II, 184. — Helm. betulinum Cda. Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 128. — Écorce du *Betula alba*.

6. **Brachysporium Pisi** Oud. Hedw. 1898, p. 183; id. N. K. A. 3, I, 527; id. Zitt. Versl. K. A. v. W. 1900, p. 390. — Sacc. Syll. XIV, 1087. — F. du *Pisum sativum*.

NAPICLADIUM.

1. **Napicladium arundinaceum** (Cda) Sacc. Syll. IV, 182. — Helmisporium arund. Cda. — N. K. A. 1, I, 54; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 127. — F. du *Phragmites communis*.

CERCOSPORA.

1. **Cercospora Apii** Fres. var. **Foeniculi** Sacc. Syll. IV, 112. — N. K. A. 3, II, 313. — F. du *Foeniculum vulgare*.

2. **Cercospora beticola** Sacc. Syll. IV, 456. — Oud. N. K. A. 3, I, 529; ibid. p. 131. — F. du *Beta vulgaris* var. *Rapa*.

3. **Cercospora Caricis** Oud. N. K. A. 2, VI, 60; ibid. 3, I, 131. — F. d'une espèce de *Carex*.

4. **Cercospora crassa** Sacc. Syll. IV, 118. — Oud. N. K. A. 2, VI, 60; ibid. 3, I, 131. — F. du *Lunaria annua*.

5. **Cercospora depazoides** (Desm.) Sacc. Syll. IV, 169. — Vermicularia depazoides West. Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 114. — F. fanées du *Sambucus nigra*.

6. **Cercospora dubia** (Riess) Wint. — Oud. N. K. A. 2, V, 513; ibid. 3, I, 131. — Sacc. Syll. IV, 456. — F. du *Chenopodium polyspermum*.

7. **Cercospora Fraxini** (D. C.) Sacc. — Dothidea Fr. — T. N. G. XI, 396. — F. du *Fraxinus excelsior*.

8. **Cercospora lilacina** Bresad. — N. K. A. 2, V, 311. — Sacc. Syll. XI, 625. — F. du *Viola palustris*.

9. **Cercospora Lythri** (West.) Niessl. — Sacc. Syll. IV, 452. — Cladosporium Lythri West. — Arch. Néerl. VIII, (1873), 388; N. K. A. 2, I, 261. — F. du *Lythrum Salicaria*.

10. **Cercospora Majanthemi** Fuck. — N. K. A. 2, II, 184; ibid. 3, I, 131; Oud. Fgi Neerl. exs. n° 85. — Sacc. Syll. IV, 476. — F. du *Majanthemum bifolium*.

11. **Cercospora Meliloti** (Lasch.) Oud. N. K. A. 2, IV, 550; ibid. 2, V, 595. — Sacc. Syll. X, 326. — Depazea Meliloti Lasch. — Oud. Arch. Néerl. VIII (1873). 366; id. N. K. A. 2, I, 169.

12. **Cercospora montana** (Speg.) Sacc. Syll. 453. — N. K. A. 3, II, 334 et 767. — F. de l'*Epilobium angustifolium*.

13. **Cercospora Resedae** Fuck. — Oud. N. K. A. 3, I, 529; ibid. p. 131. — Sacc. Syll. IV, 135. — F. du *Reseda luteola*.

14. **Cercospora Spinaciae** Oud. Zitt. Versl. K. A. v. W. 1900, p. 390; id. N. K. A. 3, II, 314. — Sacc. Syll. XVI, 1072. — F. du *Spinacia oleracea*.

15. **Cercospora Violae** Sacc. Syll. IV, 434. — Oud. N. K. A. 2, V, 513; ibid. 3, I, 131.

16. **Cercospora Violae silvaticae** Oud. Versl. Med. K. A. v. W. 3, VII (1890), 323; id. N. K. A. 2, VI, 59. — Sacc Syll. X, 620. — F. du *Viola silvatica*.

Cercospora Virgaureae Allescher. — N. K. A. 3, II, 315. — Septoria Virg. Desm. — N. K. A. 2, II, 200 et 3, II, 277. — F. du *Solidago Virgaurea*. — Voir: *Cercosporella Virgaureae* (sous les Hyalophragmeae).

DENDRYPHIUM.

1. **Dendryphium cladosporioides** Ellis et Everh. — Oud. N. K. A. 3, I, 530. — Sacc. Syll. X, 662. — Tiges du *Pisum sativum*.

2. **Dendryphium comosum** Wallr. — Oud. N. K. A. 2, V, 173; ibid. 3, I, 131. — Sacc. Syll. IV, 187. — Tiges pourrissantes.

3. **Dendryphium curtum** Berk. Br. var. **ramosius** Sacc. Syll. IV, 490. — Oud. N. K. A. 3, I, 530. — Tiges pourries du *Papaver somniferum*.

4. **Dendryphium penicillatum** (Cda.) Fr. — Sacc. Syll. IV, 489. — Brachycladium penic. Cda. — Prodr. Fl. Bat. II, 1, p. 123. Tiges pourrissantes du *Papaver somniferum*.

*BRACHYCLADIUM.

***Brachycladium penicillatum** Cda. — Voir: *Dendryphium*.

I. Phacodictyae.

a. Micronemeae.

STIGMELLA.

1. **Stigmella Atriplicis** Oud. N. K. A. 3, III, 1127. — F. sèches et blanchies de l'*Atriplex hortensis*.

2. **Stigmella Martagonis** Oud. N. K. A. 3, II, 335. — Sacc. Syll. XVI, 1076. — F. du *Lilium Martagon*.

SCHIZODERMA.

Schizoderma betulinum (Cda.) Fr. — N. K. A. 1, V, 351. — Voir: *Coniothecium*.

CONIOTHECIUM.

1. **Coniothecium alneum** Karst. — Oud. N. K. A. 3, II, 914. — Sacc. Syll. X, 669. — Ram. de l'*Alnus glutinosa*.

2. **Coniothecium Amentaceorum** Cda. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 169. — Oud. N. K. A. 2, I, 93; ibid. 3, I, 132; Oud. Herb. N. Pl. n° 525. — Sacc. Syll. IV, 509. — Ram. d'une espèce de *Salix*.

3. **Coniothecium austriacum** Thüm. — Oud. Hedw. 1898, p. 188; id. N. K. A. 3, I, 531. — Sacc. Syll. IV, 512. — Aiguilles du *Pinus Pinaster*.

4. **Coniothecium betulinum** Cda. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 170; N. K. A. 3, I, 132. — Sacc. Syll. IV, 510. — Schizoderma betulinum (Cda) Fr. — N. K. A. 1, V, 351. — Ram. du *Betula alba*.

5. **Coniothecium chomatosporum** Cda. — Oud. Arch. Néerl. VIII (1873) 374 et N. K. A. 2, I, 172. — Sacc. Syll. IV, 510. — Réceptacles mûris des Roses.

6. **Coniothecium conglutinatum** Cda. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 170. — Sacc. Syll. IV, 509. — Rameaux tombés décortiqués.

7. **Coniothecium effusum** Cda. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 170. — Sacc. Syll. IV, 508. — Bois ramolli.

8. **Coniothecium epidermidis** Cda. — Oud. Arch. Néerl. VIII (1873), 374; id. N. K. A. 2, I, 314; ibid. 3, I, 132. — Sacc. Syll. IV, 510. — Ram. du *Betula alba*.

9. **Coniothecium Heraclei** Oud. Beibl. z. bot. Centr. Bl. 1902; id. N. K. A. 3, II, 769. — F. de l'*Heracleum Sphondylium*.

10. **Coniothecium incertum** Karst. — N. K. A. 3, II, 318. — Sacc. Syll. X, 750. — Bois ramolli du *Robinia Pseudo-Acacia*.

11. **Coniothecium Mughi** Oud. Hedw. 1898, p. 318; id. Zitt. Versl. K. A. v. W. 1900, p. 391; id. N. K. A. 3, II, 318. — Sacc. Syll. XVI, 1077. — Écusson des écailles carpellaires du *Pinus Mughus*.

12. **Coniothecium phyllophilum** Desm. — Prodr. Fl. Bat. II, 1, p. 170; N. K. A. 3, II, 319. — Sacc. Syll. IV, 512. — F. du *Pirus Malus*.

13. **Coniothecium Psammae** Oud. Zitt. Versl. K. A. v. W. 1900, p. 391; id. N. K. A. 3, II, 319. — Sacc. Syll. XVI, 1077. — Gaînes des f. du *Pasmma littoralis* (Ammophila arenaria).

TETRAPLOA.

1. **Tetraploa aristata** Berk. Br. — Oud. N. K. A. 2, VI, 60; ibid. 3, I, 133. — Sacc. Syll. IV, 516. — F. du *Psamma arenaria*.

SPEIRA.

1. **Speira toruloides** Sacc. Syll. IV, 514. — N. K. A. 3, II, 771. — Ram. tombé d'origine inconnue.

SPORODESMIUM.

1. **Sporodesmium atrum** Lk. — T. N. G. XI, 105. — Bois et écorce rejetés.

2. **Sporodesmium bulbophilum** West. Prodr. Fl. Bat. II, 1, p. 159. — Bulbe de Tulipe.

3. **Sporodesmium Campanulae** Oud. N. K. A. 3, III, 1127. — Tiges du *Campanula rotundifolia*.

4. **Sporodesmium fuscum** (Bon.) Sacc. IV, 505. — Oud. Arch. Néerl. VIII (1873), 374; id. N. K. A. 2, I, 172 et 2, V, 513. — Sarments de *Vitis vinifera*.

5. **Sporodesmium exitiosum** var. **Solani** Schenk. — Oud. N. K. A. 3, I, 530. — F. du *Sol. tuberosum*.

6. **Sporodesmium myrianum** Desm. — Prodr. Fl. Bat. II, 1, p. 159. — Sacc. Syll. IV, 506. — F. du *Psamma littoralis* (= Ammophila arenaria).

***Sporodesmium opacum** Cda. — N. K. A. 2, I, 619; Arch. Néerl. VIII, 374. — Voir: *Clasterosporium*.

7. **Sporodesmium septorioides** West. — Oud. N. K. A. 3, II, 772. — Sacc. Syll. IV, 561. — F. du *Reseda odorata*.

b. Macronemeae

CLOCLADIUM.

***Clocladium botrytis** Preuss. — N. K. A. 2, IV, 243. — Voir: *Stemphylium botryosum*.

STEMPHYLIUM.

1. **Stemphylium Allii** Oud. Beibl. z. bot. Centr. Bl. 1902; id. N. K. A. 3, II, 772. — F. d'une espèce d'*Allium* cultivée.

2. **Stemphylium Alternariae** (Cooke) Sacc. Syll. IV, 523. — Sporodesmium Alt. Cooke. — Oud. Versl. Med. K. A. v. W. 2, XVIII, 373. — Face intérieure du carton d'un livre relié, gâté par l'eau.

3. **Stemphylium amoenum** Oud. Hedw. 1883, p. 61. — Sacc. Syll. IV, 523. — Papier gâté par l'humidité et pain de seigle corrompu.

4. **Stemphylium Berlesii** Oud. Beibl. z. bot. Centr. Bl. 1902; id. N. K. A. 3, II, 772. — Gélatine préparée, exposée à l'air dans un bois.

5. **Stemphylium botryosum** Wallr. — Oud. Arch. Néerl. 2, VII, 293; N. K. A. 3, I, 133; Sacc. Syll. IV, 522. — Clocladium botrytis Pr. Oud. N. K. A. 2, IV, 243. — Gélatine préparée, mêlée de terre humeuse pulvérisée; tiges mortes; face intérieure du carton d'un livre relié, gâté par l'eau.

6. **Stemphylium graminis** (Cda) Bon. — N. K. A. 3, II, 316. — Sacc. Syll. IV, 522. — F. desséchés du *Zea Mays*.

7. **Stemphylium macrosporoideum** (B. Br.) Sacc. Syll. IV, 519. — Oud. N. K. A. 3, II, 916. — Gélatine préparée dans le laboratoire de Mr. le prof. Beyerinck à Delft.

8. **Stemphylium piriforme** Bon. — N. K. A. 3, II, 318. — Sacc. Syll. IV, 521. — Ramilles du *Betula alba*.

9. **Stemphylium polymorphum** (Cda.) Bon. — N. K. A. 3, II, 318. — Sacc. Syll. IV, 501 (sub n° 25). — F. du *Pisum sativum*.

10. **Stemphylium Tabaci** Oud. Beibl. z. bot. Centr. Bl. 1902; id. N. K. A. 3, II, 773. — F. et tiges pourrissantes du *Nicotiana Tabacum* cultivé.

MACROSPORIUM.

1. **Macrosporium Avenae** Oud. Hedw. 1898, p. 184; id. N. K. A. 3, I, 531. — Sacc. Syll. XVI, 1079. — F. de l'*Avena sativa*.

2. **Macrosporium Brassicae** Berk. — Arch. Néerl. VIII (1873), 388; id. N. K. A. 2, I, 179 et 3, II, 335; ibid. 3, I, 133. — Sacc. Syll. IV, 526. — F. et tronçons de Choux cultivé.

3. **Macrosporium Caespitulum** Cooke. — Oud. N. K. A. 2, VI, 60. — Sacc. Syll. IV, 538. — Tiges fanées de l'*Asparagus officinalis*.

4. **Macrosporium caudatum** Cooke et Ellis. — Oud. N. K. A. 2, V, 173 et 3, I, 530; ibid. 3, I, 133. — Sacc. Syll. IV, 528. — Tiges du *Senecio Jacobaea;* calyces desséchés et noircis d'une espèce de *Dianthus*.

5. **Macrosporium commune** Rab. — Oud. N. K. A. 2, V, 513; ibid. 3, I, 132. — Sacc. Syll. IV, 524. — Tiges de l'*Asparagus officinalis*.

6. **Macrosporium Cookei** Sacc. Syll. IV, 530. — Oud. N. K. A. 3, II, 914. — F. du *Datura Stramonium*.

7. **Macrosporium heteronemum** Desm. — Sacc. Syll. IV, 524. — Helminthosporium heteron. Desm. — Oud. Arch. Néerl. VIII (1873), 387; id. N. K. A. 2, I, 178 et Rab. F. E. n° 1468. — F. du *Sagittaria sagittifolia*.

8. **Macrosporium ignobile** Karst. — Oud. N. K. A. 3, I, 531. — Sacc. Syll. X, 677. — F. du *Secale cereale*.

9. **Macrosporium Lunariae** Oud. et v. Hall, N. K. A. 3, III, 1126. — F. et fruits du *Lunaria biennis*.

10. **Macrosporium nobile** Vize. — Oud. N. K. A. 3, I, 530. — Sacc. Syll. IV, 529. — Calyces desséchés et noircis d'une espèce de *Dianthus*.

11. **Macrosporium parasiticum** Thüm. — Oud. N. K. A. 3, I, 531. — Sacc. Syll. IV, 537. — F. de l'*Allium escalonicum*.

12. **Macrosporium ramulosum** Sacc. — Syll. IV, 527. — Oud. N. K. A. 2, IV, 552. — Racines pourries du *Daucus Carota*.

13. **Macrosporium Saponariae** Peck. — Oud. N. K. A. 2, V, 511; ibid. 3, I, 133. — Sacc. Syll. IV, 529. — F. desséchées du *Saponaria officinalis*.

14. **Macrosporium Sarcinula** Berk. — Oud. N. K. A. 3, I, 530. — Sacc. Syll. IV, 524. — F. de l'*Avena sativa*.

SEPTOSPORIUM.

1. **Septosporium bulbotrichum** Cda. — Oud. Arch. Néerl. VIII (1873), 388; id. N. K. A. 2, I, 261. — Sacc. Syll. IV, 543. — Tiges pourrissantes du *Lactuca sativa*.

2. **Septosporium instipitatum** Preuss. — Oud. Arch. Néerl. II (1867), 41. — Sacc. Syll. IV, 544. — Fruits secs d'un *Phaseolus*.

ALTERNARIA.

1. **Alternaria humicola** Oud. Arch. Néerl. 2, VII, 292; id. N. K. A. 3, II, 913. — Produit d'une culture, sur gélatine préparée, de terre humeuse pulvérisée.

2. **Alternaria tenuis** Nees. — Oud. N. K. A. 2, IV, 215. — Sacc. Syll. IV, 545. — Produit d'une culture, sur gélatine preparée, exposée à l'air d'un laboratoire.

FUMAGO.

1. **Fumago vagans** P. — N. K. A. 3, I, 132. — Sacc. Syll. IV, 547. — Cladosporium Fumago Lk. — T. N. G. XI, 402; Prodr. Fl. Bat. II, 1, p. 124. — F. des *Acer, Pirus Malus, Quercus, Ribes nigrum, Tilia, Viburnum Tinus*; gousses du *Cytisus Laburnum*.

5. Staurosporae.

b. Macronemeae.

TRIPOSPORIUM.

1. **Triposporium elegans** Cda. — Prodr. Fl. Bat. II, 1, p. 124. — N. K. A. 3, I, 133. — Sacc. Syll. IV, 551. — Ram. et éclats de bois du *Betula alba*; sarments d'une espèce de *Rubus*.

6. Scolecosporae.

CERCOSPORA.

Voir sous les *Phaeophragmiae*.

7. Helicosporae.

a. Micronemeae.

HELICOSPORIUM.

1. **Helicosporium lumbricoides** Sacc. Syll. IV, 558. — Oud. N. K. A. 2, IV, 214. — Tannée surannée dans une serre chaude.

†[60] Stilbaceae.

2. **Hyalostilbeae.**

1 Hyalosporae

STILBUM.

Stilbum cavipes Oud. Hedw. 1883, p. 62; id. N. K. A. 2, IV, 243. — Voir: *Graphium*.

1. **Stilbum erythrocephalum** Ditmar. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 123; Oud. Versl. Med. K. A. v. W. 2, XVIII (1883), 375; id. N. K. A. 2, IV, 241. — Sacc. Syll. IV, 567. — Crottin de lapin et de lièvre.

2. **Stilbum tinctarium** Berk. Br. — Oud. Versl. Med. K. A. v. W. 2, XVIII (1883), 374; id. N. K. A. 2, IV, 241. — Sacc. Syll. IV, 572. — Crottin de lapin.

3. **Stilbum hyalinum** A. S. — N. K. A. 3, II, 320. — Sacc. Syll. IV, 568. — F. pourrissantes.

***Stilbum parasiticum** P. — N. K. A. 2, IV, 552. — Voir: *St. tomentosum*.

4. **Stilbum pubidum** Tode. — Oud. N. K. A. 2, IV, 239. — Sacc. Syll. IV, 566. — Aiguilles du *Pinus silvestris*.

***Stilbum rigidum** P. — N. K. A. 1, 1, 54; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 123. — Voir: *Graphium*.

5. **Stilbum sanguineum** Oud. Vesl. Med. K. A. v. W. 3, VII (1890), 324; id. N. K. A. 2, VI, 60. — Sacc. Syll. X, 683. — F. languissantes du *Gnetum Gnemon*.

6. **Stilbum tomentosum** Schrad. — N. K. A. 1, V, 350; Arch. Néerl. VIII (1873), 385; id. N. K. A. 3, II, 320; id. Zitt. Versl. K. A. v. W. 1900, p. 391. — Stilbum parasiticum P. — Oud. N. K. A. 2, IV, 552. — Parasite de quelques Myxomycètes (*Trichia*, *Arcyria*, *Hemiarcyria*.)

HYALOSTILBUM.

***Hyalostilbum sphaerocephalum** Oud. N. K. A. 2, IV, 241. — Voir: *Dictyostelium sphaerocephalum* Sacc. et Marchand.

TILACHLIDIUM.

1. **Tilachlidium humicola** Oud. Beibl. z. bot. Centr.bl. 1902; id. Arch. Néerl. 2, VII, 297; id. N. K. A. 3, II, 923. — Produit d'une culture, sur gélatine préparée, de terre fertile pulvérisée.

2. **Tilachlidium proliferum** Oud. Beibl. z. bot. Centr.bl. 1902; id. N. K. A. 3, II, 776. — F. pourrissantes du *Quercus rubra*.

3. **Tilachlidium racemosum** Oud. Beibl. z. bot. Centr.bl. 1902; id. N. K. A. 3, II, 776. — Produit, etc., voir 1.

CILICIOPODIUM.

1. **Ciliciopodium brevipes** Oud. N. K. A. 3, II, 774. — F. tombées du *Fagus silvatica*.

2. **Ciliciopodium Magnusii** Oud. — Arch. Néerl. 2, VII, 294; id. N. K. A. 3, II, 775. — Morceau de bois du *Betula alba* ramolli.

ISARIA.

1. **Isaria arachnophila** Ditmar. — Oud. N. K. A. 2, II, 102. — Sacc. Syll. IV, 587. — Araignée morte à la surface d'une f. de Chêne.

2. **Isaria farinosa** (Dickson) Fr. — Oud. N. K. A. 2, I, 261; ibid. 3, I, 133. — Sacc. Syll. IV, 585. — Chrysalide en état de corruption.

3. **Isaria furcellata** Mart. — Oud. Arch. Néerl. VIII (1873), 385; id. N. K. A. 2, I, 178. — Sacc. Syll. IV, 592. — Bois ramolli.

4. **Isaria murina** Oud. N. K. A. 2, VI, 62 et tab. 1, fig. 2. — Sacc. Syll. XI, 642. — Crottin de souris.

5. **Isaria sphecophila** Ditmar. — N. K. A. 3, II, 321. — Sacc. Syll. IV, 586. — Cadavre du *Vespa Crabro*.

6. **Isaria strigosa** Fr. — Oud. N. K. A. 3, I, 531. — Sacc. Syll. IV, 585. — Chrysalide morte du *Halophila prasinana*.

7. **Isaria truncata** P. — Oud. Arch. Néerl. II (1867), 40. — Sacc. Syll. IV, 584. — Sur la terre dans les bois.

8. **Isaria umbrina** P., en compagnie de l'Hypoxylon coccineum. — N. K. A. 3, III, 1129. — Écorce du *Quercus Robur*.

CERATIUM.

1. **Ceratium hydnoides** (Jacq.) A. S. — Sacc. Syll. IV, 596. N. K. A. 1, V, 359; Arch. Néerl. VIII, 385. — Bois pourri d'aune et de saule.

PILACRE.

1. **Pilacre Petersii** Berk. et Curt. — Prodr. Fl. Bat. II, 1, p. 16.

COREMIUM.

1. **Coremium candidum** Nees. — Sacc. Syll. IV, 582. — N. K. A. 1, I, 51. — C. vulgare Cda Prodr. Fl. Bat. II, 1, p. 132. — Penicillium candidum Lk. β Coremium Fr. — N. K. A. 1, I, 54. — Pommes pourrissantes.

2. **Coremium glandicola** Oud. N. K. A. 3, II, 918. — Cotyles pourrissantes du *Quercus Robur*.

3. **Coremium glaucum** Fr. — N. K. A. 1, I, 54; id. 3, II, 321; C. vulgare Cda. p. p. Prodr. Fl. Bat. II, 1, p. 132. — Pommes pourrissantes.

var. **fimicola** March. — Oud. N. K. A. 3, II, 321 et 775. — Crottin de lapin.

4. **Coremium necans** Oud. N. K. A. 3, II, 918. — F. du *Quercus Robur* enroulés, et servant de réduit aux oeufs d'un papillon.

***Coremium vulgare** Cda. — Prodr. Fl. Bat. II, 1, p. 132. Voir: *C. glaucum*.

2. Hyalophragmiae.

ISARIOPSIS.

1. **Isariopsis albo-rosella** Desm. — Sacc. Syll. IV, 630. — Oud. N. K. A. 3, II, 920. — I. pusilla Fres. — Oud. Arch. Néerl. II (1867), 40. — F. du *Cerastium triviale*.

2. **Isariopsis carnea** Oud. N. K. A. 2, I, 262; id. Arch. Néerl. VIII (1873), 392. — Sacc. Syll. IV, 630. — F. du *Lathyrus pratensis*.

***Isariopsis pusilla** Fres. — Arch. Néerl. II, 40. — Voir: *I. albo-rosella*.

β. Phaeostilbeae.

1. Hyalosporae.

GRAPHIUM.

***Graphium cavipes**. — Voir: *Sphaeronema*.

1. **Graphium Klebahni** Oud. Arch. Néerl. 2, VII, 295; id. N. K. A. 3, II, 919. — Morceau de bois ramolli.

2. **Graphium leucocephalum** Berk. et Curt. — Sacc. Syll. IV, 611. — Oud. N. K. A. 2, VI, 298 et N. K. A. 3, I, tab. V, Fig. 1. — F. pourrissantes du *Saxifraga cordifolia*.

3. **Graphium penicilloides** Cda. — Oud. Arch. Néerl. II (1867), 40. — Sacc. Syll. IV, 609. — Bois ramolli.

4. **Graphium rigidum** (P.) — Sacc. Syll. IV, 610. — Prodr. Fl. Bat. II, 1, p. 123. — Stilbum rigidum P. — N. K. A. 1, I, 54; Prodr. Fl. Bat. II, 1, p. 123. — Tronc de Chêne ramolli.

5. **Graphium stilboideum** Cda. — Sacc. Syll. IV, 610. — Oud. N. K. A. 3, III, 1128. — Fentes dans l'écorce et dans le tissu sous-cortical du Pommier.

CEPHALOTRICHUM.

***Cephalotrichum Stemonitis** Nees. — T. N. G. XI, 101; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 123. — Voir: *Stysanus*.

STYSANUS.

1. **Stysanus capitatus** Reinke et Berth. — Oud. N. K. A. 3, II, 921. — Sacc. Syll. X, 697. — F. pourrissantes du *Nicotiana rustica*.

2. **Stysanus difformis** Oud. Arch. Néerl. 2, VII, 296; id. N. K. A, 3, II, 921. — Bois ramolli.

3. **Stysanus Mandlii** Mont. — Oud. N. K. A. 3, II, 922. — F. pourrissantes des *Fagus silvatica* et *Quercus Robur*.

4. **Stysanus monilioides** (A. S.) Cda. — N. K. A. 1. I. 55; Prodr. Fl. Bat. II, 1, p. 132. — Sacc. Syll. IV, 624. — Bois ramolli de *Salix* et *Populus*.

5. **Stysanus Stemonites** (P.) Cda. — Oud. Arch. Néerl. 2, VII, 297. — Sacc. Syll. IV, 624. — Cephalotrichum Stemonites (P.) Nees. — T. N. G. XI, 401; Prodr. Fl. Bat. II, 1, p. 123. — Bois ramolli; chaumes pourrissantes du *Phragmites communis*; gélatine préparée, inoculée avec le poudre d'une terre humeuse.

6. **Stysanus verrucosus** Oud. N. K. A. 3, II, 923. — F. pourrissantes du *Quercus Robur*.

2. Phaeosporae.

SPOROCYBE.

1. **Sporocybe byssoides** (P.) Fr. — Oud. N. K. A. 2, II, 11. — Sacc. Syll. IV, 606. — Tiges de pl. herbacées pourrissantes.

3. Phaeophragmiae.

ARTHROBOTRYUM.

1. **Arthrobotryum coprophilum** Oud. Zitt. Versl. K. A. v. W. 1900, p. 392; id. N. K. A. 3, II, 319. — Sacc. Syll. XVI, 1089. — Crottin de cheval.

†[61] Tuberculariaceae.

x. **Mucedineae.**

1. Hyalosporae.

TUBERCULARIA.

1. **Tubercularia Acaciae** Fr. — Oud. N. K. A. 2, I, 178. — Sacc. Syll. IV, 639 (sub n. 1). — Ram. du *Robinia Pseudo-Acacia*.

2. **Tuberculariaria Aesculi** Opiz. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 148. — Sacc. Syll. IV, 641.

3. **Tuberculariaria Berberidis** Thüm. — N. K. A. 3, I, 134 et 531. — Sacc. Syll. IV, 640. — Ram. du *Berberis vulgaris*.

1. **Tuberculariaria confluens** P. — T. N. G. XI, 404; Prodr. Fl. Bat. II, 4, 148; Arch. Néerl. VIII (1873), 386; Oud. N. K. A. 2, I, 178. — Sacc. Syll. IV, 641. — Ram. d'espèces d'*Acer* et de *Crataegus*; puis de *Sophora japonica*.

5. **Tuberculariaria discoidea** P. — Oud. Arch. Néerl. VIII (1873), 386; id. N. K. A. 2, I, 178. — Sacc. Syll. IV, 639 (sous 1). — Ram. et écorce de l'*Acer Pseudo-Platanus*.

6. **Tuberculariaria expallens** Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 149. — Sacc. Syll. IV, 639 (sous 1). — Planches d'une clôture.

7. **Tuberculariaria floccosa** Lk. — N. K. A. 1, 1, 55; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 149. — Sacc. Syll. IV, 642. — Ram. des *Alnus* et *Betula*.

8. **Tuberculariaria granulata** P. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 149. — Sacc. Syll. IV, 639. — Ram. des *Cornus Mas* et *Pirus Malus*.

9. **Tuberculariaria herbarum** Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, p. 148. — Sacc. Syll. IV, 148. — Tronçons de Choux.

10. **Tuberculariaria liceoides** Fr. — Oud. N. K. A. 2, V, 514; ibid. 3, I, 134. — Sacc. Syll. IV, 640. — Ram. de l'*Acer campestre*.

11. **Tuberculariaria minor** Lk. — Sacc. Syll. IV, 639. Selon Sacc. une combinaison des T. Acaciae Fr. et discoidea P.

12. **Tuberculariaria mutabilis** Nees. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 148. — Sacc. Syll. IV, 641. — Ram. du *Kerria japonica*.

13. **Tuberculariaria nigricans** (Bull.) Lk. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 149. — Sacc. Syll. IV, 640. — Ram. du *Pinus silvestris*.

14. **Tuberculariaria polycephala** Lév. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 149. — Sacc. Syll. IV, 643. — Racines d'arbres déterrées.

15. **Tuberculariaria Pseud-Acaciae** Rebent. — Oud. Arch. Néerl. VIII (1873), 386. — Ram. du *Robinia Pseudo-Acacia*.

16. **Tuberculariaria Ptelcae** Oud. N. K. A. 3, II, 925. — Ram. du *Ptelea trifoliata*.

17. **Tuberculariaria Rubi** Rab. — Oud. N. K. A. 2, V, 514; ibid. 3, I, 134. — Sacc. Syll. IV, 606. — Tiges d'une espèce de *Rubus*.

18. **Tuberculariaria Sambuci** Cda. — Oud. N. K. A. 3, I, 532; ibid. 3, I, 134. — Ram. du *Samb. nigra*.

19. **Tuberculariaria vulgaris** Tode. — T. N. G. XI, 404. — Prodr.

Fl. Bat. II. 1, p. 148; N. K. A. 2, V, 591 et 3, I, 134. — Sacc. Syll. IV, 638. — Ram. de plusieurs arbres.

DENDRODOCHIUM.

1. **Dendrodochium Padi** Oud. — N. K. A. 2, V, 514; ibid. 3, I, 133. — Sacc. Syll. X, 706. — Ram. du *Prunus Padus*.

ILLOSPORIUM.

1. **Illosporium carneum** Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 1, p. 39. — Sacc. Syll. IV, 657. — Thallus des espèces de *Peltigera*.

2. **Illosporium coccineum** Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 1, p. 39. — Sacc. Syll. IV, 657. — Thallus de plusieurs Lichens.

3. **Illosporium cretaceum** Oud. — N. K. A. 2, IV, 242. — Sacc. Syll. IV, 659. — F. du *Prunella vulgaris*.

4. **Illosporium Populi** Oud. — N. K. A. 2, V, 515; ibid. 3, I, 134. — Sacc. Syll. X, 711. — Ram. décortiqués d'un *Populus*.

5. **Illosporium roseum** (Schreb.) Mart. — T. N. G. XI, 101. — Sacc. Syll. IV, 657. — Thallus du *Parmelia ciliaris*.

PHYLLOEDIA.

1. **Phyllocdia fagina** (Lib.) — Sacc. Syll. IV, 661. — Myxosporium fagineum Cda. — Prodr. Fl. Bat. II, 1, 157. — F. pourrissantes du *Fagus silvatica*.

2. **Phyllocdia punicea** (Lib.) — Sacc. Syll. IV, 661. — Myxosporium puniceum Cda. — Arch. Néerl. VIII (1873), 387; N. K. A. 1, V, 350. — Mousses et Lichens.

AEGERITA.

1. **Aegerita candida** P. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 17. — Sacc. Syll. 661. — Troncons d'arbres pourris.

SPHACELIA.

1. **Sphacelia typhina** (P.) Sacc. Syll. IV, 666. — N. K. A. 3, II, 321. — Gaines des f. du *Dactylis glomerata*.

HYMENULA.

Hymenula Arundinis Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 1, p. 153. — Voir: *Hymenopsis*.

1. **Hymenula bicolor** Oud. N. K. A. 2, IV, 553. — Sacc. Syll. X, 712. — Bois de Pin ramolli.

2. **Hymenula Psammae** Oud. Hedw. 1898, p. 184; id. N. K. A. 3, I, 532; Zitt. Versl. K. A. v. W. 1900, p. 392. — Sacc. Syll. XVI, 1094. — Chaumes du *Psamma littoralis* (Ammophila arenaria).

3. **Hymenula rubella** Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, 153. — Sacc. Syll. IV, 670. — Gaînes du *Typha latifolia*.

4. **Hymenula vulgaris** Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 152; Oud. N. K. A. 2, I, 313; Arch. Néerl. VIII, 352; XIV, 318. — Sacc. Syll. IV, 668. — Tiges pourrissantes du *Ricinus communis*.

CYLINDROCOLLA.

1. **Cylindrocolla Urticae** (P.) Bon. — Prodr. Fl. Bat. II, 3, p. 393 et 4, p. 5. — N. K. A. 3, I, 134. — Sacc. Syll. IV, 674. — Fusarium tremelloides Grev. — T. N. G. XI, 404; Oud. Arch. Néerl. II (1867), 40. — Dacrymyces Urticae Cda. — N. K. A. 1, I, 50. — Tiges pourrissantes des *Urtica*.

PATELLINA.

1. **Patellina cinnabarina** (Sacc.) Speg. — Oud. N. K. A. 3, II, 778. — Sacc. Syll. IV, 278. — Bois ramolli du *Fagus silvatica*.

2. **Patellina Ilicis** Oud. N. K. A. 3, II, 924. — Ram. de l'*Ilex Aquifolium*.

PERIOLA.

1. **Periola tomentosa** Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 147. — Sacc. Syll. IV, 681. — Pommes de terre pourrissantes.

VOLUTELLA.

1. **Volutella Buxi** (Cda.) Berk. Br. — Oud. N. K. A. 2, IV, 553. — Sacc. Syll. IV, 685. — Chaetostroma Buxi Cda. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 147. — F. pourrissantes du *Buxus sempervirens*.

2. **Volutella chalybea** Oud. N. K. A. 2, IV, 242. — Sacc. Syll. IV, 684. — Crottin de lapin.

3. **Volutella ciliata** (A. S.) Fr. var. **stipitata** (Lib.) Sacc. Syll. IV, 683. — Oud. N. K. A. 2, VI, 243. — Chaetostroma stipitatum Cda. — Versl. Med. K. A. v. W. 2, XVIII, 375. — Crottin de lapin.

4. **Volutella comata** Ellis. — Oud. N. K. A. 2, VI, 62. — Sacc. Syll. IV, 683. — Ram. du *Coronilla glauca*.

5. **Volutella Dahliae** Oud. Beibl. z. bot. Centrbl. 1902; id. N. K. A. 3, II, 778. — Tiges du *Dahlia variabilis*. — Pas synonyme avec le V. Georginae (Cda) Sacc.

6. **Volutella gilva** (P.) Sacc. Syll. IV, 686. — Psilonia gilva Fr. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 139. — Tiges desséchées des *Urtica*.

7. **Volutella Nicotianae** Oud. N. K. A. 3, II, 925. — F. pourrissantes du *Nicotiana Tabacum*.

2. Hyalophragmiae.

FUSARIUM.

1. **Fusarium apiogenum** Sacc. Syll. IV, 717. — N. K. A. 3, II, 322. — Fruits pourrissants du *Pirus Malus*.

2. **Fusarium Asperifoliorum** (West.) Sacc. Syll. IV, 703. — Selenosporium Asperif. West. Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 160. — F. fanées du *Symphytum officinale*.

3. **Fusarium aurantiacum** (Lk.) Sacc. Syll. IV, 705. — Oud. N. K. A. 3, I, 532. — Fusisporium aurantiacum Lk. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 136. — Fruits du *Cucurbita Pepo* pourrissants.

4. **Fusarium caeruleum** (Lib.) Sacc. Syll. IV, 705. — Fus. violaceum Fuck. — Oud. Arch. Néerl. II (1867), 40. — Pommes de terre en pourriture.

5. **Fusarium Caricis** Oud. Versl. Med. K. A. v. W. 3, VII (1890), 325, id. N. K. A. 2, VI, 64; ibid. 3, I, 135. — Sacc. Syll. X, 726. — F. d'une espèce de *Carex*.

6. **Fusarium desciscens** Oud. N. K. A. 2, V, 515; ibid. 3, I, 135. — Sacc. Syll. X, 722. — Ram. jeunes desséchés du *Sarothamnus scoparius*.

7. **Fusarium diplosporum** Cooke et Ellis. — Oud. N. K. A. 2, VI, 63; ibid. 3, I, 135. — Sacc. Syll. IV, 701. — Tiges du *Solanum tuberosum*.

8. **Fusarium Equiseti** (Cda) Sacc. Syll. IV, 707. — Oud. N. K. A. 3, I, 532; ibid. p. 135. — Tiges de l'*Eq. limosum*.

9. **Fusarium Equisetorum** (Lib.) Desm. — Prodr. Fl. Bat. II, 1, p. 150; Oud. Versl. Med. K. A. v. W. 2, XVIII, 375; id. N. K. A. 2, IV, 212. — Sacc. Syll. IV, 718. — Vieilles tiges de l'*Eq. limosum*.

10. **Fusarium Fuckelii** Sacc. Syll. IV, 695. — Oud. N. K. A. 3, III, 1131. — Ram. du *Buxus sempervirens*.

11. **Fusarium graminum** Cda. — Oud. N. K. A. 2, VI, 64; ibid. 3, I, 135. — Sacc. Syll. IV, 707. — Tiges du *Psamma littoralis* (Ammophila aren.)

12. **Fusarium herbarum** (Cda) Fr. — Oud. N. K. A. 2, VI, 63. — Sacc. Syll. IV, 701. — Tiges du *Cheiranthus Cheiri*.

13. **Fusarium heterosporum** Nees. — Oud. N. K. A. 2, VI, 64. — Sacc. Syll. IV, 707. — F. heterosporium T. N. G. XI, 104 et Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 149. — Spicules du *Lolium perenne*, et du *Glyceria fluitans*.

14. **Fusarium incarnatum** (Desm.) Sacc. Syll. IV, 712. — Oud. N. K. A. 2, V, 516. — Calyces mûrs du *Githago arvensis*.

15. **Fusarium insidiosum** Sacc. Syll. IV, 707. — Oud. N. K. A. 2, IV, 554. — Gaînes des feuilles de l'*Agrostis vulgaris*.

16. **Fusarium Iridis** Oud. N. K. A. 2, V, 515; ibid. 3, I, 135. — Sacc. Syll. X, 725. — F. de l'*Iris Pseudacorus*.

17. **Fusarium lateritium** Nees. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 150; Oud. N. K. A. 3, I, 532; ibid. p. 134. — Sacc. Syll. IV, 694. — Ram. du *Robinia Pseudo-Acacia*.

18. **Fusarium Lolii** (W. Smith) Sacc. Syll. XI, 652. — N. K. A. 3, II, 322. — Fruits du *Lolium perenne*.

19. **Fusarium Lycopersici** Sacc. Syll. IV, 705. — Oud. N. K. A. 3, I, 532. — Fruits du *Lycopersicum esculentum*.

20. **Fusarium Mali** Allescher. Verz. Süd. Bayer. Pilze III (1891), 130. — Sacc. Syll. XI, 650. — Oud. N. K. A. 3, III, 1131. — Ram. du *Pirus Malus*.

21. **Fusarium Nicotianae** Oud. Beibl. z. bot. Centr. Bl. 1902; id. N. K. A. 3, II, 777. — F. pourrissantes du *Nicotiana Tabacum*.

22. **Fusarium Opuli** Oud. Hedw. 1898, p. 318; id. Zitt. Versl. K. A. v. W. 1900, p. 393. — Sacc. Syll. XVI, 1101. — Ram. du *Viburnum Opulus*.

23. **Fusarium oxysporum** Schlecht. — Oud. Arch. Néerl. VIII (1873), 386; id. N. K. A. 2, I, 178. — Sacc. Syll. IV, 705. — Pommes de terre pourrissantes.

24. **Fusarium pallens** Nees. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 149. — Sacc. Syll. IV, 695. — Ram. du *Robinia Pseudo-Acacia*.

25. **Fusarium Pandani** (Cda) Sacc. Syll. IV, 721. — Oud. N. K. A. 2, V, 516. — Ram. d'un *Pandanus* cultivé.

***Fusarium pezizoides** Desm. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 150. — Voir: *Gloeosporium paradoxum*.

26. **Fusarium Platanoidis** Oud. — N. K. A. 3, III, 1131. — Ram. de l'*Acer platanoides*.

27. **Fusarium pyrochroum** (Desm.) Sacc. Syll. IV, 694. — Oud. Arch. Néerl. VIII (1873), 386; id. N. K. A. 2, I, 261; ibid. 3, I, 135. — Selenosporium pyrochr. Desm. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 159. — Ram. du *Sambucus nigra*.

28. **Fusarium quercicola** Oud. N. K. A. 3, II, 777. — F. du *Quercus rubra*.

29. **Fusarium roseum** Lk. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 149; N. K. A. 3, I, 135. — Sacc. Syll. IV, 699. — Tige du *Malva silvestris* et tronçons de Choux pourrissants.

30. **Fusarium salicinum** C'da. — Oud. Arch. Néerl. VIII (1873), 386. — Sacc. Syll. IV, 715. — Ram. d'une espèce de *Salix*.

31. **Fusarium sambucinum** Fuck. — N. K. A. 3, I, 135. — Sacc. Syll. IV, 695. — Ram. du *Sambucus nigra*.

32. **Fusarium sarcochroum** (Desm.) Sacc. Syll. IV, 694. — Oud. N. K. A. 2, VI, 63; ibid. 3, I, 135. — Selenosporium sarcochr. Desm. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 160. — Ram. du *Cytisus Laburnum*.

33. **Fusarium Sclerodermatis** Oud. — N. K. A. 2, V, 516; ibid. 3, I, 135. — Sacc. Syll. X, 727. — *Scleroderma vulgare*.

34. **Fusarium Solani** (Mart.) Sacc. Syll. IV, 705. — N. K. A. 3, II, 322. — Pommes de terre pourrissantes.

35. **Fusarium stictoides** Dur. et Mont. — Oud. Arch. Néerl. VIII (1873), 386; id. N. K. A. 2, I, 178. — Sacc. Syll. IV, 706. — F. pourrissantes d'un *Agave americana*.

36. **Fusarium subcorticale** Oud. — N. K. A. 3, I, 135. — Tronc mort d'un *Buxus sempervirens*.

37. **Fusarium subtectum** Rob. Desm. — Oud. Arch. Néerl. VIII (1873), 386; id. N. K. A. 2, I, 178. — Sacc. Syll. IV, 724. — F. du *Psamma littoralis* = Ps. arenaria.

***Fusarium sulphureum** Schlecht. — T. N. G. XII, 274; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 150. — Voir: *Fusidium*.

***Fusarium tremelloides** Grev. — T. N. G. XI, 404; Arch. Néerl. II, 10. — Voir: *Cylindrocolla Urticae*.

***Fusarium violaceum** Fuck. — Arch. Néerl. II, 10. — Voir: *Fus. caeruleum*.

38. **Fusarium viticolum** Thüm. Die Pilze u Pocken auf Wein u. Obst. 1885, p. 52. — Sacc. Syll. IV, 696. — Oud. N. K. A. 3, III, 1131. — Ram. de *Ampelopsis quinquefolia*.

39. **Fusarium Urticearum** (C'da) Sacc. Syll. IV, 698. — Oud. Arch. Néerl. VIII (1873), 386; id. N. K. A. 2, I, 178; ibid. 3, I, 135. — Ram. du *Morus nigra*.

40. **Fusarium Zeae** (West.) Sacc. Syll. IV, 713. — N. K. A. 3, II, 322. — Chaumes du *Zea Mays* pourrissants.

FUSISPORIUM.

***Fusisporium aureum** Lk. — N. K. A. 2, I, 181. Arch. Néerl. VIII, 392. — Voir: *Cylindrium aureum*.

*Fusisporium aurantiacum Link. — Prodr. Fl. Bat. II. 4, p. 136. — Voir: *Fusarium.*

*Fusisporium rhizophilum West. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 136. — Voir: *Pionnotes.*

*Fusisporium udum Berk. — Oud. N. K. A. 2, III, 155. — Voir: *Pionnotes uda.*

PIONNOTES.

1. **Pionnotes rhizophila** (Cda.) Sacc. Syll. IV, 727. — Fusisporium rhizophilum West. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 136. — Tubercules pourrissants du *Solanum tuberosum*; racines charnues du *Dahlia variabilis* et du *Beta vulgaris* var. *Rapa.*

2. **Pionnotes uda** (Berk.) Sacc. Syll. IV, 726. — Oud. N. K. A. 3, I, 533. — Fusisporium udum Berk. Oud. N. K. A. 2, III, 155. — Fusisporium aurantiacum Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 136, pour ce qui concerne le cort. Ulmi. — Disque ligneux d'un tronc de Chêne abattu.

β. Dematieae.

1. Phaeosporae.

EPICOCCUM.

1. **Epicoccum micropus** Cda. — N. K. A. 3, II, 322. — Sacc. Syll. IV, 739. — Surface d'un chapeau pourri du *Boletus edulis.*

2. **Epicoccum neglectum** Desm. — Oud. Arch. Néerl. VIII (1873), 387; id. N. K. A. 2, I, 178. — Sacc. Syll. IV, 737. — F. du *Sagittaria sagittifolia.*

3. **Epicoccum nigrum** Lk. — Oud. N. K. A. 3, II, 924. — Sacc. Syll. IV, 736. — Tige du *Solidago Virga aurea* et f. du *Liriodendrum tulipifera.*

4. **Epicoccum purpurascens** Ehrb. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 147; id. N. K. A. 2, V, 516; ibid. 3, I, 135 (E. purpureum) Sacc. Syll. IV, 736. — F. et tige du *Zea Mays*; tiges de l'*Asparagus officinalis.*

5. **Epicoccum scabrum** Cda. — Oud. Arch. Néerl. VIII (1873) p. 387; id. N. K. A. 2, II, 11. — Sacc. Syll. IV, 739. — Tige du *Zea Mays.*

6. **Epicoccum vulgare** Cda. — N. K. A. 3, II, 323. — Sacc. Syll. IV, 737. — F. du *Lilium lanceolatum.*

STRUMELLA.

1. **Strumella piricola** Oud. N. K. A. 3, II, 925. — Ram. vivants du *Pirus communis*.

HYMENOPSIS.

1. **Hymenopsis Arundinis** (Fr.) Sacc. Syll. IV, 745. — Hymenula Ar. Fr. Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 153. — Chaumes du *Phragmites communis*.

CHAETOSTROMA.

***Chaetostroma Buxi** Cda. — Prodr. Fl. Bat. II, 4; p. 147. — Voir: *Volutella*.

1. **Chaetostroma Cliviae** Oud. Zitt. Versl. K. A. v. W. 1896, p. 226 et 1900, p. 393; id. Hedw. 1898, p. 184; id. N. K. A. 3, I, 523. — Sacc. Syll. XIV, 1130. — F. du *Clivia nobilis*.

MYROTHECIUM.

1. **Myrothecium inundatum** Tode. — N. K. A. 1, V, 347 (au lieu de „nundatum" lisez „inundatum"). — Oud. Versl. Med. K. A. v. W. 2, XVIII, 375; id. Arch. Néerl. VIII (1873), 387, id. N. K. A. 2, IV, 242. — Sacc. Syll. IV, 751. — Chapeau du *Russula nigricans*.

2. Phragmosporae.

EXOSPORIUM.

***Exosporium bispidulum** Lk. — Prodr. Fl. Bat. II, 4. p. 157. — Voir: *Vermicularia*.

***Exosporium hypodermium** Lk. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 157. — Voir: *Vermicularia*.

1. **Exosporium Tiliae** Lk. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 157; N. K. A. 3, I, 136. — Sacc. Syll. IV, 755. — Helminthosporium Tiliae Fr. — T. N. G. XI, 102. — Ram. du *Tilia cordata*.

EXOSPORINA.

1. **Exosporina Laricis** Oud. Zitt. V. d. K. A. v. W. 1904, 745; N. K. A. 3, III, 1130.

†[61] Mycelia sterilia.

A. **Tuberculiformia.**

SCLEROTIUM.

1. **Sclerotium albidum** Rob. et Desm. Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 26. — Sacc. Syll. XIV, 1158. — Sarments du *Vitis vinifera*.

2. **Sclerotium Brassicae** P. — N. K. A. 1, I, 51; ibid. 3, II, 323. — Sacc. Syll. XIV, 1164. — F. d'une espèce de *Brassica* cultivée.

3. **Sclerotium bulborum** Wakker („Het zwart Snot" etc.) Haarlem 1884. — Oud. N. K. A. 2, IV, 260, sub. n° 155, sans nom. — Bulbes du *Hyacinthus orientalis*.

4. **Sclerotium bullatum** D. C. — N. K. A. 3, II, 323. — Sacc. Syll. XIV, 1165. — Fruits des *Cucumis Melo*, *Cucurbita melasperma*, *Cucumis sativus* et *Aesculus Hippocastanum*.

5. **Sclerotium cepivorum** Berk. — Oud. N. K. A. 3, II, 778. — Sacc. Syll. XIV, 1151. — Entre les écailles des bulbes de l'*Allium Cepa*.

6. **Sclerotium Clavus** D. C. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 25; N. K. A. 2, V, 596; Flor. Bat. tab. 626. — Sacc. Syll. XIV, 1151. — Spermoedia Clavus Fr. — T. N. G. XI, 392. — A la place de l'ovaire chez *Secale cereale*, *Triticum*, *Lolium*, *Agropyrum*, *Arundo*, *Glyceria*.

7. **Sclerotium compactum** D. C. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 27. — Sacc. Syll. XIV, 1165. — Pédoncules, réceptacles et graines de l'*Helianthus*, et fruits des Cucurbitacées.

8. **Sclerotium complanatum** Tode. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 28. — Sacc. Syll. XIV, 1110. — S. populinum P. — T. N. G. XI, 391. — F. pourrissantes d'un Peuplier.

9. **Sclerotium corrugatum** Fr. — N. K. A. 3, II, 323. — Sacc. Syll. XIV, 1160. — Tige de l'*Althaea rosea*.

10. **Sclerotium crustuliforme** Rob. Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 28. — Sacc. Syll. XIV, 1169. — Entre les faisceaux vasculaires dégagés des pétioles de plusieurs arbres.

11. **Sclerotium durum** P. — T. N. G. XI, 391; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 26; N. K. A. 2, V, 596. — Sacc. Syll. XIV, 1165. — Tiges desséchées de plusieurs pl. herbacées. (Ombellifères, Composites, *Solanum tuberosum*, *Calystegium sepium*, *Polygonum aviculare*, etc.)

12. **Sclerotium fibrillosum** Lib. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 28.

— Sacc. Syll. XIV, 1148. — Sur la tannée dans les serres chaudes.

13. **Sclerotium lejodermum** Rob. et Desm. — Prodr. Fl. Bat. II. 4, p. 27. — Sacc. Syll. XIV, 1166. — Tiges mortes du *Polygonum Persicaria.*

14. **Sclerotium Liliaceaeum** West. Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 27. — Tiges, f. etc. des *Scilla nutans*, *Allium vineale* et *Tulipa* (Scl. Tulipae Lib. et var. Hyacinthi Gnép. chez. Sacc. Syll. XIV, 1172).

15. **Sclerotium medullosum** Rob. et Desm. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 29. — Sacc. Syll. XIV, 1158. — Ram. ramollis de l'*Ulmus campestris.*

16. **Sclerotium muscorum** P. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 27. — Sacc. Syll. XIV, 1154. — Rhizoïdes des Mousses.

17. **Sclerotium Nicotianae** Oud. et Kon. Zitt. Versl. K. A. v. W. 30 Mai 1903, p. 48—59 = Proceedings of the Meeting of the Royal Acad. of Sciences on May 30 1903, p. 48—58. — F. et ram. du *Nicotiana Tabacum.*

18. **Sclerotium Patouillardi** Sacc, et Sydow. dans Sacc. Syll. XIV, 1152. — N. K. A. 3, II, 323. — Bractées du *Zea Mays.*

19. **Sclerotium pezizaeforme** Schwein. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 28. — Sacc. Syll. XIV, 1146. — F. tombées des Peupliers.

20. **Sclerotium pirinum** (Nees) Fr. — Prodr. Fl, Bat. II, 4, p. 27. — Sacc. Syll. XIV, 1167. — Fruits des Pomacées. (*Pirus*, *Cydonia*, etc.)

***Sclerotium populinum** P. T. N. G. XI, 391. — Voir: *Scl. complanatum.*

21. **Sclerotium Pustula** D. C. — Prodr. Fl. Bat. II, 4. p. 26. — Sacc. Syll. XIV, 1168. — S. quercinum N. K. A. 1, I, 51. — F. mortes du *Quercus Robur.*

β. **epicaula** West. Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 26. — Tige du *Solanum tuberosum.*

***Sclerotium quercinum** Grev. — N. K. A. 1, I, 51. — Voir: *Scl. Pustula.*

22. **Sclerotium rhizodes** Auersw. — N. K. A. 3, II, 323. — Sacc. Syll. XIV, 1154. — F. d'une Graminée.

23. **Sclerotium scutellatum** A. S. — N. K. A. 1, I, 51; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 28. — Sacc. Syll. XIV, 1146. — F. pourrissantes.

24. **Sclerotium Semen** Tode. — T. N. G. XI, 391; Prodr. Fl. Bat, II, 4, p. 28. — Sacc. Syll. XIV, 1142. — Tiges du *Solanum tuberosum* et du *Lappa officinalis*; f. des *Populus.*; fr. du *Fraxinus excelsior.*

25. **Sclerotium sinapispermum** West. Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 29. — Tannée dans les serres.

26. **Sclerotium tectum** Fr. — N. K. A. 3, II, 324. — Sacc. Syll. XIV, 1140. — F. et fr. du *Phaseolus nanus*.

27. **Sclerotium Uvae** Desm. — Oud. N. K. A. 3, I, 535. — Sacc. Syll. XIV, 1167. — Baies du *Vitis vinifera*.

28. **Sclerotium variegatum** Wallr. Fl. Bat. II, 4, p. 29. — Sacc. Syll. XIV, 1172. — A l'intérieur des tiges de pl. herbacées robustes.

29. **Sclerotium varium** P. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 27. — Sacc. Syll. XIV, 1166. — Pommes de terre, Carottes et Navets, conservés dans les caves ou enfouis dans les fosses.

RHIZOCTONIA.

1. **Rhizoctonia violacea** Tul. — Oud. N. K. A. 3, I, 535. — Sacc. Syll. XIV, 1175. — Racine du *Beta vulgaris* var. *Rapa*.

B. **Maculiformia.**

ECTOSTROMA.

1. **Ectostroma Iridis** Fr. — T. N. G. XI, 397. — Sacc. Syll. XIV, 1179. — F. de l'*Iris Pseudacorus*.

2. **Ectostroma Liriodendri** Fr. — T. N. G. XI, 397; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 120. — Sacc. Syll. XIV, 1177. — F. du *Liriodendrum tulipiferum*.

3. **Ectostroma parvimaculatum** Oud. N. K. A. 3, II, 926. — F. du *Cornus alba*.

4. **Ectostroma Sedi** Fr. — T. N. G. XI, 396; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 120. — Sacc. Syll. XIV, 1179. — F. et tige du *Sedum maximum*.

5. **Ectostroma Triglochinis** Oud. N. K. A. 3, II, 324; id. Zitt. Versl. K. A. v. W. 1900, p. 393. — Tiges desséchées du *Triglochin palustre*.

C. **Radiciformia.**

RHIZOMORPHA.

1. **Rhizomorpha divergens** Grev. — T. N. G. XI, 402. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 143. — Sacc. Syll. XIV. 1180. — Sous l'écorce des Pins.

2. **Rhizomorpha intestinalis** P. — T. N. G. XI, 402; Prodr.

Fl. Bat. II, 4, p. 144. — Bois d'un tronc d'*Ulmus campestris*. — Vraisemblablement en réalité les raies noires appartiennent au strome d'une espèce de *Diaporthe*.

***Rhizomorpha parallela** Rob. et Desm. — N'appartient pas à la Classe des champignons, mais représente une collection de tubes tannifères parallelles, d'abord achromes, plus tard très foncées, à la surface de la moëlle de Sureau (*Sambucus nigra*). A comparer notre „Étude sur une espèce spéciales de tubes, existant dans le tronc du Sureau (*Sambucus nigra*) et pris jusqu'ici pour un champignon (Rhizomorpha parallela Rob. et Desm.)". — (Arch. Néerl. VII (1872).

3. **Rhizomorpha setiformis** Roth. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 144. — s'Étendant sur les Mousses, dans les endroits humides.

1. **Rhizomorpha subcorticalis** P. — T. N. G. XI, 402; Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 113. — Sacc. Syll. XIV, 1180. — Sous l'écorce des troncs de plusieurs arbres. — Idem. bysso obducta (= *Rh. vestita* Rebt.), Oud. N. K. A. 3, II, 926.

D. Clavariformia.

ANTHINA.

1. **Anthina flammea** (Roth.) Fr. — Oud. N. K. A. 2, V, 175. — Sacc. Syll. XIV, 1185. — F. pourrissantes du *Fagus silvatica*.

E. Byssiformia.

ATHELIA.

1. **Athelia epiphyila** P. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 146.

OZONIUM.

1. **Ozonium auricomum** Lk. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 144; N. K. A. 2, V, 596. — Sacc. Syll. XIV, 1187. — Oz. fulvum P.; T. N. G. XI, 402. — Bois ramolli.

2. **Ozonium castaneum** Wallr. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 144. — Sacc. Syll. XIV, 1187. — Bois de Chêne pourrissant.

Ozonium fulvum P. — T. N. G. XI, 402. — Voir: *Oz. auricomum*.

3. **Ozonium parietinum** Lk. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 144. Sacc. Syll. XIV, 1188. — Murs humides.

4. **Ozonium stuposum** P. — N. K. A. 3, II, 325. — Sacc. Syll. XIV, 1188. — Planches d'une vieille porte souterraine.

RHACODIUM.

1. **Rhacodium cellare** P. — Sacc. Syll. XIV, 1189. — Antennaria cellaris Fr. — T. N. G. XI, 400. — Zasmidium cellare N. K. A. 2, V, 596. — Surface des tonneaux de vin, longtemps relégués dans les caves.

2. **Rhacodium nigrum** (Lk.) Schum. Saell. II, 147. — Sacc. Syll. XIV, 1189. — N. K. A. 3, III, 1131.

HYPHA.

1. **Hypha bombycina** P. — T. N. G. XII, 274. — Sacc. Syll. XIV, 1192. — Byssus floccosa Schreb. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 144. — Bois et pierres dans les caves et les souterrains.

2. **Hypha elongata** P. — N. K. A. 3, II, 325. — Sacc. Syll. XIV, 1194. — Bois ramolli suffoqué dans les souterrains.

3. **Hypha membranacea** (Humb.) P. Myc. Eur. I, 66. — Sacc. Syll. XIV, 1193. — Oud. in herb.

*BYSSUS.

***Byssus floccosa** Schreb. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 144. — Voir: *Hypha bombycina*.

HIMANTIA.

1. **Himantia candida** P. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 145; N. K. A. 3, II, 325. — Sacc. Syll. XIV. 1195. — F. tombées pourrissantes.

2. **Himantia helvola** P. — N. K. A. 3, II, 325. — Sacc. Syll. XIV, 1196. — Bois ramolli.

3. **Himantia nitens** P. — Oud. N. K. A. 3, I, 535. — Sporotrichum nitens P. — T. N. G. XII, 274. — F. de chêne tombées.

4. **Himantia radians** P. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, 115. — Sacc. Syll. XIV, 1195. — F. tombées dans les bois.

5. **Himantia ramosissima** Sow. — N. K. A. 3, II, 325. — Sacc. Syll. XIV, 1196. — Surface de pots-à-fleurs entassés sur une planche dans une serre.

6. **Himantia rufipes** Chev. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 115. — Tonneaux délabrés dans les serres et les caves.

7. **Himantia subcorticalis** P. — N. K. A. 3, II, 326. — Sacc. Syll. XIV, 1195. — Entre les lames d'une écorce surannée pourrissante d'un Peuplier.

F. **Membraniformia.**

XYLOSTROMA.

1. **Xylostroma giganteum** Tode. — Prodr. Fl. Bat. II, 4, p. 145. — N. K. A. 3, II, 326. — Sacc. Syll. XIV, 1197. — Fentes dans le corps ligneux d'arbres languissants, et planches ramollies de bâtiments abandonnés.

APPENDIX.

II. ASCOMYCETES.

1. DISCOMYCETES.

1. **Sclerotinia Richteriana** P. Hennings et Staritz. — Rhizomes du *Polygonatum multiflorum*. — Nunspeet, 16 Avril 1904; Mr. Beins.

VI. DEUTEROMYCETES.

1. SPHAEROPSIDACEAE.

1. **Diplodina Populi** (Delacr.) Allescher, forma *Populi albae* var. *niveae*. — Sporulis hyalinis, oblongiusculis, medio septatis, utrimque obtusis vel obtusiusculis, rectis vel subcurvatis, 7 × 2 μ. chlorinis. — In ramis *Pop. albae* var. *niveae*.

2. **Camarosporium Populi** Oud. — Peritheciis laxe caespitosis, sub peridermate occultatis, $^1/_2$ mill. in diam., nigrellis; sporulis cylindraceis, utrimque rotundatis, 10—18 × 8—9 μ, vulgo 3-septatis, loculis nunc continuis, tunc iterum uno vel altero, imo binis septo declivi divisis.

3. **Hendersonia heterospora** Pass. Diagn. IV in Atti R. Acc. d. Lincei VI (1889), 466; Sacc. Syll. X, 327; Wint. Kr. Fl. VII, 221. — Gaînes du *Phragmites communis*. — Nunspeet, Juill 1904; Mr. Beins.

4. **Leptostroma austriacum** Oud. — Zitt. V. K. A. v. W. 6 Oct. 1904, p. 294. — Aiguilles du *Pinus austriaca*. — Nunspeet, 29 Sept. 1904, p. 294.

5. **Phoma delitescens** (Wallr.) Sacc. Syll. III, 105. — Oud. in herb. — F. et ram. du *Buxus sempervirens*.

6. **Stagonospora gigaspora** (Niessl) Sacc. Syll. III, 453; Wint. Kr. Fl. VI, 970. — Hendersonia gig. Niessl Hedw. 1882, p. 181. — F. du *Carex riparia*, 5 Mai, 1903.

MELANCONIACEAE.

1. **Cryptosporium Baptisiae** Oud. — Acervulis numerosis, circularibus, parum prominulis, $^1/_4$—$^1/_2$ mill. in diam. — Conidiis breve pedicellatis; bacillis continuis, hyalinis, 16—19 × 2—$2^1/_3$ μ. — Tige du *Baptisia australis*.

MUCEDINACEAE.

1. **Clonostachys Populi** Harz. — Hyphomyceten, p. 29. — Écorce putrescente de l'*Aesculus Hippocastanum*.

2. **Ovularia necans** (Pass.) Sacc. Syll. X, 540. — Ramularia Passerini in Thüm. M. U. n° 1669. — F. du *Cydonia vulgaris*.

DEMATIACEAE.

1. **Heterosporium Ornithogali** Klotzsch. Herb. Mycol. I, n° 69; Cooke Grev. V, 123; id. Black Moulds tab. 25 f. 13; Helminthosp. echinulatum Cooke IV, tab. 63 f. 8; Sacc. Syll. IV, 480. — F. de l'*Ornith. umbellatum*.

ABBRÉVIATIONS.

⊙ = inconnu.
† = pas encore rencontré dans les Pays-Bas.
! = indigène.
A. N. H. = Annals of Natural History.
Arch. Néerl. = Archives Néerlandaises. Tomes II (1867), VII (1872), VIII (1873), XIV (1879) et XV (1880).
A. S. N. = Annales des Sciences Naturelles.

TITRES D'OUVRAGES CONSULTÉS.

Albertini (J. B. von) et **Schweinitz.** Conspectus fungorum in Lusatiae Superiores agro Niskiensi crescentium. — Lipsiae 1805; 1 vol. in 8°.

Batsch (A. J. G. C.) — Elenchus Fungorum. Halae 1783; 4°. — Continuatio 1ª 1786; Cont. 2ª 1789.

Battarra (A.) — Fungorum agri Arriminensis Historia. — Faventiae 1755; 1 vol. in 4°.

Berkeley (M. J.) — Outlines of British Fungology. — London 1860; 8°.

Berkeley and **Broome**, in Annals of Natural History.

Bolton (J.) Geschichte der merkwürdigsten Pilze, übersetzt von Willdenow u. Nees ab Esenbeck. — Berlin 1795—1820; 4 vol. in 8°.

Bonorden (H. F.) — Handbuch der allgemeinen Mycologie. — Stuttgart, 1851; 1 vol. in 8°.

Brondeau. — Cryptogames de l'Agenais. — 1828—1830.

Bulliard (P.) Herbier de la France, etc. — Paris 1780—1795. — Atlas de 602 pl. coloriées. Collection complette de plantes indigènes de ce Royaume (champignons).

Buxbaum (J. C.) — Plantarum minus cognitarum Centuriae. — Petropol. 1728—1740. Cent. 5, in 4°.

Idem. — Enumeratio plantarum accuratior in agro Halensi locisque vicinis crescentium, etc. — 1721; 1 vol. in 8°.

Chevalier (F. F.) Flore générale des environs de Paris, 1826—1827; 3 vol. in 8°.

Coemans (E.) Notices 1 à 10, dans Bulletin de la Soc. r. de Bot. de Belgique; tome I et suivants.

Cooke (M. C.) — Handbook of British Fungi. — London 1871—1883, in 8°.

Idem. — The Myxomycetes of Great Britain. — London 1877; 1 vol. in 8°.

Corda (A. K. J.) — Icones Fungorum hucusque cognitorum. — Pragae 1837—1854; 6 vol. in folio.

De Candolle (A. P.) et **de Lamarck (J. B.)** — Flore Française. — Paris 1805—1815; 6 vol. in 8°.

Ehrenberg (C. G.) — Sylvae Mycologicae Berolinenses. — Berolini 1818; 1 vol. in 4°.

Ehrhart (F.) — Beiträge z. Naturkunde, etc. — Hannover et Osnabrück; 1787—1792; 7 vol. in 8°.

Flora Batava. — 1800—1904; XVI vol. in 4° avec 1724 pl. coloriées.

Flora Danica. — 1761—1880; XVI vol. in fol. avec 2880 pl. coloriées.

Fresenius (J. B. G. W.) — Beiträge zur Mycologie. — Frankf. a/M., 1850—1863; 3 Hefte in 4°.

Fries (E.) Hymenomycetes Europaei s. Epicriseos Systematis Mycologici Editio altera. — Upsaliae 1874; 1 vol. in 8°.

Idem. Monographia Hymenomycetum Sueciae. — I, 1857; II, 1863 in 8° — Upsaliae.

Idem. — Novae Symbolae Mycologicae. — Upsaliae 1851, in 4°.

Idem. — Systema Mycologicum. — 3 vol. 8°. — Gryphiswaldiae annis 1821—1823.

Idem. — Summa Vegetabilium Scandinaviae. — Holmiae 1846—1849; 1 vol. in 8°.

Idem. — Symbolae Gasteromycetum, etc. — Lundae 1817—1818. — Fasc. 3 in 4°.

Fuckel (L.) — Symbolae Mycologicae. — Wiesbaden 1869; 1 vol. in 8°.

Greville (R. K.) — Flora Edinensis, etc. — Edinburg 1824; 1 vol. in 8°.

Idem. — Scottish cryptogamic Flora, etc. — Edinburg 1823—1829; 6 vol. in 8°.

Grevillea. — A monthly Record of cryptogamic botany, etc. — London, 1872—1905, in 8°.

Hedwigia. — Notizblatt für kryptogamische Studien. — 1851—1905; 8°.

Hoffmann (G. F.) — Deutschlands Flora oder botan. Taschenbuch. — Zweiter Theil; 1795, in 12°.

Idem. — Vegetabilia Cryptogama. — Erlangen I et II; 1787—1790 in 4°.

Holmskjold (T.) Beata ruris otia fungis danicis impensa. — Havniae, 1790—1799; 2 vol. in folio.

Hussey (F. J.) — Illustrations of British Mycology. — London, 1847—1855; 2 vol. in 4°

Jacquin (N. J.) — Miscellanea austriaca etc. — Vindobonae 1778—1781; 2 vol. in 4°.

Kalchbrenner (C.) — Icones selectae Hymenomycetum Hungariae. — Pest 1873; in folio.

Klebahn (H.). — Die wirthswechselnden Rostpilze. — Berlin 1904.

Idem. — Kulturversuche mit Rostpilzen in: Zeitschrift für Pflanzenkrankheiten: II, Heft 5 u. 6 (1er. Bericht); IV, Heft 1 (2er Ber.); V, Heft 13 (3ter Ber.); V, Heft 5 (4ter Ber.); VI, Heft 5 (5ter Ber.); VII (6er Ber.); VIII (6er Ber.); n° 2); IX, (7er Ber.); X, Heft 2; XII (10er Ber.)

Jahrb. f. wissens. Botanik XXXIV (8er Ber.); XXXV (9er Ber.)

Jahrb. der Hamb. wissens. Anstalten 1902 (11er Ber.)

Krombholz (J. V. von) — Naturgetreue Abbildungen und Beschreibungen der..... Schwämme. — Prag, X Hefte in folio; 1831—1847.

Libert (M. A.) — Plantae Cryptogamae quas in Arduenna collegit. — Cent. IV 4°, 1830—1837.

Linnaeus (C.) — Flora Succica. — Stockholm 1745; 1 vol. in 8°.

Linnaeus (C.) — Hortus Cliffortianus. — Amstelodami 1737; 1 vol. in folio.

Link (H. F.) — Observationes in ordines plantarum naturales. Diss. I et II (Berlin 1809 et 1816), citae in Abh. d. Ges. naturf. Freunde etc. Jahrgang 3 et 7.

Lister (A.) — A Monograph of the Mycetozoa. — London 1894.

Martius (K. F. P. von) — Flora cryptogamica Erlangensis. — Norimb. 1817; 1 vol. in 8°.

Massee (G.) — A Monograph of the genus Lycoperdon (Journ. Microsc. Society 1887, p. 701.)

Micheli (P. A.) — Nova Plantarum Genera — Florentiae 1729; 2 vol. in 4°.

Nederl. Kruidk. Archief. — 1e Serie, Deel I—V (1846—1860); 2e Serie, Deel I—VI (1871—1895); 3e Serie, Deel I—III (1899—1904.)

Nees von Esenbeck (C. G.) — Das System der Pilze u. Schwämme. — Würzburg 1817; 1 vol. in 4°.

Oudemans (C. A. J. A.) — Matériaux pour la Flore mycol. de la Néerlande, I et II (Arch. Néerl. II a° 1867, VII, a° 1872 et VIII, a° 1873.)

Idem et **C. J. Koning.** — Prodrome d'une flore mycologique obtenue de la culture sur gélatine préparée de la terre humeuse du Spanderswoud, près de Bussum. 33 pag. et 29 pl. (Arch. Néerl. Série II, Tome VII, 1902, p. 266.

Idem. — Révision des Champignons des Pays-Bas. — I (1892); II (1897.)

Idem. — Zittings-Versl. d. Kon. Akad. v. Wetenschappen 1896 (p. 221—233); 1897 (p. 155—164); 1900 (p. 140—157; 206—305; 347—362; 380—393); 1893 (p. 48—59; 110—111); 1904 (p. 725—749.)

Persoon (C. H.) — Icones et Descript. Fungorum minus cognitorum. — Lipsiae, 1798; I et II, 4°.

Idem. — Icones pictae rariorum fungorum — Paris 1803—1806; fasc. I—IV, in 4°.

Idem. — Observationes mycologicae. — Lipsiae 1796—1799; 2 vol. in 8°.

Idem. — Synopsis methodica fungorum etc. — Goettingen 1801; 1 vol. in 8°.

Idem. — Tentamen dispositionis methodicae fungorum, etc. — Lipsiae 1797; 1 vol. in 8°.

Prodromus Florae Batavae; vol. II, pars III (1858) et IV (1866.)

Rabenhorst (L.) et **Gonnerman.** — Flora Europaea (Atlas iconum) 1872. — Fasc. VI in 4°.

Rostafinsky (J.) — Monographia Myxomycetum. — Parisiis 1875; 1 vol. 4°.

Rostkovius in **Sturm** Pilze IV, Nürnberg 1838; V, 1844.

Saccardo (P. A.) — Sylloge Fungorum omnium hucusque cognitorum. — Vol. I—XVI (1882—1902.)

Schaeffer (J. C.) — Fungorum qui in Bavaria nascuntur icones; 1762—1774, 4°.

Schrader (H. A.) — Nova genera Plantarum. — Lipsiae 1797; in folio.

Schumacher (C. F.) — Enumeratio plantarum in partibus Saellandiae septentrion. et orient. — Havniae 1801—1803; in 8°.

Scopoli (J. A.) — Flora carniolica II (1773), 8°.

Sturm (J.) Deutschlands Flora in Abbildungen etc., 3e Abth. (Pilze); 1813—1853; Heft I—36 et tab. col. n° 480.

Sydow (P. et H.) — Monographia Uredinearum. — Lipsiae 1902—1905.

T. N. G. = Tijdschrift voor Natuurl. Geschiedenis en Physiologie, door J. van der Hoeven en W. H. de Vriese. — Leiden 1834—1845. — Vol. XII, 8°.

Tode (H. J.) — Fungi Mecklenburgenses selecti. — Lüneburgi, 1790—1791, 2 vol. in 4°.

Tulasne (L. R.) — Fungi hypogaei. — Parisiis 1851. — 1 vol. in folio.

Idem. (L. R. et C.) Selecta Fungorum Carpologia. — Parasiis 1861—1865; 3 vol. in 4°.

Vittadini (C.) — Monographia Lycoperdinorum. — Augustae Turinorum; 1842; 1 vol. in 4°.

Willdenow (K. L.) — Florae Berolinensis Prodromus. — Berolini 1787; 1 vol. in 8°.

Weinmann (J. A.) — Hymeno- et Gasteromycetes hucusque in imp. Rossico observati. — 1836 in 8°.

LISTE ALPHABÉTIQUE

DES

GENRES ET DES FAMILLES

Blz.

A.

Abrothallus 22 ..... **364**
Acetabula 20..... **328**
Achlya 25..... **379**
Acladium 29..... **489**
Acolium 23..... **368**
Acrasiaceae 26..... **395**
Acrocylindrium 30..... **496**
Acrospermeae 19..... **324**
Acrospermum 19..... **324**
Acrostalagmus 30 ..... **496**
Acrothecium 31..... **513**
Actinonema 27 ..... **442**
Actinothyrium 28 ..... **165**
Aecidiolum 12..... **228**
Aecidium 12..... **209**
Aegerita 32..... **528**
Aethalium **386**
Agaricaceae 8..... **33. 42**
Agariceae 9.....
Agaricus 9..... **94**
Aglaospora 17..... **297**
Agyrium 22 ..... **360**
Albugo 25.

Blz.

Aleurodiscus..... **134**
Alternaria 31..... **522**
Amanita 8..... **42**
Amanitopsis 2..... **43**
Amaurosporae 25..... **384**
Amblyosporium 29 ..... **488**
Amphisphaeria 15..... **266**
Anellaria 9 ..... **98**
Angiocarpae..... **35**
Anixia 13..... **213**
Antennaria 13..... **216**
Anthina 33..... **538**
Anthostoma 17 ..... **289**
Anthostomella 15..... **263**
Apiospora 15..... **263**
Apiosporium 13..... **244**
Aposphaeria 26..... **418**
Arcyria 26..... **394**
Arcyriaceae 26..... **394**
Aregma (voir: Phacidium).
Aregma **195**
Armillaria 8..... **46**
Arthoniaceae 23..... **369**
Arthrinium 30..... **506**
Arthrobotrys 30..... **499**

Blz.

Arthrobotryum 32 526
Ascobolaceae 21 355
Ascobolus 21 357
Ascochyta 27 456
Ascomycetae 13 236
Ascophanus 21 355
Ascophora 375
Ascotricha 13 244
Aspergillus 29 487
Asterella 13 245
Asterina 13, 18 . . . . 241. 316
Asteroma 27 120
Asterophora 73
Asterosporium 29 180
Athelia 33 538
Aulographum 19 378
Auricularia 11 138
Auriculariae 11 138

B.

Badhamia 25 384
Barlaea 20 338
Barlaeina 20 337
Basidiomycetes 7 35
Belonidium 21 351
Belonium 21 355
Bertia 15 266
Bispora 31 509
Blennoria 172
Blitrydium 23 367
Bolacotricha 31 . . . . 370 508
Bolbitius 9 88
Boleteae 9 . . . .
Boletus 9 105
Bombardia 15 261
Bostrichonema 10 198
Botryodiplodia 27 136
Botryosphaeria 16 271
Botryosporium 29 186
Botrytis 29 191
Bovista 7 10

Blz.

Brachycladium 517
Brachysporium 31 515
Bremia 25 381
Bulgaria 22 360
Bulgariaceae 21 360
Bullaria 28 475
Byssus 539

C.

Caeoma 12 205
Caldesiella 10 125
Caliciaceae 23 368
Calicium 23 368
Calloria 22 . . . . 141 361
Calocera 10, 11 . . . . 130. 141
Calocladia 238
Caloneetria 18 315
Calosphaeria 17 282
Calospora 17 296
Calyptospora 12 151
Camarosporium 27 446
Camptoum 30 505
Cantharelleae 8 72
Cantharellus 8 72
Capnodieae 13 245
Capnodium 13 245
Carcerina 385
Carlia 11 246
Catharinea 11 259
Catinula 359
Celidium 23 369
Cenangium 21 358
Cenococcaceae 19 321
Cenococcum 19 321
Cephalosporium 29 186
Cephalotrichum 525
Ceratiomyxa 26 395
Ceratiomyxaceae 26 395
Ceratites 12 227
Ceratitium 12 . . . .
Ceratium 32 521

	Blz.
Ceratosphaeria 16	278
Ceratostoma 16	277
Ceratostomaceae 16	276
Ceratostomella 16	276
Cercospora 31	516. 522
Cercosporella 30	502
Ceriomyces 10	121
Ceuthospora 27	428
Chaetocladiaceae 24	377
Chaetocladium 24	377
Chaetomella 27	431
Chaetomidium 13	241
Chaetomium 15	265
Chaetosphaeria 15	269
Chaetostroma 32	534
Chaetostylum 24	376
Cheilaria 27	458
Chloridium 30	503
Chlorosplenium 21	347
Chondrioderma 25	388
Chromosporium 29	482
Chrysomyxa 11	149
Chytridiaceae 24	378
Ciboria 20	343
Cicinnobolus 27	421
Ciliciopodium 32	523
Cintractia 12	232
Circinella 24	375
Cladochytricae 24	379
Cladochytrium 24	379
Cladosporium 30	509
Clasterosporium 31	512
Clathrus 8	42
Claudopus 9	80
Clavaria 10	127
Clavariaceae 10, 33	127
Claviceps 18	315
Clitocybe 8	51
Clitopilus 9	79
Clonostachys 30	496. 542
Clypeosphaeria 15	264
Clypeosphaericae 15.	
Coccomyces 22	365
Coelosphaeria	273
Coemansiella 29	486
Coleosporium 11	149
Collybia 8	54
Colpoma 19	323
Comatricha 25	390
Conioeybe 23	368
Coniophora 11	137
Coniosporium 30	503
Coniothecium 31	518
Coniothyrium 27	429
Conoplea	507
Coprinus 9	101
Coprolepa 16	271
Cordyceps 18	316
Coremium 32	524
Coronophora 17	283
Corticium 10	132
Cortinarius 9	89
Coryne 22	110. 361
Coryneum 29	478
Craterellus 10	131
Craterium 25	387
Crepidotus 9	88
Cribraria 26	391
Cronartium 11	142
Cruciburum 7	36
Cryptocoryneum 31	512
Cryptomyces 22	362
Cryptosphaeria 17	287
Cryptospora 17, 27	297
Cryptosporella 17	289
Cryptosporium 29	480. 511
Cryptostictis 27	416
Cryptovalsa 17	287
Cucurbitaria 16	275
Cucurbitaricae 16	273
Cudoniella 20	327
Cyathicula 20	327

Blz.

Cyathus 7 35
Cylindrium 29 484
Cylindrocolla 32 529
Cylindrophora 29 491
Cylindrosporium 29 480
Cynophallus 11 560
Cyphelium 23 369
Cyphella 11 135
Cystopodaceae 25 380
Cystopus 25 380
Cytodiplospora 27 442
Cytospora 27 425
Cytosporella 27 424
Cytosporina 27 459

D.

Dacryomyces 11 . . . . . .
Dacryomyceteae 11 140
Dactylaria 30 499
Dactylium 502
Daedalea 10 120
Daldinia 16 280
Darluca 27 442
Dasyscypha 21 352
Deconica 9 101
Delitschia 16 272
Dematiaceae 30 503
Dematium 31 508
Dendrodochium 32 528
Dendrophoma 26 419
Dendryphium 31 517
Depazea 26 403
Dermatea 21 358
Dermateaceae 21 358
Dermatella 21 351
Dermodium 391
Desmazierella 21 350
Detonia 20 337
Denteromycetae 26 396
Diachaea 25 388
Diaporthe (Chorostate) 17 290

Blz.

(Euporthe) 17 292
(Tetrastaga 17 294
Diatrype 17 287
Diatrypella 17 288
Diehaena 19 319
Dichomera 27 448
Dicoccum 31 509
Dictydium 26 392
Dictyostelium 26 395
Diderma 385
Didymaria 30 498
Didymeae 25 388
Didymium 25 388
Didymella 14 252
Didymosphaeria 14 254
Didymosporium 28 . 475. 497
Dinemasporium 28 467
Diplocladium 30 498
Diplodia 27 439
Diplodina 27 439
Discella 28 467
Discina 20 336
Discosia 28 464
Discula 28 466
Ditiola 11 140
Ditopella 14 252
Doassansia 13 235
Dothichiza 28 465
Dothidea 18 300
Dothideaceae 17 298
Dothidella 17 299
Dothiora 22 . . . . . 366 435
Dothiora (Plenodomus) 26 419
Dothiorella 27 423
Durella 23 367

E.

Eccilia 9 80
Echinobotryum 30 504
Ectostroma 33 537
Elaphomyces 19 324

Blz.

Elaphomycetaceae 19.... 324
Empusa 24..... 378
Enchnoa 14..... 261
Endomyces 23..... 372
Endomycetaceae 23..... 372
Endophylleae 11..... 142
Endophyllum 11..... 142
Enerthenema 25..... 391
Entoloma 8..... 78
Entomophthoraceae 24... 378
Entomosporium 28..... 464
var Cydoniae..... 465
Entyloma 12..... 233
Epichloë 18..... 315
Epicoccum 32..... 533
Epicymatia 11..... 250
Epidochium..... 474
Epochnium 31..... 512
Erysiphe 13..... 239
Erysipheae 13..... 236
Eubasidiae..... 35
Euroticae 13..... 243
Eurotium 13..... 243
Eustegia 22..... 361
Entypa 17..... 286
Entypella 17..... 285
Excipula 28..... 165
Excipulaceae 28..... 165
Exidia 11..... 138
Exoascaceae 23..... 370
Exoascus 23..... 370
Exobasidieae 11..... 138
Exobasidium 11..... 138
Exosporina 32.....
Exosporium 32..... 534

F.

Fabraea 22..... 361
Fenestella 17..... 297
Fistulina 9..... 108
Flammula 9..... 85

Blz.

Fomes 10..... 116
Fuckelia 27..... 424
Fuligo 25..... 386
Fumago 31..... 522
Fusarium 32..... 530
Fusicladium 31..... 511
Fusicoccum 27..... 424
Fusidium 29..... 483
Fusisporium..... 532
Fusoma 30..... 499

G.

Galera 9..... 87
Geaster 7..... 36
Geoglosseae 20..... 327
Geoglossum 20..... 327
Geopyxis 20..... 328
Geotrichum 29..... 484
Gibberella 18..... 315
Gliocladium 29..... 489
Gloeosporium 28..... 469
Gloniopsis 19..... 321
Glonium 19..... 319
Gnomonia 16..... 277
Gnomoniella 16..... 276
Gomphidius 9..... 101
Gonatobotrys 30..... 497
Goniosporium 30..... 506
Gonytrichum 31..... 508
Gorgoniceps 21..... 355
Grandinia 10..... 126
Graphiola 13..... 236
Graphium 32..... 525
Gymnoascaceae 23..... 370
Gymnosporangium 12... 163
Gymnosporium..... 503
Gyrodon 9..... 104
Gyromitra 20..... 325

H.

Hadrotrichum 31..... 507

	Blz.
Haimesia 28	168
Halonia	252
Haplaria 29	189
Haplariopsis 29	189
Haplographium 31	508
Haplosporella 27	131
Hebeloma 9	82
Helicosporium 32	522
Helminthosporium 31	511
Helmisporium	511
Helotium 20	313
Helvella 20	326
Hevellaceae 20	325
Hemitrichia 26	393
Hendersonia 27	113 511
Hercospora 17	290
Herpotrichia 15	268
Heterodermeae 25	391
Heterosphaeria 22	366
Heterosporium 31	513 512
Himantia 33	539
Hirneola 14	138
Holobasidieae 35.	
Homostegia 18	301
Hormiactis 30	197
Hormiscium 30	505
Hormodendrum 30	506 512
Humaria 20	338
Hyalostilbum	523
Hydnaceae 10	33
Hydnangium 7	11
Hydnum 10	122
Hydrophora	373 374
Hygrophorus 8	61
Hymenangium	11
Hymenochaete 14	137
Hymenogastraceae 7	11
Hymenopsis 32	531
Hymenoscypha	316
Hymenula 32	528
Hypha 33	539
Hyphelia	195
Hyphoderma 29	189
Hypholoma 9	96
Hypochneae 14	137
Hypochnus 14	137
Hypocopra 15	270
Hypocrea 18	314
Hypocreaceae 18	311
Hypoderma 19	321
Hypomyces 18	314
Hyponectria 18	311
Hypospila 15	263
Hypoxylon 16	279
Hysteriaceae 19	318
Hysterieae 19	318
Hysterium 19	319
Hysterographium 19	321

I.

Illosporium 32	528
Inocybe 9	83
Irpex 10	125
Isaria 32	524
Isariopsis 32	525
Hyphallus 7	11

K.

Karschia 22	366
Karstenula 14	262
Kickxella 13	213 186
Kneiffia 10	126

L.

Labrella 28	163
Lachnea 20	310
Lachnella 21	350
Lachnum 20	310
Lactarieae 8	66
Lactarius 8	66
Laestadia 14	246
Lamproderma 25	391

	Blz.
Lamprosporae 25	391
Lasiobolus 21	356
Lasiosphaeria 15	267
Lecanidion 23	367
Lecythea	198
Lembosia 19	319
Lentinus 8	75
Lenziteae 8	76
Lenzites 8	76
Leocarpus 25	387
Leotia 21	360
Lepidoderma 25	389
Lepiota 8	14
Leptonia 9	79
Leptosphaeria 14	255
Leptostroma 28	463 541
Leptostromaceae 28	
Leptostromella 28	465
Leptothyrium 28	460
Leucoloma 20	339
Leucosporae 8	
Libertella 29	481
Licea 26	392
Liceae	392
Linospora 15	261
Lizonia 16	271
Lophidium 18	318
Lophiostoma 18	317
Lophiostomaceae 18	317
Lophiotrema 18	377
Lophium 19	323
Lophodermium 19	322
Lycogala 26	391
Lycogaleae 26	391
Lycoperdaceae 7	36
Lycoperdon 7	38

M.

Macrophoma 26	417
Macropodia 20	339
Macrosporium 31	520
Marasmieae 8	73
Marasmius 8	73
Marsonia 28	475
Massaria 14	262
Massarieae 14	261
Massariella 14	261
Massarina 14	261
Mazzantia 17	298
Melampsora 11	143
Melampsorae 9	
Melampsoreae 11	142
Melampsorella 11	148
Melampsoridium 11	148
Melanconiaceae 28	468
Melanconis 17	289
Melanconium 28	473
Melanogaster	41
Melanomma 15	268
Melanopsamma 15	266
Melanotaenium 12	231
Melasmia 28	461
Melogramma 17	297
Melomastia 15	267
Merulius 10	121
Metasphaeria 14	254
Microglossum 20	327
Micropera 27	459
Microsphaera 13	238
Microsticta 28	468
Microthyriaceae 18	316
Microthyrium 18	316
Mitrula 20	326
Mollisia 21	348
Monacrosporium 30	499
Monascaceae 24	373
Monilia 29	483
Monosporium 29	491
Monotospora 30	507
Morchella 20	325
Morchelleae 20	325
Mortierella 24	377

Blz.

Mortierellaceae 24..... 377
Mucedinaceae 29..... 482
Mucor 24..... 373
Mucoraceae 24..... 373
Mucoreae 24..... 373
Mucronella 10..... 126
Mutinus 7..... 41
Mycelia sterilia 33.
Mycena 8..... 56
Mycogala 26..... 419
Mycogone 30..... 498
Myeosphaerella 14..... 247
Myiocopron 18..... 316
Myrothecium 32..... 531
Mytilidion 19..... 321
Myxomycetaceae 25..... 384
Myxomycetae 25..... 384
Myxosporium 28..... 471
Myxotrichum 23..... 370

N.

Naemaspora 28..... 472
Naematelia 11..... 140
Naematogonium 30.....
Naevia 22..... 362
Napicladium 31..... 516
Naucoria 9..... 86
Nectria 18..... 312
Nectriella 18..... 311
Nectroidaceae 28.
Nematogonium 30..... 497
Neottiella 20..... 341
Nidularia 7..... 35
Nidulariaceae 7..... 35
Niptera 21..... 354
Nitschkia 16..... 273
Nolanea 7..... 79
Nummularia 16..... 281
Nyctalis 8..... 73

Blz.

O.

Ochrospora 12..... 152
Ochrosporae 9..... 80
Odontia 10..... 127
Oedocephalum 29..... 485
Oidium 29..... 484
Ombrophila 22..... 360
Omphalia 8..... 61
Oomycetae 24..... 378
Oospora 29..... 482
Ophiobolus 16..... 278
Orbicula..... 244
Orbilia 22..... 360
Otidea 20..... 336
Otthia 16..... 274
Ovularia 30..... 494. 542
Ozonium 33..... 538

P.

Pachybasium..... 493 494
Pachyphlaens 19..... 324
Panaeolus 90..... 97
Panus 8..... 75
Passalora 31..... 511
Patellaria 22..... 366
Patellariaceae 22.
Patellina 32..... 529
Patinella 22..... 366
Paxillus 9..... 93
Penicillium 29..... 488
Peniophora 11..... 134
Perichaena 26..... 394
Periconia 30..... 506
Peridermium 12..... 224
Peridermium (voir: Coleosporium et Cronartium)
Periola 32..... 529
Perisporiaceae 13..... 236
Perisporicae 13..... 243
Perisporium 13..... 245

	Blz.
Peronospora 25	382
Peronosporaceae 25	381
Pestalozzia 29	179
Pezicula 20	347
Peziza 20	329
Pezizaceae 20	328
Pezizella 20	346
Phacidiaceae 22	362
Phacidium 22	362
Phacopezia 21	354
Phallaceae 7	41
Phallus	42
Phialea 20	344
Philocopra 16	272
Phlebia 10	126
Phleospora 27	458
Phlyctaena 27	458
Pholiota 9	80
Phoma 26	403
Phomatospora 14	296
Phragmidium 12	195
Phycomyces 24	375
Phycomycetae 24	373
Phyllachora 17	298
Phyllactinia 13	237
Phylloedia 32	528
Phyllosticta 26	396
Phymatotrichum 29	493
Physalospora 14	252
Physareae 25	384
Physarum 25	381
Phytomyxaceae 26	395
Phytophthora 25	381
Piggotia 28	461
Pilacre 11. 32	128. 524
Pilacreae 11	138
Pilaira 24	376
Pilidium	168
Pilobolus 24	376
Pionnotes 32	533
Piptocephalideae 24	377
Piptocephalis 24	377
Pirostoma 28	464
Pistillaria 10	131
Placosphaeria 27	424
Plasmodiophora 26	395
Plasmopara 25	381
Platystomum 18	318
Plenodomus 26	419
Pleomassaria 14	261
Pleosphaeria 15	269
Pleospora 14	259
Pleosporeae 14	252
Pleurotus 8	62
Plicaria	329
Plowrightia 17	299
Plutens 8	77
Podisoma	163
Podosphaeria 13	236
Polyactis	491
Polydesmus 31	513
Polynema	467
Polyporaceae 9	33
Polyporus 10	108
Polyscytalum 29	484
Polystictus 10	115
Polystigma 18	312
Polythrincium 31	301. 512
Poria 10	118. 122
Poronia 16	281
Prismaria 30	502
Proabsidia	375
Propolis 22	361
Prosthemium 27	445
Protoclavarieae 11	141
Protomyces 23	372
Protomycetaceae 23	372
Psalliota (voir Agaricus)	94
Psammina 29	477
Psathyra 9	99
Psathyrella 9	100
Pseudohelotium 20	346

Blz.

Pseudopeziza 22 363
Pseudoplectania 20 340
Pseudovalsa 17 296
Psilocybe 9 98
Psilospora 28 165
Ptychogaster 121
Puccinia 12 161
Pucciniеae 12 154
Pucciniastrum 12 152
Pustularia 20 337
Pyrenochaeta 27 421
Pyrenopeziza 21 349
Pyrenophora 14 261
Pyronema 26 337
Pythieae 25 379
Pythium 25 379

Q.

Quaternaria 17 283

R.

Rabenhorstia 27 123
Radulum 10 126
Ramularia 30 . . . . . 386. 500
Reticularia 26 392
Reticulariеae 26 392
Rhabdospora 27 456
Rhacodium 33 539
Rhaphidospora 16 278
Rhizideae 24.
Rhizoctonia 33 537
Rhizomorpha 33 537
Rhizophidium 24 379
Rhizopogon 7 11
Rhizopus 24 375
Rhodosporae 8.
Rhopalomyces 30 . . . 485. 505
Rhopographus 18 301
Rhytisma 22 365
Roesleria 23 368

Blz.

Roestelia 12 227
Rosellinia 15 264
Russula 8 69
Ryparobius 21 357

S.

Saccharomyces 23 371
Saccharomycetaceae 23 . . 371
Saccobolus 21 358
Sacidium 28 163
Saprolegniaceae 25 379
Saprolegnieae 25 379
Schizoderma 518
Schizophyllum 8 76
Schizothyrium 19 318
Scirrhia 17 299
Scleroderma 7 40
Sclerodermaceae 7 . . . . 33. 40
Scleroderris 21 359
Scleroplea 14 261
Sclerotinia 20 . . . . 342. 541
Sclerotiopsis 26 419
Sclerotium 33 535
Scolecosporium 29.
Scolecotrichum 31 511
Scutula 21 355
Selenia 27 421
Sepedonium 30 491
Septocylindrium 30 499
Septogloeum 28 477
Septomyxa 28 476
Septoria 27 448
Septoriella 27 448
Septosporium 31 521
Sepultaria 20 341
Sillia 17 298
Sistotrema 10 125
Solenia 10 122
Solenopezia 21 355
Sordaria 15 269
Sordarieae 15 269

	Blz.
Sorosporium 12	232
Sparassis 10	127
Spathularia 20	328
Spathulea	328
Speira 31	519
Sphacelia 32	528
Sphacelotheca 12	232
Sphaerella 14	217
Sphaerelleae 13	216
Sphaeria 18	301
Sphaeriaceae 15	261
Sphaerioidaceae 26	396
Sphaerobolus 7	36
Spharoderma 18	312
Sphaeronaema 26	419
Sphaeronaemella 28	459
Sphaeropsidaceae dubiae	468
Sphaeropsis 27	430
Sphaerotheca 13	236
Sphaerulina 14	252
Sphinctrina 23	369
Spicaria 30	496
Spinellus 24	375
Splanchnomyces	41
Sporendonema 29	482
Sporocybe 32	526
Sporodesmium 31	519
Sporodinia 24	376
Sporodum	506
Sporomega 19	323
Sporonema 28	466
Sporoschisma 31	513
Sporotrichum 29	489
Sporormia 16	272
Spumaria 15	389
Stachybotrys 30	506
Stachylidium 31	508
Stagonospora 27	413 511
Steganosporium 29	480
Stegia 22	361
Stemonitis 25	390
Stemphylium 31	520
Stereum 10	131
Sterigmatocystis 29	487
Stictidaceae 22	361
Stictis 22	362
Stigmatea 14	250
Stigmella 31	518
Stilbaceae 32	522
Stilbospora 29	477
Stilbum 32	522
Strobilomyces	108
Stropharia 9	95
Strumella 32	534
Stysanus 32	526
Syncephalis 24	377
Synchytricae 24	378
Synchytrium 24	378

T.

	Blz.
Tapesia 21	349
Taphrina 23	370
Teichospora 15	269
Tetraploa 31	519
Thamnidium 24	376
Thecaphora 12	233
Thecopsora 12	153
Thelebolus 7, 24	36. 273
Thelephora 11	136
Thelephoraceae 10, 33	131
Therrya 15	263
Thoracella 27	442
Thyrsidium 28	474
Tilachlydium 32	523
Tilletia 12	233
Tilletieae 12	233
Tilmadoche	387
Titaea 30	502
Torrubia 18	315
Torula 30	504
Torulopsis 31	508

Blz.

Trametes 10. 120
Trematosphaeria 15. 268
Tremella 11. 139
Tremellaceae 11, 33. . . . 138
Trichiceae 26. 393
Trichia 26. 393
Trichobasis. 198
Trichocladium 29. . . 486. 509
Trichoderma 29. 486
Tricholoma 8. 47
Trichopeziza 21. 351
Trichophila 28. 464
Trichosphaeria 15 264
Trichosporium 31 507
Trichothecium 30 498
Trinacrium 30. 502
Triphragmium 12 198
Triposporium 32. 522
Trochila 22. 364
Trullula 28. 473
Tubaria 9. 87
Tuber 19. 325
Tuberaceae 19. 324
Tubercularia 32. 526
Tuberculariaceae 32. 526
Tubereae 19. 324
Tubulina 26 392
Tubulineae 26. 392
Tulostoma 7. 36
Tympanis 21. 359
Typhula 10. 130

Blz.

U.

Ulocladium. 520
Ulocolla 11. 138
Uncinula 13 237
Uredinaceae 11. 142
Uredo 12 199
Urocystis 13 235
Uromyces 12. 151
Ustilaginaceae 12. 329
Ustilago 12. 229
Ustulina 16. 281

V.

Valsa 17. 283
Valsaceae 17. 282
Valsella 17 286
Venturia 14. 251
Vermicularia 27. 421
Vermiculariella 27. 441
Verpa 20. 326
Verticiladium 31. 508
Verticillium 30 495
Vialaea 17. 298
Volutella 32 529
Volvaria 8. 77

X.

Xylaria 16. 281
Xylariaceae 16. 279
Xylostroma 33. 540

Z.

Zignoëlla 15 266
Zygodesmus 31. 507
Zygomycetae 24. 373
Zythia 28. 459

A insérer à la page 541, après les 3 lignes, dédiées aux Discomycètes :

EXOASCACÉES.

1. **Taphrina Johansonii** Sadebeck (Krit. Untersuchungen über die durch Taphrina-Arten hervorgebrachten Baumkrankheiten, in Jahrb. der Hamburger Wissens. Arbeiten VIII, 1890; Sacc. Syll. X, 68). — Sur les ovaires du *Populus tremula*, Winschoten, 18 Mai 1905. — Mr. Schipper.

2. **Taphrina rhizophora** Johanson (Bot. Centralbl. 1888. Bd. XXXIII; Sadebeck Krit. Unters. etc. l. c.; Sacc. Syll. VIII, 813). — Sur les ovaires du *Populus alba;* Meeden près de Winschoten, 25 Mai 1905. — Mr. Schipper.

QK608.N4 O79 gen
Oudemans, C. A. J./Catalogue raisonne de
3 5185 00034 5239